

Nachruf auf ein nordburgenländisches Feuchtgebiet

JOHN C. REID

Im Viereck zwischen Zurndorf, Nickelsdorf, Deutsch Jahrndorf und Pama befand sich zwischen Leitha und Kleiner Leitha ein ausgedehntes Feuchtgebiet, das im Sommer zahlreiche seltene Brutvögel und im Winter eine lange Reihe ausgefallener Wintergäste beherbergte (Tab. 1). Wegen seiner eminenten ornithologischen Bedeutung wurde das Gebiet 1979 in die Liste der Wasservogelgebiete von nationaler Bedeutung (FAUNISTISCHES GREMIUM DER ÖGV, 1979) aufgenommen.

Obwohl der biologische Wert des Gebiets dokumentiert und den burgenländischen Naturschutzbehörden, Naturschutzorganisationen und Landesjagdbehörden bekannt war, wurde es ab Herbst 1980 im Zuge landwirtschaftlicher Wasserbaumaßnahmen brutal entwässert. Bei meinem letzten Besuch in diesem ehemaligen Vogelparadies im Herbst 1985 befand sich das einzige sichtbare Wasser in zwei künstlichen Teichen, die mittels unterirdisch verlegtem Rohr aus der Kleinen Leitha mit Wasser versorgt

wurden. Auf einem der Teiche befanden sich Lockenten.

Als Folge der Entwässerung verschwanden mit Ausnahme des Kiebitzes alle in der Tab. 1 angeführten Brutvögel aus dem Gebiet. Statt ihnen gedeiht dort nun eine Wildnis von Getreidefeldern. Ihre Produkte werden den vorhandenen Getreideberg vergrößern.

Literatur

FAUNISTISCHES GREMIUM DER ÖGV (1979):
Die Wasservogelgebiete Österreichs von internationaler und nationaler Bedeutung. Egretta 22, Sonderheft, 1-27.

Anschrift des Verfassers:

John C. Reid
Dominikanerbastei 21/71
A-1010 Wien

Brutvögel (Feuchtgebiet):	Brutvögel (Waldland):	Wintergäste:
Großtrappe	Blauracke	Seeadler
Großer Brachvogel	Bienenfresser	Schelladler
Uferschnepfe	Wiedehopf	Rotmilan
Kiebitz	Mäusebussard	Fischadler
Flußregenpfeifer	Baumfalke	Merlin
Rotschenkel	Nachtigall	Steppenweihe (2 Jahre)
Knäkente	Schwarzstürnwürger	Rauhfußbussard
Schnatterente	Pirol	Habicht
Spießente		Kranich (3 Jahre)
Löffelente		Saruskranich (Irrgast)
Tüpfelsumpfhuhn		Silberreiher
Wasserralle		Nachtreiher
Teichhuhn		Seidenreiher (1 Jahr)
Sumpfohreule		Doppelschnepfe (1 Jahr)
Rohrweihe		Zwergschnepfe (2 Jahre)
Wiesenweihe (?)		Raubseeschwalbe
		div. Anser-Arten
		Rostgans (1 Jahr)

Tabelle 1. Liste der ehemaligen Brutvögel und Wintergäste des Leitha-Feuchtgebiets zwischen Zurndorf, Nickelsdorf, Deutsch Jahrndorf und Pama.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelschutz in Österreich - Mitteilungen von Birdlife Österreich](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Reid John C.

Artikel/Article: [Nachruf auf ein nordburgenländisches Feuchtgebiet 29](#)