


# Eisvögel abseits der Brutgebiete

**An ihre Brutreviere** stellen Eisvögel hohe Ansprüche, die bei uns vor allem in naturnahen Auwäldern erfüllt werden. Doch wenn die Brutzeit im Spätsommer vorbei ist, müssen die Jungvögel das elterliche Revier verlassen. Auch die Weibchen bleiben selten das ganze Jahr über an einem Ort. So kommt es meist ab August zu Beobachtungen von Eisvögeln auch an Gewässern, die für die Aufzucht von Jungen nicht ausreichen würden, aber einem einzelnen Eisvogel genügend Nahrung bieten. Kleine Schotterteiche, flache Seen ohne Abbruchkanten weit und breit, ja sogar Park- oder Gartenteiche können so zur vorübergehenden Herberge für den Vogel werden. Halten Sie also ab Spätsommer auch an kleineren Gewässern Ausschau nach diesem besonderen Gast. Übrigens können Eisvögel trotz ihres schillernden Gefieders erstaunlich unauffällig sein und oft genug wird man auf sie erst wegen der durchdringenden Rufe (tjih) auf sie aufmerksam. Diese äußern sie oft auch im Flug. Man sollte also am besten nach einem geradlinig am Ufer entlang schießenden, kleinen blauen Vogel Ausschau halten, wenn man die Rufe vernimmt. Wenn er sich dann eine geeignete Sitzwarte am Ufer gesucht hat, hat man vielleicht sogar das Glück, ihn bei der Jagd beobachten zu können.

Foto: M. Tiefenbach



Eisvogel nach erfolgreichem Jagdflug aus dem Wasser auftauchend – gut sichtbar – die geschlossene helle Nickhaut über den Augen.



Foto: M. Dvorak

Die größten Brutbestände erreichen Eisvögel entlang der Donau und der größeren Flüsse im Alpenvorland Oberösterreichs, Niederösterreichs und der Steiermark. Auch zur Zugzeit hat man in diesen Gebieten die größten Chancen auf Beobachtungen. Aber auch im Burgenland, in Unterkärnten und dem Salzburger Flachgau, dem Vorarlberger Rheintal und vereinzelt sogar in Tirol ist er als Brutvogel, häufiger noch als Durchzügler oder an eisfreien Gewässern auch als Wintergast anzutreffen. Allerdings können von Jahr zu Jahr, je nach Bruterfolg und Härte des vorangegangenen Winters, die Bestände und damit die Wahrscheinlichkeit einer Beobachtung stark schwanken.

Eva Karner-Ranner

**Auch kleinere Schotterteiche können nach der Brutzeit Eisvögel beherbergen.**

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelschutz in Österreich - Mitteilungen von Birdlife Österreich](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [026](#)

Autor(en)/Author(s): Karner-Ranner Eva

Artikel/Article: [Der Eisvogel abseits der Brutgebiete. 5](#)