Beitrag zur Flora Niederösterreich's

aus dem Herbare Dr. A. Putterlik's.

Von.

Dr. H. W. Reichardt.

Vorgelegt in der Sitzung am 7. August 1861.

In den letzten Monaten war es meine Beschäftigung im k. botanischen Museum, das Herbar des für die Wissenschaft leider viel zu früh verstorbenen Custos-Adjuncten Dr. A. Putterlik durchzugehen um das für das

k. Herbar Brauchbare zum Behufe der Einreihung auszuscheiden.

Bei dieser Durchsicht fand ich eine ziemlich bedeutende Zahl von
Arten, welche in der Literatur bisher für Niederösterreichs Flora nicht auf-

geführt waren.

Obwohl es mir sehr auffallend erscheint, dass Dr. Putterlik, als er noch lebte, gegen keinen einzigen seiner botanischen Freunde Erwähnung von diesen Funden machte; obwohl ich bekenne, dass ich gegen die Richtigkeit einzelner Angaben im Herbare Dr. Putterlik's gewichtige Bedenken hege: So ist doch das folgende Verzeichniss für die Botaniker Niederösterreichs von so grossem Interesse, dass ich glaube, es zur allgemeineren Kenntniss bringen zu müssen.

Ich kann für die im folgenden Verzeichnisse aufgeführten Angaben nur in so ferne einstehen, als im Putterlik'schen Herbare wirklich die genannten Arten mit Etiquetten, die angegebenen Standorte enthaltend, sich vorfinden. Ob diese Pflanzen wirklich an den angegebenen Orten vor-

kommen, darüber kann ich keine nähere Auskunft geben.

Ich theile die folgenden Angaben aus dem Herbare Putterlik's den geehrten Mitgliedern der Gesellschaft vorzüglich aus dem Grunde mit, damit sie bei ihren Ausflügen sorgsam auf die folgenden Arten achten mögen. Dann werden wir bald in der angenehmen Lage sein, ein sicheres Urtheil darüber abzugeben, ob die im folgenden Verzeichnisse namhaft gemachten Pflanzen wirklich gute Bürger der Flora Niederösterreichs sind oder nicht.

Aspidium Thelypteris Sw. Auf Sumpfstellen am Kuhschneeberge.

(Putterlik).

Alosurus crispus Bernh. Am Wechsel (Portenschlag). Botrychium matricarioides W. Um Pottenstein (Putterlik).

Avena planiculmis Schrad. liegt in einem Exemplare vom Hirschberge bei Melk. jedoch ohne Bezeichnung des Sammlers, vor.

Glyceria festucaeformis Heynhold. Auf Wiesen um den Neusiedler See (Hayne, Putterlik). Sie wurde von mir bei dem Anfangs Juni nach dem Neusiedler See unternommenen Ausfluge nicht auf den mageren Triften unmittelbar am Seestrande, sondern auf den fetten Wiesen unmittelbar um Goyss beobachtet.

Carex ericetorum Poll. Diese Pflanze liegt mit einer folgende Bezeichnung tragenden Etiquette vor: "In collibus arenosis Austriae (Portenschlag)". Es lässt sich nicht entscheiden, ob unter Austria das Kaiserthum oder nur Niederösterreich gemeint ist. Mir scheint das erstere wahrscheinlicher.

Juncus Tenageja Ehrh. a. brunneus Neilreich. Ad litora piscinarum prope Schrems; nec alio loco in archiducatu Austriae visus (Welwitsch).

Malaxis paludosa Sw. Auf Torfwiesen um Schrems (Welwitsch). Amarantus Blitum L. \(\beta \). prostratus Fenzl. Um Wien (Dolliner). Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Pr. Fenzl kommt diese Form auch in Weingärten um Dürrenstein, Staatz und Aspern an der Zaya vor; sie ist jedoch sehr selten.

Plantago Lagopus L. und

Plantago Coronopus L. wurden einmal in einem Kleefelde um Hernals beobachtet (Leydolt).

Ptarmica oxyloba DC. (Anthemis alpina L.). Am Hochschneeberge.

August 1838 (Putterlik).

Cineraria palustris L. Sumpfwiesen um Gutenbrunn im Waldviertel; der Name des Sammlers ist leider nicht angegeben, vielleicht ist es Welwitsch.

Centaurea nigra L. Auf Bergabhängen zwischen Gesträuchen um

Wien (Putterlik).

Zarduus Brunneri Döll (C. nutanti-defloratus Döll). Auf trockenen, wüsten Plätzen, sonnigen Anhöhen um Wien (Putterlik). Dieser schöne Blendling, welcher vollkommen mit der Beschreibung Döll's (Flora von Baden, II. p. 964) übereinstimmt, dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach im Helenenthale bei Baden zu finden sein.

Cirsium acaule Scop. Auf trockenen Wiesen der Vorberge des Schnee-

berges.

🔀 Cirsium Siegertii Schultz bip. (cano-rivulare Siegert) lag unter Cirsium canum M. B. von nassen Wiesen um Wien (Putterlik).

Aposeris foetida DC. Kuhschneeberg (Putterlik).
Thrincia hirta Roth. Auf feuchteu Wiesen in den Donauauen (Putterlik); auf sandigen, steinigen Triften um Wiener-Neustadt (Welwitsch). Gentiana bavarica L. Auf feuchten Stellen am hohen Oetscher (Hayne). Pedicularis asplenifolia Floerk. Oetscher (Hayne).

Oenanthe pimpinelloides L. Von dieser Pflanze liegen von Putterlik gesammelte Exemplare von den Sumpfwiesen um Himberg und Moosbrunn vor. Elatine Hydropiper L. findet sich aus dem Prater von Putterlik

Trifolium spadiceum L. Sumpfwiesen um Dornbach.

Trifolium striatum L. wurde schon von Hayne und Putterlik am Laaërberge beobachtet.

2005

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen</u> Gesellschaft in Wien. Frueher: <u>Verh.des Zoologisch-Botanischen</u> <u>Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"</u>

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Reichardt Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Beitrag zur Flora NiederösterreichÂ's aus dem

Herbare Dr. A. PutterlikÂ's. 371-372