

Diagnosen der neuen Arten von Pilzen, welche die Novara-Expedition mitbrachte.

Von

Dr. H. W. Reichardt,

Docenten an der Wiener Universität.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. März 1866.

Myxomycetes.

Lycogala lejosporum Rchdt. Peridium subglobosum, e griseo fuscescens, punctato-saberulum, ore irregulariter dehiscens, sporae minimae $\frac{1}{600}$ " magnae, globosae, laevissimae, fuscescentes.

Neu-Holland. Auf faulen Stämmen um Sidney I. Jelinek.

Gasteromycetes.

Polysaccum leptothecum Rchdt. Peridium subsessile, subglobosum, castaneo-nigrescens, tuberculato-areolatum, peridiola tenerrima, fusca, polygona, capillitio albescenti, sporae sphaericae, $\frac{1}{500}$ " magnae, granulatae, alutaceae.

Neu-Seeland. Auf sandigem Boden in den Umgebungen von Nelson l.v. Hochstetter.

Eriosphaera Rchdt. Novum genus. Peridium ignotum (verosimilime simplex, caducissimum moxque evanescens); capillitium ab eo discretum, in statu adulto perfecte liberum et totum fungum formans, in pilam elasticam laneam densissime intertextum; sporae globosae, floculis tenellis, laevibus, ramosis mox inspersae.

Genus eximium, cum nullo alio *Lycoperdinearum* commutandum, *Lanopilae* Fr. proximum, sed peridio caduco non persistenteque toto coelo diversum.

E. Fenzlii Rchdt. Peridium ignotum capillitium globum pedalem et ultra formans, ferrugineum, e floccis ramosis tenellis, laevibus, $\frac{1}{400}$ " crassis densissime contextum; sporae basidiis clavatis insidentes, globosae, $\frac{1}{300}$ " magnae, e griseo fuscescentes, verruculosae.

Das Vaterland liess sich mit Sicherheit leider nicht ermitteln. Nach den mündlichen Mittheilungen des Herrn Hofgärtners Jelinek stammt dieser Pilz höchst wahrscheinlich von den Nicobaren.

Hymenomycetes.

Pterula Tahitensis Rchdt. Caespitosa, 6" alta, caulescens, crocea, cornea, basi pilis fasciculatis canescentibus strigosa, dichotoma, ramis apice compressis, obtusis; sporae globosae, $\frac{1}{300}$ " magnae, albae, laeves.

Tahiti. Auf faulenden Stämmen in Wäldern um Papiete l. Jelinek.

Hydnum griseo-fuscescens Rchdt. Apus, pilei imbricati, carnososo-lenti, tenaces, plani; dense villosi, zonati, e griseo fuscescentes, margine integro, reflexo; aculei confertissimi, subuliformes, pallescentes sporae fuscae, laeves, ellipticae, $\frac{1}{400}$ " magnae.

Neu-Holland. Auf faulenden Stämmen von *Eucalyptus* in den Umgebungen von Sidney l. Jelinek.

Trametes aphanopus Rchdt. Pileus sessilis, tuberculo laterali vix conspicuo affixus, coriaceo-membranaceus, plano depresso, obsolete zonatus, velutinus, alutaceus, margine lobato, obtuso, sterili fuscescens, contextus floccoso suberosus albidus. Pori minutissimi, rotundi obtusi, pileo concolores; sporae ellipticae albidae, laeves $\frac{1}{300}$ " magnae.

Tahiti. Auf faulenden Stämmen in Urwäldern um Fataua l. Jelinek.

Trametes Rhizophorae Rchdt. Stipes brevis, lateralis, piceo-nigricans; pileus suberosus, rigidus, tenax, rotundatus vel reniformis, plano-convexus, e griseo gilvus, velutinus, indumento secedente, obsolete zonatus, margo obtusus, integer vel sublobulatus, sterilis, contextus floccoso-suberosus; pori pileo concolores, rotundi, minimi, oculo nudo vix conspicui. Sporae ellipticae, parvae, $\frac{1}{300}$ " magnae, laeves, albidae.

Nikobaren. Auf Stämmen von *Rhizophora* in der Südbucht von Kar Nikobar, l. Jelinek.

Polyporus Fatarensis Rchdt. Resupinatus, irregulariter effusus, extus et in contextu ferrugineus, tenuis, stuposo-membranaceus, margine nudus, liberatus, obtusus, sterilis; pori minimi, umbrini, angulati, obtusi, glabri, intus gilvi, sporae minutae, $\frac{1}{300}$ " magnae, globosae, laeves, fuscae.

Tahiti. Auf faulenden Stämmen in Urwäldern um Fataua, l. Jelinek.

Polyporus Jelinekii Rchdt. Apus, pileus umbilicato sessilis, reniformis; plano-convexus, basi depresso, carnosus-lentus, alutaceo-fuscescens, contextu coloratus, strigulosus, scruoso rugulosus, zonis concentricis saturationibus fasciatus; margo plerumque integer, rarius lobulatus, concolor, acutus, subtus angustus sterilis. Pori minutissimi, oculo nudo vix conspicui, rotundi, aequales, obtusi, ex albido fuscescentes. Sporae fuscae, globosae, laeves, $\frac{1}{200}$ " magnae.

Tahiti. Auf faulenden Stämmen um Papiete. Jänner 1859, I. Jelinek.

Panus Tahitensis Rchdt. Stipes definite lateralis, brevissimus; pileus reniformis, coriaceo-lentus, plano convexus, basi depresso, ex albido alutaceus, glaberrimus; margo inflexus integerrimus (in specimibus mancus). Lamellae non decurrentes, firmae, confertae, ex ochroleuco fuscescentes, sporis pulverulentae; sporae albae, $\frac{1}{300}$ " magnae, ellipticae, laeves.

Tahiti. Auf faulen Stämmen in Wäldern um Papiete, I. Jelinek.

Lentinus umbrinus Rchdt. Stipes glaber, firmus, solidus, nigrescens, umbrino variegatus; pileus infundibuliformis, regularis vel sub-excentricus, coriaceo-lentus, umbrinus, striis radialibus saturationibus notatus, laevis, glaber, margine acuto revoluto irregulariter crenulatus. Lamellae pileo concordes, longe decurrentes, tridymae, latae, densae, acie acuta denticulatae. Sporae albae, globosae, laeves $\frac{1}{400}$ " magnae.

Tahiti. Vereinzelt auf faulenden Stämmen in Wäldern um Papiete. I. Jelinek.

Lentinus stenophyllus Rchdt. Stipes brevis, nigrescens, fusco-striatus, solidus, durus; pileus infundibuliformis, regularis, rigidus, papyraceus, e fusco pallescens, laevis, glaber, sub lente radiato-striatus, margine reflexus, crenulatus. Lamellae fuscae, densissimae, lineatim longissime decurrentes, inaequales, polydymae, angustissimae, vix tertiam lineae partem latae, acie acuta crenulato-lacerae; sporae laeves, ellipticae, $\frac{1}{500}$ " longae, fuscescentes.

Nikobaren. Auf faulenden Stämmen in Wäldern an der Westseite von Tillangschong, I. Jelinek.

Marasmius micropilus Rchdt. (Rotuleae.) Stipes corneus, e fusco nigrescens, procerus, gracilis, 4-5" longus, striatus, totus pruinosus velutinusque cavus; pileus exiguis, 4-5" magnus, fuscus (in sicco pallescens), convexus, campanulato expansus, umbonatus, submembranaceus, e centro laevi radiatim sulcatus, margine acuto crenatus; lamellae liberae, albae, inaequales, didymae, sporae albae, laeves, ellipticae, mamillatae, $\frac{1}{400}$ " magnae.

Neu-Seeland, Provinz Auckland. Auf faulenden Stämmen in Wäldern um Drury, I. v. Hochstetter.

376

Dr. H. W. Reichardt: Neue Pilzarten der Novara-Expedition.

Cortinarius Hochstetteri Rchdt. (*Dermocybe?*) Totus fungus pulcherrime azureus, stipes solidus, 3—4" longus, pileus conicus, 1" magnus, carnosus, tenuis, adultus glaber, lamellae confertae pileo concolores.

Die Diagnose ist nach Abbildungen entworfen, welche der Herr Entdecker mir freundlichst mittheilte.

Neu-Seeland, auf der Nordinsel in Urwäldern des Pateteren-Plateau's zwischen Taurunga und dem Waihu, comm. v. Hochstetter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Reichardt Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: [Diagnosen der neuen Arten von Pilzen der Novara-Expedition. 373-376](#)