

Ein Beitrag zur unterirdischen Käferfauna.

Adelops croaticus n. sp.

Beschrieben von

L. Miller.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Juni 1867.

Subhemisphaericus, fusco-ferrugineus, subtiliter pubescens, antennarum articulis elongatis. Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Dem *Ad. Khevenhülleri* sehr ähnlich, aber bedeutend grösser und nach vorn etwas mehr zugespitzt.

Fast halbkuglig, nur wenig länger als breit, dunkel rostroth, mit dichter, anliegender, grauer Behaarung bekleidet. Die Fühler sind fadenförmig, die ersten zwei Glieder ziemlich stark, die vier folgenden dünn, die fünf Keulenglieder deutlich abgesetzt, das achte kürzer und schmaler als das vorhergehende und die folgenden, das letzte länglich, zugespitzt.

Das Halsschild an der Basis in weitem Bogen ausgerandet, gegen die Spitze stark verschmälert, vorne ausgerandet, die Vorderwinkel vorstehend, abgerundet, die Hinterwinkel spitz. Die Flügeldecken mit dem Halsschild gemeinschaftlich gewölbt und an den Seiten gerundet,

äusserst fein und dicht quer nadelrissig, der Seitenrand sehr schmal aufgebogen.

Diese neue Art stammt aus der Grotte von Ozalj in Kroatien und wurde mir von Herrn Professor Sapetza in mehreren Exemplaren übersendet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Miller Ludwig

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur unterirdischen Käferfauna. 551-552](#)