

# Diagnosen

neuer von dem k. k. Oberlieutenant H. v. Hedemann in Mexico  
in den Jahren 1865—1867 gesammelter Lepidopteren.

Von

Rudolf Felder.

Erste Folge.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. April 1869.

## Rhopalocera.

Fam. Pieridae.

### 1. *Terias ingrata* Feld. n. sp. ♂.

*T. gratiosa* apud Tryon Reakirt, Proceed. of the entom. Soc. of Philadelphia 1863, p. 359.

Valde affinis *T. gratiosae* Doubldy et Hew., alis supra sulphureo-flavis, anticarum limbo externo sat lato introrsum inaequaliter sinuato, inter ramum medianum secundum et venam internam birenato, posticarum limbo externo sat lato fortiter intus projecto nigro-fuscis, his ante apicem saturatius flavis, subtus anticis paullo pallidioribus, puncto discocellulari nigro, lituris costalibus ferrugineo-fuscis, apice rufo strigillato, posticis flavidis, rufo strigillatis, puncto discocellulari et interdum alio interiore nigrescentibus, virgula antica strigaque horizontali in dimidio externo, extrorsum valde effusa, limbo apice rufo atomato.

Potrero, im Jänner \*).

### 2. *Terias Sidonia* Feld. n. sp. ♂♀.

Affinis *T. Palmyrae* Poey, sed alis anticis latioribus, posticis brevioribus, anticis maris supra pallide sulphureo-flavis, limbo costali sulphureo asperso ultra venam subcostalem limboque terminali introrsum bisinuato nigro-fuscis, vitta lata interna cano-fusca pilosa ramum medianum primum flexilem paullulum excedente, margine interno aurantiaco,

\* ) Im Coll. Felder Stücke dieser Species von Cuernavaca in Mexico und aus Guatemala, wo sie Salvín zugleich mit *T. gratiosa* sammelte. Tryon Reakirt l. c. beschreibt die Art von Honduras.

posticis pallide sulphureis, limbo costali albido, plaga antico-basali diffusa, atomis dimidii interni limboque lato externo nigro-fuscis, ♀ nae omnibus supra sulphureo-albis, anticis limbo antico-basali vittaque lata interna atomariis, limbo terminali usque ad ramum medianum primum, posticarum vitta obsoleta antico-basali, plaga apicali atomisque interioribus nigro-fuscis, subtus omnibus in utroque sexu albicantibus, fusco aspersis, anticis sulphureo tinctis.

Campeche, im Sommer \*).

**3. Terias Nelphe** Feld. n. sp. ♂♀.

*T. Nisae* Cram. valde affinis, alis ♂ris supra sulphureo - flavis, anticis limbo terminali usque ad ramum medianum primum nigro-fusco, posticis punctis marginalibus nigricantibus, subtus omnibus linea anteciliari ochracea, punctis nigris intra eam, anticis in margine costali, posticis omnino nigrescenti aspersis, illis macula discocellulari tribusque subapicalibus minutis, his punctis duobus discocellularibus fasciaque interrupta quater fracta atomaria pone medium saturate rubescenti - fuscis, ♀nae omnibus supra ut in ♂re, sed pallidioribus, subtus maculis tribus anticarum subapicalibus et macula insuper magua in apice posticarum lateritiis.

Potrero, im Jänner \*\*).

**4. Terias celata** Feld. n. sp. ♂.

*T. albulae* Godt. affinis, sed minor, alis paullo brevioribus, omnibus supra albis, anticis limbo apicali nigro-fusco plus quam tertia parte angustiore, postice valde attenuato, apud ramum medianum primum acuminate finito, subtus anticarum basi et apice, posticis omnino pallidissime ochraceis, his maculis duabus discocellularibus minutis fuscis aliisque atomariis obsoletioribus, strigam flexuosam valde interruptam constituentibus mediis inter cellulam et apicem.

Potrero, im Jänner.

**5. Terias Leucilla** Feld. n. sp. ♂.

Praecedenti simillima, tertia vero parte minor alisque paullo angustioribus, anticis paullo longioribus, supra omnibus albis, anticis limbo apicali angustulo nigro-fusco, apud ramum medianum secundum in acmine desinente, posticis subtus omnino ut in *T. celata*, maculis solum distinctioribus.

Potrero, im Jänner.

\* ) In Coll. Felder ein Pärchen dieser leicht kenntlichen neuen Species aus der Umgebung von Cuernavaca. Das Weib differirt nicht unerheblich von dem Stücke der Hedemann'schen Sammlung.

\*\*) In Coll. Felder von Vera Cruz (Sallé).

Fam. Erycinidae.

6. **Eurygona catalueca** Feld. n. sp. ♂.

*E. Eumeni* Hew. affinis, alis supra omnibus fuscis, subtus plumbeo-albis, utrinque immaculatis, ciliis nigrescenti-fuscis, fronte alba, tibiis tarsisque ochraceo-fulvis, extus nigro apiculatis.

Cordoba, Potrero, im Februar.

7. **Eurygona pusilla** Feld. n. sp. ♂.

*E. Teleclo* Stoll accedens, sed multo minor, alis angustioribus, posticis apice subangulatis, postice protractis, supra omnibus nigro-fuscis, anticarum plaga clavata infra cellulam e basi, posticarum dimidio interno usque ad plicam internam laete fulvis, subtus omnibus glauco-albis, striga discali in posticis interrupte flexuosa alteraque marginali ferrugineo-fulvis, anticis triente externo cano-fusco atomoso, lunulis seriatis albidis, alias fuscas gerentibus diviso, posticis striga exteriore obsoleta cano-fusca alteraque submarginali e lunulis tenuissimis nigricantibus.

Potrero, im Jänner.

8. **Eurygona Eubule** Feld. n. sp. ♂.

*E. Euploae* Hew. proxime affinis, alis supra laete ferrugineo-fulvis, anticarum limbo terminali usque in cellulae medium protracto marginemque costalem fere usque ad basin velante, posticarum limbo antico irregulari maculisque confluis marginalibus acuminate triangularibus nigro-fuscis, anticis macula cellulari binisque medianis diffusis ochraceo-fulvis, posticis atomis discocellularibus nigrescentibus maculaque diffusissima ochracea pone eos, subtus omnibus cano-fusculis, in dimidio basali nigrescenti suffusis, striga discali flexuosa, in posticis fortiter fracta, linea discocellulari lineaque anteciliari nigro-fuscis, maculis limbaliibus atomariis cinereis, atro foetis, intus fusco diffuse limitatis, anticis maculis tribus supernis sed albidis, posticis in disco pone strigam dilucidatis.

9. **Limnas acroleuca** Feld. n. sp. ♀.

Affinissima *L. Cephisae* Mén., alis utrinque fumato-nigris, venis multo dilutioribus, ciliis anticarumque apice a ramo subcostali tertio usque ad venam discoidalem inferiorem albis, singulis macula basali rotundata coccinea, posticis subtus altera insuper costali prope basin, abdomine fumato-nigro, maculis lateralibus rubris.

Huahuapan, im September.

10. **Emesis Paphia** Feld. n. sp. ♀.

*E. Cypriae* Feld. accedens, sed minor, alis brevioribus supra fuscis, strigulis basalibus diffusis obsoletissimis posticarumque strigis duabus subrectis pone medium et maculis obsoletis seriatis submarginalibus ob-

scurioribus, anticis utrinque fascia latiuscula aequali, obliqua ochraceo-fulvescente, subtus ferrugineo-fuscis, fascia eadem sed latiore, basi grisescenti atomosa et obsolete fusco punctata, posticis ibidem dilutioribus, quam supra, venis ultra medium, basi et margine interno grisescenti atomosis, punctis basalibus obsolete nigricantibus, strigis duabus supernis, magis tamen diffusis maculisque submarginalibus valde obsolete, introrsum aliis sublinearibus ochraceo-canis atomariis, apud plicas insedentibus, palpis frontem haud attingentibus et pedibus ochraceis, pectore et ventre pallide grisescientibus.

Atajac, im Februar.

11. **Mesene Hedemannii** Feld. n. sp. ♂.

*M. Sagaridi* Cram. secundum formam alarum proxima, minor tamen, alis supra nigro-fuscis, anticarum fascia interno-basali plaga elongata obliqua irregulari pone medium, posticarum fascia basali antice dilatata alteraque lata limbali, apicem haud attingente, saturate flavis, his margine interno flavo-albo, subtus omnibus fuscis, fasciis pallidioribus, capite atro, fronte et palpis ochraceo-flavis, abdomine nigro-fusco, supra zona basali cincturisque ventralibus flavescenti-albis, vittis duabus lateralibus posticis ochraceo-fulvis, coxis flavescenti-albis.

Passo de Magio bei Cordoba, im Februar.

12. **Calydna Hegias** Feld. n. sp. ♂.

*C. Hiriae* Godt affinis, sed paullo major et alis posticis intervenam subcostalem et ramum medianum tertium bene sinuatis, alis supra anthracinidis, atro variis, anticarum macula ad cellulae extimum, tetragona punctoque supra eam, posticarum macula fasciaeformi ante medium, subhyalina irregulariter excisa, ciliis nigris, albo intercisis, striga limbali et lunulis tenuissimis, ferreo-canis, marginis antici bitriente basali ferrugineo, subtus omnibus dilutioribus, maculis atris basalibus et discalibus, his in fascias congestis, maculis diaphanis atro marginatis, striga limbali interrupta, lunulis ejus extus atro limitatis, anticarum margine costali albo striolato, antennis distinctissime albo annulatis.

Yucatan, im Sommer.

13. **Calydna sinuata** Feld. n. sp. ♂.

Praecedenti affinis, sed tertia fere parte minor, alis anticis apice subfalcato, margine externo denticulato, medio convexo, posticis intervenam subcostalem et ramum medianum tertium sat profunde sinuatis, denticulatis, supra omnibus obscure cinereis, ciliis sordide albescenti intersectis, striga anteciliari, fasciolis basalibus, fascia discali flexuosa alteraque submarginali maculari extus lineolis albo-cinereis cinctis nigricantibus, atomis albo-cinereis limitatis, anticarum macula ad cellulae

extimum, punctis duobus supra unoque pone eam et quarto supra venam internam, posticarum macula fasciaeformi lacerata ante medium hyalinis, atro marginatis, subtus omnibus pallidioribus, maculis et fasciis multo saturationibus.

Atayac.

**14. *Charis sulphurea* Feld. n. sp. ♀.**

*Ch. Peronae* Doubldy et Hew. affinis, alis supra sulphureis, maculis circiter quindecim parvis dispersis atris, plumbeo plus minus impletis, posticarum marginalibus sex minimis, linea argentea obsoleta connexis, subtus pallidioribus, maculis iisdem sed nigris, capite, palpis, pectore et pedibus cum alis concoloribus, abdomine . . . .

Atayac.

**15. *Baeotis zonata* Feld. n. sp. ♂.**

*B. Hisbonis* Cram. fortasse vicaria, alis supra fuscis, anticingularum plagula basali, zona discali irregulari, plaga externa elongata maculaque tetragona interna prope angulum, posticarum zona basali et discali in limbo interno confluentibus, plaga externa fere fusiformi maculaque parva subanali sulphureis, linea antemarginali posticarumque maculis duabus (una antica, altera postica) plumbeis, subtus omnibus pallidioribus, absque linea et maculis plumbeis.

Potrero \*).

Fam. Nymphalidae.

**16. *Eresia pallescens* Feld. n. sp. ♂♀.**

Species parvula, ad sectionem *E. Thari* Drury pertinens, *E. pallidae* Edw., ut videtur, proxime affinis; alis supra fuscis, quasi pulverulentis, ciliis pallide fuscis, albido intercisis, anticis maculis quatuor in cellula, tribus anterioribus pallide fulvis, quarta ochracea, totidem parvulis infra truncum medianum pallide fulvis, duabus harum extimis altera super alteram positis, pone eas macula transversa angusta ochracea, statim fere pone cellulae clausum maculis duabus (in ♂re exteriore virgulari) et in ♀na duabus insuper inter ramum medianum secundum et venam internam (superiore annulari) pallide fulvis, fascia discali refracta submaculari ochracea, maculis septem exterioribus in serie fracta pallide ochraceo plus minus impletis lunulisque submarginalibus seriatis (quinta inter ramum medianum secundum et tertium majuscula) ochraceis (in ♂re superioribus et inferioribus evanescentibus), in ♀na aliis insuper ante marginem, valde obsoletis, posticis in ♂re punctis oblitteratis basalibus, macula antico-basali, altera intra cellulae clausum, tertia (saturatiore) extra illum, fascia curvata discali usque ad ramum medianum primum currente,

\* Stücke aus Neu-Granada in Coll. Felder.

lunula infra hunc maculisque sex exterioribus nigro pupillatis fulvescentibus, lunulis submarginalibus gracilibus sordide albidis, in ♀na maculis sex confertis subbasalibus, fasciis duabus latis, irregularibus discalibus, tertia exteriore e maculis subcuneatis fusco pupillatis, valde inter se approximatis, lunulis submarginalibus latiusculis pallide fulvis, fascia e lunulis antemarginalibus fundo paullo dilutiore, subtus anticis in ♂re laete fulvescentibus, in ♀na pallidioribus, maculis supernis sed ochraceis, fascia discali in ♂re intus maculis nigro-fuscis optime distinctis terminata (infima sat magna) lunulisque duabus nigro-fuscis prope angulum internum, posticis pallide ochraceis, in disco et limbo postico fusco umbratis, strigis irregularibus ferrugineis in dimidio basali, punctis externis nigro-fuscis, lunulis submarginalibus paginae superioris sed, quinta inter ramum medianum secundum et tertium sita albicante excepta, a fundo cincturis fuscis solum distinctis, in ♂re atomis albidis in medio infra plicam discoidalem, in ♀na fascia angulata submaculari discali albida trienteque basali albido inaequaliter atomato.

Puebla, im Winter \*).

17. **Eresia graphica** Feld. n. sp. ♂♀.

Praecedenti affinis, sed alis latioribus, anticis brevioribus, apice minus producto, supra omnibus nigro-fuscis, in utroque sexu maculis disformibus basalibus confertis, fasciolis duabus cellularibus, infra priorem harum maculis duabus internis, statim fere pone cellulam fasciis duabus macularibus fractis (exteriore ochraceo atomata), maculis sex exterioribus in serie fracta (nonnullis ochraceo atomatis) lunulisque submarginalibus, quinta inter ramum medianum secundum et tertium majuscula excepta minutis, in ♂re evanescentibus, ochraceo plus minus atomatis, posticis macula grossiuscula intra cellulae extimum, fasciis duabus discalibus, in ♀na multo latioribus, tertia exteriore e maculis nigrescenti pupillatis lunulisque gracilibus bene distinctis submarginalibus et in ♀ na aliis insuper atomariis ante marginem, fulvescentibus, subtus omnibus fere ut in *E. pallescens*, sed fascia discali ochracea antarum intus maculis tantum angustis nigrescentibus terminata, posticis pone cellulam et in limbo externo late ferrugineo-fusco nebulosis, basi, intervallo strigarum discalium, apice et intervallo rami mediani secundi et tertii prope marginem albido atomosis.

Huahuapan, im September.

18. **Eresia socia** Feld. n. sp. ♂♀.

*E. Eladae* Hew. (Exotic Butterfl. Vol. IV. Eresia t. VII fig. 54, 55) valde affinis, sed alis anticis supra macula intra cellulae clausum multo

\* ) In Coll. Felder ein Pärchen, aus der Gegend von Cuernavaca.

majore, maculis extracellularibus omnibus fulvescentibus, posticis fascia discali latiore, maculis pone eam jacentibus majoribus, maculis limbalibus lunulatis, subtus anticarum maculis majoribus, lunulis limbalibus omnibus albis, posticis fascia basali alba, subbasali multo latiore, macula disco-cellulari majore alba, sicut et fascia discali, lunulis limbalibus multo majoribus, cincturis nigris macularum fulvescentium inhaerentibus.

**19. *Eresia Archesilea* Feld. n. sp. ♂♀.**

*E. Alethi* Bat. proxima, sed forma alarum fere ut in *E. Stesilea* Bates alis supra maculis basalibus confertis ex atomis sordide fulvescentibus, intra cellulae clausum fasciola pallide ochracea, serie lunularum submarginalium pallide ochracea, in anticis lunula ejus quinta multo majore, reliquis vero minutis vel obliteratis, in posticis intra illam serie striolarum pallide ochracearum, costam versus fulvescenti tinctarum optime expressa, caeterum ut in *E. Alethe*, subtus etiam ut in hac specie, sed lunulis binis apicalibus alarum anticarum, macula basali et fascia discali posticarum albicantibus multo distinctioribus.

Cordoba, im Jänner.

**20. *Eresia obscurata* Feld. n. sp. ♂.**

Priori et affinibus accedens, sed antennis brevioribus, clavam late ovatam gerentibus diversa et *E. nigrellae* Bat. forsitan affinior, alis breviusculis, anticis sub apice bene angulatis, posticis rotundatis, supra omnibus fuscis, anticis maculis basalibus confertis aliisque discalibus valde obsoletis ferrugineis, his ochraceo paullum tinctis tribusque in limbo externo, minutis ochraceo plus minus atomatis, posticis fasciolis quatuor atomariis ferrugineis in dimidio interiore, maculis quinque posterioribus sublunatis fusco impletis lunulisque gracilibus seriatis submarginalibus plus minus ochraceis, harum superioribus evanescentibus, omnibus alis subtus multo pallidioribus, margine externo passim ferrugineo atomoso, posticis strigis duabus binatis flexuosis in dimidio basali, extrema harum ad costam fusco umbrata cincturisque externis lunularum paginae superioris a fundo vix distinctarum fuscis, palporum articulis primoribus subtus et ventre albidis.

Rio Atajac, im Jänner \*).

**21. *Synchloë misera* Boisd. in litt. ♀**

*S. pauperae* Feld. affinis, sed supra *S. Hippodromae* Gey. similior, alis supra anthracino-fuscis, ciliis albo maculatis, anticis puncto cellulari, aliis externis in serie flexa, intra hanc maculis quinque anticis elongatulis, fasciolam fractam sistentibus maculisque totidem submarginalibus partim obsoletis albis, posticis atomis lateritiis in disco punctisque

\*) In Coll. Felder von Cuernavaca.

obsoletis exterioribus albis, subtus omnibus pallidioribus, anticis insuper macula lateritia ad costae basin, posticis fasciola antico-basali, litura cellulari, maculis tribus internis, fascia gracili discali maculisque semi-circularibus submarginalibus ochraceis, pone fasciam maculis quinque lateritiis (anali multo majore) et mox pone eas punctis septem albis.

Huahuapan, im September \*).

22. **Myscelia Rogenhoferi** Feld. n. sp. ♀.

*M. Ethusa* Coll. Felder, non Boisd.

*M. Ethusa* Boisd. (*cyaneculae* Feld.) proxima et inter eam et *M. leucocyanam* Feld. quasi media, sed alis brevioribus, anticis magis angulatis, posticis profundius dentatis, omnibus supra saturate fuscis, anticis vitta cellulari fasciisque duabus perobliquis internis chalybaeo-caeruleis, fasciola macularum trium antica pone cellulam, maculis duabus inter ramos medianos, tribus subapicalibus et quinque submarginalibus in paribus tribus (supremis angustissimis) albis, striga antemarginali ato-maria maculari albo-caerulecente, posticis atomis basalibus, fascia discali abbreviata, altera pone cellulam, apice maculari, tertia abbreviata postica angustiore horizontalibus, striga maculari submarginali alteraque atomaria antemarginali obsoleta violaceo-caeruleis, subtus omnibus fere ut in *M. Ethusa*, sed apice cano-brunnecente et posticis fascia obliqua ante medium, utroque extimo dilatata, extrorsum vero subrecta alteraque postica multo latiore brunneo impleta cano-brunnecentibus.

Huahuapan im October \*\*).

23. **Epicalia Esite** Boisd. in litt. n. sp. ♂.

*E. Numiliae* Cram. valde affinis, sed minor, alis angustioribus, supra plaga discali anticarum fulva cellulam haud intrante, fere orbiculari, plaga earum apicali usque ad marginem protracta, plaga alarum posticarum minore, subtus fascia nigra alarum anticarum latiore et fasciis dilutioribus obsoletis posticarum minus flexis.

Potrero, im Jänner \*\*\*).

\*) Drei Stücke in Coll. Felder aus der Umgebung von Cuernavaca, darunter zwei Männchen, differieren bedeutend unter sich und von dem Weibchen der Hedemann'schen Sammlung.

\*\*) Weibliche Exemplare von Veracruz und Cuernavaca in Coll. Felder, erstere von Sallé eingesandt, welcher die Art für das Weibchen von *M. Ethusa* hält. Diese letztere kenne ich nur aus Blanchard's Diagnose (Hist. nat. des Ins. III. 1840, p. 444), deren gütige Mittheilung durch Herrn Custos Rogenhofer die Identität von *M. cyanecula* Zool. d. Novara Exp. Lep. p. 408 t. LIII Fig. 5 mit *M. Ethusa* feststellte. In unserer Sammlung liegt auch ein Männchen der *M. Rogenhoferi* von Santa Martha in Neu Granada vor.

\*\*\*) Sallé sammelte die Art auch um Veracruz und Lindig brachte sie in grosser Anzahl zugleich mit *Ep. Numilia* aus den Anden Bogota's.

**24. Pyrrhogryra Neis** Feld. n. sp. ♂.

*P. Neaereae* L. affinissima, sed alis anticis supra area interna virente usque ad venam medianam tautum extensa, subtus vitta coccinea nigro cincta in cellula juxta venam medianam et in fasciam transversam ejusdem coloris currente, hac vero cum striga externa coccinea haud juncta, posticis limbo externo fusco angustiore, fasciis duabus albidis antemarginalibus multo angustioribus.

Atajac \*).

**25. Heterochroa Emathia** Feld. n. sp. ♂.

*H. Serpae* Boisd. valde affinis, sed supra fascia alba latiore, in anticis haud maculari, harum plaga fulva minore, subtus omnibus multo saturationibus, triente basali fasciaque exteriore rufo-ferrugineis, fascia alba et anticarum plaga ut supra, hac tantum albescente, maculis limbatis multo melius circumcinctis glauco-albis, interioribus posticarum bene separatis lunatis, exterioribus etiam angustioribus, fasciis duabus basalibus posticarum angustioribus et glauco-albis.

Potrero im Jänner.

**26. Nymphalis Hedemanni** Feld. n. sp. ♂

Ad sectionem *N. Xenoclis* Westw. et *Glauces* Feld.; minor quam *Glauce*, alis anticis ad apicem fortiter productis, acute falcatis, in regione interna abbreviatis, posticis ecaudatis, sed apud ramum medianum tertium distincte angulatis, alis omnibus supra chalybaeo-nigris, dimidio basali anticarumque maculis quinque subterminalibus chalybaeis, subtus nitide cano-fuscis, albido strigilosis, fascia discali apud ramum medianum tertium angulata, introrsum effusa, striga limbali in anticis arcuata et zonam marginalem griseo-viridem amplectente anticarumque plaga antico-subapicali diffusa fuscis, posticis punctis nonnullis posticis plus minus evanescentibus atris, intus glauco-caeruleo notatis.

Potrero im Jänner.

**27. Nymphalis Pithyusa** Feld. n. sp. ♂

*N. Arginusae* Hübn. valde affinis, minor tamen, alis angustioribus, anticis apice magis productis, posticis in regione anali multo magis porrectis, his supra ad basin chalybaeo-virenti atomatis et maculis chaly-

\* In Coll. Felder von Veracruz (Sallé) und zahlreich von Bogota, wo sie Lindig zu gleich mit *Neaerea* sammelte.

baeis in margine externo superiore obsoletis atomariis, punctis albis vero majoribus, a margine magis distantibus et in serie flexa, subtus zona discali serpentino-virescente in anticis haud interrupta et extrorsum haud angulata, posticis striga posteriore multo magis arcuata, angustiore et serpentina.

Potrero, im Jänner.

28. **Nymphalis Callidryas** Feld. n. sp. ♂

Species insignis, sectionem *N. Laertis* Cram. cum illa *N. Elecrae* Hew. quasi jungens, priori vero secundum venarum distributionem certe affinior, colore paginae superioris *Callidryades* revocans, palpis caput fere duplo superantibus, articulo eorum terminali acuto, alis anticis leviter falcatis, margine interno ante angulum excavato, posticis levissime dentatis, sat abbreviatis, apud ramum medianum tertium subangulatis, angulo anali prominente, alis omnibus supra ochraceo-albis, vivide opalescentibus, margine externo ochraceo tincto, anticarum apice, posticarum maculis septem virgularibus limbalibus fuscis punctisque partim evanescentibus, nigris submarginalibus, subtus omnibus pallide virescentibus, ochraceo-fusco variegatis, striga communi recta ex anticarum apice albo maculato ad angulum ani posticarum ducta viridi-fusca, in anticis apud venam discoidealem superiorem fracta et supra eam maculari, in posticis paullo latiore, intus atomis argenteis limitata, anticis costa et margine interno albo fuscoque striolatis, nebulis violaceo-fuscis prope angulum internum, posticis apud costam fusco alboque variegatis, involucro abdominali albido strigillato, maculis tribus diffusis unaque apicali fuscis, zona externa valde obsoleta violascenti-alba strigisque duabus margini parallelis irregularibus obsoletis viridi-fuscis, intra secundam punctis albis atro foetis, venis omnium viridibus, thorace supra albido, brunneo piloso, abdomine pallide brunnescente.

Cordoba, im Sommer; von Herrn Nieto erhalten.

Fam. **Satyridae.**

**Cyllopsis** Feld. Gen. nov.

*Taygetidi* Westw. valde affine, sed oculi nudi, palpi multo graciliores, articulus eorum medius capit is longitudinem plus quam duplo superans et articulus terminalis acutus, minime vero acicularis. Forma et paginae inferioris alarum pictura genus *Cyllo* Boisd. revocantes.

29. **Cyllopsis Hedemannii** Feld. n. sp. ♂

Species habitu et tenera textura quodammodo *Taygetidi satyrinae* Bat. similis sed tertia fere parte minor, alis anticis leviter falcatis, infra

apicem obtuse angulatis, posticis remote dentatis, apud ramum medianum secundum angulatis, supra omnibus fuscis, fascia pone medium, in anticis flexuosa, margini externo parallela, in posticis obliqua, recta, multo angustiore anticarumque striga per cellulam ducta recta lateritiis obsoletis, posticis macula submarginali apud plicam medianam tertiam et altera apud plicam sequentem, evanescente nigro-fuscis, margine externo cano-brunneo atomoso, subtus omnibus multo pallidioribus. dense ochraceo variegatis, zona discali lata obscuriore, cano variegata, lateritio obsolete et ochraceo latius cincta alteraque concolore marginali, in anticis introrsum crenata, in posticis valde effusa, maculis duabus binatis apud plicas superiores et ante marginem posticum striga undata apud plicam medianam tertiam maculam atram intus diffuse ferrugineo circumdatam ferente argenteis, omnibus linea anteciliari nigricante, corpore supra fusco, subtus cum palpis nigro mixte pilosis brunnesceni-albo, antennis supra ferrugineis, subtus ochraceo-albo late articulatis, clavae apice utrinque nigro.

Potrero im Jänner.

### Pindis Feld. Gen. nov.

*Taygetidi* Westw. etiam valde affine, oculi tamen nudi, palpi porrecti, usque ad apicem dense jubato-squamosi, articulo medio capite sesquiloniore, sparse setoso, articulo terminali ei conformi ejusque trientem aequante, obtuso. Alae latae, sat breves, anticae apice sinuatim truncato, posticae ad apicem sat convexae, postice bene dentatae.

#### 30. *Pindis squamistriga* Feld. n. sp. ♀.

Species habitu *Epinephelarum*, *Epinephelum janirodem* Blanch. et *Valdiviae* Feld. expansione modice superans, alis supra fuscis, ante marginem externum saturatius tinctis, linea anteciliari fusca, altera ciliari sordide lateritia, anticis striga angulata, obsoleta obscuriore pene medium, subtus omnibus cano-brunneis, fusco strigillatis, striga pone medium, communi flexuosa, squamis elatis extrorsum cincta alteraque submarginali flexuosa ferrugineis, anticis disco toto pallide fulvescente, posticis striga per cellulæ medium currente, ferruginea, squamis valde arrectis extus cincta, punctis exterioribus atris apud plicas (paenultimo majore), abdomine subtus albido-brunnescente, antennis subtus nigro apiculatis.

Huahuapan, im September \*).

\*) In Coll. Felder das Männchen in zwei in der Gegend von Cuernavaca von einem französischen Sammler erbeuteten Stücken. Dasselbe differirt vornehmlich durch den dichter und dunkler beschuppten Discus der Vorderflügel - Oberscîte und durch die ziemlich grossen, doch pupillenlosen Augenflecken, welche an der Stelle der schwarzen Punkte auf der Unterseite der Hinterflügel erscheinen:

Fam. **Hesperiidae.**

31. **Ancyloxypha simplex** Feld. n. sp. ♂.

Facies *Hesperiae Lineolae*, statura *A. melanoneurae* Feld., alis anticis acutis, supra omnibus dilute fulvis, nitidis, costa, linea anteciliari, atomis ad basin marginaque posticarum antico - basali nigrescentibus, subtus pallidioribus, anticis macula grossa basali nigra, in lineam excurrente, posticis in bitriente antico saturatius fulvo atomosis, abdomine supra fulvescente, subtus cum palporum articulis primoribus albidis, clava antennarum subtus fulva.

Cordoba, Potrero, im Jänner.

32. **Leucochitonea lugubris** Feld. n. sp. ♂.

*L. Cereali* Cram. affinis et inter hanc et *L. Brebissonii* Latr. quasi intermedia, statura prioris, alis anticis inter plicam medianam primam et venam internam emarginatis, posticis in regione anali abbreviatis, angulo anali haud producto, regione antica elongata, apud ramum subcostalem secundum angulate projecta, supra omnibus dilute fuscis, anticis striga interno-discali fasciaque angusta submarginali interrupta nigro-fuscis, maculis hyalinis fere ut in *L. Cereali*, posticis fascia lata basali, virgula subcostali pone eam, striga discali maculari fasciaque submarginali maxima ex parte evanescente nigro-fuscis, atomis canis terminatis, subtus omnibus pallidioribus, posticis maculis tribus strigisque duabus indistinctis fuscis, palpis pectoreque subtus glauco-albis.

Orizaba, im September und October.

33. **Leucochitonea Pastor** (Kollar in M. C.) ♂.

Species venustissima, ad sectionem *L. Arsaltes* L., alis supra argenteo-albis, anticis triente fere apicali nigro-fusco, fasciola fundi coloris ornato, posticis ciliis fusco intersectis, subtus anticis fasciola antico-subapicali saturate fusca alteraque opposita apicali viridi-fusca, posticis macula lobuli costalis, fascia lata basali horizontali alteraque brevi perpendiculari interiore maculisque obsoletis atomariis limbalibus fusco-viridibus, palpis longe setosis, articulo ultimo minuto.

Lerma im Jänner \*).

34. **Leucochitonea canescens** Feld. n. sp. ♂.

E. sectione *L. Arsaltes* L., alis anticis apice acutis, posticis in regione interna sat abbreviatis, margine externo undato, supra omnibus

\*.) Das k. k. zool. Kabinet besitzt eine Reihe von Exemplaren dieser schönen Art aus Südbrasilien. Lindig brachte sie auch aus den Anden Bogotás.

pallide cano-brunneis, anticis macula interna, duabus hyalino notatis in cellula, quarta obsoleta ad cellulæ angulum superiorem, striga maculari submarginali alteraque pone cellulam, maculis septem hyalinis minutis (tribus supremis connatis) ornata fuscis, posticis basi fusco atomatis, strigis quatuor fuscis flexuosis, tertia maculas albidas vix conspicuas ferente, subtus omnibus albidis, strigis tenuioribus, corpore subtus cum palpis albicante, antennarum clava sat angusta subhamata.

Potrero, im Jänner \*).

**35. *Leucochitonea Pulcherius* (Moritz in litt.) n. sp. ♂.**

Inter *L. Melandrum* Cram. et *Tryxum* Cram. media, statura hujus, alis supra albis, marginibus anticarumque disco et limbo externo fusco atomatis, anticis strigis binis basalibus flexuosis confluentibus, litura discocellulari, striga exteriore flexuosa, maculas quatuor hyalinas connatas subapicales ferente fasciaque maculari submarginali nigro-fuscis, posticis zona effusa basali, litura discocellulari fasciisque duabus macularibus limbalibus fuscis, omnibus striga anteciliari fusca, subtus magis albatis, strigis fasciisque dilutioribus, anticis triente basali fusco, palpis ventreque glauco-albis, antennis clava subtus ochraceoalba.

Orizaba, im September und October, Atayac im Februar \*\*).

**36. *Leucochitonea hyalophora* Feld. n. sp. ♂♀.**

Species eximia, sectionem propriam constituens, antennis clava angusta, in hamum sat longum attenuata, palporum articulo tertio minuto, alis anticis apice truncato, margine externo apud ramum medianum secundum et venam internam angulate projecto, costa ante medium leviter deflexa, margine interno excavato, posticis margine externo apud ramum subcostalem primum et praesertim apud medianum secundum producto, omnibus supra albidis, basi nigro variis, anticis macula minuta subbasali in cellula, ante medium fascia apud ramum medianum primum subito contracta, nigro-fusco cincta, plagula antico-subapicali, punctum fuscum gerente, fascia interno-discali, extus infra plicam internam profunde insecta punctoque supra rami mediani secundi basin hyalinis nigro-

\* ) In Mehrzahl findet sich diese Art aus Südbrasilien im kais. Hofkabinete und von Bogota in Coll. Felder.

\*\*) In Coll. Felder von Veracruz (Sallé), aus Venezuela (Dr. Moritz) und Neu Granada (Lindig).

fusco cinctis, intervallo plagulae et fasciae rufescenti-brunneo tincto, fascia atomaria limbali umbrata virescenti-fusca, margine ipso externo nigricante, apud dentes dilatato, linea anteciliari alba, ciliis nigro maculatis, posticis macula cellulari, dein plaga irregulari discali subtrigona fasciaque exteriore irregulari, apud venam discoidalem coarctata hyalinis, intervallo harum rufo-brunneo, virgulam angulatam albam pone cellulae clausum ferente, fascia basali et margine externo ut in alis anticis, illa angustiore solum, subtus omnibus pallidioribus, posticis multo magis albicantibus, palpis, articulo terminali excepto, et corpore subtus albis.

Orizaba, im Spätsommer, Atayac im Februar, Potrero im Jänner.

37. **Leucocochitonea pulverulenta** Feld. n. sp. ♂.

Priori affinis, sed multo minor, antennarum clava crassiore, hamo haud deflexo, palpis longioribus, articulo tertio exerto, abdomine alas posticas subaequante, alis anticis integerrimis, margine externo modice convexo, posticis abbreviatis, margine externo flexuoso, omnibus supra rufescenti-brunneis, striga anteciliari albida, ciliis canis, fusco intercisis, anticis basi fusco nebulosa, litura interno-basali, striga irregulariter extus excisa, discali alteraque brevi subapicali, introrsum late fusco umbratis et extrorsum fusco cinctis hyalinis, fascia flexa diffusa limbali extus cano atomarie terminata maculisque antemarginalibus obliteratis passim cano pulverulentis, posticis in dimidio basali fusco variegatis, striga exteriore angulum formante fusco inaequaliter circumducta et intersecta albida, anticis subtus multo dilutioribus, posticis albidis, fasciis duabus basalibus latiusculis abbreviatis (exteriore subinterrupta) tertiaque pone medium, striga ad extima dilatata alba perfecta atomariis fuscis, linea anteciliari alba omnium multo distinctiore, quam supra, corpore toto subtus cum palpis, articulo horum terminali nigro excepto, albicantibus.

Orizaba im Spätsommer.

38. **Helias pallida** Feld. n. sp. ♂.

Ad sectionem *H. Busiridis* Cram., antennarum clava paullo crassiore, alis anticis acutis, margine infra apicem vix concavo, in medio vix convexo, posticis levissime angulatis, supra omnibus nitide ochraceo-brunneis, basi, fasciis duabus macularibus tertiaque evanescente submarginali dif-

fusis saturatioribus, subtus basi latius et saturatius fusca, in posticis cum fasciis plus minus confluente, anticis dimidio externo sat diluto, corpore utrinque fuso.

Jalapa, Potrero, im Jänner und Februar \*).

Zum Schlusse dieser ersten Serie neuer mexicanischer Falter, die wir dem Sammelfleisse v. Hedemann's verdanken, mögen noch die Diagnosen zweier ausgezeichneter neuer Hesperiiden aus einer südlich von der Hauptstadt Mexico in der Nähe von Cuernavaca zusammengebrachten kleinen Sammlung, welche vor wenigen Jahren in Paris bei A. Depuiset acquirirt wurde, folgen, da diese beiden Arten die Grenze zwischen den Gattungen *Leucochitonea* Wallengr. (*Pyrgus* Westw. e. p.) und *Helias* F. (*Achlyodes* Westw.) wohl verwischen.

**Leucochitonea emorsa** Feld. n. sp. ♂.

*L. Melandro* Cram. affinis, sed minor, antennarum clava graciliore, articulo tertio palporum graciliore, alis anticis margine externo postice vix flexo, posticis vero margine inter venam costalem et subcostalem et magis adhuc inter ramum subcostalem secundum et medianum tertium sinuato, caeterum leviter dentato, alis supra albis, basi fumato cano-fusca, regione antica et limbo externo aequali omnium introrsum dentato obscuriusque cincto fuscis, cano atomosis, hoc in anticis strigis duabus (exteriore evanescente), in posticis striga unica e lunulis formata diviso, striga anteciliari in maculas ciliares dilatata nigro-fusca, strigis duabus discalibus fuscis flexuosis, valde et inaequaliter interruptis, praesertim in posticis, anticis virgula tenui fusca in cellulae triente ultimo et supra eam maculis tribus hyalinis connatis subcostalibus, extus nigro-fusco cinctis, maculis sex similibus minoribus intra cincturam limbi externi a ramo subcostali secundo usque ad ramum medianum tertium, duabus altera super alteram posita in cellula et totidem inter ramos medianos male conspicuis hyalinis, posticis striga abbreviata flexuosa, interna in disco, subtus omnibus usque ad basin albis, striga reducta submargi-

\*). Zahlreiche Stücke dieser Art in Coll. Felder von Lindig's Ausbeute in den Andenhältern Bogota's. Bereits Latreille (Eoc. méth. IX. p. 792) scheint der Species als einer Abänderung von *H. Mithridates* F. zu erwähnen.

nali fusca, limbo externo fusco a fundo maxima ex parte suffuso, posticis macula subanali grossa atra, palpis supra nigris, subtus cum pectore et ventre albis.

**Leucochitonea funebris** Feld. n. sp. ♂.

Praecedenti affinis, forma alarum fere eadem, alis anticis in margine solum postico flexis, alis posticis fortius excisis, palporum articulo terminali longiore, colore et signaturis vero ad *Heliadem geometrinam* Feld. monentes, alis omnibus supra fuscis, lilascenti tinctis, fasciis duabus parallelis (prima ante medium et latiore, secunda pone medium), in anticis curvatis, in posticis arcuatis, excisis, fundo paullo saturatioribus, saturate fusco et cano cinctis, exteriore in anticis maculas quinque minutis hyalinis (duabus inferioribus inter ramos medianos) ferente, statim pone hanc fascia submarginali in anticis latiore, cano extus cincta strigaque anteciliari saturate fusca, subtus omnibus ochraceo-brunneis, fasciis in strigas maculares reductis, anticis margine et angulo interno albescenti-ochraceis, palpis subtus albidis, ventre cano atomato \*).

---

\*) Eine verwandte Art dürfte *Carcharodus Mazans* Tryon Reakirt (Proceed. of the Acad. of Nat. Scienc. of Philadelphia 1866 p. 335) sein, doch gestattet die Beschreibung keinen sicheren Schluss darauf, da sie nur die gleiche Färbung der Oberseite und ähnliche Zeichnungsanlage erkennen lässt, für die generische Stellung aber keine Anhaltspunkte bietet.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: [Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien.](#) seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Felder Rudolf

Artikel/Article: [Diagnosen neuer von dem k.k. Oberlieutenant H.v. Hedemann in Mexico in den Jahren 1865-1867 gesammelter Lepidopteren.](#) 465-480