

# Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Raibl in Ober-Kärnten.

Von

**Josef Mann.**

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Jänner 1870.

---

Auf Aneiferung meines Freundes, Herrn Professor Zeller, unternahm ich 1869 eine entomologische Reise nach Raibl.

Vom hohen k. k. Oberst-Hofmeister-Amte erhielt ich einen gnädigst bewilligten Urlaub und mässigen Reisebeitrag, von der Direction der südl. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft freie Fahrt bis Villach und zurück, wofür ich hiermit meinen besten Dank abstatte.

Die Umgegend von Raibl hat bereits Freund Zeller in diesen Verhandlungen \*) so genau geschildert, dass ich nichts weiter zu erwähnen wüsste. Ebenso freundliche Aufnahme und billige Bewirthung, wie er, fand ich bei Herrn Tobias Scheidenberger; den ich allen Reisenden auf das Beste empfehlen kann.

Ich langte am 13. Juni bei guter Witterung in Raibl an, doch trat bald Regenwetter mit Schnee ein, so dass ich während eines 30tägigen Aufenthaltes nur 9 schöne Tage hatte; da ich übrigens selbst bei Regenwetter täglich ausging, um Steine und Felsen abzusuchen, so fiel meine Ausbeute im Ganzen doch ziemlich befriedigend aus.

Ich erbeutete fast alle Arten, die Freund Zeller fand und führe im Nachfolgenden nur jene an, welche er nicht fand. Als neue Art kann ich nur *Fumea Raiblensis* anführen, deren Beschreibung an der betreffenden Stelle folgt.

---

\*) Bd. XVIII, 1868, p. 563.

- Pieris brassicae*. Raibl, Predil.  
*Polyommatus Phlaeas*. Einzeln bei Raibl auf der Strasse.  
*Lycaena Hylas*. Auf der Gravenlahn einzeln.  
 „ *Medon*. Im Raccolanathale nicht selten.  
 „ *Semiargus*. Im Raiblerthale.  
 „ *Arion*. Auf der Raibleralm.  
*Vanessa C. album*. Im Raccolanathale.  
 „ *Io*.  
 „ *Atalanta*. Am Raiblersee.  
*Melitaea Trivia*. Auf der Bauerischen Wiese.  
 „ *Dictynna*. Auf der Raibleralm nicht selten.  
*Argynnis Dia*. Einzeln auf der Gravenlahn.  
 „ *Latonia*. Auf der Predilstrasse.  
 „ *Niobe*. Auf der Bauerischen Wiese.  
 „ *Paphia*. Bei Raibl.  
*Erebia Nerine*. Raibleralm.  
*Epinephele Janira*.  
*Spilothyrus Malvarum*. Predilstrasse und Raccolanathal.  
 „ *carthami*. Predil.  
 „ *malvae*. Im Raiblerthale.  
*Hesperia Thaumus*. Predil.  
*Carterocephalus paniscus*. Auf der Bauerischen Wiese.  
*Sphinx pinastri*. An der Vitriolwand auf Knieholz ein Weib.  
*Macroglossa bombylifformis*. Auf der Bauerischen Wiese um Scabiosen.  
*Zygaena angelicae*. Bauerische Wiese.  
*Sarothripa Revayana* Var. *dilutana*. Von Eichen gescheucht.  
*Setina mesomella*. In Gebüsch am Raiblersee.  
*Gnophria rubricollis*. Bei Raibl an Waldrändern.  
*Nemeophila plantaginis*, Var. *matronalis*. Raibleralm.  
*Spilosoma fuliginosa*. Raibl.

### ***Fumea Raiblensis* m., n. sp. ♂**

Der *Fumea reticulatella* zunächst, aber  $\frac{1}{4}$  grösser (wie eine kleine *bombycella*), etwas gestreckter und dünner beschuppt, heller grau, Vorderflügel mit rindenartigen Querriefen, diese aber feiner, weniger scharf als bei *reticulatella* und etwas dunkler aschgrau als der Flügelgrund, nicht bräunlich, Spitze vorgezogen, Hinterflügel und Unterseite einfarbig hellgrau.

Die Wimpern an den Kammzähnen der Fühler scheinen mir etwas kürzer und feiner als bei *reticulatella*. Zunge, Beine wie gewöhnlich. Am 28. Juni fing ich am frühen Morgen zwei Männchen auf der Gravenlahn, im Krummholz, wo sie langsam flogen.

- Epichnopteryx nudella*. Auf der Gravenlahn in den Morgenstunden.  
*Leucoma salicis*. Am Raiblersee.  
*Bombyx Quercus*. Die Raupe auf Eichen.  
 „ *rubi*. Im Raiblerthale.  
*Acrornicta aceris*. Raibl.  
*Mamestra leucophaea*. An Felsen der Predilstrasse.  
 „ *pisi*. Am Raiblersee.  
 „ *brassicae* und *oleracea*. Raibl, an Zäunen.  
 „ *dentina*. Predilstrasse, an Felsen.  
*Dianthoecia compta*. Predilstrasse, an Felsen.  
 „ *caesia*. Am Raiblersee an Felsen.  
*Hadena strigilis* und Var. *latruncula*. Raibl, an Zäunen.  
*Dipteryga pinastris*. Raibl, beim untern Bleibergschachte.  
*Plusia interrogationis*. Raccolanathal.  
*Acontia luctuosa*. Am Raiblersee, nicht selten.  
*Aventia flexula*. Raibleralm.  
*Herminia tentacularis*. Bauerische Wiese.  
*Hypena rostralis*. Am Raiblerbach um Nesseln.  
*Rivula sericealis*. Raccolanathal in Gebüsch.  
*Nemoria porrinata*. Bauerische Wiese.  
*Acidalia aversata*. Predil, in Gebüsch.  
 „ *immutata*. Raiblerbach auf *Tussilago*.  
*Zonosoma porata* und *omicronaria*. In Gebüsch.  
*Timandra amataria*. Im Raccolanathale.  
*Zerene adustata*. Raccolanathal.  
*Synopsis sociaria*. Raiblerthal, ein Weib an einer Fichte.  
*Boarmia secundaria*. Raibleralm.  
 „ *repandaria*. Im Gebüsch am Raiblersee nicht selten.  
 „ *consortaria*. Raiblthal.  
*Gnophos ophthalmicata*. Raiblersee an Felsblöcken.  
*Odezia chaerophyllata*. Predil, auf Wiesen.  
*Lithostege griseata*. Raiblerthal, an Waldrändern.  
*Anaitis praeformata*. Raibleralm.  
*Cidaria Kollararia*. Am Raiblersee ein verflogenes Weib.  
 „ *spadicearia*. Auf der Gravenlahn.  
 „ *cyanata*. Raiblersee, an Felswänden.  
 „ *hastata*. Raibleralm, in Buchengebüsch häufig des Mittags.  
*Eupithecia impurata*. Raibl, Predil, an Felsen.  
 „ *satyrata*. Predil, auf Wiesen.  
 „ *venosata*. Predil, an Felsen.  
*Aglossa pinquinalis*. An Wänden.  
 „ *farinalis*. An Wänden.  
*Botys octomaculata*. Auf der Bauerischen Wiese.

- Botys punicealis*. Raibl und Raccolanathal nicht selten.  
 „ *cespitalis*. Raibl, auf Wiesen.  
*Eudorea dubitalis*. Raibler- und Raccolanathal, in Gebüsch.  
 „ *parella*. Predilstrasse, an Felsen, einzeln.  
 „ *truncicolella*. An Felsen am Raiblersee.  
*Crambus hortuellus*. Häufig am Raiblerbach.  
 „ *pratorum*. Predil, auf Wiesen.  
 „ *falsellus*. Einzeln an Felsen der Predilstrasse.  
 „ *Warringtonellus*. Raccolanathal.  
*Pempelia semibarbella*. Häufig am Raiblbach und Bauerische Wiese.  
*Hypochalcia marginea*. Einzeln am Predil auf Wiesen.  
*Myelois cribrum*. Bei Oberpreth auf Disteln.  
 „ *dulcella*. Predilstrasse, aus Gebüsch geschlecht.  
 „ *epelydella*. Raiblerthal, auf Weissdornhecken.  
*Acrobasis obtusella*. An Planken.  
*Homoeosoma nimbella*. Im Raccolanathal auf Hutweiden.  
 „ *sinuella*. Gravenlahn, Raiblerbach.  
*Ephestia interpunctella*. In Zimmern.  
*Teras variegana*. Einzeln aus Dornhecken geschlecht.  
 „ *asperana*. An der Predilstrasse.  
*Tortrix strigana*, Predil, auf Wiesen.  
 „ *gnomana*. Bauerische Wiese um Ahorngebüsch.  
 „ *Bergmanniana*. Im Raccolanathale einzeln auf wilden Rosen.  
*Sciaphila alticolana*. Raibleralm, um Lärchen geschwärmt.  
*Conchylis rutilana*. Raccolanathal, auf *Juniperus*.  
 „ *posterana*. Bauerische Wiese, auf Disteln.  
*Penthina sauciana*. Gravenlahn.  
 „ *rufana*. Nicht selten am Raiblerbache.  
 „ *hercyniana*. Auf Fichten beim See.  
*Retinia Bouoliana*. Vitriolwand, auf Knieföhren.  
*Grapholitha Hohenwartiana*. Bauerische Wiese.  
 „ *proximana*. Gravenlahn, um Fichten.  
 „ *Penkleriana*. Predilstrasse, um Buchen.  
 „ *roborana*. Raibl, um Dornhecken.  
 „ *Udmanniana*. Raibl, auf Brombeeren.  
 „ *aspidiscana*. Bauerische Wiese.  
 „ *albersana*. Gravenlahn.  
 „ *duplicana*. Raccolanathal, um *Juniperus*.  
 „ *fissella*. Gravenlahn.  
 „ *coronillana*. An den Lehnen des Königsberges aus Hecken geschlecht.  
 „ *ericetana*. Gravenlahn, auf Heidelbeeren.  
 „ *trifoliana*. An der Vitriolwand 2 Stück.

- Grapholitha fractifasciana*. Raiblerthal, auf Hutweiden.  
 „ *lamana*. Raccolanathal, ober dem See auf Wiesen.  
 „ *derasana*. Um Raibl.  
*Carpocapsa pomonella*. Im Zimmer.  
*Dichrorampha alpinana*. Raibl, auf *Mentha* an Waldrändern.  
 „ *Petiverella*. Bauerische Wiese, auf Dolden.  
 „ *plumbagana*. Am Raibler, auf Grasplätzen.  
 „ *plumbana*. Raccolanathal, in Gebüsch.  
*Coptoloma janthinana*. Raccolanathal.  
*Phthoroblastis rhediella*. Raibl.  
*Scardia tessulatella*. Raibleralm.  
*Tinea granella* und *spretella*. Im Zimmer.  
*Incurvaria Schoenherrella*. Gravenlahn zwischen Knieföhren.  
*Micropteryx calthella*. Bauerische Wiese, auf Dolden.  
 „ *fastuosella*. 1 Stück auf der Gravenlahn am 14. Juni.  
*Adela violella*. Bauerische Wiese, einzeln.  
 „ *minimellus*. Beim untern Bleiwerk.  
*Swammerdamia pyrella*. Gravenlahn.  
*Gelechia ferrugella*. Im Raccolanathale aus Hecken gescheucht.  
 „ *peliiella*. Gravenlahn, einige abgeflogene Stücke.  
 „ *cythisella*. Predilstrasse, aus Knieholz.  
 „ *scriptella*. Raiblerthal.  
 „ *sequax*. Predil und Raibleralm, auf Grasplätzen.  
 „ *anthyllidella*. An der Vitriolwand, einzeln.  
 „ *tenebrosella*. Vitriolwand, auf Dolden.  
 „ *bifractella*. Bauerische Wiese, auf Disteln.  
 „ *pulveratella*. Raccolanathal, um Wachholder.  
 „ *stipella*. Raibthal, an Planken.  
*Anarsia spartiella*. Auf der Gravenlahn, auf *Genista* einzeln.  
*Topeutes bar'ella*. Predil, einzeln.  
*Oecophora sulphurella*. Gravenlahn, auf Knieföhren.  
 „ *Punzerella*. Gravenlahn.  
 „ *flaviventrella*. Beim untern Bleiwerk 1 Paar in copula.  
*Acrolepia cariosella*. Auf der Winterstrasse des Predil.  
*Aechmia thrasonella*. Obere Uferwiesen des Raiblersees.  
*Simaethis pariana*. Raibleralm auf Dolden, Bauerische Wiese.  
*Tinayma perdicellum*. Auf Erdbeerblüthen.  
*Argyresthia nitidella*. Auf Ahornsträuchern.  
*Gracilaria alchimiella*. Bei Raibl, Gebüsch.  
 „ *elongella*. Ahorngebüsch.  
*Coleophora nyricella*. Raccolanathal.  
 „ *alcyonipennella*. Raiblerbach, auf *Tussilago*.  
 „ *serenella*. An Waldrändern, Säcke auf *Genista*.

*Coleophora livella*. Raibleralm, einzeln.

„ *albicostella*. Raiblerbach, einzeln.

„ *trifariella*. Raccolanathal, einzeln in Gebüsch.

*Chauliodus chaerophyllella*. Bauerische Wiese.

*Ochromolopis icrella*. Vitriolwand.

*Elachista albifrontella*. Raiblerbach, auf *Tussilago* spät Abends.

„ *cinctella*. Raiblerbach, zwischen Knieföhren.

„ *revinctella*. Gravenlahn und Knieföhren.

„ *gangabella*. Gravenlahn, auf Weiden.

„ *disertella* und *rudectella*. Raiblerbach, auf Huflattig.

„ *polinariella*. Lehnen des Königsberges.

*Lithocolletis roboris*. Auf Ahornsträuchern.

„ *Cramerella*, *ponifoliella*, *quercifoliella*, *silvella*. Predil  
in Gebüsch.

*Bucculatrix Boyerella*. Vitriolwand, auf Ulmen.

*Pterophorus fuscus*. Bauerische Wiese.

„ *baliodactylus* und *osteodactylus*. Raibleralm.

