

Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns.

Von

Ferdinand Kowarz.

K. k. Telegraphen-Beamter in Asch.

(Vorgelegt in der Sitzung am 4. Juni 1873.)

Mein diesmaliger Bericht umfasst die Aufzählung sämtlicher während meiner in den Monaten Mai und Juni 1871 nach Herculesbad unternommenen Reise gesammelten Dipteren. Ausser Neusatz und Semlin sind die Umgebungen von Orsova und Herculesbad die von mir meist durchforschten Gebiete, welche einerseits im Donauthale die wundervollen Partien des Kasan (Plavischeviza) bis nach Turn-Severin mit Inbegriff des serbischen Ufers, und andererseits die Thäler der Czerna- und Béla-Reka und Mehadika bis nach Verendin hin umfassen. — Das sehr bescheidene Ergebniss dieser von mir mit vieler Vorliebe unternommenen Sammelreise würde gewiss weit reichhaltiger ausgefallen sein, wenn nicht die anhaltende Ungunst der Witterung fast das ganze Unternehmen vereitelt hätte; dessungeachtet entdeckte ich mehrere sehr interessante neue und einige zwar bereits bekannte, jedoch in unserem Faunengebiete bisher noch nicht aufgefundene Arten. Die Sammelplätze in Rumänien und Serbien hieherzuziehen gestattet sowohl deren Nähe als auch deren nahezu gleichartige Beschaffenheit mit den diesseitigen Boden- und Vegetationsverhältnissen, unter welchen die Verbreitung der dortigen Dipteren sehr möglich ist.

Wie bereits bemerkt, ist die Ausdehnung des nachfolgenden Dipteren-Verzeichnisses verhältnissmässig sehr dürftig und lückenhaft; dennoch drängt es mich, den Herren Dipterologen das erwähnte an grossartigen Naturschönheiten so überaus reiche Gebiet, das zahllose entomologische Schätze birgt, zur eingehendsten Durchforschung ganz besonders zu empfehlen.

Die von mir aufgefundenen neuen Arten sind im Druck ausgezeichnet. Ihre Beschreibung findet sich im XVII. Bande der Berliner entomologischen Zeitschrift, Jahrgang 1873, pag. 33 unter dem Titel: „*Diptera nova, in Pannonia inferiori et in confinibus Daciae regionibus a Ferd. Kowarzio capta. Descripsit H. Loew.*“

Verzeichniss der in den Umgebungen von Herculesbad und Orsova gesammelten Dipteren.

A. Nemocera.

Lasioptera eryngii Gir.
Sciara carbonaria Mg.? — *rufiventris* Macq.
 — *humeralis* Ztt.
 — *nocticolor* Winn.
 — *brunnipes* Mg.
 — *insignis* Winn.
 — *alpicola* Winn.
 — *lugubris* Winn.
 — *pauperata* Winn.
Ditomyia fasciata Mg.
Bolitophila cinerea Mg.
Macrocera fasciata Mg.
 — *lutea* Panz.
 — *stigma* Curtis.
Platyura fasciata Mg.
 — *dorsalis* Staeg.
Sciophila limbata Winn.
 — *pallens* Lw. n. sp.
 Alpe Kernecska Csoka. Mit der vorigen sehr selten.
 — *nigriceps* Lw. n. sp.
 Im Juni bei Herculesbad auf Umbelliferen sehr selten.
Empheria lineola Mg.
Polylepta splendida Winn.
Lasiosoma pilosa Mg.
 — *rufa* Mg.
Boletina sciarina Staeg.
Glaphyroptera fascipennis Mg.
 — *borealis* Winn.
Acnemia amoena Winn.
Docosia valida Winn.
Allodia crassicornis Stan.
 — *ornaticollis* Mg.
Brachycampta amoena Winn.

Brachycampta griseicollis Staeg.
Phronia humeralis Winn.? — *signata* Winn.
Mycetophila punctata Mg.
 — *biusta* Mg.
 — *rufescens* Ztt.
Dynatosoma nobilis Lw. n. sp. Im Juni auf d. Alpe Kernecska Csoka in Schluchten ziemlich häufig.
Liponeura cinerascens Lw.
Blepharocera fasciata Westw.
Simulium reptans L.
 — *latipes* Mg.
 — *columbacense* Schönb.
Scatopse recurva Lw.
Dilophus vulgaris Mg.
Bibio marci L.
 — *hortulanus* L.
 — *venosus* Mg.? — *reticulatus* Lw.
 — *varipes* Mg.
 — *macer* Lw. n. sp. Im Mai bei Börsa im Hochgebirge an einer schattigen Waldstelle auf den Blättern einer Urtica, welche einen Sturzbach säumte, in Mehrzahl aber nur ♂♂ angetroffen.
Hesperinus imbecillus Lw.
Chironomus nubeculosus Mg. apud Schin.
 — *scalenus* Schrk.
 — *plumosus* L.
 — *ferrugineovittatus* Z.

Chironomus riparius Mg.
 — *venustus* Staeg.
 — *vibratorius* Mg.
 — *obscurus* Mg.? — *Tanypus nervosus* Mg.
 — *punctipennis* Mg.
 — *varius* F.
 — *carneus* F.
 — *monilis* L.
Ceratopogon praeustus Lw.
Orphnephila testacea Ruthe.
Culex vexans Mg.
 — *cantans* Mg.
 — *ornatus* Mg.
 — *leucacanthus* Lw. n. sp. Mit *C. vexans* sehr selten.
Anopheles maculipennis Mg.
 — *nigripes* Staeg.
Corethra plumicornis F.
Psychoda phalaenoides L.
Pericoma tristis Mg.
 — *calceata* Mg.
 — *ocellaris* Mg.
Tipula gigantea Schrk.
 — *truncorum* Mg.
 — *pabulina* Mg.
 — *heros* Egg.
 — *hortulana* Mg.
 — *pictipennis* Staeg.
 — *oleracea* L.
 — *nodicornis* Mg.
 — *ochracea* Mg.
 — *pannonia* Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad ziemlich häufig.
 — *pelostigma* Schumm

Tipula stigmatella

Schumm.?

- *truncata* Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad, Orsova und T. Severin ziemlich häufig.
- *bispina* Lw. n. sp. Im Mai bei Herculesbad sehr selten.
- *helvola* Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad im Sesseminthale und bei Plavischeviza auf der Wiese Krninamare sehr selten.
- *varicornis* Schumm.
- Pachyrrhina imperialis* Mg.
- *lunulicornis* Schumm.
- *quadrifaria* Mg.
- *histrion* F.
- *aculeata* Lw.
- Ctenophora bimaculata* L.
- *atrata* L.
- *elegans* Mg.
- Limnobia pannonica* Kow.
- *nubeculosa* Mg.
- *analisis* Mg.
- *xanthoptera* Mg.
- *tripunctata* F.
- *decemmaculata* Lw. n. sp. Im Juni auf der Alpe Kernecska-Csoka ziemlich selten.
- *chorea* Mg.
- *dumetorum* Mg.
- *trinotata* Mg.
- *macrostigma* Schum.
- *morio* F.
- *pilipennis* Egg.

Limnobia tristis Schumm.*Elliptera omissa* Egg.*Rhypholophus nodulosus* Macq.

- *pentagonalis* Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Orsova im Grazkathale und bei Herculesbad im Sesseminthale in feuchten Schluchten auf niederen Laubpflanzen selten.

Erioptera maculata Mg.— *fuscipennis* Mg.*Molophilus murinus* Mg.*Symplecta stictica* Mg.— *punctipennis* Mg.*Cladura fuscata* Lw.

- n. sp. Im Juni bei Herculesbad an Wasserfällen sehr selten.

Dicranota bimaculata Schumm.*Tricyphona immaculata* Mg.*Limnophila hospes* Egg.— *nemoralis* Mg.— *lucorum* Mg.— *discicollis* Mg.— *ochracea* Mg.*Epiphragma picta* F.*Idioptera trimaculata* Ztt.*Ephelia mundata* Lw.*Poecilostola pictipennis* Mg.*Dactylolabis tergestina* Egg.?— *Frauenfeldi* Egg.— *gracilipes* Lw.*Ptychoptera paludosa* Mg.*Dixa maculata* Mg.***B. Brachycera orthorapha.****Xylophagus ater* F.*Subula varia* Mg.*Beris clavipes* L.— *sexdentata* Ztt.— *geniculata* Curtis.— *fuscipes* Mg.*Actina nitens* Latr.*Sargus cuprarius* L.*Chrysomyia speciosa* Macq.— *formosa* Scop.*Stratiomyia concinna* Mg.— *longicornis* Scop.*Odontomyia flavissima* Rossi.

- *periscelis* Lw. n. sp. Im Mai bei Orsova am neutralen Grunde auf *Euphorbia* sehr selten.

Nemotelus pantherinus L.*Oxycera limbata* Lw.*Clitellaria Dahlii* Mg.*Cyclogaster tenuirostris* Lw.*Pachygaster ater* Panz.*Silvius vituli* F.*Tabanus pilosus* Lw.— *cordiger* Mg.— *spectabilis* Lw.— *bovinus* L.— *spodopterus* Mg.— *ferrugineus* Mg.— *infuscatus* Lw.*Haematopota italica* Mg.*Chrysopila aurea* Mg.— *splendida* Mg.

- *maerens* Lw. n. sp. Im Mai und Juni in der Umgebung von Herculesbad nicht selten.

Leptis maculata Deg.— *vitripennis* Mg.— *punctata* Lw.— *tringaria* L.— *conspicua* Mg.*Atherix marginata* F.— *Ibis* F.— *melaena* Mg.— *immaculata* F.*Dasypogon teutonus* L.*Stichopogon albofasciatus* Mg.*Dioctria aurifrons* Mg.— *oelandica* L.— *rufipes* Deg.— *linearis* F.*Leptogaster cylindricus* Deg.— *guttiventris* Ztt.*Lasiopogon cinctus* F.*Cyrtopogon lateralis* Fll.*Dysmachus spiniger* Zell.— *praemorsus* Lw.— *stylifer* Lw.— *bifurcus* Lw.*Machimus modestus* Lw.— *cyanopus* Lw.*Itamus socius* Lw.*Tolmerus atripes* Lw.*Asilus crabroniformis* L.*Pamponerus germanicus* F.*Echthistus rufinervis* Wiedem.*Laphria ephippium* F.— *aurea* Mg.— *dioctriiformis* Mg.*Thereua arcuata* Lw.*Phycus dispar* Mg.*Scenopinus niger* Deg.— *fenestralis* L.*Bombylius ater* Scop.— *medius* L.— *major* L.*Bombylius fimbriatus* Mg.— *vulpinus* Mg.— *cinerascens* Mikan.— *fulvescens* Mg.*Dischistus minimus* Schrk.*Lomatia Sabaea* F.*Hemipenthes morio* L.*Anthrax Ixion* F.*Tomomyza europaea* Lw.*Brachystoma vesiculosa* F.*Hybos fumipennis* Mg.*Trichina clavipes* Mg.*Oedalea stigmatella* Ztt.— *Holmgreni* Ztt.— *infusata* Lw.*Ocydromia glabricula* Fll.*Trichopeza longicornis* Mg.*Leptopeza flavipes* Mg.*Empis stercorea* L.— *trigramma* Mg.— *lutea* Mg.— *monogramma* Mg.— *meridionalis* Mg.— *confusa* Lw.— *tessellata* F.— *nepticula* Lw.— *opaca* F.— *livida* L.— *procera* Lw. n. sp.

Im Mai in den Umgebungen von Herculesbad und Orsova längs den Ufern der Donau bis nach Plavischeviza auf Blüten sehr häufig.

— *pennipes* L.— *decora* Mg. apud Schin.— *alampra* Lw. n. sp.Im Juni auf der Alpe Kerneckska-Csoka auf *Valeriana* sehr selten.*Empis nitidiventris*

Lw. n. sp. Mit der vorigen Art sehr selten.

— *tanyssphyra* Lw.n. sp. Im Mai fast überall auf Sanicula-
blüthen.— *plebeja* Lw. n. sp. Mit der vorigen Art.— *melanotricha* Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad auf Umbelliferen ziemlich häufig.— *pennaria* Fll.— *filata* Lw. n. sp. Im Mai bei Herculesbad und Plavischeviza ziemlich selten.— *setosa* Lw.— *pusio* Egg.— *levis* Lw. n. sp. Im Mai bei Herculesbad sehr selten.— *leucopeza* Lw. n. sp. Im Mai bei der Veteranihöhle im Kasan unter Baumkronen schwärmend ♂♂ und auf Umbelliferen ♂♀ ziemlich häufig.— *nigritarsis* Mg.*Pachymeria femorata* F.*Rhamphomyia spissirostris* Fll.— *nigripes* F.— *stigmosa* Macq.— *atra* Mg.— *umbripennis* Mg.— *hybotina* Ztt.— *sphenoptera* Lw.

n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad und am serbischen

- Donauufer mit den beiden letztern Arten.
- Ramphomyia eupterota* Lw. n. sp. Im Mai bei Plavischeviza auf Sträuchern sehr selten.
- *leptopus* Lw. n. sp. Im Juni bei Herculesbad sehr selten.
- Hilara cuneata* Lw. n. sp. Im Juni bei Plavischeviza sehr selten.
- *thoracica* Macq.
- *tetragramma* Lw. n. sp. Im Mai in der Umgebung von Orsova häufig.
- *pubines* Lw. n. sp. Im Mai im Kasan am serbischen Donauufer sehr selten.
- *quadrivittata* Mg.
- *platyura* Lw. n. sp. Mit der vorigen Art doch seltener u. auch auf Umbelliferen.
- *ciliata* Mg.?
- *lurida* Fll.
- *maura* F.
- *lugubris* Ztt.
- *pilosa* Ztt.
- *scrobiculata* Lw. n. sp. Im Mai bei Dubova und am serbischen Donauufer mit *H. quadrivittata* häufig.
- *eumera* Lw. n. sp. Im Mai bei Verendin über Bächen schwärmend.
- Hilara cornicula* Lw. n. sp. Im Mai im Bachnathale sehr selten.
- Cyrtoma nigrum* Mg. — *simplicipes* Ztt.
- Hemerodromia precatatoria* Fll.
- Tachypeza nubila* Mg. — *fuscipennis* Fll.
- Tachista annulimana* Mg. — *longipennis* Lw.
- Tachydromia cursitans* F. — *major* Ztt.
- *agilis* Mg.
- *annulata* Fll.
- *minuta* Mg.
- *annulipes* Mg.
- *bicolor* F.
- Ardoptera guttata* Hal.
- Clinocera lamellata* Lw. — *fallaciosa* Lw. n. sp. Mit der vorigen Art und unter ähnlichen Verhältnissen auch bei Herculesbad, jedoch seltener.
- *hygrobia* Lw.
- *tenella* Wahlb.?
- *Robertii* Macq.
- Dolichopus campestris* Mg. — *nubilis* Mg.
- *latelimbatus* Macq.
- *excisus* Lw.
- *claviger* Stann.
- *plumipes* Scop.
- *pennatus* Mg.
- *griseipennis* Stann.
- *signifer* Hal.
- *simplex* Mg.
- *arbustorium* Stann.
- *salictorum* Lw.
- *festivus* Hal.
- Gymnopternus regalis* Mg.
- Gymnopternus chrysozygus* Wiedem.
- *laevifrons* Lw.
- *nigriplantis* Stann.
- *atrovirens* Lw.
- *exarticulatus* Lw.
- *caudatus* Lw.
- *inornatus* Lw.
- *celer* Mg.
- *aerosus* Fll.
- Tachytrechus notatus* Stann.
- *ripicola* Lw.
- *genualis* Lw.
- Sybistroma nodicornis* Mg.
- *maerens* Lw. n. sp. Im Juni bei Orsova im Grazkathale und bei Herculesbad an den Wasserfällen hinter dem Ferdinands-hofe auf Steinen und auf Laub, stellenweise nicht selten.
- Hercostomus cretifer* Wlk. — *blepharopus* Lw.
- *longiventris* Lw.
- Hypophyllus discipes* Ahrens.
- *crinipes* Staeg.
- *sphenopterus* Lw.
- Argyria diaphana* F. — *confinis* Staeg.
- *argentina* Mg.
- *leucocephala* Mg.
- *Hoffmeisteri* Lw.
- Syntormon spicatus* Lw. — *biseriatus* Lw.
- Synarthrus monilis* Wlk. — *pallipes* F.
- *Zelleri* Lw.
- Xiphandrium caliginosum* Mg.

Xiphandrium sagax Gst.

— *monotrichum* Lw.

— *appendiculatum* Ztt.

Porphyrops spinicoxus Lw.

— *fascipes* Mg.

— *nemorum* Mg.

— *micans* Mg.

— *penicillatus* Lw.

— *praerosus* Lw.

Nematoproctus distendens Mg.

Leucostola vestita Wied.

Diaphorus oculatus Fll.

— *tripilus* Lw.

— *lugubris* Lw.

— *nigricans* Mg.

Chrysotus cupreus Macq.

— *suavis* Lw.

Teuchophorus monacanthus Lw.

Sympycnus annulipes Mg.

Campsicnemus curvipes Fll.

— *umbripennis* Lw.

— *lumbatus* Lw.

— *varipes* Lw.

Liancalus virens Scop.

Hydrophorus inaequalipes Macq.

— *balticus* Mg.

Medeterus melanopleurus Lw.

— *diadema* L.

Saucropus pallidus Fll.

— *suturalis* Fll.

Oncopygus distans Lw.

— *magnificus* Lw. n. sp. Mit der vorigen

Art und auch an den Ufern der Czerna beim

grossen Wasserfall, immer sehr selten. Ich

konnte trotz grossem

Zeit- und Müheaufwand nur wenige

♂ ♂ dieser ungewöhnlich schönen, neuen Species erlangen; das ♀ blieb mir leider unbekannt.

Psilopus platypterus F.

— *ludens* Lw. n. sp.

Im Juni bei Orsova im Grazkathale auf Sumpfpflanzen, sehr selten.

— *bellus* Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad, im Sessemithale und auf der Alpe Kernecska-Csoka selten.

Lonchoptera lutea Panz.

C. Brachycera cyclorapha.

Callomyia aemoena Mg.

— *elegans* Mg.

— *antennata* Ztt.

Platypeza atra Fll.

Pipunculus silvaticus Mg.

— *ruralis* Mg.

Dalmania punctata F.

Myopa testacea L.

Oncomyia atra F.

Zodion notatum Mg.

Ceria conopsoides L.

— *tridens* Lw. n. sp.

Im Juni beim eisernen Thor auf *Pyrethrum* sehr selten.

Callicera aenea F.

Microdon mutabilis L.

— *latifrons* Lw.

Psarus abdominalis F.

Chrysotoxum intermedium Mg.

Chrysotoxum bicinctum L.

— *festivum* L.

— *vernale* Lw.

— *silvarum* Mg.

— *elegans* Lw.

Volucella pellucens L.

— *inflata* F.

— *zonaria* Poda.

Paragus tibialis Fll.

— *albifrons* Fll.

— *bicolor* F.

Triglyphus primus Lw.

Pipiza festiva Mg.

Pipizella virens F.

Orthoneura nobilis Fll.

Chrysogaster splendidus Mg.

— *coemeteriorum* L.

— *basalis* Lw.

— *splendens* Mg.

Chilosia nigra Lw.

— *barbata* Lw.

— *variabilis* Panz.

— *melanopa* Ztt.

— *scutellata* Fll.

— *soror* Ztt.

— *means* F.

— *impressa* Lw.

— *albitarsis* Mg.

— *morio* Ztt.

— *mutabilis* Fll.

— *pygmaea* Ztt.

— *praecox* Ztt.

Chrysochlamys cuprea Scop.

Melithreptus strigatus Staeg.

— *scriptus* L.

— *dispar* Lw.

Xanthogramma ornata Mg.

Syrphus seleniticus Mg.

— *luniger* Mg.

— *corollae* F.

- Syrphus lasiophthalmus* Ztt.
 — *lunulatus* Mg.
 — *topiarius* Mg.
 — *decorus* Mg.
 — *bifasciatus* F.
 — *ribesii* L.
 — *nitidicollis* Mg.
Melanostoma hyalinata Fll.
 — *ambigua* Fll.
 — *mellina* L.
 — *gracilis* Mg.
Platychirus albimanus F.
 — *scutatus* Mg.
 — *ferrugineus* Macq.
Baccha elongata F.
Sphegina clunipes Fll.
Myiolepta luteola Gmel.
 — *vara* Panz.
Rhingia rostrata L.
Brachyopa arcuata Panz.
 — *bicolor* Fll.
Xylota segnis L.
 — *lenta* Mg.
 — *ignava* Panz.
 — *femorata* L.
 — *rufipes* Lw. n. sp.
 Im Juni bei Herculesbad und bei Orsova im Bachnathale auf *Cornus* selten.
 — *bifasciata* Mg.
 — *nemorum* F. apud Mg.
Syrpita pipiens L.
Brachybalpus eunotus Lw. n. sp. Im Mai auf einem Ausflug nach dem Meterriss ein ♀.
 — *valgus* Panz.
Mallota cristatoides Lw.
Criorrhina berberina F.
 — *asilica* Fll.
- Criorrhina oxyacanthae* Mg.
Eumerus ovatus Lw.
 — *sinuatus* Lw.
 — *tricolor* F.
 — *basalis* Lw.
 — *angustifrons* Lw.
 — *pulchellus* Lw.
Temnostoma speciosa Rossi.
 — *bombylans* F.
 — *vespiformis* L.
Helophilus florens L.
 — *pendulus* L.
 — *trivittatus* F.
Eristalis sepulchralis L.
 — *tenax* L.
 — *arbustorum* L.
 — *horticola* Deg.
Merodon equestris F.
 — *clavipes* F.
 — *aberrans* Egg.
 — *rufitibius* Rond.
 — *spinipes* F.
 — *funestus* F.
 — *aeneus* Mg.
 — *armipes* Rond.
Prosenia siberita F.
Dinera flavicornis Mg.
 — *grisea* Fll.
Zeuxia cinerea Mg.
Dexia carinifrons Fll.
 — *ferina* Fll.
 — *rustica* F.
Phorostoma adelpha Lw. n. sp. Im Juni auf der Alpe KernerCsoka und im Sesseminthale auf Umbelliferen ziemlich selten.
 — *triangulifera* Ztt.
 — *microcera* Rond.
- Phorostoma macrophthama* Lw. n. sp.
 Im Juni in der Nähe des eisernen Thores auf *Pyrethrum* sehr selten.
Mimtho praeceps Scop.
Melania volvulus F.
Thelaira leucozona Panz.
Melanophora roralis L.
Morinia nana Mg.
Rhinophora femoralis Mg.
 — *inornata* Lw. apud Schin.
 — *melania* Mg.
Leucostoma simplex Fll.?
 — *analys* Mg.
 — *limbata* Mg.
Clistia foeda Mg.?
Scopolia carbonaria Panz.
 — *succincta* Mg.
 — *cunctans* Mg.
 — *lugens* Mg.
Hypostena medorina Schin.
Degeeria seria Mg.
Macquartia nitida Ztt.
 — *grisea* Fll.
 — *chalybeata* Mg.
 — *nigrita* Fll.
 — *dispar* Fll.
Loewia setibarba Egg.
Clytia continua Panz.
Siphona cristata F.
 — *geniculata* Deg.
Thryptocera crassicornis Mg.
 — *latifrons* Mg.
 — *cognata* Schin.
Myobia fenestrata (Mg.?) Schin.
Leskia aurea Fll.
Redtenbacheria phaniaeformis Egg.

- Miltogramma oestracea* Fll.
 — *pilimana* Rond.
 — *conica* Fll.
Macronychia agrestis Fll.
 — *signata* Mg.
Metopia leucocephala Rossi.
 — *campestris* Fll.
 — *argyrocephala* Mg.
Baumhaueria goniaeformis Mg.
Phorocera concinnata Mg.
 — *caesifrons* Macq.
 — *cilipeda* Rond.
*Ctenocnemis**) *flavoscutellata* Ztt.
 — *major* Macq.
Masicera pratensis Mg.
Tachina rustica Mg.
Meigenia majuscula Rond.
 — *bisignata* Mg.
Exorista festinans Mg.
 — *gnava* Mg.
 — *lucorum* Mg.
 — *vetula* Mg.
 — *affinis* Fll.
 — *fimbriata* Mg.
Nemoraëa amoëna Mg.
 — *notabilis* Mg.
Cnephala bucephala Mg.
Gonia ornata Mg.
 — *hebes* Fll.
Plagia ruralis Fll.
 — *trepida* Mg.
 — *nigripalpis* Rond.
 — *ambigua* Fll.
Zophomyia temula Scop.
Micropalpus fulgens Mg.
- Echinomyia Brunneri* Lw. n. sp. Im Juni in der Nähe des eisernen Thores auf *Pyrethrum macrophyllum* sehr selten.
 — *tessellata* F.
 — *magnicornis* Ztt.
 — *lurida* F.
Uromyia curvicauda Fll.
Ocyptera bicolor Enc.
Gymnosoma rotundata L.
Strongygaster panonius Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad und Plavischeviza auf Dolden sehr selten.
Xysta cana Mg.
Phasia analis F.
Alophora hemiptera F.
 — *subcoleoptrata* L.
 — *pusilla* Mg.
 — *cinerea* F.
 — *muscaria* Fll.
Sarcophaga haematodes Mg.
 — *haemorrhoea* Mg.
Sarcophila Meigenii Schin.
Theria muscaria Mg.
Musca domestica L.
 — *corvina* F.
 — *vitripennis* Mg.
Pollenia vespillo F.
 — *rudis* F.
Myospila meditabunda F.
Morellia simplex Lw.
 — *hortorum* Fll.
Cyrtoneura stabulans Fll.
- Cyrtoneura pabulorum* Fll.
 — *pascuorum* Mg.
 — *caesia* Mg.
Pyrellia serena Mg.
 — *aenea* Ztt.
 — *cadaverina* L.
Lucilia regina Mg.
 — *nobilis* Mg.
 — *caesar* L.
 — *cornicina* F.
Dasyphora pratorum Mg.
Calliphora erythrocephala Mg.
Mesembrina meridiana L.
Rhynchomyia cyanescens Lw.
 — *columbina* Mg.
Idia lunata F.
Stomoxys calcitrans L.
Chirosia fallax Lw. n. sp. Im Mai bei Orsova am neutralen Grund im Grase sehr selten.
Anthomyia pluvialis L.
 — *albicincta* Fll.
 — *diaphana* Wiedem.
 — *socia* Fll.
 — *lactucae* Bouché.
 — *pratensis* Mg.?
 — *schisticolor* Ztt.
 — *radicum* L.
 — *floralis* Fll.
 — *pusilla* Mg.?
 — *villipes* Ztt.
 — *brunnescens* Ztt.
 — *paralleliventris* Ztt.
 — *triplex* Lw. n. sp.

*) Diese und ähnliche Arten sind von Robineau-Desvoidy zur Gattung *Sturmia* vereinigt worden, welcher Name wegen mehrfacher früherer Anwendung auf Pflanzengattungen verworfen werden muss, und für den später Rondani den übel gebildeten Namen *Blepharipa* gewählt hat.

Im Mai im Kasan sehr selten.	<i>Homalomyia lepida</i> Wiedem.	<i>Aricia pagana</i> F.
<i>Anthomyia cilicrura</i> Rond.	— <i>serena</i> Ztt.	— <i>angelicae</i> Scop.
— <i>corvina</i> Lw. n. sp.	— <i>herniosa</i> Rond.	— <i>urbana</i> Mg.
Im Mai bei Orsova im Grazkathale sehr selten.	— <i>aerea</i> Mg.	— <i>aculeata</i> Lw. n. sp.
	— <i>fasciculata</i> Lw. n. sp. Im Juni bei Herculesbad sehr selten.	Im Juli bei Herculesbad sehr selten.
<i>Pegomyia vittigera</i> Ztt.		— <i>pallida</i> F.
— <i>hyoscyami</i> Reaumur.	<i>Eustalomyia</i> *) <i>hilaris</i> Fll.	— <i>populi</i> Mg.
— <i>mitis</i> Mg. ?	<i>Hylemyia variata</i> Fll.	— <i>variegata</i> Mg.
— <i>bicolor</i> Wiedem.	— <i>strigosa</i> F.	— <i>fusca</i> Fll.
<i>Azelia Staegeri</i> Ztt.	— <i>nigrimana</i> Mg.	— <i>trigonalis</i> Mg.
— <i>cilipes</i> Hal.	— <i>conica</i> Wiedem.	<i>Lasiops semicinerea</i> Wiedem.
— <i>Zetterstedtii</i> Rond.	— <i>maculata</i> Macq.	— <i>cincta</i> Ztt.
— <i>aterrima</i> Mg.	<i>Spilogaster duplicatus</i> Mg.	<i>Hydrotaea occulta</i> Mg.
<i>Homalomyia pardalina</i> Rond.	— <i>uliginosus</i> Fll.	— <i>silvicola</i> Lw.
— <i>canicularis</i> L.	— <i>consimilis</i> Fll.	— <i>dentipes</i> F.
— <i>obesa</i> Lw. n. sp. Im Juni bei Orsova und Herculesbad auf Laub ziemlich selten.	— <i>pertusus</i> Mg.	— <i>dentimana</i> Mg.
— <i>monilis</i> Hal.	— <i>vespertinus</i> Fll.	— <i>armipes</i> Fll.
— <i>scalaris</i> F.	— <i>quadrimaculatus</i> Fll.	— <i>meteorica</i> L.
— <i>coracina</i> Lw. n. sp. Im Juni bei Herculesbad sehr selten.	<i>Aricia lucorum</i> Fll.	— <i>amoena</i> Lw. n. sp.
— <i>incisurata</i> Ztt.	— <i>lardaria</i> F.	Im Mai und Juni im Kasan ziemlich selten.
— <i>armata</i> Mg.	— <i>marmorata</i> Ztt.	— <i>cinerea</i> R. D.
— <i>cothurnata</i> Lw. n. sp. Im Juni im Sessemithale selten.	— <i>carbo</i> Schin.	<i>Ophyra leucostoma</i> Wied.
	— <i>umbratica</i> Mg.	<i>Dialyta atriceps</i> Lw.
	— <i>pura</i> Lw. n. sp. Im Juni bei Herculesbad sehr selten.	<i>Limnophora riparia</i> Fll.
	— <i>laeta</i> Fll.	— <i>pulchriceps</i> Lw.
	— <i>trimaculata</i> Bouché.	— <i>triangula</i> Fll.
	— <i>erratica</i> Fll.	<i>Brontaea</i> **) <i>polystigma</i> Mg.

*) Herr Dr. Löw hat in seiner Sammlung diejenigen *Hylemyia*-Arten, denen die Kreuzborsten der Stirn fehlen und deren Männchen eine breitere Stirn haben, unter dem Namen *Eustalomyia* generisch abgesondert.

**) Meigens *Anthomyia polystigma* passt in keine der bisher errichteten *Anthomyiden*-Gattungen; Herr Dr. Löw hat sie in seiner Sammlung mit *A. tonitru* Wiedem. und anderen dieser verwandten Arten zur Gattung *Brontaea* vereinigt.

<i>Lispe simplicissima</i> Lw.	<i>Eccoptomera pallescens</i> Mg.	<i>Micropeza corrigiolata</i> L.
— <i>tentaculata</i> Deg.		— <i>angustipennis</i> Lw.
<i>Myopina reflexa</i> R. D.	<i>Oecothoa fenestralis</i> Fll.	<i>Pteropocila lamed</i> Schrk.
<i>Syllegoptera ocypterata</i> Mg.	<i>Blepharoptera modesta</i> M.	<i>Ptilonota centralis</i> F.
<i>Atherigona varia</i> Mg.	— <i>serrata</i> L.	<i>Ortalis ruficeps</i> F.
<i>Mycophaga fungorum</i> Deg.	— <i>brachypterna</i> Lw.	— <i>levigata</i> Lw. n. sp.
<i>Coenosia inornata</i> Lw. n. sp. Im Mai bei Semlin in Auen auf niederen Laubpflanzen häufig.	n. sp. Im Juni bei Mehadia an Baumstämmen sehr selten.	Mit der vorigen Art selten.
— <i>tigrina</i> F.	— <i>caesia</i> Mg.	— <i>Kowarzii</i> Lw. n. sp. Im Mai bei Orsova sehr selten.
— <i>alma</i> Mg.	<i>Tephroclamys rufiventris</i> Mg.	<i>Platystoma tegularia</i> Lw.
— <i>globuliventris</i> Ztt.	— <i>laeta</i> Mg.	— <i>biseta</i> Lw.
— <i>mollicula</i> Fll.	<i>Dryomyza anilis</i> Fll.	<i>Scoptera vibrans</i> L.
— <i>tricolor</i> Ztt.	<i>Lucina fasciata</i> Mg.	<i>Acidia Heraclei</i> L.
— <i>nana</i> Ztt.	<i>Pelidnoptera nigripennis</i> F.	— <i>Lychnidis</i> F.
— <i>pedella</i> Fll.	<i>Sciomyza cinerella</i> Fll.	<i>Rhagoletis Cerasi</i> E.
<i>Chelisia monilis</i> Mg.	— <i>dubia</i> Fll.	<i>Trypeta falcata</i> Scop.
<i>Cordylura ciliata</i> Mg.	<i>Tetanocera elata</i> F.	<i>Urophora terebrans</i> Lw.
— <i>albilabris</i> F.	— <i>ferruginea</i> Fll.	<i>Carphotricha guttularis</i> Mg.
— <i>albipes</i> Fll.	— <i>punctulata</i> Scop.	<i>Oxyphora Schneideri</i> Lw.
— <i>glaucescens</i> Lw.	— <i>Chaerophylli</i> F.	<i>Oxyna parietina</i> L.
<i>Norellia spinipes</i> Mg.	<i>Limnia marginata</i> F.	<i>Tephritis cincta</i> Lw.
— <i>spinimana</i> Mg.	— <i>unguicornis</i> Scop.	— <i>postica</i> Lw.
<i>Scatophaga inquinata</i> Mg.	<i>Psila fimetaria</i> L.	<i>Palloptera ustulata</i> Fll.
— <i>stercoraria</i> L.	<i>Psila rosae</i> F.	<i>Lonchaea dasyops</i> Mg.
— <i>squalida</i> Mg.	— <i>nigricornis</i> Mg.	— <i>Deutschii</i> Ztt.
<i>Helomyza affinis</i> Mg.	<i>Chyliza atriseta</i> Mg.	— <i>chorea</i> F.
— <i>similis</i> Mg.	— <i>annulipes</i> Macq.	— <i>inaequalis</i> Lw. n. sp. Im Mai und Juni bei Herculesbad und Plavischeviza häufig.
— <i>ustulata</i> Mg.	— <i>leptogaster</i> Panz.	— <i>flavidipennis</i> Ztt.
— <i>olens</i> Mg.	— <i>vittata</i> Mg.	<i>Sapromyza longipennis</i> F.
— <i>univittata</i> v. Roser.	<i>Calobata calceata</i> Fll.	— <i>lupulina</i> F.
<i>Eccoptomera emarginata</i> Lw.	— <i>ephippium</i> F.	
	— <i>adusta</i> Lw.	
	— <i>trivialis</i> Lw.	

- Sapromyza flaviventris* Costa.
 — *fasciata* Fll.
 — *plumicornis* Fll.
 — *pallidiventris* Fll.
 — *rorida* Fll.
 — *praeusta* Fll.
 — *biumbrata* Lw.
 — *decempunctata* Fll.
 — *tetrachaeta* Lw. n. sp. Im Juni im Kasan sehr selten.
- Lauxania aenea* Fll.
Opomyza germinationis L.
Baliophora tripunctata Fll.
Scyphella lutea Fll.
 — *flava* L.
 — *latifrons* Lw. n. sp. Mit den beiden vorigen Arten selten.
- Sepsis cynipsea* L.
 — *punctum* F.
Nemopoda cylindrica F.
 — *stercoraria* R. D.
Piophilina nigriceps Mg.
 — *nigrimana* Mg.
 — *casei* L.
Saltella chaerophylli Schrk.
Madiza glabra Fll.
Notiphila riparia Mg.
 — *cinerea* Fll.
 — *dorsata* Stenh.
 — *nigricornis* Stenh.
- Discocerina obscurella* Mg.
- Discocerina nigrina* Mg.
 — *pulicaria* Hal.
Gymnopa subsultans F.
Athyroglossa glabra Mg.
 — *nudiuscula* Lw. n. sp. Herculesbad. Mit der vorigen Art sehr selten.
- Hydrellia griseola* Fll.
 — *fulviceps* Stenh.
 — *nigricans* Stenh.
 — *modesta* Lw.
- Parydra pusilla* Mg.
 — *fossarum* Hal.
 — *aquila* Fll.
 — *cognata* Lw.
 — *coarctata* Fll.
 — *quadripunctata* Mg.
 — *littoralis* Mg.
- Ephydra riparia* Fll.
Scatella sorbillans Hal.
 — *stagnalis* Fll.
- Diastata inornata* Lw.
Stegana curvipennis Fll.
Amiota variegata Fll.
Scaptomyza graminum Fll.
Drosophila maculata Duf.
 — *transversa* Fll.
 — *tristis* Fll.
 — *obscura* Fll.
 — *rufifrons* Lw. n. sp. Mit *Dr. tristis* sehr selten.
 — *ampelophila* Lw.
- Drosophila funebris* F.
Dicraeus obscurus
- Lw. n. sp. Im Mai aus Orsova sehr selten.
- Oscinis quinquangula* Lw. n. sp. Im Mai um Orsova sehr selten.
 — *abdominalis* Ztt.
- Centor Cereris* Fll.
Diplotoxa messoria Fll.
Chlorops taeniopus Mg.
 — *minuta* Lw.
 — *serena* Lw.
- Chloropisca ornata* Mg.
Crassiseta cornuta Fll.
Ochthiphila juncorum Fll.
Lobioptera speciosa Mg.
 — *ludens* Wahlb.
- Desmometopa atrum* Mg.
Agromyza obscurella Fll.
 — *abiens* Ztt.
 — *geniculata* Fll.
 — *reptans* Fll.
 — *errans* Mg.
 — *aeneiventris* Fll.
 — *trivittata* Lw. n. sp. Im Mai bei Herculesbad sehr selten.
- Ceratomyza denticornis* Panz.
Napomyza lateralis Fll.
Phytomyza affinis Fll.
 — *flavoscutellata* Fll.
 — *albipennis* Fll.
 — *obscura* Fll.
- Borborus nitidus* Mg.
 — *niger* Mg.
 — *suillorum* Hal.

<i>Sphaecocera subsultans</i> F.	<i>Limosina crassimana</i>	<i>Phora florea</i> F.
— <i>pusilla</i> Fll.	Hal.	— <i>mordellaria</i> Fll.
<i>Limosina limosa</i> Fll.	— <i>coxata</i> Stenh.	— <i>rufipes</i> Mg.
— <i>pumilio</i> Ztt.	— <i>geniculata</i> Macq.	— <i>crassicornis</i> Mg.
— <i>lutosa</i> Stenh.	— <i>ferruginata</i> Stenh.	<i>Gymnophora arcuata</i> Mg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Kowarz Ferdinand

Artikel/Article: [Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns. 453-464](#)