

# Ueber eine fünfte Sendung von Vögeln aus Ecuador.<sup>1)</sup>

Von

## August von Pelzeln.

(Vorgelegt in der Versammlung am 5. November 1879.)

Durch die Güte des Herrn Professor P. Wiesbaur habe ich in diesem Jahre die fünfte Sendung von Vogelbälgen aus Ecuador zum Bestimmen erhalten. Dieselbe umfasst 88 Stücke, welche durch das geehrte Mitglied der zoologisch-botanischen Gesellschaft, P. Luis Sodiro S. J., im Februar 1878 eingesendet worden sind.

*Trogon personatus* Gould f.

*Diglossa personata* (Fras.).

— *aterrima* Lafr.

*Oreotrochilus Pichincha* (Bourc. et Muls.).

*Chalybura Buffoni* (Less.) f.?

*Panoplites Mathewsii* Gould.

— *Jardinei* (Bourc.).

*Myrtis Fannyi* Less.

Drei Weibchen und ein junges Männchen, an dem die glänzende Kehlfärbung mit einigen Federn sich zu zeigen beginnt.

*Lesbia Victoriae* (Bourc. et Muls.) (*L. Amaryllis* ante).

— *gracilis* Gould.

*Pterophanes Temminckii* (Boiss.).

*Rhamphomicron Herrani* (Del.).

Junges Männchen. Das Schwarz am Oberkopf und die glänzenden Farben der Kehle sind noch nicht entwickelt.

*Metalhura thyrianthina* (Loddig).

*Petasophora iolata* (Gould).

— *Delphinae* (Less.).

*Heliangelus strophianus* Gould.

*Bourcieria fulgidigula* Gould.

<sup>1)</sup> Verh. d. k. k. zool.-botan. Ges. Wien XXIV. (1874) 171, XXVI. (1876) 766, XXVIII. (1878) 15.

*Lampropygia Wilsoni* (De Lattre et Bourc.).

*Eriocnemis Luciani* (Bourc.).

*Saucerottia cyanifrons* (Bourc.).

Männchen: Oberkopf und jederseits die Gegend unter den Augen blau.

Exemplar: Oberkopf wenig, Gegend unter den Augen mehr blau.

Männchen (jung): Kein Blau auf dem Oberkopf und unter den Augen, Kehle, Gurgel und übrige Unterseite auf weissem Grunde grün geschuppt.

Im Nomencl. Av. Neotrop. 92 und von Mulsant, Hist. nat. Ois.

Mouches I. 334 nur aus Columbien angeführt.

*Chlorostilbon angustipennis* (Fras.)

*Parula pitiayumi* (Vieill.).

*Setophaga ruficoronata* Kaup.

*Pyrocephalus rubineus* (Bodd.).

*Ampelio arcuatus* (Lafr.).

Männchen und Weibchen.

*Rupicola sanguinolenta* Gould.

*Cyanocitta turcosa* Bonap.

Ein offenbar junger Vogel; im Nacken und Rücken, Brust und Bauch nur wenig von bläulichem Schimmer zu sehen, Farbe matt bläulichgrün, Oberkopf weisslich, das die lichtblaue Kehle einschliessende schwarze Band sehr schmal.

*Ostinops atro-castaneus* Cab.

*Pendulinus (Icterus) chrysocephalus* (L.).

Nach Sclater und Salvin (Nomencl. Av. Neotrop.) aus Guiana, Amazonien und Columbien, nach Natterer am Rio negro und Rio blanco.

*Buarremon latinuchus* Du Bus.

*Poecilothraupis lunulata* (Du Bus.).

*Calliste yeni* (Lafr. et Orb.).

— *gyroloides* (Lafr. et Orb.).

— *cyanicollis* (Lafr. et Orb.).

— *pulchra* (Tschudi).

— *Schrankii* (Spix).

*Psittospiza Riefferi* (Boiss.).

*Iridornis Dubusia* Bonap.

Es kommt sonach in Ecuador die columbische *I. Dubusia* und nicht die peruanische *I. Reinhardti* Sclater vor. Im Nomencl. Av. Neotrop. nur aus Columbien angeführt.

*Euphonia nigricollis* (Vieill.).

— *xanthogastra* Sundev.

*Chamaepelia passerina* (Linné).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von

Artikel/Article: [Ueber eine fünfte Sendung von Vögeln aus Ecuador. 525-526](#)