

Mycologische Beiträge. VI.

Von

Stephan Schulzer von Muggenburg.

(Fortsetzung von Band XXX, Seite 498.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 2. November 1881.)

Berichtigung. Die in den Verhandlungen des vorigen Jahres Seite 495 unter Nr. 151 gegebene Diagnose betrifft den *Ag. (Armillaria) subrubescens* n. sp. und der ganze Schlusssatz, welcher mit den Worten beginnt: „So weit ich mich . . .“ gehört zu einem andern Pilze, wolle daher gestrichen werden.

158. *Ag. (Psathyrella) tenebricosus* n. sp. *Hygrophanus*; pileo e conico explanato, margine deflexo, plerumque minute umbonato, 1—3 cm. lato, extra verticem submembranaceo, pro tempore dilute aut saturate-umbrino usque fere castaneo, non striato, sed interdum in adultis radiatim subplicato, sub lente innato-fibrilloso; lamellis non confertis, postice rotundato-attingentibus, antice rotundatis, 2·5—5 mm. latis, e dilute, obscure-fuligineis; stipite anguste-fistuloso, cartilagineo, undique 1·5—2·5 mm. cr., 1·5—3·5 cm. l., ad basim plerumque parum curvato, albo, laevi, glabro, nitido, discreto. Sine odore aut sapore distincto. Sporae nigrae, oblongo-ellipsoideae, fere cylindraceae, 0·005—0·006 mm. longae, 0·002 mm. cr. Mense Octobri in frondosis gregatim aut subcaespitose; terrestres.

Im Walde Crni gaj bei Vinkovce.

159. *Ag. (Psathyrella) serotinellus* n. sp. *Hygrophanus*; pileo late-conico, nunquam explanato, 1·5—2·6 cm. lato, 1—1·5 cm. alto, membranaceo, ad marginem fisso, in senilibus subplicato, non striato, sed Jove pluvio quandoque zona lata marginali obscura notato, fulvente-griseo, glabro; lamellis non confertis, late-adnatis, demum liberis, subventricosis, usque 6 mm. latis, nigro-fuscescentibus, acie integra albicantibus; stipite discreto, ubique 1—2 mm. cr., 6—9 cm. l., valde caduco, flexuoso aut subrecto aut ad basim curvato, laevi, ad basim albo-strigoso, ceterum glabro et albido, in vetustis deorsum

fuscescente-luteolo, valde fistuloso, intus tomento albo vestito. Odor nullus, sapor subamarus, malus. Sporae nigrae, ellipsoideae inaequilaterales, 0'008—0'01 mm. longae, 0'004—0'005 mm. latae. Mense Novembri catervatim in frondosis inter folia, stipulas etc.

Im Walde Crni gaj bei Vinkovce.

160. *Ag. (Pleurotus) squamatus* n. sp. *Non hygrophanus, extus intusque albus, demum vertice, pileis et basi stipitis vix conspicue luteolis. Pileus integer, irregularis, pulvinatus, carnosus, 6·5 cm. latus, nec tabulatim rimosus ut A. dryinus, sed vertice propter pilos innatos conjunctos squamosus, pars reliqua laevis. Lamellis non confertis, antice cuspidatis, postice sinuoso-adnatis, nec decurrentibus ut in Agarico dryino, 7—9 cm. latis; stipite contiguo, excentrico, adscendente-curvato, cylindrico, 2·5 cm. longo, 1 cm. crasso. Velum nullum. Odor suavis, sapor bonus. Sporae cylindraceae, interdum leniter curvatae, 0'008—0'012 mm. longae, 0'003 mm. crassae (in A. dryino vix 0'007 mm. longae). Mense Octobri ad Carpinum Betulam vivam sub-caespitose.*

Im Walde Crni gaj bei Vinkovce.

Beim flüchtigen Ansehen dem *A. dryinus* P. überaus ähnlich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Schulzer von Muggenburg Stephan Joseph

Artikel/Article: [Mycologische Beiträge VI. 679-680](#)