

Ueber Dr. Emin Bey's dritte Sendung von Vögeln aus Central-Afrika.¹⁾)

Von

August von Pelzeln.

(Vorgelegt in der Versammlung am 6. December 1882.)

Die nachfolgenden Blätter enthalten den Bericht über Dr. Emin Bey's dritte Sendung von Vögeln aus Central-Afrika an das Wiener Museum. Dieselbe umfasst eine neue Art *Argya amauroura* und folgende Species, welche aus diesem Gebiete noch nicht bekannt geworden waren: *Merops viridissimus* Sw., *Drymoeca mystacea* (Rüpp.), *Cisticola marginata* Heugl., *C. ruficeps* (Rüpp.), *Saxicola isabellina* (Cretzschr.), *Lanius pyrrhostictus* (Hol. et Pelz.) und *Scopus umbretta* (Gm.).

Eine für die geographische Verbreitung interessante Thatsache ist auch das Vorkommen des von Dr. Holub in Central-Transvaal entdeckten *Lanius pyrrhostictus* in dem von Dr. Emin Bey erforschten Gebiete.

Falco ruficollis Swains.

Hartlaub, Abhandl. d. Naturwiss. Vereines zu Bremen, VII. Bd., S. 115 und VIII. Bd., S. 221.

Ein Exemplar, der Grösse nach wohl ein Männchen, ohne Zettel. Unterscheidet sich von den in unserer Sammlung befindlichen Exemplaren dadurch, dass die ganze Unterseite von der Brust an ocker- oder blass rostgelb ist, auf welcher Grundfarbe wenig zahlreiche, schwärzliche Querbinden sich zeigen, welche auf der Bauchmitte gänzlich fehlen. An den Flanken dagegen werden die Binden breiter, deutlicher, und die Grundfarbe ist theilweise weiss.

¹⁾ Vgl. Verh. der k. k. zool.-bot. Gesellsch., 1881, S. 141 und 605. — Einen wichtigen Beitrag zur Kenntniss der Ornith. des äquatorialen Afrika bildet Dr. Hartlaub's werthvolle Abhandlung: Ueber einige neue Vögeln aus dem oberen Nilgebiete (Journ. f. Ornith. 1882, S. 321, Taf. I), in welcher folgende von Dr. Emin Bey entdeckte und im Ornith. Centralbl. 1882, S. 91 vorläufig publicirte Arten beschrieben werden: *Peuholaea clericalis*, *Hyphantornis Emini* (Taf. I, Fig. 1), *Habropyga oenochroa*, *Lanius gubernator* (Taf. I, Fig. 2), *Fringillaria Forbesi*, *Aegitholus masculus*, *Traebypodus versicolor*, *Franiolinus ochrogaster*. Im Centralbl. a. a. O. findet sich noch die Diagnose von *Phyllostrophus rufescens*.

Ohne Zweifel zeigt dieser Vogel das jüngere Kleid dieser Art, an dem die Ausfärbung des Unterleibes noch nicht erfolgt ist.

Tinnunculus alaudarius (Briss.).

Pelzeln, Abhandl. der zool.-bot. Gesellsch., 1881, S. 607.

Männchen, Ladó, 5. Februar 1881. „*Longit. tot. 340 mm., rostri a fronte 19, alae 254, caudae 159, tars. 38. Iride fusca, periophthalmiis, pedibus flavis, ceromate ochraceo flavo, rostro coerulescente nigro.*“ E. B.

Vollkommen mit dem ausgefärbten *T. alaudarius* aus Europa übereinstimmend.

Melierax polyzonus (Rüpp.).

Pelzeln, a. a. O. 143 und 607.

Astur Mechowi Cab. Hartlaub, a. a. O. VIII, 213.

Männchen, Toromia, 6. März 1881.

Dieses Exemplar ist einem von Dr. Vierthaler am blauen Nil gesammelten Weibchen sehr ähnlich, nur an der Brust etwas mehr ins Bräunliche ziehend. Die Flügeldecken und Secundarien sind, wie an jenem, gesprenkelt.

Elanus melanopterus (Dond.).

Pelzeln, a. a. O. 607.

Weibchen, Ladó, 19. März 1881. „*Longit. tot. 345 mm., rostri a fronte 22, alae 276, caudae 133, tars. 27. Iride coccinea, rostro corneo nigro, ceromate, ciliis et pedibus flavissimis.*“ E. B.

Hirundo aethiopica (Blanf.).

Hartlaub, a. a. O. VIII, 206.

Männchen, jung, Redjaf, 30. Mai 1881.

Eurystomus afer (Lath.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 110. — Pelzeln, a. a. O. 143.

Männchen, Fadjulli, 13. Mai 1881.

Coracias abyssinica (Gmel.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 110. — Pelzeln, a. a. O. 608.

Männchen, Ladó, 5. Februar 1881. „*Longit. tot. 445 mm., rostri a fronte 29, alae 157, caudae 137, tars. 19, retr. extimae 255. Iride fusca, rostro nigro, pedibus ochraceis.*“ E. B.

Weibchen, Ladó, 16. März 1881. „*Longit. tot. 425 mm., rostri a fronte 30, alae 155, caudae 120, tars. 21, retr. 228. Iride umbrina, rostro nigro, pedibus ochraceis.*“ E. B.

Halcyon senegalensis (Linné).

Hartlaub, a. a. O. VII, 110. — Pelzeln, a. a. O. 143 und 608.

Männchen, Ladó, 14. Juni 1881.

Merops superciliosus Linné.

Hartlaub, a. a. O. VII, 111.

Weibchen, Ladó, 15. Februar 1881. „*Longit. tot. 286 mm., rostri a fronte 41, alae 128, caudae 83, tars. 10, retr. med. 122. Iride cinnabarina, rostro nigro, pedibus plumbeis.*“ E. B.

**Merops viridissimus* Swains.

Weibchen, Ladó, 10. Februar 1881. „*Longit. tot. 220 mm., rostri a fronte 24, alae 90, caudae 114, tars. 10. Iride scarlatina, rostro nigro, pedibus plumbeis.*“ E. B.

Nectarinia pulchella (L.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 107. — Pelzeln, a. a. O. 144 und 609.

Männchen im Winterkleid, Ladó, 13. Februar 1881. „*Longit. tot. 122 mm., rostri a fronte 17, alae 42, caudae 40, tars. 16. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Weibchen, Ladó, 9. Februar 1881. „*Longit. tot. 111½ mm., rostri a fronte 16½, alae 52, caudae 55, tars. 13. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Anthreptes orientalis Hartl.

a. a. O. VII, 109; VIII, 205. — Pelzeln, a. a. O. 609.

Männchen, Ladó, 20. Februar 1881. „*Longit. tot. 121 mm., rostri a fronte 14, alae 55, caudae 45, tars. 14½. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“

Männchen, Ladó, 9. März 1881. „*Longit. tot. 135 mm., rostri a fronte 15½, alae 66, caudae 46, tars. 14½. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“

Männchen (Winterkleid), Ladó, 5. März 1881. „*Longit. tot. 128 mm., rostri a fronte 14, alae 68, caudae 45, tars. 17. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“

Weibchen, Ladó, 4. März 1881. „*Longit. tot. 122 mm, rostri a fronte 14, alae 59, caudae 43, tars. 17. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“

Weibchen, Ladó, 20. Februar 1881. „*Longit. tot. 120 mm., rostri a fronte 14, alae 65, caudae 44, tars. 17. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Phyllolais pulchella (Rüpp.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 90; VIII, 190.

Weibchen, Ladó, 5. April 1881. „*Longit. tot. 99 mm., rostri a fronte 7½, alae 45, caudae 39, tars. 13. Iride helvola, rostro flavido corneo, pedibus ochraceis.*“ E. B.

**Drymoeca mystacea* Rüpp.

Männchen, Ladó, 10. März 1881. „*Longit. tot. 123 mm., rostri a fronte 11½, alae 48, caudae 54, tars. 17. Iride helvola, rostro nigro, pedibus rubellis.*“

Männchen, Ladó, 20. März 1881. „*Longit. tot. 126 mm., rostri a fronte 12, alae 48, caudae 55, tars. 16½. Tride helvola, rostro nigro, pedibus incarnato rubellis.*“ E. B.

**Cisticola marginata* Heuglin.

Drymoeca marginalis Heuglin, Syst. Uebers. Nr. 175.

Drymoeca marginata Heuglin, Ibis 1869, p. 94, Taf. I, Fig. 1.
— Gray, Hand List Birds, sp. 2781.

Cisticola marginata Heuglin, Orn. N.-Ost-Afrikas 248 et LXXXIII.

Männchen, Ladó, 20. März 1881. „*Longit. tot. 137 mm., rostri a fronte 12, alae 54, caudae 59, tars. 20. Iride helvola, rostro corneo fusco, pedibus rubellis.*“

Männchen, Ladó, 7. Februar 1881. „*Longit. tot. 134 mm., rostri a fronte 14, alae 56, caudae 45, tars. 28 $\frac{1}{2}$. Iride helvola, rostro corneo subtus pallido, pedibus rubellis.*“ E. B.

**Cisticola ruficeps* (Rüpp.).

Heuglin, Orn. Nordost-Afrikas 258 et LXXIV.

Weibchen, Ladó, 21. April 1881.

Camaroptera brevicaudata (Rüpp.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 90. — Pelzeln, a. a. O. 144.

Männchen, Ladó, 21. April 1881.

Männchen, Ladó, 13. März 1881. „*Longit. tot. 128 mm., rostri a fronte 11, alae 52, caudae 41, tars. 21. Iride helvola, rostro nigro, pedibus incarnato-rubellis.*“

Männchen, Ladó, 24. Februar 1881. „*Longit. tot. 127 mm., rostri a fronte 11, alae 62, caudae 43, tars. 21. Iride helvola, rostro nigro, pedibus incarnato-rubellis.*“

Weibchen, Ladó, 14. Juni 1881.

Weibchen, Ladó, 7. Juni 1881.

Weibchen, Ladó, 18. Juni 1881.

Weibchen, Wakkala, 10. April 1881. „*Longit. tot. 122 mm., rostri a fronte 12 $\frac{1}{2}$, alae 57, caudae 40, tars. 19. Iride flavo-brunnea, rostro nigro, pedibus rubellis.*“ E. B.

Alle diese Exemplare zeigen graue Oberseite und entsprechen der von Dr. Hartlaub a. a. O. gegebenen Beschreibung.

Oligura microura Rüpp.

Oligocerius rufescens (V.). Hartlaub, a. a. O. VII, 92.

Oligura microura Rüpp. Pelzeln, a. a. O. 144.

Männchen, Ladó, 25. Februar 1881. „*Longit. tot. 95 mm., rostri a fronte 12, alae 59, caudae 20, tars. 15. Iride rubella, rostro corneo, pedibus rubellis.*“ E. B.

Weibchen, Ladó, 20. Juni 1881.

Weibchen, Ladó, 18. Juni 1881.

Hypolais pallida Hempr. et Ehrenb.

Weibchen, Ladó, 14. Februar 1881. „*Longit. tot. 132 mm., rostri a fronte 15, alae 15, caudae 46, tars. 18 $\frac{1}{2}$. Iride pallide aurantiaca, rostro flavidio-corneo, pedibus rubellis.*“ E. B.

Saxicola oenanthe (L.) (*frenata* Heugl.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 88. — Pelzeln, a. a. O. 145.

Männchen, Ladó, 13. Februar 1881. „*Longit. tot. 157 mm., rostri a fronte 15, alae 96, caudae 51, tars. 25. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“

Männchen, Ladó, 13. März 1881. „*Longit. tot. 166 mm., rostri a fronte 14, alae 98, caudae 57, tars. 25. Iride umbrina, rostro et pedibus nigris.*“

Weibchen, Ladó, 8. Februar 1881. „*Longit. tot. 150 mm., rostri a fronte 12 $\frac{1}{2}$, alae 94, caudae 52, tars. 23. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

**Saxicola isabellina* (Cretzschm.).

Heuglin, Orn. Nordost-Afrikas 344, XCVI et CCXXXVI.

Männchen, Ladó, 14. Februar 1881. „*Longit. tot. 180 mm., rostri a fronte 15, alae 97, caudae 60, tars. 24. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Weibchen, Ladó, 5. März 1881.

Turdus pelios Bp.

Turdus icterorhynchus Pr. Württ. Hartlaub, a. a. O. VII, 88.

Turdus pelios Pelzeln, a. a. O. 146.

Männchen, Ladó, 20. Februar 1881. „*Longit. tot. 232 mm., rostri a fronte 20, alae 123, caudae 93, tars. 27. Iride margaritacea, rostro aurantiaco, pedibus rubellis.*“ E. B.

Ein zweites Exemplar war durch Insectenfrass zerstört.

Pycnonotus nigricans (Vieill.) (*P. niloticus* Dr. Emin Bey msc.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 93. — Pelzeln, a. a. O. 610.

Männchen, Ladó, 25. April 1881.

Cichladusa guttata Heuglin.

Hartlaub, a. a. O. VII, 92. — Pelzeln, a. a. O. 610.

Männchen, Ladó, 11. Juni(?) 1881. „*Longit. tot. 192 mm., rostri a fronte 15, alae 83, caudae 80, tars. 22. Iride fusco umbrina, rostro nigro, pedibus fuscis.*“

Männchen, Ladó, 17. März 1881. „*Longit. tot. 195 mm., rostri a fronte 17, alae 87, caudae 79, tars. 23. Iride umbrina, rostro nigro, pedibus plumbeo fuscis.*“

Männchen, Ladó, 24. März 1881. „*Longit. tot. 186 mm., rostri a fronte 15, alae 88, caudae 80, tars. 25. Iride castanea, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Männchen, Tarrangue, 7. März 1881.

Argya rufula Heuglin.

Pelzeln, a. a. O. 146 und 610.

Argya rufescens. Hartlaub, a. a. O. VIII, 191.

Männchen, Ladó, 10. Februar 1881. „*Longit. tot. 211 mm., rostri a fronte 15½ mm., alae 82, caudae 94, tars. 23. Iride pallide flava, rostro corneo, pedibus rubellis.*“ E. B.

Männchen, Ladó, 15. März 1881.

**Argya amauroura* n. sp.

A. supra brunnea, cauda brunneo-nigra striis transversalibus nigris obsoletis, infra brunnescente cinerea, rectricum extimarum apicibus albidis, loris, oculorum ambitu et gula albis, gastraeo reliquo pallide ferrugineo, medio fere albo, rostro corneo, tomis et mandibula pallidis, pedibus, plumbeo-fuscis. Longit. 217 mm. (8"), alae 75 (3"), caudae 93 (3"7"), rostri a rictu 22 (16"), tars. 25 (1").

Argya rufulae Heuglin similis sed rostro multo breviore, corpore supra magis obscuro, cauda obscura fere nigrescente, et gastraea multo pallidiore diversa.

Männchen (N. 115), Fadibek, 5. Mai 1881. „Longit. tot. 217 mm., rostri a fronte 15, alae 75, caudae 93, tars. 25. Iride margaritacea, rostro corneo, tomiis et mandibula pallidis, pedibus plumbeo-fuscis.“ E. B.

Dicrourus divaricatus (Licht.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 97. — Pelzeln, a. a. O. 610.

Männchen, Ladó, 28. Februar 1881. „Longit. tot. 231 mm., rostri a fronte 17, alae 124, caudae 102, tars. 18 $\frac{1}{2}$. Iride coccinea, rostro et pedibus nigris.“ E. B.

Cassinia semipartita (Rüpp.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 98; VIII, 197. — Pelzeln, a. a. O. 146 und 610.

Weibchen, jung (162), Ladó, 6. Juni 1881. „Longit. tot. 182 mm., rostri a fronte 12, alae 88, caudae 78, tars. 15. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.“ E. B.

Weibchen, jung, Redjaf, 30. Mai 1881.

Männchen, jung, Ladó, 28. Juni 1881.

Das letzterwähnte Männchen ist ohne Zweifel Nestvogel und stimmt mit der von Dr. Hartlaub gegebenen Beschreibung überein; die beiden Weibchen sind älter und beginnen sich dem Kleide des alten Vogels zu nähern.

Terpsiphone melanogastra Sw.

Tchitreia melanogastra Sw. Hartlaub, a. a. O. VII, 97; VIII, 197, — Pelzeln, a. a. O. 146 und 610.

Männchen, Ladó, 21. Februar 1881. „Longit. tot. 315 mm., rostri a fronte 14, alae 88 $\frac{1}{2}$, caudae 112, tars. 16, rectr. med. 225. Iride fusca, rostro et pedibus nigro-coerulescentibus.“ E. B.

Campephaga phoenicea (Lath.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 96; VIII, 197.

Männchen, Wakkala, 11. April 1881. „Longit. tot. 218 mm., rostri a fronte 13, alae 104, caudae 98, tars. 19. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.“

Männchen, Wakkala, 11. April 1881. „Longit. tot. 216 mm., rostri a fronte 12, alae 99, caudae 96, tars. 18 $\frac{1}{2}$. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.“ E. B.

Lanius excubitorius Prev. et Des Murs.

Hartlaub, a. a. O. VII, 96; VIII, 195. — Pelzeln, a. a. O. 146.

Männchen, Ladó, 5. Februar 1881. „Longit. tot. 269 mm., rostri a fronte 15, alae 114, caudae 127, tars. 24. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.“ E. B.

Männchen, Ladó, 14. Juni 1881.

**Lanius pyrrhostictus* Hol. et Pelz.

Beitr. z. Orn. Süd-Afrikas 97, Taf. 2.

Weibchen (N. 103), Agarú, 30. April 1881 (als *L. humeralis* bezeichnet).

„*Longit. tot. 254 mm., rostri a fronte 13, alae 91, caudae 125, tars. 19. Iride umbrina, rostro nigro, pedibus coriaceis nigris.*“ E. B.

Dieses Exemplar stimmt ganz mit dem von Dr. Holub erhaltenen typischen Exemplar des *L. pyrrhostictus* aus der Umgebung von Rustenberg, Central-Transvaal, überein, nur ist der Schwanz bei dem ersten länger und die Schwanzfedern sind schmäler, fast wie an *L. collaris* und dem durch geringere Grösse sich unterscheidenden *L. humeralis*.

Eurocephalus Rueppellii Bonap.

Hartlaub, a. a. O. VII, 97. — Pelzeln, a. a. O. 147 und 611.

Männchen, Ladó, 7. März 1881. „*Longit. tot. 235 mm., rostri a fronte 17½, alae 123, caudae 96, tars. 20. Iride umbrina, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Junges Exemplar ohne Bezeichnung.

Laniarius erythrogaster Rüpp.

Hartlaub, a. a. O. VII, 94. — Pelzeln, a. a. O. 611.

Männchen, Ladó, 14. Mai 1881.

Telephonus erythropterus (Shaw.).

Pelzeln, a. a. O. VII, 147.

Weibchen, Wakkala, 21. Februar 1881.

Notauges superbus (Rüpp.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 106. — Pelzeln, a. a. O. 612.

Männchen, Ladó, 19. März 1881. „*Longit. tot. 215 mm., rostri a fronte 18, alae 127, caudae 78, tars. 27. Iride straminea, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Männchen, jung, Ladó, 25. Juni 1881.

Textor alecto Temm.

Hartlaub, a. a. O. VII, 101. — Pelzeln, a. a. O. 148.

Männchen, Ladó, 4. Juni 1881. „*Longit. tot. 256 mm., rostri a fronte 20½, alae 122, caudae 98, tars. 25. Iride fusca, rostro flavo, apice et tomiis nigris, pedibus corneo fuscis.*“ E. B.

Hyphantornis abyssinica (Gmel.).

Hyphantornis habessinica (Gm.). Hartlaub, a. a. O. VII, 99.

Hyphantornis abyssinica. Pelzeln, a. a. O. 612.

Männchen, Fadjulli, 10. Mai 1881. „*Longit. tot. 198 mm., rostri a fronte 20½, alae 96, caudae 54, tars. 24. Iride aurantiaca, rostro nigro, pedibus rubellis.*“

Weibchen, Fadjulli, 10. Mai 1881. „*Longit. tot. 177 mm., rostri a fronte 19, alae 81, caudae 53, tars. 20. Iride aurantiaca, rostro plumbeo-fusco, basi mandibulari pallida, pedibus rubellis.*“ E. B.

Hyphantornis taenioptera Reichenb.

Hartlaub, a. a. O. VII, 99.

Männchen, Ladó, 7. Juni 1881. „*Longit. tot. 148 mm., rostri a fronte 15, alae 72, caudae 44, tars. 17. Iride fusca, rostro nigro, pedibus rubellis.*“ E. B.
Männchen, Ladó, 7. Juni 1881.

Sitagra luteola (Licht.).

Hyphantornis luteola. Hartlaub, a. a. O. VII, 100; VIII, 200.

Sitagra luteola. Pelzeln, a. a. O. 612.

Männchen, Ladó, 1. Juni 1881.

Männchen, Ladó, 3. Juni 1881. „*Longit. tot. 127 mm., rostri a fronte 12 $\frac{1}{2}$, alae 63, caudae 40, tars. 14. Iride rufa, rostro nigro, pedibus rubento fuscis.*“ Weibchen, Ladó, 7. Juni 1881.

Weibchen, Ladó, 11. Juni 1881. E. B.

Anaplectes melanotis (Lafr.).

Sycobius melanotis. Hartlaub, a. a. O. VII, 101.

Anaplectes melanotis. Pelzeln, a. a. O. 150.

Männchen, Fadjulli, 10. Mai 1881. „*Longit. tot. 166 mm., rostri a fronte 18, alae 88, caudae 62, tars. 17. Iride castanea, rostro cinnabarino, pedibus rubellis.*“ E. B.

Männchen, Redjaf, 30. Mai 1881.

Quelea aethiopica Sundev.

Pelzeln, a. a. O. 612.

Hyphantica aethiopica. Hartlaub, a. a. O. VIII, 201.

Männchen, Ladó, 16. Juli 1881. „*Longit. tot. 136 mm., rostri a fronte 14, alae 67, caudae 38, tars. 16. Iride umbrina, annulo periophthalmico coralino, rostro sanguineo apice rubro, pedibus rubris.*“ Zwei Männchen, Ladó, 18. Juli 1881.

Weibchen, Ladó, 16. Juli 1881. „*Longit. tot. 132 mm., rostri a fronte 14, alae 47, caudae 38, tars. 16. Iride umbrina, annulo periophthalmico ochraceo, rostro aurantiaco, pedibus flavescenti-rubellis.*“ E. B.

Euplectes taha A. Smith.

Hartlaub, a. a. O. VII, 103; VIII, 201.

Männchen, Ladó, 5. Juni 1881. „*Longit. tot. 122 mm, rostri a fronte 13 $\frac{1}{2}$, alae 57, caudae 30, tars. 14. Iride rufo-umbrina, rostro nigro, pedibus rubellis.*“ E. B.

Männchen, Ladó, 12. Juni 1881.

Weibchen, Ladó, 8. October 1881.

Weibchen, Ladó, 28. Juni 1881.

Bei diesen Exemplaren beträgt die Flügellänge der Männchen nach meiner Messung 60 Mm., jene der Weibchen 58, wogegen sie an einem Männchen aus der Transvaal beinahe 70 Mm. erreicht. Die letztere Dimension stimmt mit der von A. Smith gegebenen nahezu überein.

Es scheint also, dass die central-afrikanischen Vögel dieser Art durch kürzere Flügel von ihren südlicheren Verwandten sich unterscheiden.

Nigrita Arnaudii Puch.

Hartlaub, a. a. O. VII, 104. — Pelzeln, a. a. O. 150.

Männchen, Ladó, 18. Juni 1881. „*Longit. tot. 130 mm., rostri a fronte 12, alae 65½, caudae 35, tars. 14½. Iride castanea, rostro nigro, pedibus rubellis.*“

Männchen, Ladó, 20. Februar 1881. „*Longit. tot. 112 mm., rostri a fronte 11, alae 64, caudae 31, tars. 15. Iride castanea, rostro nigro, pedibus incarnato-rubellis.*“ E. B.

Weibchen, Ladó, 22. Juni 1881.

Sorella Emini Hartl.

a. a. O. VII, 104; VIII, 201. — Pelzeln, a. a. O. 150. — Journ. f. Ornith. 1881, Taf. 1, Fig. 34.

Männchen, Ladó, 17. Februar 1881. „*Longit. tot. 118 mm., rostri a fronte 9, alae 63, caudae 48, tars. 13. Iride fusca, rostro corneo fusco, pedibus fusco-rubellis.*“

Männchen, Ladó, 19. Februar 1881. „*Longit. tot. 116 mm., rostri a fronte 9, alae 63, caudae 41, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco basi et mandibula pallidioribus, pedibus fusco-rubellis.*“

Männchen, Ladó, 21. Februar 1881. „*Longit. tot. 118 mm., rostri a fronte 9, alae 63, caudae 41, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco, mandibula et basi pallidioribus, pedibus fusco-rubellis.*“

Männchen, Ladó, 22. Februar. „*Longit. tot. 117 mm., rostri a fronte 9, alae 64, caudae 41, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco, basi pallidiore, pedibus fusco-rubellis.*“

Männchen, Ladó, 6. März 1881. „*Longit. tot. 120 mm., rostri a fronte 9, alae 64, caudae 42, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco, basi et mandibula pallidioribus, pedibus fusco-rubellis.*“

Männchen (Nr. 181), Ladó, 22. Juni 1881. „*Longit. tot. 122 mm., rostri a fronte 9, alae 63, caudae 41, tars. 13. Iride fusca, rostro nigro, pedibus rubellis.*“

Männchen, Ladó, 23. April, 22. und 30. Juni 1881.

Männchen (wohl jung), Ladó, 22. Februar 1881. „*Longit. tot. 118 mm., rostri a fronte 9, alae 64, caudae 43, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco, basi et mandibula pallidioribus, pedibus fusco-rubellis.*“

Weibchen, Ladó, 21. Februar 1881. „*Longit. tot. 117 mm., rostri a fronte 9, alae 64, caudae 40, tars. 13. Iride fusca, rostro pallide corneo, pedibus fusco-rubellis.*“

Weibchen, Ladó, 22. Februar 1881. „*Longit. tot. 117 mm., rostri a fronte 9, alae 63, caudae 41, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco, basi pallidiore, pedibus fusco-rubellis.*“

Weibchen, 28. Februar 1881. 2 Exemplare. 1. „*Longit. tot. 117 mm., rostri a fronte 9, alae 63, caudae 40, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco,*

mandibula et basi pallidioribus, pedibus fusco-rubellis.“ 2. „*Longit. tot. 116 mm., rostri a fronte 9, alae 64, caudae 41, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco, mandibula et basi pallidioribus, pedibus fusco-rubellis.*“

Weibchen, Ladó, 1. März 1881. „*Longit. tot. 117 mm., rostri a fronte 9, alae 64, caudae 41, tars. 13. Iride fusca, rostro fusco, mandibula et basi pallidioribus, pedibus fusco-rubellis.*“ E. B.

Weibchen, Ladó, 23. und 30. April, dann 7. Juli 1881.

Hypphantica cardinalis Hartl.

Journ. f. Ornith. 1880, 325, und 1881, Taf. I, Fig. 1, 2; Abhandl. d. Naturwiss. Vereines zu Bremen, VII. Bd., 102, und VIII. Bd., 201.

Männchen (Nr. 196), Ladó, 2. Juli 1881. „*Longit. tot. 120 mm., rostri a fronte 11, alae 62, caudae 35, tars. 14½. Iride fusca, rostro nigro, pedibus rubellis.*“ E. B.

Männchen, Ladó, 8., 9., 12., 14. Juli 1881.

Weibchen, Ladó, 14. Juli 1881.

Sporopipes frontalis (Vieill.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 102. — Pelzeln, a. a. O. 151.

Zwei Männchen, Ladó, 7. und 18. Juni 1881.

Urobrachya axillaris (Smith).

Hartlaub, a. a. O. VII, 102. — Pelzeln, a. a. O. 151.

Urobrachya phoenicotis (Heugl.). Hartlaub, a. a. O. VIII, 221.

Männchen im Winterkleide, Ladó, 12. Februar 1881. „*Longit. tot. 160 mm., rostri a fronte 16, alae 85, caudae 61, tars. 20. Iride fusca, rostro corneo, tomis pallidis, pedibus rubellis.*“ E. B.

Der letztere Vogel ist im Uebergange zum Prachtkleide begriffen. Nach genauer Untersuchung halte ich ihn aber für *U. axillaris* und nicht zu *U. zanzibarica* Shelley (Proc. Z. S. 1881, 586) gehörig.

Männchen (bez. *Urobrachya zanzibarica* Shelley), Ladó, 5. Juli 1881.

Ein unbrauchbar gewordenes Männchen war von Ladó, 8. Juli 1881.

Penthetria macroura (Gmel.).

Pelzeln, a. a. O. 613. — Hartlaub, a. a. O. VIII, 202.

Männchen (Nr. 114), Fadibek, 5. Mai 1881. „*Longit. tot. 210 mm., rostri a fronte 14, alae 79, caudae 94, tars. 19. Iride fusca, rostro nigro, mandibula coerulecentia pallida, pedibus fusco-rubellis.*“

Weibchen, Obbo, 22. Mai 1881. „*Longit. tot. 170 mm., rostri a fronte 14½, alae 82½, caudae 45, tars. 19. Iride umbrina, rostro corneo, mandibula pallida, pedibus flavescente rubellis.*“ E. B.

Coryphegnathus melanotus Heugl.

Amblyospiza albifrons (Vig.). Hartlaub, a. a. O. VII, 101.

Coryphegnathus melanotus Heugl. Pelzeln, a. a. O. 152 und 613.

Amblyospiza capitalba. Hartlaub, a. a. O. VIII, 221.

Männchen, Ladó, 24. März 1881. „*Longit. tot. 205 mm., rostri a fronte 24, alae 101, caudae 72, tars 23. Iride umbrina, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Astrilda cinerea (Vieill.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 103. — Pelzeln, a. a. O. 614.

Männchen, Ladó, 14. Februar 1881. „*Longit. tot. 112 mm., rostri a fronte 8, alae 48, caudae 80, tars. 12 $\frac{1}{2}$. Iride umbrina, ciliis et stria transoculari coccineis, pedibus nigricantibus, rostro corallino.*“ E. B.

Pytelia melba (Linné).

Hartlaub, a. a. O. VII, 104.

Pytelia citerior Strickl. Pelzeln, a. a. O. 614.

Männchen, Ladó, 30. Juni 1881.

Weibchen, Ladó, 20. März 1881. „*Longit. tot. 142 mm., rostri a fronte 12, alae 60, caudae 50, tars. 14. Iride castaneo-rubra, rostro rubro, pedibus fusco-rubellis.*“ E. B.

Zonogastris erythroptera (Swains.).

Pytelia erythroptera. Hartlaub, a. a. O. VIII, 203.

Männchen, Ladó, 23. Juni 1881. „*Longit. tot. 128 mm., rostri a fronte 11, alae 58, caudae 37, tars. 13. Iride coccinea, rostro nigro, pedibus rubellis.*“ E. B.

Dieser Vogel unterscheidet sich von dem im kais. Museum befindlichen Originalexemplare des *Zonogastris lineata* Heugl. von *W. Abyssinica* nur durch den schwarzen Schnabel.

Sporothlastes fasciatus (Gm.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 203.

Männchen, Ladó, 24. Februar 1881. „*Longit. tot. 118 mm., rostri a fronte 10, alae 64, caudae 39, tars. 15 $\frac{1}{2}$. Iride fusca, rostro corneo, pedibus rubellis.*“

Weibchen, Ladó, 24. Februar 1881. „*Longit. tot. 119 mm., rostri a fronte 9 $\frac{1}{2}$, alae 65, caudae 39, tars. 13. Iride fusca, rostro corneo, pedibus rubellis.*“

Männchen, Ladó, 13. März 1881. „*Longit. tot. 128 mm., rostri a fronte 11, alae 66, caudae 41, tars. 13. Iride umbrina, rostro plumbeo, pedibus rubellis.*“

Weibchen, Ladó, 13. März 1881. „*Longit. tot. 127 mm., rostri a fronte 11, alae 65, caudae 42, tars. 13. Iride umbrina, rostro plumbeo, pedibus rubellis.*“

Weibchen, Ladó, 13. März 1881. „*Longit. tot. 127 mm., rostri a fronte 11, alae 64, caudae 42, tars. 13. Iride umbrina, rostro plumbeo, pedibus rubellis.*“ E. B.

Passer Swainsoni Rüpp.

Hartlaub, a. a. O. VII, 105. — Pelzeln, a. a. O. 614.

Männchen, Ladó, 21. Juni 1881.

Buceros abyssinicus Gmel.

Hartlaub, a. a. O. VII, 125.

Exemplar ohne nähere Bezeichnung.

Pogonorhynchus Rolleti (de Fil.).

Pogonias Rolleti. Hartlaub, a. a. O. VII, 112; VIII, 209.

Pogonorhynchus Rolleti. Pelzeln, a. a. O. 153 und 615.

Männchen, Wakkala (Fattuka), 14., Männchen, Wakkala, 22. Februar,
Männchen, Wakkala, 1. März 1881.

Pogonorhynchus leucocephalus (de Fil.).

Pogonias leucocephalus. Hartlaub, a. a. O. VII, 112; VIII, 209.

Pogonorhynchus leucocephalus. Pelzeln, a. a. O. 153.

Männchen, Redjaf, 30. Mai 1881; ein Exemplar ohne Zettel.

Pogonorhynchus habessinicus (Lath.).

Pogonias habessinicus (Lath.). Hartlaub, a. a. O. VII, 112.

Pogonorhynchus habessinicus. Pelzeln, a. a. O. 615.

Männchen, Ladó, 22. März 1881. „*Longit. tot. 171 mm., rostri a fronte 22, alae 86, caudae 48, tars. 20. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Männchen, Wakkala, 1. März 1881.

Pogonorhynchus diadematus Heugl.

Pelzeln, a. a. O. 615.

Pogonias diadematus. Hartlaub, a. a. O. VII, 112.

Männchen, Ladó, 13. März 1881. „*Longit. tot. 160 mm., rostri a fronte 19, alae 78, caudae 45, tars. 21. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“

Männchen, Ladó, 17. März 1881. „*Longit. tot. 156 mm., rostri a fronte 18, alae 81 $\frac{1}{2}$, caudae 45, tars. 15. Iride fusca, rostro et pedibus nigris.*“ E. B.

Männchen, Ladó, 28. Juni 1881.

Trachyphonus Arnaudii (Prev. et Des Murs.).

Hartlaub, a. a. O. VII, 113. — Pelzeln, a. a. O. 615.

Männchen, Ladó, 19. März 1881. „*Longit. tot. 194 mm., rostri a fronte 17, alae 87, caudae 77, tars. 24. Iride umbrina, rostro incarnato-corneo, pedibus fusco-rubellis.*“

Weibchen (Nr. 147), Ladó, 3. Juni 1881. „*Longit. tot. 201 mm., rostri a fronte 16, alae 78, caudae 86, tars. 19. Iride fusco-umbrina, rostro incarnato-corneo, pedibus plumbeo-fuscis.*“ E. B.

Männchen, Ladó, 16. Juni 1881.

Picus nubicus Gmel.

Hartlaub, a. a. O. VII, 109.

Weibchen, Ladó, 24. März 1881. „*Longit. tot. 202 mm., rostri a fronte 21, alae 110, caudae 67, tars. 18. Iride rubra, rostro nigro, pedibus plumbeis.*“ E. B.

Männchen, Ladó, 10. Februar 1881.

Centropus monachus Rüpp.

- Hartlaub, a. a. O. VII, 114. — Pelzeln, a. a. O. 153 und 615.
Männchen, Ladó, 5. Juli 1881.
Weibchen, Ladó, 6. Juli 1881.

Cuculus Heuglini Cab. et F. Heine.

- Hartlaub, a. a. O. VII, 113.
Weibchen, Wakkala, 26. Februar 1881.

Lamprococcyx chrysochlorus Cab. et Heine.

- Pelzeln, a. a. O. 153 und 616.
Chalcites cupreus (Bodd.). Hartlaub, a. a. O. VII, 113; VIII, 209.
Chalcites chrysochlorus. Hartlaub, a. a. O. VIII, 221.
Männchen, Ladó, 3. und 6. Juni 1881.
Junges Weibchen, Ladó, 2. Juli 1881.

Der letztere Vogel ist im Uebergangskleide, der ganze Oberkopf, die Ränder vieler Federn an der Oberseite rostgelb; zahlreiche Flecken an den Schwingen und Schwanzfedern zeigen dieselbe Farbe anstatt des Weiss der ausgefärbten Vögel.

Treron Waalia (Gmel.).

- Hartlaub, a. a. O. VII, 117.
Männchen, Wakkala, 19. Februar 1881.

Chalcopelia afra (L.).

- Hartlaub, a. a. O. VII, 117. — Pelzeln, a. a. O. 616.
Weibchen, Ladó, 16. Februar 1881. „*Longit. tot. 225 mm., rostri a fronte 15, alae 111, caudae 11½, tars. 19. Iride fusca, rostro nigro, pedibus fusco-rubris.*“ E. B.

Ptilopachus ventralis (Val.).

- Hartlaub, a. a. O. VIII, 217.

Männchen, Fadibek, 5. Mai 1881. „*Longit. tot. 303 mm., rostri a fronte 16, alae 126, caudae 86, tars. 26½. Iride umbrina, ceromate, orbitis et pedibus sanguineis, rostro rubro, apice corneo.*“ E. B.

Coturnix Delegorguei Del.

- Hartlaub, a. a. O. VII, 118. — Pelzeln, a. a. O. 154.
Männchen, Gondocoro (Condocroro), 29. März 1881. „*Longit. tot. 180 mm., rostri a fronte 13, alae 95, caudae 27, tars. 20. Iride pallide umbrina, rostro nigro, pedibus flavidio-incarnatis.*“

**Scopus umbretta* (Gmel.).

- Weibchen, Ladó, 2. März 1881.

Ortygometra nigra (Gmel.).

- Hartlaub, a. a. O. VII, 119. — Pelzeln, a. a. O. 155 und 617.
Männchen, Ladó, 9. Juli 1881.

Parra africana Gm.

Hartlaub, a. a. O. VII, 119.

Weibchen, Ladó, 9. Juli 1881.

Dendrocypha fulva (Linne).

Hartlaub, a. a. O. VIII, 216.

Männchen, } Ladó, 17. Juli 1881.
Weibchen, }

Unmittelbar nachdem die Abfassung dieses Berichtes beendigt war, erhielt ich Dr. Hartlaub's vortreffliche Abhandlung: Zweiter Beitrag zur Ornithologie der östlich - äquatorialen Gebiete Afrikas (Abhand. d. Naturwiss. Vereines zu Bremen, VIII. Bd., 1882), welche unsere Kenntniss dieser interessanten Fauna so wesentlich erweitert. Es war mir jedoch noch möglich, diese höchst wichtige Arbeit an den betreffenden Stellen zu citiren. Die Namen der hier zum ersten Male aufgeführten Arten sind von mir an Herrn Dr. Hartlaub mitgetheilt worden, um das in seiner Abhandlung gegebene Verzeichniss sämmtlicher von Dr. Emin Bey gesammelter und durch ihn an die Museen von Bremen und Wien gelangten Vögel zu vervollständigen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von

Artikel/Article: [Ueber Dr. Emin Bey's dritte Sendung von Vögeln aus Central-Afrika. 499-512](#)