

## Ueber die Lepidopteren-Gattung *Laora* Walk.

Von

Prof. C. Berg in Buenos-Aires.

Vorgelegt von Custos A. Rogenhofner in der Jahres-Versammlung am 1. April 1885.

Aus der im Jahre 1855 von Walker aufgestellten Gattung *Laora* war lange Zeit hindurch nur eine Art, die *L. antennata* Walk., bekannt. Erst 1882 führte Butler derselben vier andere hinzu, indem er gleichzeitig die Gattungsbeschreibung durch die Bemerkung erweiterte, dass die Weiber ungeflügelt seien und dass das Genus *Anartia* Hb. nahe stehe.

Die von mir 1875 als ? *Bombyx deserticola* beschriebene und 1877 zur Gattung *Ocnogyna* Led. verwiesene Art gehört nun ebenfalls zu *Laora*, wie solches sich durch Vergleich mit chilenischen Exemplaren von *L. angustior* Butl. herausgestellt hat.

Da die Gattungsbeschreibung Walker's kurz und unvollständig ist, so dass ohne Vergleichsmaterial das Genus kaum erkannt werden kann, so gebe ich hier eine ausführliche und zähle gleichzeitig die bis jetzt bekannten Arten auf.

### **Laora** Walk.

*Antarctia* Hb. sehr nahe verwandt, aber hauptsächlich von ihr verschieden durch die zwei paar Hintersporne und durch die ungeflügelten oder nur mit Flügelstummeln versehenen Weiber.

Fühler beim ♂ stark doppelt gekämmt, mit gefiederten Zähnen und starker Endborste von  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  der Flügellänge; beim ♀ schnurförmig, mit stark vortretenden Gliederecken oder schwach sägezählig.

Nebenaugen zwischen den Haaren sehr versteckt.

Palpen hängend, selten vorgestreckt, Endglied eben so lang als Mittelglied oder länger, geneigt, anliegend behaart, während letzteres dichte und abstehende Behaarung trägt.

Vorderflügel breit mit schwach gerundetem Saume und langem Innenrande. Rippen 3, 4 und 5 getrennt aus der Unterecke der Mittelzelle, 6 aus der Oberecke neben dem gemeinschaftlichen Stiel von 7 und 8; 9 aus 8, sehr

selten mit 10 auf gemeinschaftlichem Stiel. (Bei *Antarctia* zuweilen 10 aus der Oberecke der Mittelzelle.)

Hinterflügel mit den Rippen 3, 4 und 5 getrennt, 6 und 7 aus einem Punkt, 8 aus dem ersten Viertel oder Drittel der Subcostale.

Abdomen des ♂ überragt gewöhnlich den Innenwinkel der Hinterflügel um  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ , mit Afterbusch.

Vorderschienen ohne Hornklaue, nur mit kurzem Vorsprung; Hinterschienen nur mit Endspornen.

♀ sehr behaart, mit kurzen Flügelstummeln und starkem Afterbusch.

Die Raupe ist stark behaart und mit kräftigen Warzen versehen; die von steifen bedornten und auseinander stehenden Haaren gebildeten Seitenpinsel sind länger als die des Rückens, und dieser trägt ausserdem eine Doppelreihe von weichen und ziemlich kurzen Haarbürsten.

Das Gespinnst ist weich, aber ziemlich dicht und stark.

### 1. *Laora antennata* Walk.

Walker, List of Lep. Ins. Bomb. VI, p. 1482, 1 (1855).

Patria: Santa Fé de Bogotá.

### 2. *Laora deserticola* Berg.

? *Bombyx deserticola* Berg. Acta Acad. Nac. Córdoba I, p. 78, 20 et Bull. Soc.

Imp. des Nat. Moscou. XLIX, p. 212 (1875).

*Ocnogyna deserticola* Berg, Bull. Soc. Imp. des Nat. Moscou. LII, p. 13 (1877). —

Burm., Descript. phys. de la Rép. Arg. V, p. 457 (1878). — Berg, Anal.

Soc. Cient. Arg. X, p. 231, 3 (1880): Larva.

Patria: Republicae Argentina et Uruguayensis.

### 3. *Laora latior* Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. 1882, p. 5, Nr. 8.

Patria: Chile.

### 4. *Laora tegulata* Butl.

Butl., l. c., p. 6, Nr. 9.

Patria: Chile.

### 5. *Laora angustior* Butl.

Butl., l. c., p. 6, Nr. 10.

Patria: Chile.

### 6. *Laora obscura* Butl.

Butl., l. c., p. 7, Nr. 11.

Patria: Chile.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Berg Karl (Carl) Heinrich Edmund von

Artikel/Article: [Ueber die Lepidopteren-Gattung Laora Walk. 359-360](#)