

sutura depressa; prope basim subito constricta, strictura albovillosa. Pedes graciles, femoribus clavatis. Long. 2.5 mm.

Mit *F. consul* und *praetor* Laf. in dem längsgefurchten vorderen Prothoraxtheile übereinstimmend, aber durch den gewaltig grossen Kopf und die bauchigen, nahe der Basis stark eingeschnürten Flügeldecken verschieden. Sehr eigenthümlich ist die schmale weisse Binde, die sich in jener Einschnürung befindet; sie besteht aus einer einzigen Querreihe von langen, dicken, niedergedrückten, mit der Spitze nach hinten gerichteten, weissen Borsten.

Ein Exemplar dieser hübschen Art wurde von Wroughton im Neste von *Cremastogaster subnuda* Mayr in Nord-Guzerath entdeckt. Ihren Namen nehme ich von der Aehnlichkeit ihres Vorderkörpers mit demjenigen eines *Apoderus*.

Ein neuer *Nysson* aus Tirol.

Von

A. Handlirsch.

(Eingelaufen am 1. Juli 1898.)

Nysson mopsus nov. spec. ♂. 7 mm. Schläfen gerandet, Vorderrand des Clypeus niedergedrückt und etwas ausgebuchtet, Stirne unbewehrt, Fühler kurz und gedrunken, ihr vorletztes Glied etwas weniger erweitert als bei *maculatus*, das Endglied etwas kürzer als bei dieser Art, stark gebogen und am Ende scharf abgestutzt. Thorax von gewöhnlicher Form, gedrunken, die untere Partie der Mittelsegmentseiten glatt; Scutellum und Metanotum einfach, Mittelsegment mit kurzen, kräftigen Seitendornen. Flügel beraucht; die Cubitalqueradern der Vorderflügel münden fast in einem Punkte in den Radius. Die Anzelle der Hinterflügel endigt hinter dem Ursprunge des Cubitus. Beine normal, die Schienen nicht deutlich bedornt. Zweite Ventralplatte einfach gewölbt, siebente Dorsalplatte in zwei mässig lange Spitzen ausgezogen, dazwischen nicht vorragend. Punktirung sehr grob und reichlich, namentlich auf dem Thorax und Abdomen gröber als bei *maculatus*. Unterseite und Gesicht silberweiss tomentirt. Körper schwarz, das erste Segment und die Seitenränder des zweiten dunkel rostroth; auf den vier ersten Dorsalplatten je zwei gelblichweisse Seitenflecken. Fühler dunkel, Beine dunkel mit lichten Knien. Durch den ganz schwarzen Thorax und die übrigen Merkmale leicht von den nächstverwandten Arten *niger*, *maculatus*, *variolatus* und *tridens* zu trennen.

Die Beschreibung bezieht sich auf ein ♂, welches Collega H. Friese am 11. Juli 1895 in Bozen erbeutet hat. Die Type befindet sich in der Sammlung des Wiener Hofmuseums.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Handlirsch Anton

Artikel/Article: [Ein neuer Nysson aus Tirol. 484](#)