

Die Art dürfte an den angegebenen Merkmalen wohl ohne besondere Schwierigkeit zu erkennen sein. Am nächsten steht sie wohl dem *St. Koenigii*, der jedoch auf dem Mittelsegmente gröbere Punktirung und etwas dunklere Flügel besitzt.

Ein neuer *Nysson* aus Oran.

Beschrieben von

Anton Handlirsch.

(Eingelaufen am 28. April 1901.)

Nysson Costae nov. spec.

♂. Gruppe des *N. epeoliformis*. Hinterrand der Schläfen bis zum Mundrande gerandet. Von den Höckerchen am Vorderrande des Clipeus sind die zwei mittleren deutlich, die zwei seitlichen jedoch äusserst undeutlich. Stirne unbewehrt. Dornen des Mittelsegmentes kurz und dick. Die zweite und dritte Cubitalquerader der Vorderflügel vereinigen sich fast in einem Punkte der Radialader. Analzelle der Hinterflügel hinter dem Ursprunge des Cubitus endend. Hinterschienen etwas bedornt. Zweite Bauchplatte gleichmässig gewölbt, nicht stark vorragend. Matt, dicht und grob punktirt, oben braun, unten silberweiss tomentirt. Schwarz: Clipeus, Rand des Pronotum mit den Schulterbeulen, Basis des Scutellum und ziemlich breite, schmal unterbrochene Binden der drei ersten Dorsalplatten satt gelb. Erstes Dorsalsegment und die Mitte der zweiten Ventralplatte rostroth. Fühler schwarz, ihre drei ersten Glieder zum Theile licht. Beine rostroth, ihre Hüften und Trochanteren schwarz.

Länge 10 mm.

Von männlichen Sexualcharakteren ist hervorzuheben: Endglied der Fühler länger als die zwei vorhergehenden, deutlich gekrümmt und unten doppelt ausgerandet, am Ende abgestutzt. Letzte Dorsalplatte am Ende abgerundet und mit zwei Zähnen versehen.

Diese Art stammt aus Oran und wurde mir vor mehreren Jahren von Herrn Prof. Ach. Costa zur Untersuchung eingeschickt. Costa's Absicht, dieselbe zu beschreiben, wurde durch dessen Ableben vereitelt, und ich glaube daher berechtigt zu sein, nunmehr die Beschreibung zu veröffentlichen. Die Art steht dem *epeoliformis* nahe, ist aber an der verschiedenen Färbung und der Undeutlichkeit der seitlichen Höckerchen des Clipeusrandes zu erkennen. Die Punktirung ist jener des *epeoliformis* ähnlich, die Flügel sind schwach beraucht mit einem dunkleren Rande.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [51](#)

Autor(en)/Author(s): Handlirsch Anton

Artikel/Article: [Ein neuer Nysson aus Oran. 510](#)