

was vom Einsender auch schon in der Lepidopterenfauna dieses Landes (in diesen „Verhandlungen“, 1899, S. 176) bekannt gemacht worden sei.

Herr Fritz Wagner bemerkt hierauf, daß er auch von anderen Seiten auf das ihm gut bekannte Vorkommen dieser Form in Steiermark aufmerksam gemacht worden sei, daß es aber auf einem Mißverstehen seiner vielleicht nicht ausreichend deutlichen Mitteilung beruhe, worin er nur von einem neuen Fundorte innerhalb unserer Monarchie gesprochen habe und nicht davon, daß die Form überhaupt neu für unsere Monarchie sei.

Herr Dr. Rebel fügt bei, daß die in Frage stehende *Repan-data*-Form auch in Galizien gefunden wurde.

Schließlich macht Herr Dr. Porsch darauf aufmerksam, daß von Dr. Siepi in Marseille (Feuille des jeunes Naturalistes, XXXIII, 1903, p. 56, Pl. 4) ein Generationsunterschied bei *Charaxes Jasius* L. im Flügelschnitt und in der Form der Schwanzspitzen der Hinterflügel behauptet worden sei, was Dr. Rebel mit Rücksicht auf die sehr geringe individuelle Variabilität bei allen *Charaxes*-Arten sehr bemerkenswert findet.

---

## Sektion für Zoologie.

---

Versammlung am 13. März 1903.

Vorsitzender: Herr **Prof. Dr. K. Grobden.**

Herr Dr. Karl Graf Attems hält einen Vortrag, betitelt: „Über die Verwandtschaftsverhältnisse der Myriopoden.“

Herr Dozent Dr. Franz Werner demonstriert einige seltenere Amphibien.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Sektion für Zoologie. Versammlung am 13. März 1903. 168](#)