

Contribuzione alla Flora micologica della Valle Lagarina.

Per il

D^{re} Ruggero Cobelli

in Rovereto.

II.

(Eingelaufen am 30. Mai 1908.)

In continuazione di miei studi sui funghi della Valle Lagarina,¹⁾ pubblicai nel 1891 una prima contribuzione.²⁾ Da quell'epoca raccolsi le alcune specie qui sotto elencate, le quali serviranno se non a completare la Flora micologica della Valle Lagarina, almeno a renderla meno imperfetta.

E così il numero delle specie finora raccolte viene portato da 526 a 552, distribuite come segue:

Hymenomycetes	468
Discomycetes	50
Gasteromycetes	20
Tuberacei	2
Myxomycetes	12
Totale	552

Hymenomycetes.

Gen. I. Agaricus Fries.

13. *Amanita strobiliformis* Vill.

14. *Amanita solitaria* Bull.

¹⁾ Elenco sistematico degli Imeno-, Disco-, Gastero-, Myxomiceti e Tuberacei finora trovati nella Valle Lagarina dal D^{re} Ruggero Cobelli. (VII Pubblicazione fatta per cura del civico Museo di Rovereto. Rovereto, 1885.)

²⁾ Contribuzione alla Flora micologica della Valle Lagarina per il D^{re} Ruggero Cobelli in Rovereto. (Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, Jahrg. 1891.)

- 174. *Tricholoma chrysenterum* Bull.
- 202. *Tricholoma personatum* Fries.
- 255. *Clitocybe phyllophilla* Fries.
- 272. *Clitocybe opaca* With.
- 284. *Clitocybe sinopica* Fries.
- 289. *Collybia acervata* Fries.
- (6.) *Omphalia Giovanellae* Bresadola.
- 916. *Flammula gummosa* Larch.
- 1045. *Crepidotus pezizoides* Nees.

Gen. III. **Coprinus** Pers.

- 9. *Coprinus soboliferus* Fries.

Gen. V. **Cortinarius** Fries.

- 8. *Cortinarius varius* Fries.
- 54. *Cortinarius lilacinus* Fries.

Gen. VIII. **Hygrophorus** Fries.

- 6. *Hygrophorus melizeus* Fries.
- 9. *Hygrophorus erubescens* Fries.

Gen. IX. **Lactarius** Fries.

- 13. *Lactarius zonarius* Fries.

Gen. XIII. **Nyctalis** Fries.

- 6. *Nyctalis parasitica* Bull.

Gen. XIV. **Marasmius** Fries.

- 13. *Marasmius scorteus* Fries.
- 47. *Marasmius androsaceus* Fries.

Gen. XVI. **Panus** Fries.

- (208.) *Panus fulvidus* Bresadola.

Gen. XLIII. **Telephora** Fries.

- 6. *Telephora caryophyllea* Schöff.

Gen. LIII. **Pistillaria** Fries.

10. *Pistillaria puberula* Berkl.

Discomycetes.

Gen. **Helotium** Pers.

25. *Helotium serotinum* Fries.

Gasteromycetes.

Gen. **Geaster** Pers.

Geaster fornicatus Huds.

Gen. **Rhizopogon** Tul.

Rhizopogon luteolus Tul.

Epeolus-Arten Südafrikas. (Hymenoptera.)

Von

Dr. med. **Hans Brauns**

in Willowmore (Kapland).

(Eingelaufen am 29. Juni 1908.)

In der Zeitschrift für system. Hymen. und Dipter., 3. Jahrg., S. 362, beschrieb ich *Epeolus Friesei* Brauns und *Epeolus militaris* Gerst. Eine in diese Gruppe, die sich durch gleichartigen Habitus auszeichnet, gehörige neue Art entdeckte ich seither und gebe im folgenden eine Tabelle der drei Arten, indem ich für die bereits beschriebenen auf meinen Aufsatz, l. c., verweise.

1. Scutellum mit deutlichen Seitendornen.

militaris Gerst.

— Scutellum ohne Spur von Seitendornen 2

2. Mittelsegment an den Seiten ohne vorspringende Lamelle, abgerundet *Friesei* Brauns

— Mittelsegment je an den Seiten mit einer deutlichen zahnartigen Lamelle, welche in der Kontur abgerundet ist. Schwarz,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): Cobelli Ruggero

Artikel/Article: [Contribuzione alla Flora micologica della Valle Lagarina. II. 7-9](#)