

Catalogue
des
Insectes Coléoptères,

recueillis par M. Gaetano Osculati,

pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords
du Napo et de l'Amazone.

P a r

M. F. E. Guérin-Ménéville,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Membre correspondant des académies royales des Sciences de Turin, Madrid etc. etc.; Membre titulaire de la société impériale et centrale d'Agriculture et de la société entomologique de France, et d'un grand nombre d'autres académies et sociétés savantes, nationales et étrangères.

Au Lecteur!

Si l'humanité doit sa reconnaissance aux grands voyageurs qui, soutenus par leurs Gouvernements, qui leur en donnaient les moyens, ont porté leurs pas intrépides dans les coins les plus reculés du monde avec tant d'avantage pour les sciences positives et morales, combien n'en devrait-on pas à ceux qui supportèrent les mêmes fatigues, affrontèrent les mêmes dangers!, sans le secours de personne, à leurs frais, et soutenus seulement par l'amour de la science et des grandes émotions que la nature seule peut donner? Combien ne doit-on pas honorer le nom de ces héros qui laissant dans leur patrie les douces joies et les tendresses de la famille, ont bravé toutes les difficultés dont la nature sauvage aime à chaque pas à barrer le chemin aux courageux qui fouillent dans ses endroits les plus inaccessibles et les plus difficiles? Ni les froids de la mer glaciale ou flottent des montagnes transparentes comme le verre et azurées comme le ciel, ni les chaleurs du désert n'ont pu dompter leur courage et abattre la vigueur de leurs âmes. Malheureusement quelquefois ce sont les forces physiques qui leur ont fait défaut!

L'Italie, la patrie de Colomb et de Marco Polo, n'a pas manqué à plusieurs reprises d'avoir parmi ses fils, des hommes qui sans richesse pro-

pre, sans l'argent de l'État ont su graver leurs noms sur les rochers les plus inabordables au pôle et à l'équateur et montrer au monde que lorsqu'on veut on peut et on réussit toujours.

Parmi ces esprits élevés, courageux, dévoués nous devons mettre M. *Osculati*, nom déjà assez connu dans le monde scientifique et particulièrement cher aux voyageurs et aux naturalistes. L'amour des voyages se déclara bientôt dans le jeune *Osculati*, et le porta plusieurs fois loin de ses foyers, ou errant parmi les forêts vierges de l'Amérique, ou nomade parmi les déserts de la Perse. — Après avoir, tout jeune, visité l'Égypte et l'Arabie, en 1834, 1835, 1836, il parcourut le Pérou, le Chili, la Terre de feu, le Paraguay, dans un voyage dont il donna une excellente description. — En 1843 M. *Osculati* alla visiter la Perse, l'Arménie et les Indes, recueillant une foule d'objets rares et précieux. De retour de ce long voyage il conçut l'idée de parcourir l'Indostan et les îles de la Polynésie. — Mais, comme dit l'illustre voyageur: „l'uomo propone e Dio dispone.“ Après avoir abandonné l'Europe, un incendie éclata sur le vaisseau où il se trouvait et l'obligea à descendre à New-York. — Dans cette occasion il visita les États-Unis et particulièrement le Canada. Après, il chercha de nouveau à recommencer le premier voyage projeté, mais de nouveau à la hauteur des Bermudes un orage abîma tout son équipage et l'obligea à renoncer à son projet. Pas découragé M. *Osculati*, tout près de l'Amérique comme il était, conçut le projet hardi de parcourir et de traverser l'Amérique méridionale dans sa plus grande largeur; savoir, de prendre terre au Guayaquil, d'aller à Quito pour descendre après, le long des affluents des Amazones et toucher au Para sur l'Atlantique.

Toutes les objections faites par ses amis à Quito à propos des dangers de cette immense traversée, exécutée tout seul et livré imprudemment aux Indiens des rivages du Napo barbares et anthropophages, ne réussirent pas à changer son idée. Le voyage dura depuis avril 1847 jusqu'à juin 1848 et il fut vraiment horriblement dangeureux. Mais le courage et l'amour de la science soutinrent toujours notre voyageur, qui après une année de souffrances a pu revoir sa patrie.

De retour à Milan, M. *Osculati* rédigea la description de son voyage sous le titre: „Esplorazione delle Regioni equatoriali lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni ecc. Milano 1854“ qui forme un gros volume in 8. avec une carte géographique du Bassin du Droys et 13 planches. Cette narration est très intéressante et on la lit avec un plaisir qui croît toujours, et qu'on éprouve sans pouvoir le décrire.

J'ai rédigé le catalogue des Animaux vertébrés que M. *Osculati* a recueilli et qu'en partie le Musée de Milan a acheté. A la fin du volume on voit ce catalogue qui a pour titre: „Vertebratorum synopsis in Museo Mediolanensi extantium, quae per novam orbem Cajetanus Osculati collegit. Annis 1846—48. Speciebus novis vel minus cognitibus adjectis.“

Mais ce furent les insectes dont M. *Osculati* a fait de préférence une col-

lection très-riche. M. Guérin Méneville par déférence pour l'illustre voyageur se chargea de leur classification, laquelle devait être mise dans le volume même de la description historique. Malheureusement ce beau travail du célèbre Entomologiste de Paris ne fut pas prêt lors de la publication du Voyage de M. Osculati et nous avons dû maintenant avoir recours au Recueil de la Société Zoologico-Botanique de Vienne, pour lui donner la publicité qu'il mérite; sûr comme nous sommes de faire une chose agréable à tous les Entomologistes. Même au nom de M. Osculati je dois rendre mes remerciements au savant Naturaliste de Paris qui a bien voulu faire un travail si long et si important en concourant puissamment à la gloire du voyageur italien.

Doct. Emile Cornalia,
Adj. Direct. au Musée de Milan.

Milan, 15. Août 1855.

Les régions de l'Amérique Méridionale explorées par M. Gactano Osculati sont encore peu connues des naturalistes, aussi avons-nous accueilli avec plaisir et reconnaissance l'honorable proposition que ce savant et intrépide voyageur nous a faite de donner, dans son bel ouvrage, un Catalogue, avec la description sommaire des espèces nouvelles des Coléoptères qu'il a rapportés de ses pénibles voyages dans ces contrées.

Au premier coup d'oeil, l'ensemble de cette faune de Coléoptères a la plus grande ressemblance avec celles de la Colombie, de la Bolivie, de la Mence, de la Guyane et du Brésil. — Beaucoup de ces Insectes appartiennent aux mêmes espèces; mais il y en a un certain nombre, surtout dans les régions élevées des bords du Napo et de l'Amazone, qui forment des espèces distinctes et dont quelques unes n'avaient pas encore été publiées.

Déjà nous connaissons plusieurs des espèces propres à la région du Napo, grâce aux explorations de Mr. Bourcier qui, pendant un court séjour dans ces pays comme Consul de France, y avait recueilli des oiseaux nouveaux et beaucoup d'insectes d'un haut intérêt. Nous avons aussi reconnu un certain nombre des espèces rapportées par M. Osculati, dans les voyages de Humboldt et de D'Orbigny, et surtout dans un travail plus récent, le „*Conspectus insectorum Coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt*,” que l'on doit à F. Erichson. *) C'est la méthode présentée dans ce travail que nous avons suivie dans l'arrangement des groupes naturels dont ce catalogue offre des représentants.

Nous n'avons pas eu sous les yeux la totalité des Coléoptères rapportés par M. Osculati, mais une liste dressée par Mr. Ghiliani nous a donné

*) Archiv für Naturgeschichte etc. Von W. F. Erichson. 1847. p. 67 à 185.

les noms des espèces que ce savant Entomologiste a déterminées à Turin en les comparant aux riches Collections du Musée de l'Université Royale de cette Ville.

Fam. **Cicindeletae.**

Gen. *Tetracha*, Hope, The coleopt. mant. 2, p. 7.

1. *T. Spixii*, Brullé, voyage de D'Orbigny, Ins. p. 3 pl. 1 f. 3.

2. *T. fulgida*, Klug, Jahrb. der Insekt. p. 6.

Megacephala Hilarii? Laporte, Études Entom. p. 34.

Gen. *Pseudoxycheila*. Guér. - Mén. Dict. Pitor. d'hist. nat. 6, p. 573.

3. *P. bipustulata*, Latr. Voy. de Humboldt, Ins. p. 228 pl. 16 f. 1,2.

Gen. *Oxycheila*. Dej. Spécies des Coléop. 1, p. 15.

4. *O. bisignata*, Guér. Dic. Pitor. d'hist. nat. 16, p. 572. (Var.)

NOTA. Les sujets rapportés du haut Pérou, par M. Osculati diffèrent un peu de ceux de Demerari par leurs élytres qui ont une petite épine à la suture et par la tache rouge du milieu de ces organes qui n'est pas légèrement oblique. Comme nous possédons un individu provenant de la Colombie et semblable à ceux de Demerari, nous ne pensons pas que cette petite pointe des élytres puisse motiver la formation d'une espèce nouvelle.

Cette espèce se distingue des *Oxycheila tristis* et *aquatica*, les seules que j'ai actuellement sous les yeux, par un caractère qui motivera probablement, dans l'avenir la formation d'un genre. En effet, dans les deux espèces que je cite, le dessous des tarses antérieurs des femelles est garni seulement de poils fins, et le dernier article est glabre et plus mince que les précédents, surtout à sa base. Dans l'*O. bisignata* le dessous des mêmes tarses est garni d'un double rang d'épines à tous les articles, et le dernier est notablement plus épais et non aminci à sa base.

Si d'autres espèces venaient se ranger dans ce groupe, que nous ne proposons aujourd'hui que comme une simple section dans le genre, et si on les en séparait pour établir un genre particulier, nous donnerions à ce genre le nom de *Cheiloxya* auquel nous n'attachons aucune signification et qui sera rangé dans les noms propres.

Fam. **Carabici.**

Gen *Apiodera*, De Chaudoir. Bulletin de Moscou, 1848, p. 35.

5. *A. elegans*. Guér. Noire, luisante; tête lisse avec le devant un peu bosselé. Corselet plissé en dessus, à cotés lisses. Elytres allongées, inégales, striées et ponctuées à la base et à l'extrémité, lisses au milieu, avec une petite tache jaune à la base, quatre autres antérieures remontant obliquement vers l'angle huméral, quatre autres au tiers posté-

rieur et une petite pr s de l'angle postérieur et sutural. Antennes et pattes jaunes; extrémité des cuisses, des jambes et des articles des tarsi noirs. — L. 9; l. 2½ millim.

Gen. *Agra*, Fabr. Syst. Eleuth. 1, 224.

6. *A. Osculatii*, Guér. Noire; tête lisse. Corselet allongé, avec de gros points enfoncés ou fossettes, rangés en lignes longitudinales. Élytres tridentées à l'extrémité, avec des fossettes et de gros points enfoncés plus petits vers la base, à fond vert. Antennes noires avec la base des articles, à l'exception des trois premiers, d'un brun un peu fauve. Pattes noires avec le milieu des cuisses jaune. — L. 16½, l. 4 mill.

Cette *Agra* est très-voisine de celles qui ont été décrites par Klug sous le nom de *geniculata* et par Brullé sous celui d'*erythroceræ* (voy. de D'Orbigny, Ins. p. 10, pl. 1, f. 9). Mais elle s'en distingue par ses pattes dont les jambes sont entièrement noires, et par ses antennes annelées de noir et de brun roussâtre. Mr. De Chaudoir, dans son excellente révision de ce genre, a omis l'*Agra erythroceræ* de Brullé, quoiqu'il cite les autres espèces décrites et figurées dans le même ouvrage.

Gen. *Trichognathus*, Latr. Règne Anim. Ins. 4 — 374.

7. *T. marginipennis*, Latr. Règne anim. 2. Éd. T. 4, p. 375. — Guér. Mén. Icon. du Règne Animal. Ins. pl. 4. f. 5.

Gen. *Pheropsophus*, Solier. Ann. Soc. Ent. 2 — 466.

8. *P. distinctus*, Dej. Spec. Col. T. 5 p. 415.
9. *P. aequinoctialis*, Lin. — *Complanatus*, Fabr. Syst. Eleuth. 1, 217.

Gen. *Calleida*, Dej. Spec. Coléop. 1, 220.

10. *C. Alcyonea*, Erichs. Consp. Col. Peruana. p. 69.

Gen. *Plochionus*, Dej. Spec. Col. 1, 250.

11. *P. Bonfilsii*, Dej. Spec. Coleopt. 1, 251.

Gen. *Tetragonoderus*, Dej. Spec. 4, 484.

12. *T. figuratus*, Spec. 5, 855.

Gen. *Anisodactylus*, Dej. Spec. Col. 4 — 132.

13. *A. peruvianus*, Dej. Spec. Col. 4, 289.
14. *A. elatus*, Erichs. Consp. Coléopt. Peruana. p. 70.

Gen. *Anchomenus*, Bonelli, Obs. ent. Part. 1. Tableau.

15. *A. elegans*, Dej. Spec. Col. 5, 725.
16. *A. brasiliensis*, Dej. Spec. Col. 3, 110.

Gen. *Feronia*, Latr. Règne Anim. 3, p. 191.

17. *F. (Argutor) confusa*, Dej. Spec. Col. 3, 573.
18. *F. (Platysma) chalcea*, Dej. Spec. 3, 300. — Cette espèce a été rencontrée sur beaucoup de points de l'Amérique Méridionale.

Fam. **Dytiscidae.**

Gen. *Acilius*, Leach. Zool. Miscel. 3, 69.

19. *A. incisus*, Aubé. Spec. des hydr. p. 147.

Fam. **Gyrinites.**

Gen. *Gyrinus*, Lin. S. n.

20. *G. Buqueti*, Aubé. Spec. hydr. p. 658.

Fam. **Lissomites.**

Gen. *Lissomus*, Dalm. Eph. Entom. 1, 14.

21. *L. ebeninus*, Blanch. Voy. de D'Orbigny, Ins. p. 145.

Fam. **Elaterites.**

Gen. *Semiotus*, Esch. Thon. arch. 2.

22. *S. ligneus*, Lin. S. n. 2. 652.
23. *S. seladonius*, Guér. — Mén. Revue Zool. 1844. p. 16. (Variet.)
24. *S. intermedius*, Herbst. Col. 10, 8 pl. 159 f. 4.
25. *S. affinis*, Guér. — D'un jaune fauve, luisant; tête fauve avec deux cornes aigues et deux taches noires, l'une en avant, l'autre en arrière. Corselet allongé et assez étroit, d'un jaune vif presque rouge; avec deux larges bandes longitudinales noires atteignant les deux extrémités et une petite tache noire de chaque côté vers le milieu. Élytres avec la suture, l'écusson et une large bande sur le côté, atteignant l'angle huméral, d'un noir vif. Dessous jaune avec une bande noire interrompue de chaque côté du corselet, de la poitrine et de l'abdomen. Pattes et base des antennes d'un jaune fauve, les autres articles des antennes noirs. — L. 30; I. 8. mill. (femelle).

Il ressemble beaucoup au *S. Cornutus* de Kirby, mais il s'en distingue par son corselet plus étroit et par conséquent paraissant un peu plus allongé, par les deux bandes noires qui sont droites, larges et continues, atteignant les extrémités, tandis que chez trois femelles du *S. cornutus*, que nous avons sous les yeux, les bandes sont un peu sinueuses, plus étroites, interrompues près de la base, et qu'elles n'atteignent pas les bords, surtout

en avant. D'autres caractères dans la forme des élytres et dans l'ensemble de l'aspect, distinguent encore cette espèce, qui est cependant la plus voisine que nous connaissions de ce *Semiotus cornutus* si commun au Brésil.

26. *S. striatus*, Guér. — Jaune pâle, peu luisant, garni d'un fin duvet jaune, à l'exception des élytres qui sont glabres. Tête arrondie en avant, excavée au milieu, fauve, avec le bord antérieur jaune. Corselet fauve au milieu, jaune sur les bords, avec deux larges bandes noires, longitudinales et n'atteignant pas le bord antérieur. Élytres jaunes, brusquement rétrécies en arrière, fortement striées et presque sillonnées, avec de gros points enfoncés dans chaque strie. Dessous d'un jaune fauve avec une large bande noire de chaque côté et les bords des segments de l'abdomen jaunes. Antennes noires avec les deux premiers articles fauves. Pattes d'un jaune fauve. — L 21. l. 5¾ mill. (Femelle.)

Gen. *Eucamptus*, Chev. Col. du Mex. Fasc. 1, Nr. 9.

27. *E. imperialis*, Guér. Revue Zool. 1844, p. 15.
28. *E. cuspidatus*, Chev. Col. du Mex. 1. Nr. 9.

Gen. *Chalcolepidius*, Esch. Thon arch. 2.

29. *C. porcatus*, Lin. s. n. — 2. 652 — et Var. *Virens* Fabr. S. E. 2. 226.
— et Var. *striatus*, Lin. Oliv. Ent. 2. Nr. 31, pl. 1 f. 2.
30. *C. aequinoxialis*, Laporte. Rév. Ent. de Silberm. T. 4. p. 13.
31. *C. Fabricii*, Erichs. Zeitsch. Entom. 1. 3, p. 83.
32. *C. Bonplandii*, Guér. Revue Zool. 1844, p. 17.
33. *C. gossipiatus*, Guér. Rev. Zool. 1844. p. 18.

Gen. *Pyrophorus*, Esch. Thon arch. 2. 32.

34. *P. noctilucus*, Lin. S. n. 1. Part. 2, p. 657. — Germ. Zeitsch. Ent. 3. 13.
35. *P. pellucens*, Esch. Thor. arch. 2. p. 33. — Germ. Zeitsch. Ent. 3—17.

Fam. Lampyrides.

Gen. *Megalophthalmus*, Gray. An. Kingd. Ins. 1. 371.

36. *M. marginatus*, Guér. — Tête noirâtre avec les antennes d'un brun enfumé. Corselet de forme transversale, deux fois plus large que long, à peine arrondi au milieu en avant, d'un jaune pâle avec une tache brune au milieu et en arrière sur laquelle il y a deux tubercules. Écusson jaune. Élytres d'un brun jaunâtre avec la suture et une assez large bordure latérale jaune. Dessous et pattes bruns avec l'avant dernier segment abdominal jaune. — L. 7; l. 3 mill.
37. *M. costatus*, Laporte. Ann. Soc. Ent. 2. 132. — Syn. *Meg. obsoletus*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 122, pl. 7 f. 7.

Gen. *Photinus*, Laporte. An. Soc. Ent. 2. 140.

38. *P. albomarginatus*, Lap. Hist. nat. Ins. T. 1, p. 269.

39. *P. subcostatus*, Guér. — Jaune obscur. Corselet jaune pâle, avec deux taches diaphanes en avant et le milieu d'un brun enfumé en arrière. Élytres brunâtres avec le côté externe largement bordé de jaune qui se confond avec le brun du disque qui porte deux ou trois faibles côtes longitudinales effacées en arrière. Dessous et pattes d'un brun jaunâtre avec les trois derniers segments de l'abdomen jaunes. — L. 21. l. 10 mill.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, mais elle s'en distingue par une taille moins grande, par le commencement des côtes élevées de ses élytres et par la couleur jaune des trois derniers segments de son abdomen.

40. *P. viduus*, Erichs. Consp. Coleopt. Peruan. p. 80.

41. *P. versicolor*, Fabr. Ent. Syst. Suppl. p. 125.

42. *P. scintillans*, Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 14, pl. 1 f. 4.

43. *P. linearis*, Latr. n. p. 348. pl. 22 f. 3.

Gen. *Aspisoma*, Laporte. An. Soc. Ent. 2, p. 145.

44. *A. maculatum*, Fabr. Syst. Eleuth. 2. 106.

45. *A. ignitum*, Fabr. id — 2—107.

46. *A. hesperum*, Lin. S. n. 1. 2 p. 644.

47. *A. fenestratum*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 111.

Gen. *Lucidota*, Laporte. Ann. Soc. Ent. 2. 136.

48. *L. limbata*, Lap. id. 2. 137.

49. *L. thoracica*, Oliv. Ent. T. 2. Nr. 28 pl. 3 f. 29.

50. *L. Osculatii*, Guér. Tête noire avec les antennes grandes, noirâtres à articles larges et aplatis. Corselet aussi long que large, arrondi en avant avec le bord antérieur un peu avancé, d'un jaune d'ocre avec le milieu du disque orné d'une grande tache noirâtre carrée, située en arrière. — Écusson jaune. Élytres allongées, d'un brun noirâtre avec la suture et les bords latéraux jaunes. Dessous et pattes d'un brun noirâtre avec les hanches, la base des cuisses, et le dernier segment abdominal jaunes. — L. 14. l. 4½ mill.

Cette espèce est très-voisine de la *Lucidota modesta*, Lap. An. Soc. Ent. T. 2 p. 138, mais elle est beaucoup plus grande et se distingue en outre par la bordure jaune des élytres qui s'étend jusqu'à l'extrémité et vient rejoindre la suture en arrière.

Nous avons suivi pour ce travail, la classification publiée par Mr. Delaporte dans les Annales de la Société entomologique de France, mais nous avons été bien contrarié par cette foule de noms de catalogues répandus si fâcheusement dans toutes les collections. En effet, les espèces qui ne nous ont pas été envoyées avaient été com-

parées à des individus nommés d'après ces catalogues, mais publiés sous d'autres noms depuis.

Nous n'avons pas cherché à rapporter ces Insectes aux genres nouvellement établis par M. de Motschoulsky, — dans ses *Études Entomologiques*, Helsingfors 1852. p. 26 à 58, car pour y arriver il faudrait entreprendre une vraie monographie du groupe.

Fam. Lycides.

Gen. *Calopteron*, Lap. Rev. Ent. Silberm. T. 4. p. 25.

51. *C. cyaneum*, Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 81.
52. *C. terminatum*, Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 32, pl. 32 f. 5.
53. *C. nigricorne*, Latr. id. p. 102. pl. 39 f. 1.
54. *C. gracile*, Guér. Noir, étroit et allongé. Corselet aussi long que large, un peu élargi et terminé par deux épines en arrière, avec une carène longitudinale au milieu. Élytres à peine un peu élargies en arrière, avec deux fortes carènes, une plus petite entre elles, et des réticulations transversales assez distantes. Elles sont noires comme tout l'Insecte avec l'extrémité postérieure fauve remontant un peu à la suture et au bord externe. Les pattes et le dessous du corps sont également noirs. — L. 9; l. 2 mill.
55. *C. speciosum*, Guér. Corps, antennes et pattes noirs. Corselet triangulaire, noir, largement bordé de jaune de chaque côté. Élytres élargies en arrière, à côtes élevées et réticulées, noires jusqu'au milieu et ensuite d'un beau jaune orangé séparé du noir par une ligne droite transverse; une petite tache noire à l'extrémité postérieure. — L. 15; l. 4. (aux épaules) et 9 (en arrière) mill.
56. *C. binotatum*, Guér. — Corps, antennes et pattes noirs. Corselet de forme carrée, un peu plus large que long, terminé en arrière par deux petites pointes, à bords peu relevés et ayant au milieu une faible carène à peine visible. Élytres fortement élargies en arrière chez les mâles, plus étroites chez les femelles, d'un brun noirâtre avec les nervures d'un noir vif et une tache jaune arrondie sur chacune vers le tiers postérieur. Chaque élytre n'a que trois nervures longitudinales et la tache jaune est placée entre la seconde et la troisième, à partir de la suture. — L. 8 à 12; l. 3 à 6 mill.

Gen. *Chauliognathus*, Hentz. Trans. Amer. philos. Soc. III.

57. *C. scriptus*, Germ. Spec. Ins. nov. T. 1. p. 68.
58. *C. tenuis*, Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 83.

Fam. Melyrides.

Gen. *Astylus*, Lap. Rev. Ent. T. 4. p. 32.

59. *A. rubripennis*, Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 258. pl. 17 f. 3.
60. *A. Bonplandi*, Erichs. Consp. Coleopt. Peruan. p. 84.

Fam. Silphales.

Gen. *Necrophorus*, Fabr. Syst. Entom. p. 71.

61. *N. didymus*, Brullé. Voy. de D'Orbigny. Ins. p. 73. pl. 5 f. 3.

Gen. *Silpha*, Lin. Syst. nat. 10^e Edit.

62. *S. erythrura*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 75. pl. 5 f. 4.

C'est par erreur que M. Brullé, en décrivant l'espèce suivante, a cité la figure 4, de la pl. 5, de l'Atlas de D'Orbigny. Cette figure représente bien évidemment une espèce à élytres arrondies en arrière et non le *S. discicollis* qui a les élytres terminées en pointe. M. Erichson a copié cette erreur dans son *Conspectus des coléoptères du Pérou*. p. 88.

63. *S. discicollis*, Brullé. Voy. de D'Orb. Ins. p. 75. (non la figure citée.)

64. *S. anticola*, Guér. — Noir. Tête finement ponctuée, avec une carène transversale en arrière et une fossette de chaque côté entre les yeux. Antennes entièrement noires ayant les trois derniers articles tomenteux. Corselet un peu plus large que long, finement ponctué, arrondi sur les côtés, avec quatre côtes longitudinales peu élevées, dont deux au milieu partant du bord antérieur, se rapprochant et se terminant assez près du bord postérieur, et deux autres partant du bord postérieur et formant un arc pour rejoindre chacune des deux carènes médianes vers le milieu du corselet. Écusson et élytres couverts de points enfoncés assez forts et serrés: les élytres ayant chacune trois côtes lisses dont l'externe se termine en arrière, un peu au delà du milieu, à un tubercule ou nodosité de l'élytre qui s'observe chez toutes les espèces du même groupe Américain. Segments de l'abdomen offrant une carène transversale au milieu, le dernier fauve obscur, surtout dans les femelles, quelquefois tout-à-fait noir chez quelques mâles. — L. 17; l. 7 mill.

Cette espèce est très-voisine des *S. lineatocollis* De la Porte, et *apicalis* Brullé (Voy. de D'Orb. Ins. p. 74 pl. 5 f. 5.); mais elle s'en distingue par les antennes qui n'ont pas les derniers articles d'un jaune orangé et par d'autres caractères. Dans le mâle les élytres sont arrondies en arrière; dans la femelle elles sont un peu acuminées. Nous avons vu un assez grand nombre d'individus de cette espèce particulière aux sommets des Andes, parce que M. Bourcier en a rapporté aussi plusieurs qu'il a bien voulu nous remettre. Parmi ces individus il s'en trouve un qui offre une petite anomalie. Son élytre droite présente sous l'angle huméral le commencement d'une quatrième carène, et en arrière, la troisième, interrompue au tubercule, se continue ensuite et va s'anastomoser avec la seconde.

Fam. **Staphylinii.**

Gen *Staphylinus*, Lin. — Erich. Gen. et Spec Staph. p. 345.

65. *S. Osculatii*, Guér. — D'un noir verdâtre, Tête et corselet fortement ponctués. Ecusson noir, lisse. Elytres d'un noir bronzé, bordées de fauve, très-finement chagrinées. Abdomen d'un noir un peu verdâtre, avec le bord postérieur des segments d'un fauve obscur et l'anus d'un fauve plus vif. Pattes noires avec des cils et un duvet brun jaunâtre. — L. 18; l. 4 mill.

Il est assez voisin du *St. caliginosus*, pour la forme et la taille, et il a aussi des affinités avec le *St. Antiopus* d' Erichson, mais il diffère des deux et de tous les autres de la même division par la couleur et par les segments abdominaux bordés de fauve.

Gen. *Belonuchus*, Nordm. Er. id. p. 419.

66. *B. mordens*, Er. Gen. et Sp. Staph. p. 422.

Gen. *Philonthus*, Leach. Er. id. p. 426.

67. *P. candens*, Erich. Gen. et Sp. Staph. p. 460.

68. *P. feralis*, Erich. id. p. 469.

Gen. *Latona*, Guér. Revue Zool. 1844. p. 13.

69. *L. Spinolae*, Guér. id. p. 13.

Gen. *Cryptobium*, Mann. Er. id. p. 561.

70. *C. prolixum*, Erichs. id. p. 564.

Gen. *Leptochirus*, Germ. Er. id. p. 824.

71. *L. scoriaceus*, Germ. — Erichs. id. p. 825.

Fam. **Histerini.**

Gen. *Saprinus*, Erichs., Klug. Jahrb. 1. 176.

72. *S. impressifrons*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 72.

73. *S. decoratus*, Erichs., Klug. Jahrb. 1. 176.

Fam. **Hydrophili.**

Gen. *Tropisternus*, Solier. Ann. Soc. Ent. de France. T. 3. p. 308.

74. *T. lepidus*, Brullé. Voy. de d'Orb. Ins. p. 57 pl. 4 f. 4.

75. *T. dorsalis*, Brullé. id. p. 57. pl. 4 f. 6.

Gen. *Cyclonotum*, Erichs. Käf. der M. Brandenb. T. 1. p. 212.

76. *C. striatopunctatum*, Muls. An. Sc. phys. et nat. de Lyon. T. 7. p. 179.

Fam. Nitidulariae.

Gen. *Camptodes*, Erichs. Germ. Zeitsch. t. 4, p. 321.

77. *C. obscurus*, Erichs. id. p. 338.

Fam. Dermestini.

Gen. *Dermestes*, Latr. Gen. Crust. et Ins. T. 2. p. 30.

78. *D. carnivorus*, Fabr. Syst. El. T. 1. p. 312.

79. *D. peruanus*, Lap. hist. nat. des Ins. T. 2. p. 33.

Fam. Scarabaeides.

Gen. *Enema*, Hope. — Burm. Handb. der Entom. T. 5. p. 233.

80. *E. infundibulum*, Burm. id. p. 234.

81. *E. Pan*, Fabr., Burm. id. p. 235.

Gen. *Podischnus*, Burm. Handb. der Ent. 5. 237.

82. *P. Agenor*, Oliv., Burm. id. 238.

Gen. *Strategus*, Hope. — Burm. id. p. 128.

83. *S. Antaeus*, Oliv., Fab., Burm. id. p. 129.

Gen. *Heterogomphus*, Burm. id. p. 224.

84. *H. Bourcieri*, Guér. Revue Zool. 1851. p. 160.

85. *H. dilaticollis*, Burm. Handb. der Ent. T. 5. p. 229.

Gen. *Democrates*, Burm. Handb. T. 5. p. 28.

86. *D. Burmeisteri*, Reiche. Revue Zool. 1852. p. 21. pl. 1 f. 1.

Gen. *Cyclocephala*, Latr. R a. T. 4. p. 552.

87. *C. Scarabaeoïdes*, Burm. Handb. T. 4. p. 39.

88. *C. pubescens*, Burm. id. p. 68.

89. *C. Castanea*, Oliv., Burm. id. p. 49.

90. *C. frontalis*, Burm. id. p. 50.

Gen. *Chalepus*, Mac-Leay, Horae Ent. T. 1. p. 149.

91. *C. geminatus*, Fabr., Burm. Handb. T. 5. p. 78.

Gen. *Chasmodia*, Mac-Leay. Horae. Ent. 155.

92. *C. trigona*, Fabr., Burm. Handb. Ent. T. 4. p. 339.

Gen. *Macraspis*, Mac-Leay. id. p. 156.

93. *M. hemichlora*, Laporte. hist. nat. des Ins. T. 2. p. 118.
94. *M. anticola*, Burm. Hand. Ent. T. 4. p. 252.
95. *M. fucata*, Fab. Burm. id. p. 353.

Gen. *Chrysophora*, Latr. fam. nat. p. 370.

96. *C. chrysochlora*, Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 106, pl. 15 f. 1. 2. —
Guér. Icon. du Règne animal, Ins. pl. 24 f. 1.

Gen. *Rutela*, Latr. Gener. Cr. et Ins. T. 2. p. 106.

97. *R. lineola*, Latr. — Burm. Handb. der Ent. T. 4. p. 284.
98. *R. laeta*, Weber. — Burm. id. p. 385.

Gen. *Pelidnota*, Mac-Leay. Horae. Ent. T. 1. p. 157.

99. *P. osculatii*, Guér. — Entièrement d'un bronzé vert en dessus et couleur de cuivre rouge en dessous. Tête triangulaire avec le chaperon rétréci et trouqué en avant, criblée de gros points enfoncés en partie confluents. Corselet transversal, assez anguleux sur les côtés, criblé de gros points enfoncés qui deviennent de grosses rugosités sur les côtés, avec une ligne longitudinale enfoncée au milieu, terminée en arrière par une espèce de fossette. Ecusson trois fois plus large que long avec une petite échancrure au milieu en arrière, lisse, avec quelques points enfoncés vers sa base. Elytres allongées, avec quelques traces de stries, lisses, assez marquées, à la base, quelques plis transversaux, qui deviennent très-profonds sur les côtés et au dessous des angles huméraux. Elles sont couvertes d'un grand nombre de petits points enfoncés donnant chacun attache à une petite écaille grise et couchée. Le dessous est d'un cuivreux rouge, avec les pattes fortement ponctuées et le reste du corps garni de petits points et de poils d'un jaune roussâtre, couchés et assez longs. — L. 26; l. 13 mill.

Cette magnifique espèce se distingue de toutes celles connues jusqu'ici par les petites écailles grises insérées dans les points enfoncés des élytres. Nous en avons vu un second individu dans la collection de M. Deyrolle, provenant des rives de l'Amazone.

Gen. *Cnemida*, Kirby. Zool. Journ. T. 3. p. 146.

100. *C. retusa*, Fabr. — Burm. Handb. Ent. 4—379.

Gen. *Platycoelia*, Burm. Handb. Ent. T. 4. p. 452.

101. *P. valida*, Burm. Handb. id. p. 453.
102. *P. lutescens*, Cat. des Coll. Ent. du Mus. de Paris. Coléopt. p. 227.
102. *P. scutellata* Guér. — Ovalaire d'un beau vert avec l'écusson jaune et le milieu du ventre noir. Tête finement chagrinée, avec la partie antérieure

un peu plus fortement rugueuse, plus avancée que dans les autres espèces (*Boliviensis* et *flavostriata*) moins arrondie en avant. Antennes et palpes fauves. Corselet transversal, lisse, bordé d'un fort sillon en avant et sur les côtés, entouré d'un fin liseré jaune fortement échancré de chaque côté vers les angles postérieurs, ce qui le distingue nettement de toutes les espèces connues, qui ont les côtés du corselet régulièrement arrondis et élargis vers l'angle postérieur. Ecusson triangulaire, d'un beau jaune et lisse. Elytres lisses, finement bordées de jaune, avec quelques faibles côtes larges et peu élevées dont les sillons n'offrent aucune trace de points enfoncés. Dessous et pattes verts, garnis de poils jaunes assez épais. Abdomen très-lisse et sans poils, avec le milieu des segments d'un noir vif qui se prolonge au milieu de la poitrine jusqu'à la pointe sternale. Tarses fauves. — L. 28; l. 16 mill.

Gen. *Bolax*, Fisch. — Bull. Mosc. 1829.

104. *B. Anticola*, Burm. Handb. Ent. T. 4. p. 490.

Gen. *Philochlaenia*, Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 103.

105. *P. compacta*, Erichs. Consp. id. p. 103.

Gen. *Gymnetis*, Mac-Leay, Horae. Ent. T. 1. p. 152.

106. *G. meleagris*, Burm. Handb. Ent. T. 3. p. 294.

Gen. *Cyclidius*, Mac-Leay. Ill. of the Zool. of South. Afr. III. 17.

107. *C. elongatus*, Oliv. Ent. t. 1. Nr. 6. p. 24. pl. 6 f. 51.

Gen. *Hyboma*, Serv. et St. Farg. Encycl. meth. Ins. T. 10. p. 352.

108. *H. Icarus*, Oliv. Ent. T. 1. Nr. 3. p. 155. Nr. 189. pl. 15 f. 151. a.

109. *H. dentipes*, Esch. Entomogr. (Edit. franc) p. 37. pl. 1 f. 4.

110. *H. Chalcea*, Buq. Revue Zool. 1844. p. 19.

111. *H. hyppona*, id. p. 19.

Gen. *Canthon*, Hoffm. — Wiedm. Zool. Mag. T. 1. p. 161.

112. *C. rugosum*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 159.

113. *C. histrio*, Lepell. et Serv. Encycl. T. X. p. 352.

114. *C. Sanquincollis*, Guér. — Tête et corselet d'un rouge de sang, luisants. Chaperon quadriépieux: Massue des antennes fauve. Corselet lisse, anguleux de chaque côté, avec le bord postérieur d'un noir violet fondu avec le rouge et n'occupant que la partie qui touche aux élytres. Il offre sur le milieu du disque trois gros points noirs disposés transversalement, et l'on voit de chaque côté les vestiges d'une autre tache, ce qui doit en porter le nombre à cinq et peut-être même former une bande transverse chez certaines variétés. Elytres d'un beau bleu

violet à reflets verdâtres, avec de fines stries peu marquées surtout en arrière. Dessous noir à reflets bleuâtres, avec le pygidium rouge. Pattes d'un noir verdâtre à reflets métalliques avec toutes les cuisses rouges au milieu. Jambes antérieures terminées par trois grosses dents denticulées à leur base et qui sont précédées de denticulations. — L. 11; l. 7½ mill.

115. *C. sexpilotum* Guér. — Corps jaune avec les élytres d'un brun violet terne. Tête jaune, lisse, bidentée avec les bords teintés de verdâtre. Corselet jaune, lisse, un peu anguleux de chaque côté, orné de six gros points noirs ainsi disposés: un au milieu du bord antérieur; quatre placés transversalement sur le disque, du côté antérieur, et un plus gros et carré placé au bord postérieur devant la suture. Élytres d'un brun terne à reflet violet, montrant des traces à peine visibles de stries longitudinales, avec le bord réfléchi sous la côte latérale d'un jaune d'ocre. Dessous et jambes jaunes avec les trochanters, la base et l'extrémité des cuisses et des jambes intermédiaires et postérieures noirs. Jambes antérieures noires terminées par trois fortes dents denticulées à leur base et qui sont précédées de denticulations très-fines sur la tranche. — L. 8; l. 5 mill.

Cette jolie espèce a des affinités avec le *C. sexpunctatum* de Fabricius; mais elle est beaucoup plus petite et les taches de son corselet sont autrement disposées.

116. *C. quadripustulatum* Guér. — Noir avec de faibles reflets bleuâtres. Tête très faiblement ponctuée, avec le chaperon terminé par deux pointes très-rapprochées et arrondies, précédées chacune d'un petit angle indiquant la place de deux autres pointes; antennes jaunes. Corselet bombé, finement ponctué, arrondi sur les côtés. Élytres d'un noir terne avec de faibles traces de lignes enfoncées et ayant chacune deux taches fauves peu visibles placées-sous l'angle huméral et à l'extrémité externe. Pattes noires à reflets verdâtres. Les antérieures semblables à celles des deux espèces précédentes. — L. 6; l. 3½ mill.

Cette petite espèce ressemble assez à celle que M. Blanchard a décrite dans le voyage de D'Orbigny sous le nom de *Tetraechna sanguineo-maculata*, mais chez celle-ci le chaperon a quatre épines en avant, ce qui a motivé ce genre, que, du reste M. Blanchard n'a pas caractérisé et qui ne pourra être conservé. Le *Canthon sanguinicornis* ci-dessus appartiendrait à ce genre.

Gen. *Chaeridium*.

117. *C. cupreum*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 169.
118. *C. prasinum*, Blanch. " " " " " 169.

Gen. *Copris*, Geoff.

119. *C. assifera*, Esch. Entomogr. (Édit. franç.) p. 27.

120. *C. triangulariceps*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 177.

121. *C. conicollis*, Blanch. " " " " 179.

122. *C. alexis*, Blanch. " " " " 180.

123. *C. nesus*, Fabr. Syst. El. T. 1, p. 44.

124. *C. cotopazi*, Guér. Noir. Tête un peu avancée au milieu, de forme un peu triangulaire, avec une petite dent obtuse de chaque côté en avant des yeux, fortement chagrinée, portant chez le mâle une corne assez courte, un peu élargie et tronquée au bout, placée près du bord antérieur, dirigée en avant et dont la base se prolonge un peu en arrière en forme de carène. Palpes et antennes fauves, celles-ci ayant la massue grise. Corselet plus large que long, arrondi sur les côtés, fortement chagriné, tronqué antérieurement, avec la tranche supérieure de cette troncature élevée, un peu sinuée, lisse, et aboutissant de chaque côté à une grande fossette latérale à fond et bord antérieur très-lisse. Elytres faiblement chagrinées, à rugosités comme effacées, avec sept lignes longitudinales enfoncées et à fond garni de petits points assez distants; dessous ponctué, avec quelques cils fauves sous la tête et sur les côtés du thorax. Jambes antérieures à bord externe faiblement sinué, sans dents, avec le dessus orné d'une sculpture formant un fort sillon composé d'une série de fossettes en gros points enfoncés.

La femelle ressemble entièrement au mâle; seulement sa tête porte en arrière une élévation en carène transversale, et la carène supérieure du corselet ne se prolonge pas tout-à-fait jusqu'aux fossettes latérales. — L. 24; l. 15 mill.

Gen. *Phanaeus*, Mac-Leay. Hor. Entom.

125. *P. lancifer*, Fabr. Syst. El. T. 1. p. 43.

126. *P. Jasius*, Oliv. Ent. T. 1. Nr. 3. p. 109. pl. 7 f. 50. e. f.

127. *P. mimas*, Fabr. Syst. El. T. I. p. 45.

128. *P. imperator*, Guér. Icon. Règn. Anim. Ins. pl. 21 f. 8.

129. *P. splendidulus*, Fabr. Syst. El. T. 1. p. 32.

130. *P. floriger*, Kirby. Centurie d'Ins. (Édit. franç.) p. 21. Nr. 29.

131. *P. planicollis*, Perty. Voy. de Spix et Martius, Ins. p. 40, pl. 8, f. 13.

132. *P. Meliboeus*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 176. pl. 10 f. 7.

133. *P. Meleagris*, " " " p. 176.

134. *P. conspicillatus*, Fabr. Syst. El. T. 1. p. 32.

135. *P. Silenus*, Lap. hist. nat. des Ins. T. 2. p. 82. Nr. 3.

136. *P. palens*, Lap. " p. 82. Nr. 4.

Gen. *Ontophagus*

137. *O. compressus*, Guér. — Noir, luisant; tête triangulaire, presque aigue en avant, aplatie avec des rides transverses et deux tubercules aigus en arrière, réunis par une faible élévation transverse. Antennes fauves. Corselet de forme carrée, presque aussi long que large, très-lisse, élargi en avant, avec une large et profonde échancrure pour

l'insertion de la tête. Il offre de chaque côté une forte dépression oblique et dirigée en avant, comme dans l'*Ont. obliquus* de Fabricius, terminée en arrière, près des angles postérieurs externes, par une crête transversale très-saillante formant une espèce de pointe de chaque côté. Les élytres sont arrondies, très-lisses, avec sept stries bien marquées et fortement ponctuées. Le dessous est lisse et luisant avec les côtés du thorax et de l'abdomen ponctués. Les pattes antérieures sont terminées par trois fortes dents externes. — L. 14. l. 8 mill.

138. *O. clypeatus*, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 182. pl. 10 f. 8.

139. *O. nasutus*, Guér. — Noir, luisant; tête arrondie et large sans cornes ni saillies, très-finement ponctuée en avant, avec le bord antérieur du chaperon prolongé en une corne plate recourbée et relevée avec l'extrémité tronquée et arrondie. Le corselet est épais, tronqué droit en avant, avec le milieu très-élevé formant une forte éminence quadrilobée dont les lobes du milieu sont plus avancés et cachent l'insertion de la tête lorsqu'on regarde l'insecte en dessus. Les côtés antérieurs sont fortement excavés et ponctués, il y a une petite fossette en arrière de ces excavations, près des bords latéraux qui sont arrondis et assez saillants, et le dessus est très-lisse et très-luisant. Les élytres sont très-lisses et luisantes, avec des stries ponctuées. Le dessous est fortement ponctué avec les antennes et les tarses fauves. — L. 7. ; l. 4½ mill.

Cette espèce est très-voisine de la précédente; mais elle s'en distingue facilement par l'absence de cornes, par la couleur et par le luisant de tout le corps. Notre individu est évidemment un mâle.

140. *O. osculatii* Guér. — D'un vert foncé et terne tirant sur le bleu, surtout aux élytres et en dessous; tête finement ponctuée, arrondie, à bord antérieur un peu relevé, avec deux cornes assez longues, droites, insérées en arrière, au dessus des yeux et dirigées en arrière. Ces cornes ne sont pas réunies par une petite carène élevée, et l'on ne voit aucune trace d'une autre carène en avant, comme cela a lieu chez une autre espèce voisine, connue dans les collections sous le nom d'*Ont. hirculus*. Corselet ponctué, excavé en avant de chaque côté pour recevoir les cornes, avec le milieu avancé, arrondi et peu élevé et un sillon médian assez marqué en arrière. Elytres à stries ponctuées. Dessous et pattes luisants, ponctués, antennes et tarses fauves. — L. 7. l. 4. mill.

141. *O. rubescens* Blanch. Voy. de d'Orbigny, Ins. p. 183.

Gen. *Vroxys* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4 p. 229.

142. *V. cuprascens* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5. p. 229. pl. 16. f. 5.

Gen. *Eurysternus* Dal m. Ephem. Entom. fasc. 1.

143. *E. marmoreus* Laporte, hist. nat. des Ins. T. 2. p. 93.

144. *E. pectoralis* Guér. — D'un noir verdâtre terne avec les élytres d'un brun rougeâtre obscur et une forte protubérance au milieu de la poitrine. La tête est lisse, avec le bord antérieur un peu échancré et les côtés un peu avancés. Le Corselet est ponctué avec quelques faibles fossettes vaguement marquées en avant et un sillon médian en arrière. Les élytres d'un brun roussâtre terne ont de fines stries sans points, avec leurs intervalles plans et garnis d'une rangée de petits points. La suture, le cinquième intervalle et la carène humérale sont un peu élevés et d'un brun noir. Le dessous et les cuisses sont ponctués et l'on remarque au milieu du Mésothorax, entre l'insertion des pattes intermédiaires, un tubercule élevé, comprimé latéralement et formant une carène courte terminée en points. Les jambes antérieures sont courtes et épaisses, armées de trois fortes dents au bord externe, creusées en dessous et garnies autour de cette excavation de quatre forts tubercules dentiformes dirigés en bas. Les jambes postérieures sont fortement arquées dès leur base et ciliées en dedans. — L. 17. l. 8 mill.

Cette curieuse espèce est très-voisine de l'*Eurysternus magnus* de Laporte, mais elle est un peu plus grande et se distingue de toutes celles connues par le tubercule pectoral qui doit être un attribut des mâles.

Gen. *Passalus* Fabr. Syst. Ent. T. 1. p. 240.

145. *P. crassus* Smith. Nomencl. des col. du British Mus. Passalidae p. 14. n. 61.

146. *P. Compar* Erichs. Comp. Ins. col. Peruan. p. 112.

147. *P. aduncus* Erichs. id. p. 112.

148. *P. transversus* Dal m. Percher. Monogr. des Passalides p. 37. pl. 7. f. 3.

Fam. **Tenebrionites.**

Gen. *Nyctelia* Latr. Fam. nat. du Règne animal. p. 375.

149. *N. laerigata* Erichs. Meyen Reis. Zool. 369. pl. 48 f. 3.

Gen. *Scotobius* Germ. Spec. Ins. nov. spec. p. 135.

150. *S. punctatellus* Blanch. Voy. de d'Orb. Ins. p. 195. pl. 13. f. 5.

Gen. *Nyctobates* Guér. Mag. Zool. 1834. p. 34.

151. *N. gigas* Linné. Fabr. syst. El. T. 1. p. 144.

Gen. *Stenochia* Kirby. Trans. Lin. Soc. Vol. XII.

152. *S. haemorrhoidalis* Fabr. Syst. El. T. 1. p. 159.

Fam. **Curculionites.**

- Gen. *Arrhenodes* Schoen. Gen. et Spec. Curcul. T. 1. p. 313.
 153. *A. dispar* Lin. Sch. id. p. 315.
- Gen. *Belorhynchus* Latr. R. A. T. 3. p. 390. Sch. id. p. 340.
 154. *B. curvidens* Fab. Sch. id. p. 341.
- Gen. *Brenthus* Illig. Mag. 3. 101. Schoen. ibid. p. 342.
 155. *B. Anchorago* Lin. Sch. id. T. 1. p. 343.
 156. *B. vulneratus* Sch. id. T. 1. p. 345.
- Gen. *Cephalobarus* Sch. Gen. et spec. Curc. T. 5. p. 517.
 157. *C. macrocephalus* Sch. id. p. 519.
- Gen. *Claeoderes* Sch. gen., T. 1. p. 362.
 158. *C. radulirostris* Sch. id. p. 363.
- Gen. *Vlocerus* Dalm. Eph. Ent. T. 1. p. 25.
 159. *V. laceratus* Dalm. Sch. 1. 374.
- Gen. *Entimus* Germ. Sch. T. 1. p. 454.
 160. *E. imperialis* Fabr. Sch. id. p. 455.
 161. *E. nobilis* Oliv. Sch. id. 455.
- Gen. *Polyteles* Sch. T. 1. p. 452.
 162. *P. Guerini* Sch. id. T. 5. p. 743.
- Gen. *Naupactus* Sch. T. 1. p. 567.
 163. *N. decorus* Fab. Sch. id. T. 1. p. 571.
- Gen. *Cyphus* Schoen. Curc. disp. Meth. p. 107.
 164. *C. gibber* Lin. Sch. Sch. Gen. et Spec. Curc. T. 1. p. 621.
- Gen. *Platyomus* Sch. Curc. disp. p. 109.
 165. *P. piscatorius* Germ. Sch. id. T. 6. p. 161.
 166. *P. Bourcieri* Guér. — Oblong, noir, entièrement couvert de petites écailles d'un beau vert. Front plan à peine un peu excavé en avant du rostre, avec le chaperon faiblement échancré. Antennes grandes, noires avec la massue blanche. Corselet oblong, très inégal avec le dessus un peu aplati et les élévations des côtés en forme de gros plis obliques et transversaux. Elytres aplaties sur le dos, avec des stries de grosses fossettes produisant des espèces de plis transversaux sur chaque intervalle, et trois faibles côtes dont la seconde, la plus courte, se termine assez loin de l'extrémité en un petit tubercule gris. L'extrémité des élytres est terminée par deux fortes pointes mousses

et grises, garnies de poils roux, divergeant un peu entre elles et dont le gris remonte sur la suture jusqu'au milieu de la longueur à peu près. Les pattes et le dessous ont des écailles vertes, plus brillantes que celles du dessus. — L. 25; l. 8 mill.

Cette belle espèce se placera à côté et avant le *Pl. viridipes* de Schoenherr.

167. *P. furcatus* Guér. — Oblong, noir, couvert en dessus de petites écailles vertes, tête noire, avec quelques écailles vertes autour des yeux. Une petite impression à la naissance du rostre, entre les yeux, suivie d'un fort canal médian, élargi en avant au milieu du rostre, et donnant lieu à deux fortes carènes latérales qui divergent brusquement en avant et dépassent un peu l'insertion des antennes. Corselet oblong, avec des fossettes irrégulières et peu profondes, ayant le dessus déprimé et excavé longitudinalement au milieu, ce qui donne lieu à deux fortes côtes à sommet lisse et dépourvu d'écailles par le frottement. Elytres allongées, fortement acuminées à l'extrémité, avec des fossettes assez fortes, rangées longitudinalement, sans côtes élevées ni tubercules postérieurs, et ayant les pointes postérieures très-fortes, divergeantes et assez aigues. Dessous, pattes et antennes d'un noir luisant sans écailles. Massue des Antennes d'un gris cendré. — L. 13. l. 4. mill.

168. *P. canescens* Schoen. Gen et Spec. Curcul. T. 6. p. 181.

169. *P. viridivittatus* Guér. — Ovale, allongé, noir, couvert d'écailles d'un blanc argenté et d'un vert luisant. Front argenté avec le vertex vert et le chaperon noir, profondément échancré. Corselet garni de gros points, argenté avec les côtés et trois lignes longitudinales verts. Elytres à séries de gros points enfoncés, avec les intervalles un peu élevés en faibles côtes d'un beau blanc argenté, ornées chacune de deux larges lignes longitudinales vertes, l'une en dessus, l'autre sur la côte. Extrémité des élytres peu avancée. Dessous et pattes argentés, cuisses tachées de vert. — L. 14. l. 5 mill.

Cette délicieuse espèce a été trouvée aussi en Colombie et nous lui avons conservé le nom que nous lui avons imposé dans notre collection et qu'a adopté M. Jeckel dans la sienne.¹⁾

¹⁾ Parmi les espèces qui nous ont été envoyées par M. Osculati, se trouvait un individu du *Lachnopus splendidus* de Schoen. T. 6. p. 382. Jusqu'à présent cette espèce, ainsi que toutes celles du même genre qui sont exclusivement des Antilles, n'avait été trouvée que dans l'île de Cuba. Il est difficile d'admettre que cet insecte ait été pris dans le haut Pérou; il doit avoir été ajouté par erreur aux Insectes de M. Osculati, et plus probablement comme M. Osculati a dû visiter aussi, avant cette exploration, les Antilles, il l'aura confondu avec les autres du haut Pérou.

Gen. *Hypsonotus* Germ. Sch. T. 2. p. 253.

170. *H. umbrosus* Germ. Sch. T. 2. p. 258. et T. 6. p. 152.
 171. *H. clericus* Sch. id. T. 2. p. 268 et T. 6. p. 169.

Gen. *Lordops* Sch. T. 2. p. 268 et T. 6. p. 173.

172. *L. Gyllenhali* Sch. ibid. T. 6. p. 177.
 173. *L. navicularis* Germ. Sch. 6 — 178.
 174. *L. variabilis* Jeckel, Fabricia Entomol. 1ère Partie, I. V. 15.

Gen. *Lixus* Fabr. Sch. T. 3. p. 1.

175. *L. impressus* Sahlb. Sch. T. 3. p. 37.
 176. *L. pulvinatus* Sch. id. T. 3. p. 38.

Gen. *Heilipus* Germ. Sch. T. 3. pag. 154 et T. 7. p. 27.

177. *H. Osculatii* Guér. — Entièrement d'un brun noir, allongé, rostre peu arqué, cylindrique et lisse. Corselet allongé, rétréci en avant, avec quelques gros points, peu profonds en dessus et une fossette assez large en arrière. Il est orné de quatre lignes longitudinales blanches et minces, deux de chaque côté, et ses bords inférieurs sont garnis de poils blancs. Elytres offrant quelques lignes longitudinales de gros points peu marqués, et ornées chacune de quatre minces lignes blanches ainsi disposées: la première près de la suture et aboutissant à l'extrémité; la seconde au milieu de la partie supérieure, arquées, venant se confondre en arrière avec la première; la troisième près du bord supérieur, partant du dessus de l'angle huméral, d'abord parallèle à la seconde, puis en divergeant pour se diriger en arrière vers le bord externe et se confondre avec la quatrième qui longe ce bord externe. En arrière, les seconde et troisième lignes laissent un espace qui est occupé par deux courtes lignes blanches très-minces qui se réunissent en avant et en arrière et entourent ainsi la callosité postérieure. Le dessous de l'abdomen a quelques bandes transversales de poils blancs. Les pattes sont noires. — L. 13. l. 4. mill.

Cette espèce a beaucoup d'affinités avec celles que nous avons publiées sous le nom d'*Heilipus norresii* et *elegans*, dans le texte de notre Iconographie du Règne animal (Ins. p. 148.); mais elle en diffère par les lignes blanches et minces, formées de fines écailles, qui ornent son corselet et ses élytres.

178. *H. loqueatus* Erichs Comp. Ins. col. Peruan. p. 130.
 179. *H. difficilis* Sch. T. 7. p. 106.

Gen. *Ambates* Sch. T. 3. p. 278 et T. 7. p. 150.

180. *A. griseolus* Erich Comp. α. p. 131.
 181. *A. clitellatus* Sch. id. T. 7. p. 152.

Gen. *Sternechus* Schoen. T. 3. p. 472 et T. 7. p. 353.

182. *S. Guerini* Schoen. id. T. 7. p. 353.

Gen. *Leptosomus* Guér. Icon. Règne anim. Texte Ins. p. 168.

183. *L. lancifer* Guér. ibid. p. 169.

184. *L. aries* Guér. ibid. p. 168.

185. *L. deplanatus* Guér. — Noir terne, complètement plat et horizontal en-dessus, avec les côtés parallèles et tranchants, surtout aux élytres. Tête lisse, noire, avec le rostre brusquement inséré en avant, presque aussi long que le corselet, un peu arqué au bout, couvert de fortes rugosités formant au milieu, ou avant, une espèce de petite carène élevée et en arrière laissant un enfoncement peu marqué comme un sillon postérieur. Corselet plus long que large, un peu plus large au milieu qu'à la base, brusquement rétréci ensuite, couvert en dessus et sur les côtés d'assez fortes granulations, avec une espèce de ligne longitudinale à peu près lisse au milieu, un peu enfoncée. Elytres un peu plus larges que le corselet, s'élargissant un peu à partir des épaules qui sont assez anguleuses, à côtés parallèles et droits, jusqu'au tubercule postérieur ou elles s'abaissent brusquement en arrière. Leur dessus, très-plat, offre quelques plis obliques et vagues, quelques points enfoncés, le plus souvent cachés par une matière grise, mêlée à quelques courts poils fauves, et de petits tubercules lisses vaguement dispersés. Leur extrémité postérieure, à l'endroit où la déclivité commence, offre une sorte de carène transversale formée par les tubercules latéraux et par six faibles bosses velues, et l'on observe de chaque côté, au dessous de cette espèce de carène, un tubercule assez fort. Les côtés des élytres, embrassant l'abdomen, sont ornés de gros points enfoncés presque rangés en séries longitudinales et de petits tubercules luisants placés sans ordre. Les dessous est garni de petits tubercules avec le dernier segment abdominal fortement chagriné. Les pattes sont couvertes de matière grise et de petits tubercules luisants et noirs. Les tarsi et les antennes sont bruns. — L. 15. : l. 5 mill.

186. *L. complanatus* Guér. — Semblable au précédent pour la taille, la forme générale et la couleur; mais ayant le dessus un peu moins aplati. Le rostre est fortement tuberculeux et n'offre ni trace de carène ni sillon. Le corselet est un peu noir, élargi au milieu, couvert de rugosités beaucoup plus fortes et confluentes formant de gros plis obliques. Les élytres ont en dessus des bosses peu saillantes, elles ont le dessus un peu convexe vers l'arrière et la carène postérieure et transversale qui marque la déclivité postérieure, est formée, outre le tubercule externe, d'un seul gros tubercule. Leurs côtés ont de grosses fossettes laissant des intervalles élevés qui forment des espèces de plis en zigzag, et toute leur surface, dessus et côtés, est couverte de tu-

bercules très-lisses, à sommet d'un rouge fauve luisant et portant de l'enduit et des poils gris. Cette espèce, qui est de la même taille que la précédente, ne serait-elle que l'autre sexe? Je ne le pense pas; car ces deux individus ont l'abdomen tout à fait semblable.

187. *L. margaritatus* Guér. — Très-allongé, aplati en dessus, acuminé en arrière, d'un noir terne. Tête lisse, avec le rostre très-arqué en avant, lisse à l'extrémité et granulé ensuite jusqu'à son insertion avec la tête qui en est distinguée par un petit sillon transversal. Corselet beaucoup plus long que large, un peu arrondi sur les côtés, rétréci en avant, fortement chagriné et plissé et offrant deux larges carènes de chaque côté qui laissent un large espace excavé au milieu et une fossette longitudinale assez marquée de chaque côté. Les élytres sont fortement ponctuées, à peine plus larges que le corselet, à leur base, elles s'élargissent un peu sur les côtés; mais vont en se rétrécissant bientôt et avant même le milieu de leur longueur et se terminent par deux pointes mousses formant fourche. Elles ont comme le corselet, deux grosses carènes élevées: l'une partant de l'angle huméral et se terminant à l'extrémité de la pointe postérieure, l'autre au milieu du côté et arrivant aussi en ligne droite à cette même pointe. Ces deux carènes sont ornées sur leur sommet d'une série de gros tubercules lisses, ronds, un peu inégaux et à milieu fauve, et l'on voit sur le disque aplati en dessus, et sur l'intervalle supérieur des bords latéraux une série de ces mêmes tubercules, mais beaucoup moins forts. Le dessous est lisse, terne et un peu ridé. Les pattes sont granuleuses, avec les tarsi noirs, luisants; les antennes sont brunes. L. 16. l. 4½ mill.

Cette curieuse espèce se distingue de toutes celles connues jusqu'ici par sa forme très-allongée et par les tubercules en forme de perles qui se voient alignés sur les côtés de ses élytres.

Gen. *Solenopus* Schoen. Curc. T. 3. p. 597 et T. 8. p. 24.

188. *S. Cacicus* Sahlb. Schoen. id. T. 8, p. 24.

189. *S. sexmaculatus* Oliv. Schoen. T. 8. p. 25.

Gen. *Dionychus* Germ. Schoen. T. 3, p. 580 et T. 8. p. 18.

190. *D. squamulosus* Sch. T. 8. p. 19,

Gen. *Amerlinus* Sch. T. 3. p. 599. et T. 8. p. 26.

191. *A. Dufresnii* Kirby. Sch. id. T. 8. p. 26.

192. *A. Ynca* Sch. id. T. 8. p. 26.

Gen. *Baridius* Sch. T. 3. p. 643 et T. 8. p. 114.

193. *B. Mutilus* Sch. id. T. 8. p. 149

Gen. *Cylindrocercus* Sch. T. 3. p. 789 et T. 8. p. 260.

194. *C. Comma* Sch. id. T. 8. p. 261.

Gen. *Dactylocrepis* Sch. T. 8. p. 265.

195. *D. flabellitarsis* Sch. id. T. 8. p. 266.

Gen. *Diorymerus* Sch. T. 3. p. 799 et T. 8. p. 275.

196. *D. armatus* Guér. Presque aussi large que long, avec les angles huméraux très-saillants. Tête et rostre noirs, finement rugueux. Corselet d'un rouge fauve avec les côtés inférieurs, le bord antérieur et le dessous noirs, et une corne noire comprimée en lame, dirigée en haut et en avant, dentée en arrière à sa base et insérée au bord postérieur qui s'avance fortement sur l'écusson en un lobe arrondi. Elytres fortement striées, noires, avec la moitié antérieure jaune et la protubérance humérale noire. Dessous et pattes noirs, avec les cuisses d'un fauve obscur — L. 6. : l. 4 mill.

Cette curieuse espèce est très-voisine du *Diorymerus monoce-ros* de Schoenherr (T. 3, p. 800), à cause de la corne aplatie en lame qu'elle porte en arrière du corselet; mais elle s'en distingue facilement par sa coloration. Elle devra être placée aussi dans le voisinage de deux autres espèces très-remarquables que nous avons publiées dans le magasin de Zoologie, 1839, pl. 13, sous les noms de *D. Pradieri* et *lancifer*.

Gen. *Cratosomus* Sch. T. 4. p. 1 et T. 8. p. 293.

197. *C. stellio* Oliv. Sch. T. 8. p. 299.
198. *C. lucifugus* Sch. T. 8. p. 300.
199. *C. Lafontii* Guér. Icon. Règne anim. Texte, Insect. p. 163.
200. *C. fasciatopunctatus* Guér. id. p. 164,

Gen. *Catapycnus* Sch. T. 4. p. 39.

201. *C. granulatus* Sch. id. T. 4. p. 40.

Gen. *Cryptorhynchus* Illig. Sch. T. 4. p. 47 et T. 8. p. 303.

202. *C. lirinus* Sch. T. 8. p. 305.
203. *C. lemmiscatus* Sch. T. 4. p. 51.
204. *C. stigma* Lin. Sch. T. 4. p. 63.
205. *C. circulus* Sch. T. 4. p. 64.
206. *C. leucophaeus* Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 133.

Gen. *Macromerus* Sch. T. 4. p. 183 et T. 8. p. 356.

207. *M. grallipes* Schoen. T. 4. p. 187.
208. *M. innoxius* Herbst. Sch. T. 4. p. 189.
209. *M. numenius* Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 133.

Gen. *Coelosternus* Sch. T. 4. p. 198 et T. 8. p. 359.

210. *C. Occatus* Germ. Sch. T. 4. p. 205.
211. *C. rugicollis* Schoen. T. 4. p. 210.

Gen. *Conotrachelus* Sch. T. 4, p. 392 et T. 8, p. 15. (Pars. 2).

212. *C. tricostatus* Sch., T. 8, p. 19.

213. *C. corallifer* Sch., T. 8, p. 34.

214. *C. pilosellus*, Sch., T. 8, p. 50.

Gen. *Peridinetus* Schoen. T. 4, p. 467 et T. 8 (2), p. 56.

215. *P. irroratus* Fabr. Sch. T. 4, p. 468.

Gen. *Zygops* Sch. T. 4, p. 601 et T. 8 (2), p. 88.

216. *Z. Strix* Fabr. Sch. T. 4, p. 606.

217. *Z. albicollis* Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 134.

Gen. *Piazurus* Sch. T. 4, p. 651. et T. 8. (2), p. 110.

218. *P. defector* Schoen. T. 4, p. 667.

219. *P. varipes* Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 135.

Gen. *Rhina* Olivier, Sch. T. 4, p. 790 et T. 8 (2) p. 205.

220. *R. barbirostris* Fabr. Sch. T. 4, p. 792.

221. *R. costalis* Sch., T. 4,, p. 793.

Gen. *Sipalus* Sch. T. 4, p. 800 et T. 8 (2) p. 209.

222. *S. striatus* Schoen., T. 4. p. 805.

223. *S. immundus* Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 135.

Gen. *Rhynchophorus* Herbst. Sch. T. 4, p. 816 et T. 8 (2) p. 216.

224. *R. Borassi* Fab. Sch. T. 4, p. 818.

225. *R. politus* Sch. T. 4, p. 819.

226. *R. palmarum* Lin. Sch. T. 4, p. 820.

227. *R. nitidulus* Guér. Icon. du règne anim. Texte Insectes p. 175.

Gen. *Sphenophorus* Sch. T. 4, p. 874 et T. 8 (2) p. 234.

228. *S. perforatus* Sch., T. 8 (2) p. 236.

229. *S. hemipterus* Lin. Fab. Sch. T. 8, p. 237.

230. *S. dispar*. Sch. T. 4, p. 892.

231. *S. loetus* Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 137.

232. *S. variabilis* Sch. T. 4. p. 898.

Fam. **Cerambycini** Latr.

Gen. *Mallodon* Serv. Ann. Soc. Ent. de France, T. 1, p. 176.

233. *M. spinibarbe* Lin. Fabr. Syst. Eleuth. T. 2, p. 263.

234. *M. bajulum* Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 138.

Gen. *Psalidognathus* Griff. An. Kingd. Ins T. 2, p. 115.

235. *P. limenius* Erichs. id. p. 139.

Gen. *Pyrodes* Serv. Ann. Soc. Ent. T. 1, p. 186.

236. *P. fastuosus* Erichs. Consp. etc. p. 139.

237. *P. nigricornis* Guér. — Raccourci, fauve, à reflets verts métalliques surtout en dessous. Antennes noires avec le premier, le second et plus de la moitié du troisième article fauves. Tête plus large que longue, à gros points enfoncés, avec une forte excavation longitudinale au milieu et rétrécie en arrière. Corselet transversal, rétréci en avant, denticulé sur les côtés antérieurs, avec deux épines de chaque côté, séparées par une profonde excavation, l'une en arrière, au delà du milieu, l'autre à l'angle postérieur. Dessus du corselet fortement rugueux et ponctué avec une large fossette transversale au milieu. Ecusson grand, ponctué. Elytres courtes, larges, presque parallèles sur les côtés, rugueuses, presque aussi larges en arrière qu'à leur base, comme tronquées et ayant l'angle sutural manifestement épineux. Dessous lisse et luisant avec les pattes assez fortement ponctuéées. — L. 19 : l. 9½ mill.

Cette petite espèce, qu'au premier aspect l'on prendrait pour un individu piqué avant d'avoir pris ses couleurs métalliques, me semble cependant arrivée à son état normal, car les téguments ont la fermeté de ceux des Insectes éclos dans de bonnes conditions. Elle se distingue par la double épine des côtés de son corselet et quoique voisine du *P. bifasciatus* par ce caractère et par la brièveté de son corps, elle diffère de ce dernier parce que celui-ci a la seconde épine des côtés du corselet bifide et que l'angle sutural de ses élytres ne montre aucune trace de saillie épineuse.

238. *P. heterocerus* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 139.

Syn. *P. antennatus* White, Cat. col. Ins. Coll. Brit. mus. part.

VII. *Longicornia*, p. 51. pl. 2 f. 6.

L'examen de plusieurs individus de cette espèce nous a démontré qu'elle varie assez et que celle que notre ami M. White a décrite comme nouvelle ne diffère pas essentiellement de l'espèce publiée primitivement par Erichson.

Gen. *Mallaspis* Serv. An. Soc. Ent. de France T. 1, p. 188.

239. *T. xanthaspis* Guér. Icon R. An Insectes, Texte p. 214.

Gen. *Trachyderes* Dalm. in Sch. Syn. Ins. T. 1. pars 3, p. 364.

240. *T. succinctus* Lin. Syst. nat. T. 2, p. 627. — Mag. Zool. 1838. pl. 191. f. 2.

241. *T. Reichei* Dup. Mag. de Zool. 1836. pl. 155.

242. *T. rufipes* Fabr. Syst. Eleut. T. 2. p. 275.

243. *T. Juvencus* Dup. Mag. de Zool. 1940. pl. 34.

Gen. *Ancylosternus* Serv. Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 3. p. 49.

244. *A. albicornis* Erichs. Consp. col. Peruan. p. 139.

Gen. *Chlorida* Serv. Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 3. p. 31.

245. *C. festiva* Lin. Syst. nat. Ins. T. 2. p. 623. — Serv. *ibid.* p. 32.

Gen. *Eburia* Serv. Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 3. p. 8.

246. *E. sulphureo-signata* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 140.

247. *E. quadrinotata* Latr. Humb. obs. T. 1. p. 165. pl. 16. f. 9.

Gen. *Chrysoprasia* Serv. Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 3. p. 5.

248. *C. rufiventris* Germ. Ins. sp. nov. T. p. 495. n. 660.

249. *C. hypocrita* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 142.

Gen. *Achryson* Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 2. p. 572.

250. *A. circumflexum* Serv. id. — Oliv. Ent. T. 4. g. 67, p. 127, pl. 23 f. 182.

Gen. *Macropus* Thunb. Serv. id. T. 4. p. 18.

251. *M. trochlearis* Oliv. Serv. id. T. 4. p. 19.

Gen. *Steirastoma* Serv. id. T. 4. p. 24.

252. *S. depressa* Oliv. Fabr. Syst. El. T. 2. p. 276.

Gen. *Polyrhaphis* Serv. id. T. 2. p. 26.

253. *P. papulosa* Schön. Spn. Ins. T. 3. p. 395.

Gen. *Anisocerus* Serv. id. T. 4. p. 79.

254. *A. scopifer* Germ. Ins. sp. nov. p. 476.

255. *A. stellatus* Guér. — D'un brun noirâtre, avec de nombreuses taches rondes, jaunes, formées par un duvet court, sur la tête, le corselet les élytres et le dessous du corps. Antennes fauves avec les deux premiers articles et l'extrémité des suivants, noirs. Un pinceau de poils noirs à l'extrémité du troisième article. Jambes fauves avec la base et l'extrémité noires, tarsi jaunes, fortement ciliés. — L. 17; l. 8 mill.

Gen. *Acanthoderes* Serv. id. T. 4. p. 29.

256. *A. antennatus* Guér. — Corps allongé, subdéprimé, noir. Tête carrée, avec les antennes à peu-près de la longueur du corps, noires, avec le troisième article et les suivants fauves à la base. Ce troisième

article est garni, dans presque toute sa longueur, de longs poils noirs et serrés qui forment un long pinceau cylindrique. Corselet transversal, épineux sur les côtés, avec un fort tubercule aigu de chaque côté, au dessus de l'épine latérale. Elytres couvertes d'un fin duvet couleur marron, avec une forte carène médiane qui s'élève en crête, denticulée à leur base, et ornées d'une grande tache grise commune derrière l'écusson et d'une large bande oblique de la même couleur au milieu. Dessous noir avec les côtés du thorax et de l'abdomen tachés de gris. Pattes noires à cuisses fortement renflées, avec les jambes et les tarsi d'un jaune orangé. — L. 17; l. 6½ mill.

257. *A. Daviesii* Oliv. Ent. T. 4. capr. p. 104 pl. 6 f. 42.

258. *A. leucogaesus* Erich. Consp. Ins. col. Peruan. p. 143.

Gen. *Taeniotes* Serv. id. T. 4 p. 90.

259. *T. scalaris* Fabr. Syst. El. T. 2. p. 273.

Gen. *Oncideres* Serv. id. T. 4. p. 67.

260. *O. amputator*. Fab. Syst. El. T. 2. p. 293.

Gen. *Colobothaea* Serv. id. T. 4. p. 69.

261. *C. Osculatii* Guér. — Noire, entièrement couverte d'un duvet gris cendré assez foncé avec des lignes sur la tête et le corselet et des points sur les élytres d'un blanc jaunâtre. Tête de forme carrée en avant, avec deux fines lignes blanches et deux autres lignes semblables sur le sommet, réunies en avant entre l'insertion des antennes. Corselet plus long que large, un peu rétréci en avant, avec quatre fines lignes longitudinales blanches. Elytres rétrécies en arrière, carénées sur les côtés, échanquées à l'extrémité, avec un forte épine à l'angle extérieur, et couvertes d'un grand nombre de petites taches blanches, rondes, inégales et jettées sans ordre. Dessous noir, tacheté de blanc. Antennes deux fois plus longues que le corps, noires, avec la moitié antérieure du sixième segment blanc. Pattes noires, avec un fin duvet grisâtre. — L. 20; l. 5½ mill.

262. *C. femorosa* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 149.

Gen. *Hemilophus* Serv. id. T. 4, p. 49.

263. *H. brachialis* Guér. — Noire terne. Tête et corselet d'un jaune orangé soyeux. Elytres fortement ponctuées, avec une côte latérale lisse n'atteignant pas l'extrémité qui est échanquée et armée d'une épine à l'angle externe. Pattes antérieures à cuisses fauves et base des articles des antennes pâle, avec leur dessous faiblement cilié dans toute la longueur des antennes. — L. 14; l. 4 mill.

264. *H. tuberculicollis* Guér. — Noir, avec la tête et les côtés du corselet d'un fauve obscur, ainsi que la base des articles des antennes, qui sont faiblement ciliées en dessous dans toute leur longueur. Le corselet est plus large que long, et il offre en dessus et au milieu de la longueur, trois tubercules arrondis et lisses, dont le médian est le plus gros, et un peu, en arrière, et sur les côtés un autre tubercule placé plus bas. Les élytres sont ponctuées, avec une côte latérale et l'extrémité échancrée avec l'angle sutural aigu et une épine à l'angle externe. Dessous et pattes noirs, luisants, avec les trochanters et les hanches d'un brun roussâtre. — L. 10; l. 3 mill.
265. *H. frontalis* Guér. — D'un jaune fauve, avec le milieu du corselet en arrière et une large bande longitudinale, au milieu de chaque élytre, noirs. Front très-ponctué, bombé au milieu, avec la partie avancée échancrée au milieu et comme hidentée. Yeux et côtés de la tête, derrière les antennes, noirs. Antennes noires à la base, jaunes à partir du quatrième article, avec l'extrémité de chaque articulation noire; des cils peu nombreux dans toute leur longueur. Corselet fauve, avec une tache noire de chaque côté et au milieu, en arrière. Les bords latéraux offrent, dans la partie fauve, une bande d'un jaune soyeux qui ne s'aperçoit bien que lorsqu'on fait jouer la lumière. Elytres jaunes, assez finement ponctuées, arrondies à l'extrémité, sans carène sur les côtés, avec une large bande longitudinale d'un noir de velours, partant de la base et arrivant à l'extrémité où elle se courbe pour venir toucher à la suture. Dessous jaune avec les côtés de la poitrine et deux longues bandes confondues en arrière sur l'abdomen, noirs. Pattes jaunes avec les jambes et les tarses noirs. — L. 11; l. 3 mill.

Fam. **Chrysomelinae** Latr.

Gen. *Lema* Fabr. Lacord. Phytoph. T. 1. p. 303.

266. *L. saphirea* Lac. Monogr. des Phytoph. T. 1. p. 504.
 267. *L. tricolor* Oliv. Lacord. id. p. 514.
 268. *L. ioptera* Erichs. Cons. Ins. col. Peruan. p. 150.

Gen. *Mastostethus* Lacord. Mon. Phyt. T. 1. p. 614.

269. *M. atrofasciatus* Blanch. Voy. de d'Orb. Lac. Mon. Phyt. T. 1. p. 623.
 270. *M. trifasciatus* Guér. Ic. R. A. Texte Ins. p. 256.

Gen. *Cephaloleia* Chev. Dict. univ. d'hist. T. 3. p. 272.

271. *C. Pertyi* Guér. Icon. R. A. Texte Ins. p. 282.
 272. *C. corallina* Erichs. Cons. Ins. col. Peruan. p. 151.

Nous avons un individu de cette espèce qui nous vient de Cayenne.

Gen. *Alurnus* Fabr. Syst. El. T. 2. p. 25.

273. *A. D'Orbigny* Guér. Revue Zool. 1840. p. 231.

274. *A. nigripes* Guér. id. p. 231.

Gen. *Imatidium* Fabr. Syst. El. T. 1. p. 245.

275. *I. fasciatum* Fabr. S. E. T. 1, p. 246.

Nous avons des individus de cette ancienne espèce provenant des bords de l'Amazone et de Cayenne.

276. *I. rubricatum* Guér. — Ic. Règne anim. Ins. Texte p. 285.

Gen. *Desmonota* Bohem. Mon. Cass. T. 1. p. 137.

277. *D. multicava* Latr. Humb. Obs. zool. T. 2, p. 352. pl. 22. f. 8. 9.

278. *D. salebrosu* Bohem. Mon. Cass. T. 1, p. 142.

Gen. *Canistra* Erichs. Boh. Mon. Cass. T. 1. p. 166.

279. *C. Osculatii* Guér. — Arrondie, élytres peu bossues; noire, à élytres couvertes de fossettes; une bande de chaque côté du corselet, et des taches réticulées et transversales près des bords latéraux des élytres; dessus et dessous d'un rouge vif. — L. 19: l. 16. mill.

Cette belle espèce appartient à la seconde division du genre, établie par M. Boheman.

Gen. *Dolichotoma* Hope. Bohem. Mon. Cass. T. 1. p. 176.

280. *D. Bohemani* Guér. — Arrondie, avec les épaules un peu saillantes comme dans la *D. variegata* (Boh. p. 185); d'un noir métallique à reflets violets. Corselet presque lisse, avec une fossette transversale de chaque côté et un pli en arrière, devant l'écusson. Elytres élevées au milieu, réticulées, avec les côtés presque lisses, et le dessous d'un bleu foncé. Antennes, pattes et dessous du corps, noirs, à reflets bleuâtres. L. 17: l. 17 mill.

281. *D. Peruviana* Bohem. Mon. Cass. T. 1, p. 196.

282. *D. strigata* Bohem. id, p. 203.

Gen. *Mesomphalia* Hope. Bohem. Mon. Cass. T. 1, p. 218.

283. *M. quadraticollis* Bohem. Mon. Cass. T. 1, p. 219.

284. *M. gibbosa* Fabr. Boh. id. p. 223.

285. *M. plagiata* Boh. id. p. 312.

286. *M. elocata* Boh. id. p. 315.

287. *M. reticularis* Fabr. Boh. p. 317.

288. *M. bipustulata* Fab. Boh. id. p. 303.

289. *M. lateralis* Fab. Boh. p. 301.

290. *M. quatuordecimsignata*. Boh. p. 338.

291. *M. fastuosa* Bohem. T. 1, p. 383. — *Illustris* Erichs. Consp. Ins. Col. Peruan. p. 153.

M. Boheman a été obligé de changer le nom donné par Erichson à cette espèce, parce que ce nom: *Illustris* a été employé et publié par M. Chevrolat en 1835 dans le troisième fascicule de ses *Coléoptères du Mexique*.

Gen. *Chelymorpha* Bohem. Mon. Cass. T. 2, p. 1.

- 292. *C. brunnea* Fabr. Boh. mon. Cass. T. 2, p. 6.
- 293. *C. gibba* Fab. Boh. p. 9.
- 294. *C. cribraria* Fab. Boh. p. 35.
- 295. *C. Klugii* Boh. p. 75.
- 296. *C. areata* Erichs. Boh. p. 94.

Gen. *Selenis* Hope Boh. id. T. 2, p. 94.

- 297. *S. venosus* Erichs. Boh. id. T. 2, p. 98.

Gen. *Omoplata* Hope. Boh. id. T. 2, p. 101.

- 298. *O. flava* Lin. Boh. id. T. 2, p. 110.
- 299. *O. trichroa* Boh. id. p. 117.

Gen. *Batonota* Hope. Boh. id. T. 2, p. 153.

- 300. *B. truncata* Fab. Boh. id. T. 2, p. 173.

Gen. *Aspidomorpha* Hope. Boh. id. T. 2, p. 242.

- 301. *A. limbipennis* Boh. id. T. 2, p. 285.

Gen. *Cassida* Lin. Boh. id. T. 2, p. 329.

- 302. *C. heteropunctata* Boh. id. T. 2, p. 459.
- 303. *C. glaucovittata* Erichs. Consp. Ins. Col. Peruan. p. 154.
- 304. *C. judaica* Fabr. Syst. El. T. 1, p. 392. Erichs. id. p. 155.
- 305. *C. aurofasciata* Erichs. id. p. 155.

Gen. *Doryphora* Illig. Mag. des Ent. T. 3, p. 124 (1802).

- 306. *D. reticulata* Fabr. Syst. El. T. 2, p. 3 (*Erotylus*).
- 307. *D. histrio* Oliv. (*albicincta* Germ.) Ins. nov. p. 581.
- 308. *D. Fabricii* Guér. Icon. R. A. Ins. Texte p. 228.
- 309. *D. testudo* Demay. Rev. Zool. 1839, p. 23. Syn *margaritae* Blanch Voy. de d'Orbigny, Ins. p. 213, pl. 25. f. 2.
- 310. *D. subdepressa* Guér. Icon. R. A. Ins. Texte p. 299.
- 311. *D. catenulata* Oliv. Entom.
- 312. *D. Osculatii* Guér. — Noire. Corselet couvert de gros points enfoncés groupés et laissant des espaces lisses. Elytres fortement ponctuées, à points presque rangés en lignes longitudinales, avec trois larges bandes transversales et fortement dentelées, jaunes. — L. 15. : l. 11½ mill.

- Cette helle espèce est très-voisine de ma *D. Olivierii* (Icon. R. A. p. 298) et un examen superficiel la ferait confondre avec elle. Cependant dans ma *D. Olivierii* la tête et le corselet sont d'un noir verdâtre le labre et le bord antérieur du chaperon sont jaunes, avec une grande tache noire transversale sur le labre, et la tête et le corselet sont presque lisses, n'offrant que de très-petits points enfoncés et également dispersés
313. *D. fulvicornis* Guér. — Ovalaire, d'un noir verdâtre, avec le labre et les palpes jaunes, les antennes fauves, jaunes à l'extrémité. Tête et corselet finement ponctués. Elytres ayant de forts points enfoncés, assez bien rangés en lignes. Elles ont chacune une large bande jaune à la base, une autre oblique, au milieu, et l'extrémité jaunes et dentelées ainsi que le bord externe. La bande antérieure offre trois petites taches brunes dans sa partie la plus large; celle du milieu, rétrécie en pointe vers la suture, présente quatre taches rondes au milieu, et la grande tache de l'extrémité est ornée de quatre lignes de la même couleur dont deux sont parallèles au bord externe, une à la suture et la quatrième plus courte dans l'espace laissé en haut par les autres. Le dessous et les pattes sont d'un noir verdâtre luisant, avec l'extrémité des jambes et le dessous de tarsi garnis de duvet fauve. — L. 11. l. 8. mill.
314. *D. flavocincta* Guér. — Arrondie, d'un bronzé obscur peu luisant, avec une large ligne jaune, lisse, près du bord externe de chaque élytre. Le labre est jaune taché de noir au milieu. La tête et le corselet sont finement et vaguement ponctués. Les élytres offrent de grosses fossettes distantes et rangées en lignes, entre lesquelles il y a plusieurs petits points qui semblent destinés à compléter des stries ponctuées. La bordure jaune forme une espèce de bourrelet, qui part de l'angle huméral, marche parallèlement au bord externe et va se terminer très près de la suture. — L. 17. l. 13. mill.
315. *D. Bourcierii* Guér. — Arrondie, d'un bronzé verdâtre obscur et peu luisant en dessus, avec la bouche, les bords du corselet et des élytres, les antennes, les pattes et le dessous d'un cuivré rouge très-brillant. Tête et corselet couverts de petits points enfoncés. Ecusson lisse, bordé de rouge cuivreux. Elytres ayant de gros points en petites fossettes, très-rapprochés, placés sans ordre. Dessous et pattes finement ponctués. — L. 17. l. 12½ mill.
316. *D. bivittata* Guér. — Ovalaire, d'un noir de poix peu luisant. Labre jaune taché de noir au milieu. Tête et corselet finement ponctués, celui-ci rebordé sur les côtés, avec une série de gros points ou fossettes près de ce rebord. Ecusson lisse. Elytres ayant chacune neuf sillons à fond ponctué et un commencement de strie près de la suture et de l'écusson; les troisième et neuvième intervalles lisses et jaunes, formant deux bandes partant du bord antérieur, où elles ne se touchent pas et allant aboutir près de l'extrémité où elles sont réunies. Dessous et pattes finement ponctués, d'un bronzé plus luisant et plus métallique. Antennes de la couleur du dessus. — L. 14. l. 9½ mill.

317. *D. Humboldtii* Guér. Arrondie, noire, peu luisante. Labre finement bordé de jaune. Tête et corselet assez fortement ponctués. Ecusson lisse, brun. Elytres couvertes de points enfoncés assez bien rangés en séries géminées, avec une tache carrée jaune au milieu de la base, réunie extérieurement avec une large bande de la même couleur qui longe le bord externe sans le toucher et va se terminer près de l'angle sutural postérieur. Antennes, pattes et dessous du corps d'un noir bronzé assez luisant. — L. 11, l. 8. mill.

Cette espèce se rapproche assez de ma *Dor. limbata* (Icon. R. A. Ins. Texte p. 299), mais elle en diffère par la couleur du fond et surtout par les stries ponctuées qui sont simples et plus distantes.

318. *D. glaucina* Guér. Icon. R. A. Ins. Texte p. 300 (1843—44) *ibid.* Erichs. Consp. ins. Col. Peruan. p. 155 (1847).

319. *D. Dejeanii* Germ. Col. Spec. nov. p. 580.

320. *D. olivacea* Guér. Icon. R. A. id. p. 300.

321. *D. axillaris* Germ. Col. Spec. nov. α p. 579.

322. *D. congregata* Guér. — Ovale, noire, une petite tache jaune sur le vertex, avec le bord du labre de la même couleur. Corselet très-finement ponctué, avec deux taches en arrière très-grandes et deux gros points en avant, un de chaque côté, noirs. Quelquefois ces points et taches se réunissent et ne laissent que les bords antérieur et latéraux et une petite tache au milieu et en arrière jaunes. Ecusson noir. Elytres jaunes avec quatre bandes maculaires noires, quelquefois à taches réunies, avec le bord externe toujours jaune et la suture noire. Elles offrent des stries géminées de points enfoncés assez distincts. Les antennes, les pattes et le dessous sont noirs avec l'extrémité de la pointe sternale jaune. — L. 10; l. 7 mill.

Nous possédons aussi quelques individus de cette espèce pris dans les environs de la Plata.

323. *D. suturella* Guér. — Arrondie, d'un noir tirant au bleu avec le dessous à reflets verdâtres, fortement ponctuée, avec les élytres jaunes, à suture et bords d'un noir bleu. Palpes jaunes à extrémité noire. Antennes noires avec les cinq premiers articles jaunes. — L. 12. l. 8. mill.

Gen. *Dorysterna* Guér. — Mén.

Ce nouveau genre est très facile à distinguer des *Doryphores* par un caractère apparent. Ses Antennes, au lieu d'être presque de la même épaisseur dans toute leur longueur, s'élargissent brusquement à partir du septième article et forment une large massue aplatie comme celles du genre *Eumolpides* nommé par M. Chevrolat *Platycerynus* et caractérisé par Hope (Coléopt. manual. 3 partie p. 162) sous le nom de *Corynodes*.

324. *D. Bourcierii* Guér. — Ovale, d'un vert foncé avec les élytres violettes, ornées chacune de trois grandes taches jaunes. Tête assez fine-

ment ponctuée, avec une faible et large impression au milieu du front. Corselet presque deux fois plus large que long, avec de gros points enfoncés assez distants et formant des groupes irréguliers. Ecusson lisse et vert. Elytres d'un brun violet foncé, avec neuf fortes stries à fond garni de gros points et quelques points sur les intervalles. Elles offrent chacune trois taches jaunes: l'une à la base, sur l'épaule et transversale oblique; la seconde un peu au delà du milieu, formant une bande oblique commençant près du bord externe et se terminant, en descendant, assez près de la suture, et la troisième, oblongue, près de l'angle inférieur. Les antennes sont un peu plus longues que la tête et le corselet réunis, d'un beau vert foncé et luisant jusqu'au septième article, qui commence la massue, et d'un beau bleu ensuite. Les pattes sont finement ponctuées, vertes, avec les tarses d'un noir bleuâtre. — L. 12. : l. 8. mill

Ce magnifique insecte a été découvert sur les bords du Napo. M. Bourcier en a aussi rapporté un individu.

Gen. *Polyspila* Hope. Coléopt. Man. Part. 3, p. 165.

325. *P. vulgaris* Guér. — Syn. *Chrysomela polyspila* Germ. Mag. des Ent. T. 4, p. 176.

Il est fâcheux que M. Hope ait assigné à ce genre, caractérisé pour la première fois par lui en 1840, le nom d'une de ses espèces, mais ce n'est pas une raison pour le rejeter. Nous avons cependant été obligé de changer le nom de l'espèce et comme elle est commune dans toute l'Amérique méridionale; que nous en possédons des individus du Brésil, de la Plata, de la Colombie, de la Bolivie, des Bords de l'Amazone etc. nous avons pensé que le nom de vulgaire lui convenait.

326. *P. flavitarsis* Guér. — D'un beau vert luisant avec les élytres jaunes bordées de noir sur les côtés et à la suture, avec trois raies longitudinales d'un noir bleu, les deux premières, commençant près de la base et se réunissant avant l'extrémité, la troisième partant du milieu où elle touche à la seconde par un épaississement et se terminant aussi avant l'extrémité. La première offre en outre, vers le milieu, un épaississement qui touche presque la suture. Antennes noires, avec les cinq premiers articles jaunes, tachés de noir. Extrémité des jambes et tarses d'un beau jaune orangé. — L. 10. l. 6½ mill.
327. *P. scalaris* Guér. — D'un vert bronzé obscur. Elytres jaunes, avec une large ligne suturale émettant de chaque côté quatre dents et bordée d'un fin liseré jaune plus pâle, une grosse tache à l'épaule, une autre moins forte sur le bord externe, au milieu de sa longueur, et douze petits points ronds, également d'un vert bronzé et entourés aussi d'un petit liseré jaune plus pâle. Antennes noires avec les quatre premiers articles fauves tachés de noir. Pattes de la couleur du corps. — L. 10½ : l. 6½ mill.

328. *P. matronalis* — *Calligrapha matronalis* Erichs. Consp. Ins. Col. Peruan. p. 138.

Gen. *Plagioder*a Erichs. Consp Ins. Col. Peruan. p. 158.

329. *P. proecincta* Erichs. id. p. 158.
330. *P. encausta* Guér. — Ovale, assez aplatie, rouge. Tête ayant une tache noire en arrière. Corselet transversal, avec deux grosses taches arquées au milieu et un point près des bords, noirs. Elytres vertes, très-brillantes, ponctuées, avec le bord externe et une large bande près de la suture et réunie à l'extrémité avec la bordure, rouges. Antennes noires avec les cinq premiers articles rouges. Tarses noirâtres. L. 9. l. 5½ mill.
331. *P. Germarii* Guér. — Arrondie, moins aplatie que la précédente, rouge. Une petite tache derrière la tête et sept points sur le corselet, noirs. Elytres d'un bleu peu luisant, à ponctuation à peine visible à une forte loupe, avec le bord externe et une large bande rouges, réunis en arrière. Antennes, dessous et pattes comme dans l'espèce précédente. — L. 6. l. 4½ mill.
332. *P. toeniata* Guér. — Semblable à la précédente pour la forme et la couleur, mais plus luisante. Elytres assez fortement ponctuées, d'un bleu vert très-brillant, avec le bord externe, la suture et une large bande longitudinale au milieu, n'atteignant pas l'extrémité, d'un beau rouge. — L. 6½. l. 5 mill.

Gen. *Phaedon* Latr. Règne Anim. 2. Ed. T. 5, p. 151.

333. *P. semimarginatum* Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 376. pl. 23. f. 11.

Gen. *Colaspis* Fabr. Syst. El. T. 1, p. 411.

334. *C. crenata* Fabr. id. p. 411.
335. *C. flavicornis* Fab. id. p. 412.
336. *C. bicolor*. Oliv. Ins. Fol. 6. p. 879. genre 96, pl. 1, f. 2,
337. *C. coelestina* Erichs. Consp. Ins. Col. Peruan. p. 160.
338. *C. gemmula* Erichs. id. p. 161.
339. *C. albicincta* Erichs. id. p. 161.

Gen. *Chalcophana* Chev. Dict. de d'Orb. T. 3, p. 372.

340. *C. illustris* Erichs. Consp. T. p. 161.
341. *C. atricornis* Erichs. id. p. 162.
342. *C. fulva* Fabr. Syst. El. T. 1, p. 414.

Gen. *Typophorus* Erichs. id. p. 163.

343. *T. nigrinus* Fabr. Syst. El. T. 1, p. 421. — Oliv. Ins. T. 6, p. 912. genre 96. pl. 2. f. 24.

608

344. *T. 5-maculatus* Erichs. id. p. 163.

345. *T. spinipes* Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 71. pl. 4. f. 12.

Gen. *Eumolpus* Fabr. Syst. El. T. 1, p. 418.

346. *E. fulgidus* Oliv. Ent. T. 6. p. 898, pl. (*Eumolpus*) 1. f. 3.

347. *E. cupreus* Oliv. id. pl. 1. f. 2.

348. *E. prasinus* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 164.

Gen. *Eudocephalus* Chev. Dict. d'hist. d'Orb. T. 5. p. 210.

349. *E. geniculatus* Guér. — Entièrement d'un jaune pâle avec les yeux, l'extrémité des antennes, les genoux, les jambes et les tarsi, noirs. — L. 17. l. 9 mill.

350. *E. flavipennis* Guér. — Totalement noir, avec les élytres d'un jaune uniforme. Tête et corselet finement ponctués, avec un fort sillon longitudinal au milieu du front; deux impressions transversales de chaque côté du corselet. Une petite tache jaune à l'extrémité du dernier segment abdominal. — L. 12. l. 8 mill.

Gen. *Coelomera* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 165.

351. *C. Çayennensis* Fabr. Syst. El. T. 1. p. 480.

352. *C. Peruana* Erichs. id. p. 165.

Gen. *Galerica* Geoff. his. des Ins. de Paris, T. 1, p. 251.

353. *G. hebes* Erichs. id. p. 165.

354. *G. illigata* Erichs. id. p. 165.

Gen. *Diabrotica* Chev. Dict. d'hist. d'Orb. T. 4. p. 717.

355. *D. lucifera* Erichs. Consp. α. p. 166.

356. *D. 7-liturosa* Erichs. id. p. 167.

357. *D. tumidicornis* Erichs. id. p. 167.

358. *D. rubripennis* Erichs. id. p. 168.

359. *D. flavolimbata* Erichs. id. p. 169.

Gen. *Cerotoma* Chev. Dict. d'Orb. T. 3. p. 342.

360. *C. facialis* Erichs. id. p. 170.

361. *C. ruficornis* Erichs. id. p. 170.

Gen. *Oedionychis* Latr. Regne Anim. T. 5. p.

362. *Oe. opulenta* Erichs. id. p. 171.

363. *Oe. opima* Germ. Col. spec. nov. p. 608.

Gen. *Homophoita* Erichs. id. pag. 172.

364. *H. albicollis* Fabr. Oliv. Ent. T. 6. p. 682. pl. 2. f. 22.

365. *H. quadrinotata* Fabr. Oliv. Ent. T. 6. p. 682. pl. 2. f. 23.

Gen. *Aspicela* Chev. Dict. d'hist. nat. de d'Orb. T. 2. p. 233.

366. *A. cretacea* Latr. voy. de Humb. Ins. 2. Part. p. 51. pl. 3. f. 6
 367. *A. Osculatii* Guér. Ovalaire, noire, avec le dessus du corselet, à l'exception d'une bande longitudinale au milieu, et les élytres, d'un jaune obscur. — L. 12½ l. 7 mill.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente, et l'on pourrait la considérer comme n'en étant qu'une variété ayant une ligne noire au milieu du corselet, si celui-ci n'offrait pas une forme un peu différente, plus large, plus arrondie sur les côtés, et si l'ensemble de son corps n'était pas plus élargi.

368. *A. unipunctata* Latr. Voy. de Humb. Ins. 2. Part. p. 63. pl. 4. f. 4.
 369. *A. rugosa* Guér. — Ovalaire, d'un noir vif, avec les côtés du corselet et le bord externe des élytres ornés d'une bordure jaune qui descend jusqu'à l'extrémité pour remonter à la suture jusqu'au milieu de leur longueur. Tête petite, avec une forte impression au milieu du front. Corselet très-finement ponctué, à angles antérieurs aigus, noir, avec les côtés largement bordés de jaune. Elytres couvertes de grosses fossettes séparées par des élévations formant un réseau réticulé. — L. 10. l. 6 mill.
 370. *A. scutata* Latr. Voy. de Humb. Ins. 2. Part. p. 52. pl. 3. f. 7.
 371. *A. albo-marginata* Latr. id p. 53. pl. 3. f. 8.
 372. *A. Bourcierii* Guér. — Ovalaire, noire, corselet aplati, lisse et luisant, d'un blanc jaunâtre, avec une grande tache transversale noire au milieu, pointue aux deux côtés. Elytres finement rugueuses ou chagrinées, d'un jaune pâle, avec la base et une large bande près des bords, n'atteignant pas l'extrémité, d'un noir vif; on voit une teinte verdâtre près de la suture. Le dessous et les pattes sont d'un noir luisant avec les deux derniers segments de l'abdomen jaunes. — L. 10 l. 7½ mill.
 373. *A. nigroviridis* Guér. — Ovalaire, noire. Corselet vert, très lisse. Elytres assez fortement ponctuées, noires, avec les bords et l'extrémité verts. Dessous noir luisant avec le dernier segment abdominal jaune. — L. 8 à 10. l. 5 à 6 mill.

Nous avons sous les yeux une variété chez laquelle les élytres sont entièrement vertes. Elle a été trouvée dans les Andes, sur les hautes montagnes du Quindiu, dans la nouvelle Grenade.

Gen. *Graptodera* Chev. Dict. d'hist. de d'Orb. T. 6. p. 307.

374. *G. plicata* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 173.

Gen. *Ocnoscelis* Erichs. id p. 174.

375. *O. purpurata* Erichs. id. p. 174.

Fam. **Erotylenae** Latr.

Gen. *Pselophacus* Perch. Gener. des Ins. fasc. 4. N. 6.

376. *P. transversalis* Lacord. Monogr. des Erotyl. p. 77.

377. *P. puncticollis* Guér. Revue zool. 1841. p. 158. Lacord. id. p. 87.

Gen. *Ischyryus* Lacord. Monogr. α. p. 89.

378. *I. venustus* Lacord. id. p. 109.

Gen. *Mycotretus* Lacord. Mon. p. 132.

379. *M. tigrinus* Oliv. Lac. Mon. p. 145.

380. *M. marginicollis* Lac. Mon. p. 159.

381. *M. melanophthalmus* Dupouch. Lac. Mon. p. 179.

Gen. *Thonius* Lacord. Mon. p. 252.

382. *T. unicolor* Guér. Icon Regn. Anim. Texte. Ins. p. 309.

Gen. *Coccimorphus* Hope, Rev. Zool. 1841, p. 114.

383. *C. coccinelloides* Dupouch. Monogr. — Lacord. Mon. p. 272.

384. *C. unicolor* Oliv. — Lacord. Mon. p. 272.

Gen. *Oegythus* Fabr. Syst. El. T. 2. p. 9.

385. *Oe. cyanipennis* Guér. Rev. Zool. 1841. p. 120. — Lac. Mon. p. 279.

386. *Oe. consularis* Guér. — Très-large, arrondi, noir; élytres d'un bleu d'acier violet, avec une grande tache rouge de chaque côté, commençant derrière l'angle huméral, n'atteignant pas l'extrémité, occupant la moitié de la longueur de l'élytre, à partir de son bord externe, dilatée en arrière et formant un grand crochet qui se rapproche de la suture, et garnie de gros points noirs. Tête lisse, terne, avec le chaperon ponctué, séparé du front par un petit sillon transverse. Labre jaunâtre. Corselet lisse, terne, avec les bords un peu plissés et deux gros points enfoncés au milieu. Ecusson noir, triangulaire, arrondi, lisse, sans enfoncement en arrière, ce qui le distingue de l'*Oeg. cyanipennis*. Elytres lisses, avec quelques taches luisantes comme celles de l'autre espèce, mais moins nombreuses et moins visibles. Antennes, pattes et dessous noirs, avec le bord postérieur et les côtés des segments de l'abdomen roussâtres. — L. 16. l. 14.

387. *Oe. Bourcierii* Guér. — Très-large, arrondi, noir, corselet inégal en dessus. Elytres lisses, couvertes de gros points enfoncés ou fossettes irrégulièrement dispersées et laissant par place des intervalles plus grands. — L. 17. l. 14 mill.

Cette belle espèce, découverte sur les bords du Napo par M. Bourcier, à qui l'histoire naturelle et la sériciculture doivent tant, diffère de toutes celles du genre par les fossettes de ses élytres et les

impressions de son corselet. En effet, on ne connaissait jusqu'ici que l'*Oeg. cribrosus*, dont les élytres soient couvertes de points enfoncés.

388. *Oe. Surinamensis* Lin. Fabr. Lacord. Mon. p. 285.

Gen. *Brachysphaenus* Lacord. Monogr. p. 296.

389. *B. (Megaprotus) duplicatus* Lacord. Mon. p. 299.
 390. *B. (id.) moniliferus* Guér. Rev. Zool. 1841. p. 155. Lac. Mon. p. 302.
 391. *B. (Acronotus) annularis* Guér. Rev. Zool. 1841. p. 119. Lac. Mon. pag. 333.
 392. *B. (Morphoides) ruficeps* Guér. Rev. Zool. 1841. p. 118. — Lac. Mon. p. 359.
 393. *B. (Barytopus) alternans* Oliv. Fab. Lac. Mon. p. 379.
 394. *B. (id.) nigropictus* Lac. Mon. p. 387.

Gen. *Erotylus* Fabr. Genera Ins. p. 36.

395. *E. vinculatus* Lacord. Mon. p. 427.
 396. *E. taeniatus* Latr. Voy. de Humb. Ins. 2. Part. p. 9. pl. 31. f. 1. — Lac. Mon. p. 428.
 397. *E. Lacordairei* Lacord. Monogr. p. 446.
 398. *E. maculiventris* Lacord. Monogr. p. 444.
 399. *E. Cornaliae* Guér. — Oblong, noir, assez luisant. Tête lisse, fortement excavée en avant, entre l'insertion des antennes, ce qui produit, quand on l'observe en dessus, deux petites saillies en avant des yeux. Corselet presque deux fois plus large que long, fortement rétréci en avant, à côtés peu arrondis, lisse, avec un faible sillon longitudinal au milieu, sur lequel il y a une fossette médiane, et des fossettes et plis latéraux peu marqués. Elytres jaunes, lisses, avec quelques faibles traces de gros points enfoncés, sur le milieu et vers la base. Elles ont chacune une bande noire et fortement dentelée à la base; deux autres larges bandes également dentelées, l'une au tiers antérieur, l'autre au delà du milieu, entre lesquelles on remarque deux petites taches vers le côté; quatre taches carrées en arrière et l'extrémité noires. Les antennes, les pattes et le dessous sont noirs et luisants. — L. 21. l. 12 mill.

Cette belle espèce, dont nous n'avons vu qu'un seul individu mutilé ira se placer près de l'*Erotylus Lacordairei* de M. Lacordaire. Nous l'avons dédiée à notre savant ami M. E. Cornalia, professeur de Zoologie et Directeur-Adjoint du musée Civique d'histoire naturelle de Milan.

400. *E. Ghilianii* Guér. — Presque arrondi, d'un noir luisant. Elytres très convexes, portant de gros points enfoncés disposés sans ordre sur les côtés, mais assez bien rangés en lignes longitudinales au milieu et vers la base et ornées d'un grand nombre de grosses taches d'un rouge de brique, dont la plupart sont confluentes et forment même, dans certains

endroits, des espèces de cercles, et qui sont presque rangées en des espèces de bandes transversales très-irrégulières. Bord des élytres et leur repli latéral en dessous, d'un rouge vif sans taches. — L. 19. l. 11 mill.

Cette belle espèce a beaucoup de rapports avec les *Erotylus giganteus*, *incertus* et *papulosus*, mais elle s'en distingue facilement par la bordure rouge de ses élytres et surtout de leur repli latéral. Nous l'avons dédiée à M. Victor Ghiliani, aide naturaliste au museum royal d'histoire naturelle de Turin, qui a rendu tant de services à l'Entomologie par ses voyages et qui vient de publier il y a peu de temps, un excellent ouvrage ayant pour titre: „Materiali per servire alla compilazione della fauna entomologica Italiana, ossia elenco delle specie di Lepidotteri riconosciute esistenti negli Stati Sardi.

- Gen. *Omoiotelus* Hope, Rev. Zool. 1841. p. 112. — Lac. Mon. p. 506.
401. *O. testaceus* Fabr. Syst. Ent. app. p. 822. — Guér. Icon. R. A. Texte Ins. p. 312. Dans sa Monographie des Erotyliens, p. 508, M. Lacordaire a confondu avec cette ancienne espèce mon *O. d'Orbigny* publié dans la Revue zoologique 1841. p. 119. J'ai démontré dans mon texte de l'Iconographie du Règne animal qu'il l'avait fait à tort.

Fam. **Endomychides** Leach.

Gen. *Amphyx* Casteln. hist. nat. des Ins. T. 2. p.

402. *A. tarsatus* Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 181.

Fam. **Coccinellidae** Latr.

Gen. *Eriopsis* Muls. spec. des sécurip. p. 5.

403. *E. connexa* Germ. Muls. id. p. 7.

Gen. *Daulis* Muls. id. p. 296.

404. *D. sanguinea* Lin. Muls. id. p. 328.

Gen. *Epilachna* Chev. Dict. de Orb. T. 5. pag. 358. — Muls. spec. pag. 700.

405. *E. Bomplandi* Muls. Spec. des secur. p. 721.

406. *E. proteus* Guér. Icon. R. A. Texte Ins. p. 319. — Muls. spec. p. 713.

407. *E. cacica* Guér. Icon. R. A. id. p. 319. — Muls. spec. p. 842.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Quérin-Ménéville M.F.E.

Artikel/Article: [Catalogue des Insectes Coleopteres sur les bords du Napo et de l'Amazone. 573-612](#)