© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Hyla arborea L. — Kleine Larven in einem Tümpel auf Korfu, erwachsen bei Pikermi beobachtet.

Rana ridibunda Pall. — Larven von Korfu, 11. IV.; Tiryns-Mykenä, 17. IV.; Pikermi, 19. IV.; auch bei Phaleron beobachtet.

Von Pikermi liegen auch einige Kaulquappen vor, die von Prof. Abel mitgebracht wurden (28. V. 1911).

Rana agilis Thomas (= *dalmatina* Fitz.). — Korfu, 11. IV., ein Weibchen.

Hieracium subspeciosum N. P. subspec. nov. *Austianum* Murr et Zahn.

Von

K. Aust (Wien).

(Eingelaufen am 18. April 1913.)

Anläßlich einer Ende Juli 1911 von mir in das pflanzenreiche Gebiet des von der krummen Steyerling durchflossenen Bodinggrabens bei Windischgarsten unternommenen Exkursion fand ich am Wege von Haslers Gatter gegen Mayerreith im dolomitischen Kalkgrus ein *Hieracium,* welches seiner Gestalt nach auf den ersten Blick einem *Hieracium vulgatum* Fr. ähnelte, der Gestalt der Blätter und der Behaarung nach an ein *H. oxyodon* Fr. erinnerte. Ich legte dieses *Hieracium* Herrn Prof. Dr. Murr vor, welcher es für eine Zwischenform von *oxyodum-vulgatum* hielt, es aber vorsichtsweise an den rühmlichst bekannten Hieraciologen Herrn Hermann Zahn übersendete. Letzterer erklärte die Pflanze als eine Zwischenform von *H. oxydon* und *scorzonerifolium* Vill ssp. *pseudopantotrichum* Zahn, respektive *H. bifidum* Kit.

Zahn gibt folgende Diagnose:

***Hieracium subspeciosum* N. P. subsp. nov. *Austianum* Murr et Zahn** (e grege *Patulum* N. P.).

Caulei ad 35 cm altus, gracilis, striatus, phyllopodus. Folia ramularia 2—5 (saepe longe) petiolata, exteriora ovata obtusa florendi tempore plerumque emarcida, reliqua elliptico — vel oblongo — vel late lanceolata plerumque submagna, denticulata vel leviter

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

sinuato- et acute pluridentata, cito acuminata; caulina 2—4 cito descrescentia circum radicalibus simile breviter et late alato-petiolatum, reliqua lanceolata longe acuminata basi angustata sessila, summum lineare, omnia viridia subglaucescentia et saepe sublutescentia rubrigidiuscula, margine saepe (praesertim caulina) subundulata. Inflorescentia alte furcata parum supra fastigiata (1—) 2—5 (—10) cephala (sed rami inferiores et capitula partim aborta). Acladium 5—8 cm longum, rami 1—3 (—5) valde remoti gracile, oblique erecti vel subsquarrosi. Ordines axium 3. Involucrum 11—12 mm denique late ventricoso-globosum depressum. Squamae latiusculae lanceolatae acuminatae acutae v. nonnullae apice acutiusculae obscurae pilei floccisque canescentes, interiores viridi-submarginatae. Bracteae 2—3 subulatae. Pili diluti in involucro densiusculi 1·5 mm longi, in caulomatibus ± densiusculi 2—3, basin versus ad 5 mm longi mollissimi, in foliis supra modice numerosi vel subdensiusculi, margine subtusque numerosiores, in nervo dorsali petiolisque densiusculi sublongi mollissimi intertexti. Glandulae in involucro pedunculisque superne sparsissimae minutae. Flocci in involucro subnumerosi basi densiusculi, pedunculi canotomentosi, caulis superne canescens, deorsum cito minus floccosus basin versus efflococosus. Folia effloccosa, caulina superiora tantum in nervo dorsali parcefloccosa. Ligulae (et styli) luteae apice non ciliatae. Achenia brunnea.

Die beschriebene Form steht der Subspezies *patulum* N. P., II, 151, sehr nahe, unterscheidet sich davon aber durch breitere, oberseits stärker behaarte Blätter, die Drüsen an den Hüllen und Kopfstielen und den gelben Griffel. Sie ist als Zwischenform zwischen *H. scorzonerifolium* Vill. ssp. *pseudopantotrichum* Zahn (*pantotrichum* N. P., II, 133, nec p. 27) und *H. oxydon* Fr., respektive *H. bifidum* Kit. anzusehen.

H. Austianum wächst in Gesellschaft von *H. oxyodon* Fr., *H. subspeciosum* N. P. ssp. *melanophaeum* N. P., *H. scorzonerifolium* Vill. ssp. *pseudopantotrichum* Zahn, *H. bifidum* Kit. und *H. glabratum* Hoppe, 1196 m m. adr.

Die Pflanze ist sehr selten, indem ich trotz emsigen Suchens an der eingangs bezogenen Stelle im Jahre 1911 nur zwei Exemplare und im Jahre 1912 ebendaselbst nur vier Stück auffand.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 63

Autor(en)/Author(s): Aust Karl

Artikel/Article: Hieracium subspeciosum N.P. subspec. nov. Austianum Murr et Zahn. 314-315