

## Drittes Verzeichnis von Neufunden höherer Pflanzen aus der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebieten

Von H. Scholz und H. Sukopp

In Fortführung der in den Heften 83—97 und 98—100 begonnenen Mitteilungen zur Flora der Mark Brandenburg berücksichtigt auch dieses dritte Verzeichnis wieder Pflanzenfunde aus allen Teilen des Gebietes. Wir danken allen Korrespondenten für die Übermittlung ihrer wertvollen Beobachtungen. Leider zwingt die gespannte finanzielle Lage des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu äußerster räumlicher Beschränkung im Druck. Es konnten daher nur Fundmeldungen bis zum Jahre 1961 Aufnahme finden. In den nächsten Heften soll versucht werden, Anschluß an die floristischen Forschungsergebnisse der jeweils letzten Jahre zu gewinnen. Daneben soll älteren unveröffentlichten Beobachtungen, soweit sie schriftlich fixiert oder in Herbarien belegt sind, stets gebührender Raum zur Publikation eingeräumt werden. Um Zusendungen entsprechender Notizen (auch aus Nachlässen) wird gebeten. In dem vorliegenden Verzeichnis sind es einige Aufzeichnungen von Herrn W. LEMKE-Jena (vormals Ludwigsfelde) aus dem Gebiet südlich Berlin und aus dem Kreise Prenzlau, die der Wissenschaft nicht verloren gehen dürfen und deshalb mitteilenswert erschienen. Ferner ist es unser Ziel, in die Serie der floristischen Mitteilungen auch neue Erkenntnisse der systematischen Botanik, wenn sie sich — etwa durch Herbarrevisionen — auf die Flora Brandenburgs beziehen, für einen kritischen Benutzerkreis zum Abdruck zu bringen, um damit fördernd auf die Entwicklung der Heimatfloristik zu wirken und die Herausgabe einer „Kritischen Flora der Mark Brandenburg“ vorbereiten zu helfen. Grundlagen einer solchen Flora sind die Teil- und Lokalfloren, von denen seit 1960 erschienen sind: M. SCHULZE †, Verzeichnis der bis zum Jahre 1954 in der Umgebung von Müllrose aufgefundenen Farn- und Samenpflanzen und deren Fundorte, Abh. u. Ber. Naturkde.-Mus. Görlitz 36, Heft 2, 1960. — W. FISCHER, Flora der Prignitz, 2. verb. und erw. Auflage, Pritzwalk 1963. — W. FISCHER, Flora des Ruppiner Landes, Potsdam 1964 (Veröffentl. des Bezirksheimatmuseums Potsdam, Heft 5). — E. PATZKE, Die Flora des Meßtischblattes Dahme, VBVB 101, Heft 2, 1964.

Das vorliegende Verzeichnis enthält wieder eine große Zahl von Mitteilungen über Ruderal- und Adventivpflanzen. Erwähnung verdient das in Berlin eingebürgerte nordamerikanische *Epilobium adenocaulon*. Besonders ergiebig war in Berlin wiederum der Trümmerberg am Teufelssee (Grunewald), wo an drei räumlich weit voneinander liegenden Plätzen (im Verzeichnis entsprechend gekennzeichnet) eine reiche ausländische Ephemerophytenflora beobachtet wurde. Da das Studium der Fremdpflanzen schon zu manchen wertvollen Feststellungen führte und die in dieser Zeitschrift niedergelegten Beobachtungsergebnisse immer wieder im in- und ausländischen Schrifttum erwähnt werden, aber für einen Fernerstehenden die Autorschaft oft nicht deutlich kenntlich erscheint, sei auf Folgendes hingewiesen: Der am Schluß eines Fundortes (oder einer Reihe solcher) oder einer Bemerkung in Klammern gesetzte Name bezeichnet den Autor und Verantwortlichen des gesamten vorherlaufenden, einem Artnamen

untergeordneten Textes. In wissenschaftlichen Abhandlungen, die Bezug nehmen auf Mitteilungen im „Verzeichnis von Neufunden . . .“, sollte stets nur dieser für alle sachlichen und geographischen Angaben (und ev. Irrtümer) Verantwortliche zitiert werden. Für das Literaturverzeichnis einer solchen Abhandlung empfiehlt sich als korrekte Schreibweise — es werden zwei aktuelle Beispiele aus der Forschung über Neophyten genannt —: „HUDZIOK in SUKOPP 1957, Verzeichnis von Neufunden . . . VBV 83—97: 38—39“ (über *Linaria spartea* bei Guben — HUDZIOK ist der Autor dieses Textes) oder „SCHOLZ in SCHOLZ u. SUKOPP 1960, Zweites Verzeichnis von Neufunden . . . VBV 98—100: 44“ (über *Solanum nitidibaccatum* in Berlin).

Bei den Fundortsangaben sind folgende Abkürzungen von Ortsnamen neu hinzugekommen:

Mü	Mühlberg, Kr. Liebenwerda
Tr	Trebbin
Ro	Roßlau.

Zu den bisher benutzten Abkürzungen der Namen von Beobachtern (hierzu und zu den Abkürzungen der Ortsnamen vgl. VBV 98—100, 24—25, 1960) sind folgende hinzuzufügen:

HDZ.	HUDZIOK, Grüna bei Jüterbog
JA.	JAGE, Kemberg
L.	LEMKE, Jena
SCHM.	SCHMEJA, Wiesenburg
STRI.	STRICKER, Panitzsch bei Leipzig
ULR.	ULRICH, Brandenburg
VO.	VOGEL, Brandenburg.

Die Angaben von F. BERGER, DAGEFÖRDE, E. FAHRENDORFF, H. FRITSCH, H. KRÜGER, O. LADEMANN und H. SCHMIDT wurden durch Herrn LEMKE (Belege in seinem Herbar) übermittelt.

*Equisetum hiemale* L.: Nr Kunsterspring bei Margaretenruh und im Jg. 103, 1961 (F.).

*E. variegatum* Schleich.: Na ziemlich zahlreich in einem lückigen, basiphilen Moliniatum, etwa 1 km östl. Bhf. Brieselang nahe der Bahnstrecke nach Falkensee 1960 (F.).

*Lycopodium selago* L.: FbH Nordwestufer des Stoitzsees 1958 (F.).

*L. inundatum* L.: Ge Ziesar, Sandgrube an der Autobahn nahe der Straße nach Köpernitz in Mengen 1960 (F.). KöW Ausstiche zw. Gr. Köris und Halbe (STR.). Gu Torfteich (Schmickatz) südwestl. Kerkwitz. Fi Ehem. Steinbruch bei Fischwasser (Kr.).

\**Selaginella apus* (L.) Spring: P Park Sanssouci, zw. den Römischen Bädern und dem Pferdestall im Rasen 1960 (RÜFFLE), 1961 (F.).

*Botrychium lunaria* (L.) Sw.: P Kl. Ravensberg, Kiesgrube am Süd-Hang 1956 (BENKERT).

*B. matricariifolium* (Retz.) A. Br.: B Grunewald Jg. 114 westl. Teufelssee im Winkel zw. Teltower Weg und Schildhornweg 1951 (K. ERNST); Wannsee, nahe S-Bahnhof 1960, 1961 (20—30 Expl.), häufiger als *B. lunaria* (My.); Frohnau, Jägersteig (E. SCHMIDT, My.).

*Osmunda regalis* L.: **Wi** Neuendorf bei Dossow im Jg. 176, 1959. **Na** Brieselang, im Bruchwald Jg. 38, einige Pflanzen 1960. **KöW** Märk.-Buchholz, am Nordufer des Köthen-Sees, im Kiefern-Birken-Bruchwald 1961 (F.). **Tr** südl. Forsthaus Lenzburg, Bruchwaldrand am Weg nach Mertensmühle 1928 (L.), 1953 (FRITSCH).

\**Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.: **B** Spandau, Glühwürmchengrund 1959, jetzt verschwunden (D. MÜLLER); Kaulsdorf, Pferdebucht 1959 (VOBACH).

*Asplenium trichomanes* L. em. Huds.: **Eb** an einer Mauer in Trampe, 1 Expl. (JA.). **Ca** an der Kirche 1961 (F.).

*A. viride* Huds.: **Or** Tiergartenschleuse des Ruppiner Kanals, die ca. 15 Büschel durch Reinigen und Verschmieren der Fugen 1961 ausgerottet (WIŚNIEWSKI).

*A. ruta-muraria* L.: **Te** Stadtmauer (SCHONERT); Mühlentor (JA.); Mauer in Ringenwalde 1960 (F.). **Od** Liepe-Teufelsberg, Mauer; Kloster Chorin. **Eb** Mauern in Trampe und Klobbicke. **St** Mauer in Hirschfelde (JA.). **Ca** an der Kirche 1961. **L** Kirchhofsmauer in Drehna 1960. **Helmstedt** Mauer des Parkes in Harbke 1959 (F.).

*Dryopteris phegopteris* (L.) Christens.: **Feldberg** 1958 im Forst Jg. 60, 62 u. 122. **Bz** im Walde bei Alte Helle bei Wiesenburg; im Walde zw. Schlamau und Schmerwitz bei Wiesenburg; an der Hauptallee von Medewitz nach Golmenglin 1962 (SCHM.).

*D. linnaeana* Christens.: **Je** Stadtmauer von Prettin (STRI.).

*D. oreopteris* (Ehrh.) Maxon: **Bz** Sumpf an der Hauptallee nach Golmenglin bei Medewitz; im Walde bei Alte Helle bei Wiesenburg; im Walde zw. Schlamau und Schmerwitz bei Wiesenburg 1961, 1962 (SCHM.). **Ge** in der Forst Magdeburgerforth südöstl. Forsthaus Sandforth 1961 (F.).

*D. cristata* (L.) A. Gray: **Or** am Teufelssee im Briesetal 1950 (STR.). **L** bei Weißsack im Moor XIII, Jg. 72, 1960 (F.).

*Salvinia natans* (L.) All.: **B** Spandau, bei Eiswerder bis 1958 (LÜDEMANN). **Br** Torfloch am Totenkopf unweit des Quenzsees (ULR. u. Vo.).

*Sparganium erectum* L. subsp. *neglectum* (Beeby) Sch. et Thell.: **Or** in einem Graben zw. Glienicke und Schönfließ 1902, leg. R. SCHULZ, Herb. Bot. Mus. Berlin-Dahlem. — Subsp. *oocarpum* (Čelak.) Domin: **B** Spandau, auf dem Gelände des Wasserwerkes Tiefwerder 1961; Siemensstadt, Kanal am Goerdeler Damm gegenüber der Moabiter Gasanstalt. — Neuere Literatur: COOK in Ber. Bayer. Bot. Ges. 34 (1961): 7—10. Zur einwandfreien Bestimmung der vier im Gebiet vorkommenden Subspezies müssen fruchtende Pflanzen vorliegen. Subsp. *erectum* ist allgemein verbreitet und häufig. (SCH.).

*Sp. minimum* Wallr.: **Tr** im Priedel (Wiesenmoor) in Torflöchern 1927/28 (L.). **Lb** Briesener See 1961. **L** Torfmoor XIII nordwestl. Weissack 1960; Berger Moor in Torfstichen 1961 (F.). **Je** kleines Altwasser ca. 1 km östl. Meuselko (HDZ. u. STR.).

*Potamogeton pusillus* L.: **B** Hermsdorf, Baggerloch am Tegeler Fließ bei Str. 183, 1960; Wittenau, Nordgraben östl. Roedern-Allee 1958 (SCH.).

*Triglochin maritimum* L.: **Na** Salzwiese an der Eisenbahn Nauen-Kremmen südl. des Dechtower Damms 1961 (KR.). **Tr** Hackbuschwiesen 1927; Glauer „Seeken“ am Weg nach Glau 1928; Blankensee, sumpfige Wiese am Westufer 1928. **Bz** Brück, Wiesen nördl. der Stadt 1934 (L.).

*Najas marina* L.: P Sakrower See, 1 Exemplar angeschwemmt 1961 (Kr.).

*Alisma lanceolatum* With.: B Lichterfelde, am Stichkanal 1961. — Die zuverlässigsten Unterscheidungsmerkmale dieser Art gegenüber *A. plantago-aquatica* zeigen die Früchte: *A. lanceolatum* mit jeweils 2 Rückenfurchen an der Teilfrucht; *A. plantago-aquatica* mit nur 1 Rückenfurche. S. auch HERMANN, Flora von Nord- und Mitteleuropa 1956. Die in VBV 98—100 (1960): 26 gemeldete Pflanze ist demnach nur gewöhnliche *A. plantago-aquatica*. (SCH.)

*Baldellia ranunculoides* (L.) Parl.: Br am Südufer des Beetz-Sees bei Grabow, im Flutrasen auf Uferschlamm, mit *Apium repens*, *Oenanthe fistulosa*, *Scirpus tabernaemontani*, *Samolus valerandi*, *Teucrium scordium* und *Brachythecium mildeanum*, 1961. (F.)

*Bromus secalinus* L.: Od Südufer des Paarsteiner Sees nordwestl. Pehlitz, Brache (JA.). Tr Wiesen an der Nuthe 1925 (L.). L Acker an der Straße nach Frankendorf; Waltersdorf, an der Straße nach Luckau 1961 (F.). B Grunewald, Wegrand am Grunewaldturm 1960; Kladow, Ufermauer bei der Dampferanlegestelle 1960; Spandau, Müllschüttung bei den Egelpfuhlwiesen 1961. — *Bromus secalinus*-Saatgut findet neuerdings vielfach Verwendung zur Erstbegrünung jungfräulichen Bodens. In der Wismarer Straße in Berlin-Lichterfelde waren 1961 weite Flächen vor Wohnungsneubauten dicht bestanden mit der Roggentrespe. Ähnliches wurde auch beobachtet in Lübars (Ansäaten in einem Vorgarten) und auf dem Gelände des Wasserwerkes Tiefwerder (Begrünung von neu aufgeworfenen Böschungen). Nach eigenen Beobachtungen und briefl. Mitteilung von Herrn Dr. FOERSTER -Kleve-Kellen werden auch in anderen Teilen Deutschlands Begrünungen mit *Br. secalinus* durchgeführt. S. auch HENKER, Flora um Wismar, Neukloster und Warin, Arch. Freunde Naturgeschichte Mecklenburg 6 (1960): 146. (SCH.)

*B. arvensis* L.: P zahlreich an der neugebauten Chaussee zw. dem Forsthaus Templin und Caputh 1961 (F.).

*B. racemosus* L.: Or Teufelsbruch bei Hennigsdorf 1959 (L.). B Wittenau, feuchte Wiese südl. der ehem. Fasanerie 1960; Heiligensee, Sumpfwiese an der Heiligenseestr., 1961 (SCH.).

*B. ramosus* Huds. subsp. *benekeni* (Lange) Asch. et Gr.: Feldberg im Forst Jg. 105 am Wege nach Schlicht; Süd-Teil des Conover Werders 1958 (F.).

\**B. madritensis* Jusl.: B Wittenau, 1 Pfl. unter Serradella bei der Kolonie Bürgersruh 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.)

\**B. carinatus* Hook. et Arn. = *Ceratochloa carinata* (Hook. et Arn.) Tutin: B Wilmersdorf, Wiesbadener Str. an der Rüdesheimer Str. 1961, det. H. SCHOLZ (FRIEDRICH).

\**B. unioloides* (Willd.) Kunth = *Ceratochloa unioloides* (Willd.) P. B.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961. — Heimat: Südamerika. (SCH.)

*Festuca heterophylla* Lam.: P Sanssouci an der Orangerie und auf dem Drachenberg 1960 (F.). B Die von der Spandauer Stadtforst verschiedentlich genannte *F. heterophylla* (RIECKE in VBV 98—100, 1960: 50—112) ist nach Belegen im Herbar REIMERS *Festuca rubra* L. Im Berliner Gebiet wurde *Festuca heterophylla* in neuerer Zeit nicht beobachtet. Ältere Angaben z. B. in ASCHERSON 1864 (*F. duriuscula*) bedürfen einer Bestätigung und Nachprüfung. *F. heterophylla* kennzeichnet sich gegenüber *F. rubra* durch einen behaarten Fruchtknotenscheitel. (SCH.)

- Vulpia myurus* (L.) Gmel.: L Duben, zahlreich in Sandfluren westl. des Dorfes. Ge in der Forst Magdeburgerforth am Forsthaus Sandforth bei Schoppendorf, mit *Aira praecox* 1961 (F.). Je Sandstelle in Düßnitz (STRI.).
- Puccinellia distans* (L.) Parl.: Na Salzwiese an der Eisenbahn Nauen-Kremmen südl. des Dechtower Dammes 1961 (KR.).
- Scolochloa festucacea* (Willd.) Link: B Ost- und Westufer des Tegeler Sees 1961 (vergl. ASCHERSON 1864); Grunewald, an der Havel zw. Kuhhorn und Rettungsstation Grunewaldturm 1960 (SCH. u. SU.).
- Poa bulbosa* L.: B Heiligensee, Sandhauser Str., 1961 (FRIEDRICH); Spandau, zahlreich auf dem Südteil des Pichelswerder 1960; Charlottenburg, im Schloßpark 1961; Kladow, Sakrower Landstr., 1956 (SCH.); Wannsee, Böttcherberg 1956 (BOLZ); Volkspark Glienicker (FRIEDRICH, KOCH); auch auf der Pfaueninsel immer noch seit vielen Jahren (verschiedene Beobachter); Marienfelde, im Gutspark 1957 (SCH.-M.); am Müggelsee bei Friedrichshagen 1951 (WA.); Gosen, Waldrand beim Gosener Graben 1961 (EICHNER).
- \**P. chaixii* Vill.: B NSG Schildow 1959; Pfaueninsel beim Ententeich 1961 (SU.). P Park Sanssouci bei der Fasanerie, am Neuen Palais und auf dem Drachenberg; beim Bhf. Geltow—Caputh 1960 (F.).
- \**Beckmannia erucaeformis* (L.) Host: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).
- Lolium temulentum* L.: B unter Serradella bei Gatow 1961; Wannsee, Müllplatz nördl. Griebnitzsee 1 Pfl. 1961 (SCH.).
- \**L. persicum* Boiss. et Hoh.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961 (SCH.).
- \**L. strictum* Presl: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960. — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.).
- Agropyron caninum* (L.) P. B.: B Pfaueninsel 1961 (SCH. u. SU.); Köpenick, Pferdebucht 1959 (VOBACH). P Petzower Park am Schwielowsee 1961. L Park in Drehna 1961 (F.).
- \**Aegilops caudata* L.: B Die in VBV 98—100 (1960): 23 u. 27 gemeldete Art wurde bei einer Nachbestimmung als *Ae. cylindrica* Host identifiziert. (SCH.).
- \**Ae. cylindrica* Host: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1958 (s. o.), 1960 u. 1961 (1). — Heimat: Südosteuropa, Vorderasien. (SCH.).
- \**Ae. triuncialis* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet, Vorderasien. (SCH.).
- \**Ae. triaristata* Willd.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960. — Heimat: Mittelmeergebiet, Kleinasien. (SCH.).
- \**Hordeum jubatum* L.: Fb am Gebäude des Hüttenwerkes, leg. SIEGEL (KR.). B Friedrichshain, Gürtel-Ecke Scharnweberstr. leg. HAMANN 1960 (SCH.). Ge Ziesar-West, vor dem Bahnhof (ULR. u. Vo.). — Var. *pampeanum* Hauman: B Lichterfelde, Schuttplatz am Stichkanal 1960. Über die Varietät *pampeanum* vergl. HAUMAN in Anales Mus. Nacional Hist. Nat. Buenos Aires 28 (1916): 285 (SCH.).
- Hordelymus europaeus* (L.) Jessen: Feldberg Conower Werder, spärlich 1958 (F.).

- \**Elymus arenarius* L.: Or Bhf. Nassenheide (Kr.). B Buch, Rieselfelder 1961 EICHNER); Wittenau, hart südl. des Nordgrabens; Bez. Tiergarten und Charlottenburg, auf dem Bahngelände der Ringbahn an den Bhfn. Putlitzstr., Beusselstr., Jungfernheide und Westkreuz beobachtet. Nach HENTZEN Mschr. 1950, S. 83 dort (?) und am Bhf. Gesundbrunnen 1784 zur Befestigung entwaldeter Dünens angepflanzt (SCH. u. SU.); Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1961 zwischen Neuapflanzungen, wohl verschleppt (SCH.); Friedrichsfelde, Sandgelände an der Bahn bei der Treskowallee 1951; Zehlendorf, Täubchenstr., 1953 (SU.). P Deetz, am Friedhof; Bahndamm zw. Ferch-Lienewitz und Seddin; Beelitz, am Bahnhof (KR.).
- \**Eragrostis poaeoides* P. B.: Br Bhf. Dahmsdorf 1961 (F.). Bz Bhf. Brück 1936 (L.).
- \**Cynodon dactylon* (L.) Pers.: B Wannsee, Kronprinzessinnenweg an der Königstr. 1960 (WA.).
- \**Sporobolus* spec.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).
- Aira praecox* L.: Te Waldlichtung 1 km nordöstl. Julianenhof 1960. Kl Klötze, häufig am Weg von Zichtau zum Starkenberg 1959 (F.). B Grünau, bei Schmöckwitz im Jg. 29, 1961 (SCH.); Insel im NSG Krumme Laake bei Müggelheim 1961 (VOBACH).
- Avena fatua* L.: B immer wieder auf Schutt- und Müllplätzen; außerdem: Kadow, zahlreich auf einem Brachfeld am Ritterfelddamm, 1961; Mariendorf, Lupinenacker nördl. der Buckower Chaussee, 1958 (SCH.).
- A. strigosa* Schreb.: B Wittenau, unter Serradella bei der Kolonie Bürgersruh 1961; desgl. bei Gatow 1961. Wahrscheinlich *A. brevis* Roth (SCH.).
- \**A. sterilis* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.).
- Helictotrichon pratense* (L.) Pilger: P Reiherberg in Golm 1960; zahlreich auf Burgwall (Hohe Warte) in Knoblauch 1961 (F.).
- Alopecurus myosuroides* Huds.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960, 1961 (SCH.).
- Hierochloe odorata* (L.) Wahlenberg: P Eichen-Kiefern-Wald westl. Schwielowsee nördl. Mittelbusch (BENKERT).
- \**Anthoxanthum puelii* Lecoq et Lamotte: Kl Osthang des Rentgersberg bei Wiepke, in der Silbergrasflur 1959 (F.). B Bez. Tiergarten, im Westhafen 1958; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960 (SCH.); Charlottenburg, Uferweg der Spree westl. Rohrdammbrücke 1961 (FRIEDRICH). Br Sandfeld am Südufer des Wusterwitzer Sees 1960. L nördl. Stiebsdorf in der Lammkraut- und Straußgrasflur 1960 (F.). Zo Ludwigsfelde, Autobahnböschung, unter *Calluna* 1952—53 (L.).
- \**Phalaris canariensis* L.: B immer wieder aus verschüttetem Vogelfutter auf Müll- und Schuttplätzen (SCH.).
- \**Ph. paradoxa* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.).
- \**Ph. minor* Retz.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet, Vorderasien. (SCH.).
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. subsp. *aegyptiaca* (Retz.) Henr.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961; ob die Kulturform var. *frumentacea* Henr.? (SCH.).

\**Panicum capillare* L.: B Heiligensee, Heiligenseestr., am sandigen Straßenrand 1960; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961; Charlottenburg, zwischen den Gleisen des Bhf. Savignyplatz 1961 (SCH.); Bhf. Grunewald, auf Eisenbahnschotter 1961 (HDZ.).

\**P. huachucae* Ashe: B Wannsee, Potsdamer Chaussee zw. Nibelungen- und Isoldestr. mit ca. 20 Horsten. Diese Hirseart wurde an der bezeichneten Stelle von den Herren stud. pharm. MÜNZEL u. ECKERT 1961 entdeckt. Nachdem zuerst nur ein kleines Bruchstück der Pflanze vorlag, konnte die Art bei erneuter Erkundung des Geländes in größeren und kleineren Expl. wieder aufgefunden und bestimmt werden. Die Ansiedlung dürfte schon mehrere Jahre bestehen. Die Potsdamer Chaussee wurde nach dem Kriege verbreitert. An den seitlich aufsteigenden, sandigen Böschungen wächst heute ein lückiger Trockenrasen mit Birken und Robinien. An der Fundstelle des *Panicum huachucae* wurden notiert: *Robinia pseudo-acacia*, *Betula verrucosa*, *Festuca ovina*, *Agrostis tenuis*, *Rumex acetosella*, *Euphorbia cyprissias*, *Chondrilla juncea*, *Artemisia campestris*, *Oenothera biennis*, *Potentilla argentea*, *Hypericum perforatum* und *Digitaria ischaemum*. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein eingezäntes militärisches Übungsgelände der amerikanischen Garnison. — *P. huachucae* ist in Nordamerika sehr formenreich und besiedelt dort „open woods and clearings“. In Japan ist die Art eingebürgert. Literatur: HITCHCOCK, Manual of the Grasses of the United States 2. ed. 1951; HITCHCOCK and CHASE in Contrib. U. S. National Herbarium 15, 1910. (SCH.)

*Setaria verticillata* (L.) P.B.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).

*S. italicica* (L.) P.B. subsp. *moharia* (Alef.) Körn.: B hin und wieder auf Müllplätzen, z. B. Wannsee, aufgelassener Müllplatz an der Glienicker Str., 1960. Wohl immer aus Vogelfutter, aber bedeutend seltener als die subsp. *italicica*. Abweichende Formen: Heiligensee, an der Heiligenseestr., mit abfallenden Ahrchen, eine den Fatuoiden des Saathafers entsprechende Mutante (*S. ketzchovellii* Men. et Eriyan); Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961; Steglitz, Ödland an der Gelieustr., 1961. — Literatur: H. SCHOLZ in Ber. Dtsch. Bot. Ges. 73 (1960): 471—476; KRAUSE in Beih. Bot. Centralbl. 29 (1912): 143—145. (SCH.)

\**Cenchrus pauciflorus* Benth.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960, mehrere Pflanzen. — Heimat: Nord- und Südamerika. (SCH.)

*Cyperus fuscus* L.: B Reinickendorf, Ausstiche bei Wilhelmsruh 1947 (STR.); Heiligensee, Grabenrand an der Schulzendorfer Str., 1960; Grunewald, östliches Havelufer vom Pichelswerder bis Moorlake zerstreut 1960 (SCH. u. SU.); Kaulsdorf, am südlichen Baggersee 1959 (VOBACH). P Teichufer der Römischen Bäder im Park Sanssouci; Westufer des Sakrower Sees 1960. L Teiche bei Drehna 1961; Dorfteich in Gr. Radden 1961 (F.). St Hirschfelde, Dorfteich (JA.). Je Kleindröben (STR.).

*Holoschoenus vulgaris* Link: Br wieder aufgefunden am Buhnenhaus, Nähe Havelmündung in den Plauer See (ULR. u. VO.).

*Scirpus tabernaemontani* Gmel.: B Kreuzberg, Oranien-Ecke Alte-Jakob-Straße auf der bis zur Kellersohle abgeräumten Trümmerfläche im Wasser zusammen mit *Typha latifolia*, *Phragmites* und *Ranunculus sceleratus* 1960 (SU.); Kladow, am Havelufer 1959; Lichterfelde, feuchte Wiese am Stichkanal

1959; Blitz, Tümpel in der Hufeisen-Siedlung 1960; Zehlendorf, Teltowkanal Nähe Teltower Damm, 1958 (SCH.); Zehlendorf, Havelufer an der Rettungsstation Großes Fenster 1960; Wannsee, Pfaueninsel südl. Parschenkessel 1961 (SU.); Zehlendorf, am Südwestufer des Nikolassees 1954 (KOCH). P Westufer des Sakrower Sees 1960. Br Beetz-See bei Grabow 1961 (F.). KöW am Sutschketeich bei Bestensee; Südufer des Frauensees in der Dubrow 1949 (STR.).

*Blysmus compressus* (L.) Panz.: Feldberg häufig am Carwitz und Zansen. A Ostufer des Unteren Uckersees (F.). KöW Ausstiche Autobahn südl. Gr. Köris am Sutschketeich bei Bestensee 1949 (STR.).

*Isolepis setacea* R. Br.: Sz im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959. L am Großen Teich bei Wanninchen; Teiche zw. Bornsdorf und Riedebeck 1961; südöstl. Presenchen auf dem Weg zw. dem Gr. Busch und Elsbruch 1960 (F.). Lb am Wege Schönwalde—Waldow, etwa 200 m hinter der Autobahn auf einem Lein-Brachfeld 1955 (BIALUCHA).

*Eleocharis acicularis* (L.) R. et Sch.: P Westufer des Sakrower Sees 1960. Ca am Seesenteich in der Lübbenauer Heide 1961. L Drehnaer Teiche 1960 (F.). Je Kleindröben; Deich westl. Klöden; nordwestl. Schützberg; Ausstich südöstl. Labrun (STR.).

*Cladium mariscus* (L.) Pohl: Bg im Rott sehr vereinzelt 1959 (F.). P Schmerbergtümpel (= Karinchen) südl. der Lienewitz-Seen 1956 (ARLT, WERNICKE, BENKERT). Br am Wutzerwitzer See; Erlengebüsch bei Gallwitz (ULR. u. VO.).

*Rhynchospora alba* (L.) Vahl: P Hochmoor am Backofenberg bei Tremsdorf 1960 (F.).

*Carex dioica* L.: P Wiese im Springbruch (BENKERT).

*C. diandra* Schrank: P häufig auf den Springbruchwiesen bei Rehbrücke (F.).

*C. appropinquata* Schum.: Or Zerpenschleuse, sumpfige Wiese an der Bahnstrecke 1925. Zo Sperenberg, am Hegesee 1930. Bz Brück, Wiesen nördl. der Stadt, mehrfach 1932—34; Schloßbusch 1934 (L.).

*C. brizoides* Juslen.: W Griebo am Bach (HDZ. u. STR.). L Wald östl. Giechow an der Schrake 1961; Wald zw. Gehren und Waltersdorf 1961 (F.).

*C. arenaria* L.: Je Die Art erreicht im Elbtal des Kreises Jessen ihre absolute Südgrenze; ihre dortigen Fundorte seien daher mitgeteilt: südöstl. und südl. Listerfehrda; östl. Hemsendorf; nördl. und nordwestl. Grubo; südöstl. an Düßnitz; südöstl. und südwestl. Hohndorf; Weinberg nördl. Prettin; ehem. Ziegelei südöstl. Prettin; Südrand des Waldes südl. Prettin (STR.).

*C. reichenbachii* Bonn.: W westl. Griebo am Bach, wenige Schritte von *C. brizoides* und *C. arenaria* entfernt, 1954 (STR.).

*C. ligerica* Gay: P Stahnsdorf, Weg nach Teerofen, mit *C. arenaria* 1922. Bz Brück, Böschung an der Kleinen Plane im Kiefernwald 1932. Tr Ludwigsfelde, vor dem Südtor des Werkes 1948; vor dem Sportplatz 1953, in Menken (L.). Je ca. 2 km westl. Elster bei der Windmühle (HDZ. u. STR.); nordwestl. Gorsdorf; ca. 2 km östl. Hemsendorf; Windmühle südl. Schützberg; nördl. und nordwestl. Grubo; nordwestl. Meuselko (HDZ. u. STR.); Friedhof Kleindröben; südwestl. Hohndorf; Sportplatz und ehem. Ziegelei südöstl. Prettin; Weinbergrund nördl. Prettin (STR.).

*C. cyperoides* L.: L am Schlagteich bei Riedebeck auf ausgebaggertem Sand zahlreich 1961 (F.).

- C. supina* Wahlbg.: **P** Maulbeerallee, am Paradiesgarten 1950 (ECKARDT); Reiherberg in Golm 1958 (BENKERT); Südwesthang der Phöbener Berge 1953; Berg nördl. von Alt-Töplitz 1952 (KR.).
- C. limosa* L.: **P** Hochmoor am Backofenberg bei Tremsdorf; Beelitz, Hochmoor am Fresdorfer See (BENKERT).
- C. silvatica* Huds.: **Sz** im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959 (F.).
- C. distans* L.: **P** Ostufer des Gr. Seddiner Sees bei Wildenbruch; Wiese westl. Freesdorf nahe dem Fresdorfer See (BENKERT); am Gröbener See 1956 (GÖTZ). **L** Frankendorfer Moor, verbreitet 1960 (F.).
- C. hostiana* DC.: **Or** Hennigsdorf, Teufelsbruch 1959 (L.).
- Arum maculatum* L.: **Sz** Park von Beetzendorf, zahlreich 1959. **Helmstedt** Park und Wald von Harbke, zahlreich; Wald östl. Sommerschenbruch 1959. **M** Park in Hadmersleben 1959 (F.). **P** Weg vom Schloß Lindstedt nach Bornim, hinter Höhe 45,7 links im Eichen-Birken-Gehölz einzelne Exempl. 1951 (GÖRITZ).
- Lemna gibba* L.: **B** Tegeler Fließ am NSG Schildow und bei Lübars (SCHLÜTER, KANDELER, SCH.). **Kl.** Hermsdorfer See (E. SCHMIDT); Britz, Röthepfuhl an der Mariendorfer Allee, 1960 (SCH.).
- Wolffia arrhiza* (L.) Wimmer: **B** Britz, Röthepfuhl an der Mariendorfer Allee, 1960 massenhaft in Gesellschaft mit allen heimischen Lemnaceen, einschl. *L. gibba* (SCH.). **P** Sanssouci, im Friedensteich (BENKERT). **Ge** im Tümpel am Genebach unweit Ziesar in großer Menge (Vo.); Geuen, Tümpel am Totenkopf unweit des Wendsees (ULR.).
- Juncus squarrosus* L.: **Ge** feuchte Sandgrube an der Autobahn bei Ziesar nahe der Straße nach Köpernitz 1960. **Ca** Lübbenaue Heide nördl. der Stadt, Holzschlagflur 1961. **L** feuchtes Callunetum südl. Bergen 1961 (F.).
- J. filiformis* L.: **B** Heiligensee, Sumpfwiese am Nordende des Sees 1959 (PATZKE). **Ge** Sandgrube an der Autobahn bei Ziesar nahe der Straße nach Köpernitz in Massen 1960. **L** ausgetrockneter Teich bei Drehna 1960 (F.). **Je** östl. Mauken am Riß (STRI.).
- J. capitatus* Weig.: **Tr** Acker südl. der Stadt an der Bahn vor dem Drehkreuz am Schulzendorfer Kirchsteig 1927, später verschwunden (L.). **L** südl. Bornsdorf, Trittfur im Nardetum 1961 (F.).
- J. subnodulosus* Schrank: **B** Quellmoor beim NSG Lübars 1953 (SU.) **Bg** im Rott sehr zahlreich 1959 (F.).
- J. alpinus* Vill.: **B** Wittenau, Supfwiesen südöstl. der ehem. Fasanerie 1961; Grunewald, Hundekehlenfenn, leg. SUKOPP 1958, die Art also dort noch nicht verschwunden (s. SUKOPP in Bot. Jb. 79, 1960: 152). (SCH.).
- J. atratus* Krocker: **Br** Wiese zw. Pritzerbe und Däberitz (Vo.).
- Luzula albida* (Hoffm.) DC. = *L. luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott: **B** Wannsee, Grasflächen auf der Pfaueninsel und Volkspark Glienicker nahe der Glienicker Brücke 1959 (SU.). **W** westl. Griebo am Bach (HDZ. u. STRI.). **L** am Waldbach 1 km südwestl. Bornsdorf 1960 (F.).
- L. pallescens* (Wahlbg.) Swartz: **B** Heiligensee, Am Dachsbau bei der Heiligenseestr. an grasiger Grabenböschung 1961. — Autoren der Art nach JANICHEN, Catalogus Florae Austriae 4, 1960: 748. (SCH.).

*Colchicum autumnale* L.: **Na** Wiese östl. vom Bhf. Wustermark 1955 (F.); Wiese in der Nähe des Dorfes Bötzow (RÜFFLE). **P** Wiese im Südteil des Saarmunder Elsbruches nahe der Chaussee Tremsdorf—Saarmund 1955 (GÖRITZ).

*Anthericum liliago* L.: **Na** zw. Buchow und Karpzow (GÖRITZ). **St** wenige Pflanzen im Kiefernwald östl. Alt-Rüdersdorf 1961 (WEYMAR u. a., WIŚNIEWSKI). **P** Südosthang des Krähenberges in Caputh sehr spärlich 1960; Glatzberg bei Nedlitz, an der Chaussee zw. Nedlitz und Fahrland 1955 (F.); Reihenberg bei Golm 1951 (KR.); Südwesthang des Schäfereiberges im Wildpark 1957 (WERNICKE); Südhang vom Brauhausberg; Südhang vom Kl. Ravensberg 1958 (BENKERT); Werder, Südhang des Krielower Berges (MORITZ). **Je** Weinbergsrand nördl. Prettin; Ziegelei östl. Prettin; bei den Ställen nordwestl. Schützberg (STRI.).

*G. lutea* (L.) Ker-Gawl.: **B** Tegel, auf der Insel Scharfenberg 1957 (E. SCHMIDT); Wannsee, feuchte Schlucht am Bhf. Wannsee 1959 zusammen mit *Anemone ranunculoides* (Sch.). **Helmstedt** Park in Harbke 1959 (F.).

*Allium ursinum* L.: **B** Schulgarten Blankenfelde 1962 (BICKERICH).

*A. angulosum* L.: **Fb** Neuzelle/Oder, auf den Oderwiesen 1922 (L.). **Ro** an der Straße nach Coswig adventiv 1956 (HDZ. u. STRI.) wie sicherlich auch teilweise bei den folgenden Fundorten: südwestl. Bhf. Wittenberg an der Fernstraße 2; beim NSG Wendel. **Je** dicht nördl. Gorsdorf an der Straße; Sandhügel südl. Listerfehrda; an der Straße Gorsdorf — Schützberg; alter Deich nordwestl. und westl. Schützberg; nordwestl. Grubo; Ziegelei Hendorf (STRI.).

*A. oleraceum* L.: **B** Schildow, am Weg nach Lübars bei der Sektorengrenze 1959; Charlottenburg, Angerburger Allee beim Pichelsberg 1957 (SCH.); Grunewald, Nordostrand des Teufelssees 1958 (SU.); Gosen, Ostfuß der Gosener Berge 1950 (RS.).

\**A. paradoxum* (M. B.) Don: **Nr** Park in Wustrau, leg. KARSTÄDT um 1950, det. REIMERS. **Na** im Südteil der Bredower Forst bereits 1947, Moosbruchheide, leg. REIMERS (vergl. VBVB 98—100, 1960 : 30). (SCH.) **B** Buch, Schloßpark 1934 (SCHUBERT); Zehlendorf, am Teltowkanal westl. Gut Eule 1960 (KOCH); Treptow, Plänterwald, um 1947 (BICKERICH).

*Fritillaria meleagris* L.: **Ge** in der Umgebung Ziesars an zwei Stellen: im „Sieb“ und im Fiener. Auch zahlreiche weiße *Fritillaria*. (ULR. u. VO.)

\**Ornithogalum nutans* L.: **P** Park Sanssouci 1958 (F.); Neu-Falkenrehde (GÖRITZ).

\**O. boucheanum* (Kunth) Asch.: **Lb** Spreeufer am Schloßgarten 1960, leg. BIALUCHA (SCH.).

\**Muscari comosum* (L.) Mill.: **L** an der Straße zw. Ukro und Langengrassau in einer wegbegleitenden Frischwiese 1960 (F.).

*Iris sibirica* L.: **Na** Bredower Forst nahe am Bahnwärterhäuschen Falkenhagen 1956 (F.).

\**Commelina communis* L.: **P** als Unkraut in Kleingärten zw. Bhf. Wildpark und Luftschiffhafen. **Lb** Bahnhofstr., 1961 (KR.).

*Cephalanthera rubra* (L.) L. C. Rich.: **Feldberg** Forstrevier Jg. 92, 6 Expl. am Hohlweg 1958 (F.). **St** Kiefernwald bei Alt-Buchhorst, reichlich 1960 (WEYMAR u. a.), 1961 (WIŚNIEWSKI).

- C. damasonium* (Mill.) Druce: Pr an der Autobahn in der Nähe des Grimnitzsees (SCHONERT).
- Epipactis palustris* (Mill.) Cr.: Feldberg Nordwest-Ufer des Haussees, im kalkholden Kleinseggenrasen 1958. Ly Sumpfwiesen am Wurlsee; Waldmoor am Stubnitz-See 1958 (F.).
- Neottia nidus-avis* (L.) L. C. Rich.: Feldberg Jg. 92 u. 82, 1958 (F.). Ra Park von Nennhausen 1961; Kornhorst bei Lochow, unter Haselbüschern 1961 (ZIETMANN). Br im Krugpark, Nähe Göttiner Bruch (ULR.).
- Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.: Br Pfeifengraswiese südl. Weseram 1961 (F.).
- Orchis morio* L.: Pr Gollmitz (SCHONERT).
- O. militaris* L.: A ein Expl. auf Kahlschlag im Walde zw. Geesow und Tantow im Kr. Angermünde. Na Bredower Forst. Die von mir 1960 einmal gefundene Pflanze — lus. *braschii* (ungeteilte, spitze Lippe ohne Seitenlappen und Seitenzipfel, dazu gehört auch die in Willdenowia 2, 1958 : 1—6 von REIMERS beschriebene Pflanze von Eichhorst bei Joachimsthal) — wurde nicht wieder festgestellt, da fast sämtliche *O. militaris* abgeschnitten waren (WIŚNIEWSKI). O Hennigsdorf, Teufelsbruch 1959 (L.) P Stahnsdorf, Wiese südl. des Teltowkanals 1922, später nicht mehr gefunden trotz alljährlichen Suchens (L.); in der Sandgrube des Krielower Berges 1961 etwa 50 blühende Expl. (BENKERT).
- O. palustris* Jacq.: Br NSG Rietzer See bei Brandenburg/H., Salzstelle; Gräbenräder einer wechselfeuchten Wiese an der Bahnlinie Potsdam-Brandenburg bei km 58,1 1961 (WIŚNIEWSKI). P zw. Bornim und Marquardt 1930 (H. KRÜGER). T Ludwigsfelde, Wiese bei Löwenbruch, vereinzelt 1950 (L.) Zo Rangsdorf, Pfälzingsee 1908 (F. BERGER).
- O. incarnata* L.: Tr auf den Nuthewiesen und bei Märk. Wilmersdorf weiter verbreitet als in VBV 64: 207 angegeben; Ludwigsfelde, Wiesen bei Löwenbruch 1951. P Stahnsdorf, Wiese am Südufer des Teltowkanals 1922 (L.). Te Wiese am Fährsee 1949 (H. FRITSCH).
- O. incarnata* L. × *latifolia* L.: Tr außer bei Märk. Wilmersdorf 1922 auch bei Klein-Schulzendorf 1927 und bei Paulshöhe 1931 (L.).
- O. incarnata* L. × *traunsteineri* Saut.: Tr Paulshöhe und Klein-Schulzendorf 1927. Diese von mir als *O. latifolia* var. *gracilis* Warnst. oder als *O. traunsteineri* bestimmten Pflanzen deutete A. COHRS-Oederan als die genannte Hybride und bemerkte dazu, daß an vielen Stellen *O. traunsteineri* ausgestorben ist, aber ihre Hybriden mit *latifolia* und *incarnata* sich erhalten haben. (L.).
- O. maculata* L.: Bz Brück, im Südteil des Schloßbusches (Erlenbruchwald), 1932, 1934 auch in lus. *immaculata* (L.). Lb westl. Radensdorf an der Straße nach Lübben, im Nardetum 1961. L südl. Kahnsdorf, im Eu-Molinietum 1961 (F.).
- O. latifolia* L. × *traunsteineri* Saut.: Tr Nuthewiesen südwestl. der Stadt 1922, det. COHRS (L.).
- Platanthera bifolia* (L.) L. C. Rich.: Or Mühlenbeck, Jg. 90, 3 Expl. am Rande einer sumpfigen Waldwiese (von Wild verbissen) (WIŚNIEWSKI). St Kranichsberge bei Erkner 1949, zahlreich (Hdz.); bei Alt-Buchhorst, mehrfach (WEYMAR u. a., WIŚNIEWSKI 1961). Tr südl. Zelle, Weg am Bruchwaldrand 1928, in var. *densiflora* Drej. (L.). L Waldrand zw. Wanninchen und der

Mühle 1960 (F.).

*Hammarbya paludosa* (L.) O. Kuntze: Or Zwischenmoor am Nordufer des Lubow-Sees 1961 (KR.).

*Liparis loeselii* (L.) L. C. Rich.: Bg im Rott 1960 (WIŚNIEWSKI).

*Urtica kioviensis* Rogowitsch: B Spandau, auf dem Gelände des Wasserwerkes Tiefwerder am Hohlen Weg 1961. Wohl erstmalig nach dem Krieg wieder in der Mark Brandenburg beobachtet (SCH. u. SU.); Tegel, am Ostufer des Tegeler Sees südl. der Fährstelle nach Reiswerder 1961 (SU.).

\**U. pilulifera* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).

*Parietaria erecta* M. et K.: Gd Kalbe a. d. Milde, im Park zahlreich 1959 (F.). Br über viele Plätze und Anlagen in großer Zahl ausgebreitet, nach SCHRAMM 1857 selten (ULR. u. VO.). B Gatow, Villa Lemm 1959 (W. KRÜGER).

*Thesium ebracteatum* Hayne: Na an der Bredower Forst 1948 (STR.).

*Asarum europaeum* L.: P Werder, Glindower Erdeberge, bewaldeter Ostteil; Goethepark in Werder (ARLT.).

*Aristolochia clematitis* L.: P Gr. Kreutz, in der Dorfstraße 1955 (F.); Werder, Neuer Friedhof; Kemnitzer Str. und ehemalige Weinberge in Werder (WERNICKE); Kemnitz 1961 (F.); Dorfstraße in Golm 1959 (RÜFFLE); am Pfingstberg 1910 (L.). Ge Ziesar, an einem Gartenzaun 1960 (F.). Zo Klausdorf am Mellensee, Wegrand, 1925. Tr Kliestow 1931, Chausseerand; Dorfaue in Christinendorf 1946. J Straße in der Zinnaer Vorstadt 1912 (L.). W Griebo. Je Klöden; Kleindröben; Prettin (Hintersee) (STRI.).

\**Rumex triangulivalvis* (Danser) Rech. fil.: B Grunewald, Havelufer bei Kuhhorn, 1 Pfl. 1960 (SCH. u. SU.).

*R. palustris* Sm.: B Heiligensee, Graben an der Hennigsdorfer Str. 1960; Siemensstadt, an der Faulen Spree östl. Kraftwerk Reuter 1961; Bez. Mitte, auf Schutt am ehem. Schauspielhaus 1960 (SCH.); Grunewald, verwildertes Gartengrundstück in der Bilsestr., 1943. P Stahnsdorf, Pfuhl an der Chausee nach Gütergotz (Güterfelde) 1944; Caputh, Ufer am Schwielowsee 1925. J Wiesen zw. Kloster Zinna und Werder 1922 (L.).

\**R. stenophyllum* Ledeb.: B Bez. Tiergarten, abgeräumte Ruinenfläche an der Margaretenstr., 1960. — Heimat: Südosteuropa, Asien. (SCH.).

*R. sanguineus* L.: Te Buchheide mehrfach 1960. Sz im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959 (F.).

*R. tenuifolius* Wallr.: Tr Galgenberg 1927, 1931. J am Bahnhof Werder-Zinna 1923 (L.).

\**R. thyrsiflorus* Fingerh.: Bz Brück, an der Bahnstrecke 1934. Tr Ludwigsfelde, Bahnstrecke südl. Haltestelle Birkengrund-Süd in Menge 1953. J Weg an der Kleinbahn nach Dorf Werder 1922 (L.).

\**Emex spinosus* (L.) Camp.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet, Vorderasien. (SCH.).

*Polygonum calcatum* Lindm.: Tr Ludwigsfelde, Parkplatz an Autobahn und Potsdamer Str., 1952, 1953 (L.).

*P. tomentosum* Schrank var. *somphocarpum* (De Bruyn) Danser = *P. somphocarpum* De Bruyn: B Heiligensee, 1960 auf Ackerland nördl. der Heiligenseestr. — Früchte bei dieser Varietät matt, nicht glänzend wie bei der ty-

pischen Art und wie bei *P. lapathifolium*. In Mitteleuropa bisher noch nicht beobachtet. In Frankreich örtlich allgemeiner als die typische Form. Die Berliner Pflanze nähert sich mehr dem *P. lapathifolium* subsp. *mesomorphum* (Danser) Danser. Literatur: DANSER in Rec. trav. bot. néerl. 18 (1921): 139 und DANSER in Nederl. Kruidk. Archief 1931: 112. (SCH.)

\**P. orientale* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Indien, Ostasien. (SCH.)

\**Chenopodium botrys* L.: P Klein-Machnow, in Menge an einer Baustelle am Spandauer Weg 1932 (L.); Freundschaftsinsel, als Unkraut auf den Blumenbeeten seit 1960 (F.). Tr Ludwigsfelde, Autobahn 1947 (L.) und Schuttstelle an der Thälmannstr. leg. et det. LEMKE 1947, Herbar Bundesanstalt für Vegetationskunde, Bad Godesberg (SCH.).

*Ch. bonus-henricus* L.: P Stahnsdorf, am Vorderen Karpfenteich 1926. Tr Christinendorf, Dorfstraße 1946 (L.).

*Ch. vulvaria* L.: Je Schützenberg; Kleindröben; Kähnitzsch. Mü in Kossdorf (STRI.).

*Ch. murale* L.: Pr Lützlow 1953 (L.). B Spandau, Schutt an der Egelpfuhlstr., 1961; Wannsee, Müllplatz nördl. des Griebnitzsees 1961; Bez. Kreuzberg, Grimmstr. Ecke Planufer 1961; Rudow, Waltersdorfer Chaussee Ecke Neudecker Weg 1960, 1961 (SCH.). P Grube; Dorfstraße in Saarmund (BENKERT). Bz Bhf. Brück 1934 (L.).

\**Ch. giganteum* Don: B Wittenau, Müllplatz bei der Kolonie Bürgersruh 1961. — Heimat: Nordindien. (SCH.)

\**Ch. strictum* Roth: Br an der Neuendorfer Str. auf Ruderalstellen 1960 (F.).

*Ch. opulifolium* Schrad.: B Bez. Mitte, Spittelmarkt 1953 (L.); Kreuzberg, Wiener Str. bei der Glogauer Str., 1961; Schöneberger Südgelände 1960; Friedenau, Ringstr., 1960; Steglitz, Steglitzer Damm, 1960 (SCH.). Je in Düsseldorf; Kähnitzsch. Mü in Kossdorf (STRI.).

*Ch. ficifolium* Sm.: B Spandau, Müllplatz bei den Egelpfuhlwiesen 1961; Grunewald, mehrfach auf dem Trümmerberg am Teufelssee 1960; Heiligensee, Rübenacker am Bumfeld 1960 und am Büsumer Pfad 1961; Bez. Mitte, Wilhelmstr. Ecke Thälmannplatz 1960; Lichterfelde, Gemüseäcker am Stichkanal 1961 (SCH.).

\**Ch. foliosum* (Moench) Asch.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee an 2 Stellen 1961 (SCH.).

\**Ch. ambrosioides* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).

\**Atriplex nitens* Schkuhr: Nr Wustrauer Luch bei Linumhorst an der Luchstr. Pe zw. dem Schlachthof und der Bahnstrecke seit 1959. Br häufig auf Schuttgelände; Zachow; Ketzin; Päwesin; Etzin. P Golmer Luch auf Müllablagerungen in Massen 1960; an der Chausee zw. Hermannswerder und Templin 1960; Fahrland; Priort; Elstal; Knoblauch; Caputh. Alle Beobachtungen 1960. (F.). Tr Ludwigsfelde, Autobahn nahe der Brücke über die Potsdamer Str., 1951 (L.). J Schuttplätze östl. des Bahnhofs 1949 (L.), 1960 (F.).

\**A. hortensis* L.: B Wittenau, Müllplatz bei der Kolonie Bürgersruh 1961 (SCH.).

\**A. rosea* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1961 (SCH.).

- \**A. tatarica* L.: Kr Ludwigslust-Grabow, auf Schutt beim Sportplatz 1959, leg. KRAMBEER (auf einem Herbarbogen zusammen mit *Ch. glaucum*) (SCH.).
- \**Axyris amaranthoides* L.: B Bez. Tiergarten, auf dem Gelände der projektierten Großmarkthalle an der Beusselstr. eine einzige Pflanze etwa 1951; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961. — Heimat: Asien. (SCH.).
- \**Kochia densiflora* Turcz. = *K. scoparia* (L.) Schrad. subsp. *densiflora* (Turcz.) Aellen: B Bez. Mitte, Massenbestand auf Schutthaufen am Schillerplatz 1960, 1961. — Heimat: Südrussland, Asien. (SCH.).
- \**Corispermum leptopterum* (Asch.) Iljin: Od Liepe, Straße nach Brodowin. Eb 2,5 km nördl. Trampe, Straßenrand. Br Fernstraße 102 südl. am Paterdamm (JA.); am Grund der Sand- und Kiesgrube Damsdorf (ULR. u. Vo.).
- \**Salsola pestifer* A. Nelson: Br in der Nähe des altstädtischen Städtebahnhofes (ULR. u. Vo.). P Stahnsdorf, Straßenrand 1922. Tr Straße an der Bahn 1938 (L.). Je nordwestl. Schützberg bei den Ställen; Schützberg, östl. der Windmühle (STRI.).
- \**Amaranthus blitoides* S. Wats.: B Nach einem Beleg im Herbar REIMERS wurde die Art bereits 1929 von BOTHE auf Ödland unweit des Bhf. Beusselstr. gesammelt; dort heute noch (SCH.).
- \**A. albus* L.: St sandiger Hang am Nordwest-Rand der Langedammwiesen 1950, leg. REIMERS (SCH.). P am Neuen Palais; am alten Markt; Dorfstraße in Saarmund (BENKERT).
- \**A. chlorostachys* Willd.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee, an verschiedenen Stellen 1960, 1961, 1962; Wannsee, auf dem ehem. Müllplatz an der Glienicker Str., 1960; Lichterfelde, Schuttplatz am Stichkanal 1960 (SCH.). Bz Brück, Chaussee nach Rottstock 1934, 1936 (L.).
- \**A. paniculatus* L.: B Wannsee, Müllplatz nördl. des Griebnitzsees 1960, 1961 (SCH.).
- Portulaca oleracea* L.: B Lichterfelde, Schuttplatz am Stichkanal 1960 (SCH.). P Park Sanssouci, jährlich besonders in der Umgebung des Bot. Gartens (RÜFFLE). Lb am Sportplatz beim Schloßturm 1961 (BIALUCHA).
- \**Claytonia perfoliata* Donn ex Willd.: Pe Garten in der Karlstr. seit 1956. P Sanssouci, als Unkraut im Botanischen Garten 1960 (F.); Werder, Kemnitzer Chaussee, auf den Grundstücken 138/140, bis 1950 (WERNICKE). Co Parkanlagen 1960 (KR.).
- Agrostemma githago* L.: Pr Getreidefeld am Unteruckersee (SCHONERT). Feldberg Felder am Plattenberg, spärlich 1958. Te Lychen, Straße am Oberpfuhl 1958. Br am Gallberg; am Chausseerand bei Gollwitz (ULR. u. Vo.). P Äcker an der Straße zw. Bornim und Marquardt 1957 (F.); Tremsdorf, südwestl. des Dorfes 1955 (GÖTZ).
- \**Silene conica* L.: Od Pimpinellenberg 1940 (E. SCHENK). B Heiligensee, Straßenrand der Hennigsdorfer Str., 1961 (FRIEDRICH u. MOLLENHAUER).
- \**S. dichotoma* Ehrh.: Pu Schmolde, in Feldkulturen 1952 (L.). B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee, an zwei verschiedenen Stellen 1961 (SCH.). P Havelufer am Außenring unweit Templin (BENKERT); Teltow, an der Potsdamer Str., 1942. Tr Ludwigsfelde, Autobahnböschung 1949 (L.).

- \**S. gallica* L. var. *quinquevulnera* (L.) M. et K.: B Gatow, unter Serradella 1961. — Heimat: Westeuropa, Mittelmeergebiet. (SCH.).
- S. chlorantha* (Willd.) Ehrh.: L Gr. Radden am südl. Dorfausgang, am Weg nach Willmersdorf, etwa 20 Pfl. im nitrophil beeinflußten Sandtrockenrasen 1961 (F.).
- S. tatarica* (L.) Pers.: Fb auf den Oderwiesen hinter der Stadt, 1932 (LADEMANN).
- S. otites* (L.) Wibel: Eb Sandkrug 1907 (F. BERGER). B Gatow, am Windmühlenberg 1957 (SCH.); Grunewald, Sandhang an der Nordseite der Lieper Bucht 1958 (WERNICK, WA.). Br Kahler Berg bei Zachow 1961. P Burgwall in Knoblauch; südwestl. Ketzin an der Fährstelle nach Schmergow; Gehrensberg östl. Schmergow; Trebelberg bei Schmergow 1961 (F.). Fb Neuzelle/Oder, Hohlweg zum Fasanenwald 1922. Mi Großmachnower Weinberg 1928. Tr Löwendorfer Berg 1922 (L.). W Elbtalhang östl. der ehem. Militärbadeanstalt. Je etwa 2 km westl. Elster bei der Windmühle (Hdz. u. STRI.); beim Sportplatz Prettin (STRI.).
- Melandrium rubrum* (Weig.) Gärcke: B Spandau, im Forst, 1960 an der Brücke in Jg. 45 (FRIEDRICH); Steglitz, Schmidt-Ott-Ecke Arno-Holz-Str. unter Gebüsch am Gartenzaun 1961 (SCH.); Lankwitz, Beyendorffpark 1957 (W. KRÜGER); Müggelsee, am Uferweg hinter Müggelperle 1961 (EICHNER). T Niemegk, Werdermühle 1961 (KR.). W westl. Griebo am Bach. Je Burg Klöden (STRI.).
- M. noctiflorum* (L.) Fries: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961. Auch das in VBVB 98—100 (1960): 36 gemeldete *M. macrocarpum* aus dem Bez. Kreuzberg ist *M. noctiflorum*. (SCH.).
- \**M. macrocarpum* (Boiss.) Willk.: Die Fundmeldung in VBVB 98—100 (1960): 36 ist irrtümlich; s. unter *M. noctiflorum*. (SCH.).
- Cucubalus baccifer* L.: Je am Deich westl. und nordwestl. Schützberg; Ostrand von Kleindröben; an der Straße Kleindröben-Mauken; östl. Mauken, Gebüsch südl. der Straße vor dem Riß; nördl. Axien im Wald (STRI.).
- Vaccaria pyramidata* Med.: B Wittenau, Müllplatz bei der Kolonie Bürgersruh 1960; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961 (SCH.).
- Dianthus armeria* L.: L Wall in Kahnsdorf 1960 (F.).
- Stellaria nemorum* L.: Sz im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959 (F.).
- St. alsine* Grimm: B Frohnau, am Hubertussee 1958 (WA.).
- St. crassiflora* Ehrh.: Or Zwischenmoor am Nordufer des Lubowsees 1961 (KR.).
- Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk.: L am Weg Stiebsdorf-Crinitz am Bahnübergang im Sedetalia-Rasen 1960 (F.).
- M. viscosa* (Schreb.) Sch. et. Thell.: Tr reichlich auf einem Roggenfeld an der Schützenstr. 1927 (L.).
- Corrigiola litoralis* L.: W Fähre Coswig; Bootsverleih Wittenberg. Je Gallin; westl. Elster bei der Windmühle (Hdz. u. STRI.); Gorsdorf; Fähre nach Pretzsch; Fähre nach Wörblitz; Fähre Prettin (STRI.).
- Illecebrum verticillatum* L.: Br Trechwitz, Kiesgrube (SCHONERT). Zo nahe Fauler See bei Sperenberg 1960 (RÜFFLE). L Bergen, Lichtung eines feuchten Kiefernwaldes südl. des Dorfes, in Mengen mit *Hypericum humifusum*, *Juncus bufonius*, *Holcus mollis* und *Gnaphalium uliginosum*, 1961; Borns-

dorf, Äcker südöstl. des Dorfes, in der feuchten Lammkraut-Flur 1961 (F.).

\**Herniaria hirsuta* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1961 (an einer anderen Stelle des ausgedehnten Geländes; s. Fundmeldung in VBVB 98—100: 36) (SCH.).

*Ceratophyllum submersum* L.: Pr Stadtpark, im Fischteich (SCHONERT). B Britz, Tümpel innerhalb der Hufeisensiedlung 1960; Mariendorf, Tümpel an der Richterstr., 1960, 1961; Zehlendorf, im Nikolassee 1960 (SCH.).

*Trollius europaeus* L.: Pr am Strom bei Gollmitz; Schönermark (SCHONERT).

\**Eranthis hiemalis* (L.) Salisb.: Sz Park von Beetzendorf 1959, eingebürgert (F.).

*Nigella arvensis* L.: Od Südufer des Parsteiner Sees nordwestl. Pehlitz, Brache (JA.); Äcker bei Brodowin mehrmals. Bu Äcker bei der Pritzhagener Mühle (F.).

\**N. damascena* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet, Vorderasien. (SCH.).

*Clematis recta* L.: Je westl. und nordwestl. Schützberg mehrfach; dicht nordwestl. Gorsdorf am Deich; östl. Gorsdorf; östl. vom ehem. Vorwerk Lug (STRI.).

*Anemone silvestris* L.: St östl. Alt-Rüdersdorf 1961, sicher Ausstrahlung von Rüdersdorf (WEYMAR, WIŚNIEWSKI). Gu Revier Eichhorst b. Pinnow Jg. 129, 1960 (GROSSER).

*Pulsatilla pratensis* (L.) Mill.: Te Lychen, Kiefernwald am Südufer des Wurlsees, spärlich 1958 (F.). Ge am Bahndamm bei Herrenhölzer (KR.). Br auf der Insel Buhnenwerder im Plauer See 1961. P Trebelberg bei Schmargow 1961 (F.).

*Myosurus minimus* L.: Tr Roggenacker auf der „Breite“ 1928; Wiesenrand südl. vom Stauwehr der Nuthe 1929; Roggenacker am Weg nach Glau 1928 (L.).

*Ranunculus arvensis* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (2) 1961 (SCH.). Tr Roggenfeld am „Schleusenwall“ 1922—1929. Bz Brück, Wiesenweg an Nordseite der Stadt 1932, Kümmerform; Roggenfeld an Südseite der Stadt vor der Bahnstrecke 1933 (L.). Je östl. Kleindröben (STRI.).

*R. sardous* Cr.: Od westl. Brodowin (JA.). Tr Blankensee, an den Gutsscheunen, vereinzelt 1927 (L.).

*R. polyanthemus* L.: Pr Acker zw. Warnitz und Melzow (SCHONERT). Je etwa 1,5 km nordwestl. Mauken (STRI.).

*R. lanuginosus* L.: Pr Arendsee, Gutspark 1951; Forst Gramzow 1953 (L.).

*R. auricomus* L.: Die brandenburgischen Formen des *auricomus*-Komplexes sind z. Z. unbestimmbar und bedürfen deshalb einer kritischen Revision. B auffällig 1960 eine Form in Kladow, Rohrsängersteig, am schattigen Straßenrand mit *Urtica dioica*; Honigblätter verkümmert und alle Blätter tief geteilt. (SCH.).

*R. circinatus* Sibth.: Pr Lützlow 1953 (H. SCHMIDT). B Rahnsdorf, Wasserloch im Nordzipfel der Krummen Laake 1948 (Rs.). Tr Blankensee, Bucht am Strandhotel mit *R. fluitans* 1927 (L.).

*R. aquatilis* L. = *R. heterophyllum* Weber: B Spandau, in der Kuhlake 1960, det. HAMANN et WAGENITZ (U. et A. HAMANN).

*R. radians* Rével: Ein heterophyller Wasserhahnenfuß, aber Schwimmblätter im Gegensatz zu *R. aquatilis* tief geteilt; Artrecht strittig. B Wittenau, Graben südl. der ehem. Fasanerie 1960; Spandau, Stadtforst, Wasserlachen im Jg. 55; Köpenick, Teufelssee in den Müggelbergen 1959, leg. EICHNER (SCH.).

*R. trichophyllum* Chaix: Tr Christinendorf, Graben am Weg nach Märkisch-Wilmersdorf 1952; schlammiger Wiesengraben bei Paulshöhe 1927; Kliestower See, Nordufer 1928; Holzgraben in der Luckenwalder Str. mit *Stratiotes aloides* und *Hippuris* 1930; Priedel, Graben im Nordteil 1931; Bz Brück, Graben auf den Wiesen nördl. der Stadt 1932, 1933; Graben am Linther Oberbusch 1932, 1936 (L.).

*Thalictrum minus* L.: Te Lychen, Gandenitz, Westufer des Gr. Lychen-Sees 1958 (F.). Eb Westufer des Werbellin-Sees an der Fernstraße 198 nordöstl. Wildau (JA.). B Steglitz, beim Stadtpark an der Birkbuschstr. leg. REIMERS 1953, im Herbar REIMERS als „*Th. flexuosum*“ (SCH.); Grunewald, Jg. 112, 1960, leg. HAMER (SU.). P Burgwall in Knoblauch 1961. Br Windelberg bei Zachow 1961 (F.). Je nordwestl. Schützberg am Deich; Weinbergsrand nördl. Prettin (STRI.).

*Th. lucidum* L.: Je etwa 1,5 km nordwestl. Mauken an einem kleinen Gewässer am Deich (STRI.).

\**Adonis aestivalis* L.: L Äcker zw. Beesdau und Görlsdorf 1960 (F.).

*Corydalis cava* (L.) Schw. et K.: Pr Axelberge bei Gollmitz (SCHONERT). Ba im Park zahlreich im feuchten Eichen-Hainbuchenwald 1961. M Park in Hadersleben 1959 (F.).

*C. pumila* (Host) Rchb.: Le Amtsgarten 1961 (KR.).

*C. fabacea* (Retz.) Pers.: Br im feuchten Wald längs der Buckau zw. Neuemühle und Görtsgräben (ULR. u. VO.).

\**C. lutea* (L.) DC.: Sz Mauern der Burgruine in Beetzendorf 1959. L Mauer nahe der Kirche und am Friedhof 1960 (F.).

*Fimaria vaillantii* Lois.: Br häufiges Gartenunkraut, auch Marienberg, det. H. SCHOLZ (ULR. u. VO.).

\**Brassica nigra* (L.) Koch: B Spandau, Müllschüttung bei den Egelpfuhlwiesen 1961 (SCH.).

\**Erucastrum gallicum* (Willd.) O. E. Schulz: Br Havelufer nördl. Götz am Korsäthenbruch 1961. P Bauplatz an der Hauptpost; Schuttplatz im Katharinenholz 1960 (F.).

\**Hirschfeldia incana* (Jusl.) Lagr.-Foss.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (2) 1961; Steglitz, Ödland an der Gelieustr., 1961 (SCH.).

\**Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy = *Brasicella erucastrum* O. E. Schulz: B Spandau, an einem Vorgarten in der Görklstr., 1961. — Zur Nomenklatur vergl. DANDY in Watsonia 4 (1957): 41. (SCH.).

\**Sinapis alba* L.: B Spandau, Müllschüttung bei den Egelpfuhlwiesen 1961 (SCH.); Steglitz, am Finanzamt 1959 (SU.).

\**Diplotaxis erucoides* (L.) DC.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Iberische Halbinsel, westl. Nordafrika. (SCH.).

\**D. muralis* (L.) DC.: Eb Niederfinow 1907 (F. BERGER). Br an der Neuen-dorfer Str. u. a. Orten; Kirchmöser 1960 (F.). Bz Bhf. Brück, 1934. Tr

- Güterbf. Ludwigsfelde 1952 (L.). **L** Ringwall bei Freesdorf 1960 (F.).  
**Gu** auf dem Viehmarkt 1931 (LADEMANN); **Je** auf dem Bahndamm südl. Hohndorf (STRI.).
- \**D. tenuifolia* (Jusl.) DC.: **F** Lossower Berge (KARSTÄDT). **L** Bahnhof Luckau 1960 (F.).
- \**Rapistrum perenne* (L.) All.: **Bz** am oberen Ende der Rummel hinter der kath. Kapelle in Wiesenburg; Schlamau, 1954 beobachtet, aber wieder verschwunden (SCHM.).
- \**R. rugosum* (L.) All.: **B** Spandau, Uferweg an der Havel nördl. der Freybrücke 1961; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1961, an 2 Stellen (SCH.).
- \**Moricandia arvensis* (L.) DC.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: westl. Mittelmeergebiet. (SCH.).
- \**Conringia orientalis* (L.) Dum.: **Tr** Ludwigsfelde, vereinzelt an der Autobahn 1948 (L.).
- \**Lepidium virginicum* L.: **St** in Seebad Rüdersdorf 1961 (STRI. u. SEIDEL). **B** Wittenau, an der Güterbahn beim Quickborner Weg, 1961; Kladow, Fuchserberge häufig, auch Imchenplatz und Nailaer Weg 1960 (SCH.).
- \**Lepidium campestre* (L.) R. Br.: **Pr** Acker zwischen Warnitz und Melzow (SCHONERT). **B** Friedrichshagen, Waldweg im Jg. 292, 1961 (EICHNER). **Tr** Ludwigsfelde, Bahngelände vor Haltestelle Birkengrund-Süd 1948 (L.). **Gu** Viehmarkt 1931 (LADEMANN). **L** Freesdorf auf dem Ringwall; Uckro, 1960; an der Straße von Gehren nach Walddrehna 1961 (F.).
- \**L. sativum* L.: **B** Steglitz, Amfortasweg, 1950 (Rs.).
- \**L. densiflorum* Schrad.: **Br** Schenkendorf am Straßenrand zahlreich 1961 (F.). **P**, **Tr** um Stahnsdorf, Kleinmachnow, Teltow, Trebbin auf Sandflächen und an trockenen Wegrändern verbreitet, 1922—1932; Ludwigsfelde, an und nahe der Autobahn 1947—1953 (L.). **KöW** südwestl. an Wernsdorf; nördl. Niederlehme (JA.).
- \**Cardaria draba* (L.) Desv.: **Na** Bahnhof Wustermark 1961. **Br** Kiesgrube am Kl. Kreutzer Weinberge 1961; Bhf. Nauen 1961 (F.). **P** Stahnsdorf, an der Potsdamer Chaussee 1943. **Bz** Brück, an der Bahnstrecke nördl. vom Bhf. 1935 (L.). **L** Crinitz nahe Bhf. Drehna, Schutthaufen an kleinen Teichen (KLIX).
- Coronopus squamatus* (Forsk.) Asch.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.). **L** Dorfanger von Freesdorf 1960 (F.).
- Biscutella laevigata* L.: **Je** nordwestl. Schützberg; südl. Schützberg bei der Windmühle; am Radweg Klöden-Kleindröben ein einzelnes Exemplar; hohe Düne nordwestl. Düßnitz; ehemalige Ziegelei südöstl. Prettin. — An allen Stellen, vor allem durch Sandabfuhr, stark bedroht. (STRI.).
- Thlaspi perfoliatum* L.: **W** Abhang zum Elbtal am Ostrand der Stadt, etwas südl. der Ziegelei beim NSG, 1957 etwa 30 Exemplare unter Gebüsch am obersten Hochwasserrand. Die Samen dieser Art werden anscheinend öfter durch Hochwasser weit hinabgeschwemmt. Im Herbar des Naturkundlichen Heimatmuseums Leipzig liegen 1953 von O. FIEDLER gesammelte Exemplare vom Elsterrand b. Stahmeln westl. Leipzig, die wohl aus der Gegend von Gera stammen. Ebenso trat die Pflanze 1938 „stellenweise häufig, später nicht mehr“ im am Elbufer liegenden Stadtpark von Riesa auf, auch weit außerhalb ihres Areals. (STRI.).

- \**Tb. alpestre* L.: W westl. Griebo an der Straße nach Coswig, am Bach und weit bachaufwärts (HDZ. u. STRI.). Je westl. Gorsdorf; nordwestl. Schützberg; nördl. Burg Klöden; südl. von Schützberg; nordöstl. Kleindröben; Straße Fährhaus-Prettin. Im Kreis Jessen fast nur am Elbdeich. (STRI.)
- Neslia paniculata* (L.) Desv.: L Äcker zw. Beesdau und Görlsdorf 1960 (F.).
- \**Bunias orientalis* L.: Or Kremmener Luch, 1,5 km südöstl. Moorhof 1960. L Kahnsdorf an der Hühnerfarm 1960 (F.).
- \**Euclidium syriacum* (L.) R. Br.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961. — Heimat: Südosteuropa bis Mittelasien. (SCH.)
- Cardamine impatiens* L.: Eb ostsüdwärts Forsthaus Voigtwiese an der Straße Joachimsthal-Golzow (JA.). P Sanssouci, unweit der Friedenskirche (BENKERT).
- C. hirsuta* L.: B Lichterfelde, Enzianweg in der Kolonie Giesendorf, auf Schotter an einem Gartenzaun 1960 (SCH.); Zehlendorf, Späths Baumschulen in der Finkensteinallee, sehr häufig im Freien und in Kästen 1961 (SU.). P Sanssouci, Unkrautpflanze im Botanischen Garten, auch in Frühbeeten und in den Gewächshäusern 1960 (F.); Havelhänge nach dem Forsthaus Templin hinaus 1958 (BENKERT).
- C. parviflora* L.: Or Birkenwerder, an der Briese 1908 (F. BERGER). Ro feuchte Wagenspur an der Dorfstraße nördl. Golmenglin, 1 Expl. 1954 (HDZ. u. STRI.).
- C. amara* L.: B Frohnau, in Gräben am Hubertus-See 1958 (E. SCHMIDT); nordöstl. Lübars am Tegeler Fließ 1947 (ME.), 1958 (W. KRÜGER).
- C. bulbifera* (L.) Cr.: Feldberg Conower Werder häufig 1958 (F.).
- Barbarea stricta* Andrz.: Je nordwestl. Schützberg am Deich (STRI.).
- Rorippa austriaca* (Cr.) Bess.: Je nordwestl. Prettin als Getreideunkraut bei der Müllgrube und vor dem Altwasser 1956 (STRI.).
- \**Matthiola longipetala* (Vent.) Mgf.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960. Lw Schutt bei der Försterei Lindhorst 1960, leg. HUDZIOK. — Hierzu als Synonym der in VBVB 98—100 (1960): 38 gewählte Name *M. oxyceras* DC. Vgl. MARKGRAF in HEGI 4 (1959): 160. (SCH.)
- Erysimum hieraciifolium* Jusl.: Je Klöden; Kleindröben; Stadtmauer Prettin (STRI.). — Subsp. *virgatum* (Roth) Sch. et Thell.: B S. VBVB 98—100 (1960): 38. Die fehlende Subspeziesbezeichnung für die Pflanzen in Lichterfelde am Teltowkanal — auch noch 1961 — sei hiermit nachgetragen. (SCH.)
- \**Sisymbrium irio* L.: B Wittenau, Wilhelmsruher Damm 1961 (SCH.).
- \**S. loeselii* Jusl.: Br Bahnhof und auf Schuttplätzen in der Stadt häufig; Etzin; Dahmsdorf; Mötzow; Päwesin 1961. P Knoblauch 1961 (F.); Kleinmachnow, am Teltowkanal 1947; Potsdam, Uferweg 1942. Tr Ludwigsfelde an der Bahnstrecke, bes. nach Birkengrund hin sehr zahlreich und in den Jahren 1948—53 das *S. altissimum* immer mehr zurückdrängend (L.). Je Düne nordwestl. Düßnitz; Fähre nach Pretzsch; Sportplatz Prettin (STRI.).
- \**S. altissimum* L.: Br häufig auf dem Bhf. und Gesteinstrümmern der Stadt 1960; Kirchmöser; Dahmsdorf 1961. P Krähenberg in Caputh 1960 (F.); auf dem Küssel, vielfach 1948—1953; Bhf. Stahnsdorf, 1926; an den Wegen nach Güterfelde und Sputendorf 1924. Zo Bahnstrecke bei Mellen-

- see 1925. Tr Ludwigsfelde, Bahnstrecke, vielfach 1948—53. J Werder, an den Wegen zur Kleinbahn und zur ehem. Militärbahn 1923 (L.). T Treuenbrietzen an der Chaussee nach Tiefenbrunn 1960; L Bhf. Luckau 1960 (F.).
- \**S. orientale* Torner: B Schöneberg, Martin-Luther-Str. Ecke Rosenheimer Str., mehrere Pflanzen auf einer planierten Ruinenfläche 1961 (SCH.).
- \**Camelina microcarpa* Andr.: Pr Gramzow, Weg zum Zehnebecker Wald 1953 (H. SCHMIDT). P Ufer des Kanals am Golmer Luch 1956 (RÜFFLE). Tr Galgenberg 1927; Bahnwall am Bohldamm 1930 (L.).
- \**Reseda lutea* L.: Pr Gramzow, Weg zum Zehnebecker Wald 1953 (H. SCHMIDT). Br Kirchmöser am Weg zum Wusterwitzer See 1960 (F.). Tr Galgenberg 1927; Vorortbhf. Ludwigsfelde 1947; Bahnstrecke bei Birkengrund-Süd 1948. Zo Teltow, Potsdamer Str., 1942 (L.).
- R. luteola* L.: Ge Schoppsdorf, Gelände der Autobahnverwaltung (ULR. u. Vo.).
- \**R. alba* L.: B Lichterfelde, Schuttplatz am Stichkanal 1961 (FRIEDRICH u. SCH.).
- Sedum rupestre* L.: B Gatow, Windmühlenberg 1961 (SCH., SU.); Müggelheim, Müggelheimer Damm am Chausseehaus 1954 (SCH. u. SU.); Gosen, Gosen-Berge östl. der Schillerwarte 1960, 1961 (FRIEDRICH, SCH., SU., WA.).
- \**Sempervivum tectorum* L.: A bei einem erneuten Besuch des Jungfernberges bei Stolzenhagen 1960 konnte festgestellt werden, daß es sich bei den dort in der Wiesensteppe wachsenden wenigen Exemplaren nicht um *S. soboliferum*, sondern um *S. tectorum* handelt. Die Angabe bei MÜLLER-STOLL u. KRAUSCH (Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen, 2. Reihe) Wiss. Z. Pädag. Hochschule Potsdam, Math.-nat. Reihe 4 (1959): 122 ist entsprechend zu berichtigen. Die Art dürfte an dieser Stelle ausgepflanzt worden sein. (KR.).
- Saxifraga tridactylites* L.: B Spandau, Äcker und Schonungen am Niederneundorfer Kanal 1961 (SCH.).
- \**Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.: Bz in größerer Menge verwildert bei Lübnitz; bei der Werder-Mühle im Planetal 1954—1962 (SCHM.).
- Rubus saxatilis* L.: L Borchelts Busch im Südwestteil nach Beesdau zu, zahlreich im Erlbruch unter Fichten 1960 (F.).
- Potentilla collina* Wibel: J Nordrand von Merzdorf 1957 (HDZ.).
- P. sordida* (Fr.) Zimm.: Bz Brück, Kiefernwald an der Kleinen Plane nahe der Silberbrücke 1932 (L.).
- \**P. recta* L.: B Siemensstadt, auf dem Gelände des Wasserwerkes an der Rohrdammbrücke 1961 (SCH. u. SU.); Charlottenburger Schloßpark 1961 (SCH.); am Scholzplatz 1960, det. H. SCHOLZ; Grunewald, Avusausfahrt am Gr. Stern 1960 (FIUCZYNSKI); Zehlendorf, Schwarzer Grund 1953 (RS.); Dahlem, van-t'Hoff-Str., zw. den Universitätsneubauten 1961; Tempelhof, Götz-Ecke Ringbahnstr. 1961 (FRIEDRICH); Wannsee, Pfaueninsel, Meiereiwiese 1961 (SU). St Rüdersdorf, Straße zum großen Steinbruch 1925. P Stahnsdorf, an Gebüsch nahe der Kirche 1928 (L.). Je Südrand des Kiefernwaldes südöstl. Prettin ein Ex. 1956 (STRI.).
- Potentilla supina* L.: Na Pessin, Dorfstraße 1961 (RÜFFLE). St Hirschfelde, Dorfteich (JA.). P Stahnsdorf, grasige Brache hinter der Mühlenstr. am Fußsteig zum Friedhof 1946 (L.). Je in Elster (HDZ. u. STRI.).

\**P. norvegica* L.: Pr Weggun, Senke am Bahnhof 1951 (H. SCHMIDT). St Hirschfelde, Dorfteich (J.A.). P Kleinmachnow, Nordufer des Teltowkanals östl. der Schleuse auf Torfboden 1926 u. 1945 (L.). L Borchelts Busch bei Frankenfelde an der Berste 1960; am Schlagteich bei Riedebeck 1961 (F.).

\**P. intermedia* L.: B Grunewald, auf Lindwerder 1960 (SCH. u. SU.); Steglitz, Birkbuschstr. am Birkbuschgarten 1951 (Rs.).

*P. anglica* Laich.: Pr Weggun, Westseite des Schulzensees 1950; nördlich vom Petznicksee 1951. Te Schorfheide bei Kappe 1949 (H. SCHMIDT). St Rüdersdorf, am Weg nach Stolp 1942 (L.).

*Agrimonia procera* Wallr.: B Spandau, am Forstamt 1959 (PATZKE). — Neue Literatur: SKALICKÝ in Acta Horti Bot. Pragensis 1962: 87—108 (SCH.).

*Sanguisorba officinalis* L.: Na Wiesen südl. der Bredower Forst (F.).

*S. minor* Scop.: Feldberg trockene Hügel am Bahnhof. Od bei Brodowin. Na am Südrand der Bredower Forst. P an der Bahnstrecke Wildpark-Eiche-Golm nahe am Wasserturm (F.).

\**S. muricata* (Spach) Gremli = *S. minor* Scop. subsp. *muricata* (Spach) Brig.: B Teltowkanal gegenüber Lichterfelder Hafen 1961, mit *S. minor* (s. VBV 98—100: 39). — *S. muricata* ist in allen Teilen größer als *S. minor*, ihre Kelche in der Fruchtreife auffällig runzelig-vertieft (nicht nur netzartig gemustert wie bei *S. minor*). Fundmeldungen von *S. minor* aus der Mark Brandenburg von Bahndämmen und Böschungen dürften sich wenigstens in einigen Fällen auf *S. muricata* beziehen. *S. muricata* ist in Südeuropa heimisch. Mit Gras- oder Futterpflanzensaaten wird sie oft in nördl. Gegenenden eingeführt oder eingeschleppt. (SCH.).

*Aphanes microcarpa* (Boiss. et Reut.) Rothm.: Te Kappe bei Zehdenick, Roggenfeld, confirm. ROTHMALER (H. SCHMIDT 1951).

*Alchemilla hybrida* L. s. str.: Fb Neuzelle, Wäldchen vor der Schlabener Mühle 1922 (L.).

*A. vulgaris* L.: Alle im folgenden verzeichneten *Alchemilla*-Arten aus dem Herbar LEMKE (Sammler: BERGER, LEMKE, SCHMIDT) wurden — wie *A. hybrida*, s.o. — von ROTHMALER revidiert. (L.).

*A. glabra* Neygenf.: Pr Weggun, sumpfige Wiese am „Torfloch“ 1950 (H. SCHMIDT).

*A. monticola* Opiz: B Tegel, Tivoli an der Havel 1907 (F. BERGER). J Kloster Zinna, Wall an der Nuthe 1913 (L.).

*A. gracilis* Opiz: Pr Weggun, Wiese am Petznicksee 1950; Weggun, Priesterwiese 1951 (H. SCHMIDT).

*A. acutiloba* Opiz: Pr Weggun, sumpfige Wiese am „Torfloch“ 1950 (H. SCHMIDT).

*Rosa* L.: Bei dem nachstehenden Fundortsverzeichnis der *Rosa*-Arten aus dem Herbar LEMKE (Sammler: LEMKE, SCHMIDT) sind die von E. SCHENK vorgenommenen Varietätsbestimmungen fortgelassen worden. Fundstellen von *R. canina* L., *R. dumetorum* Thuill. und *R. glauca* Vill. wurden nicht aufgeführt. (L.) Herr FISCHER übermittelte eine Fundortsangabe.

\**R. pomifera* J. Herrm.: Na am Forsthaus Bredow, hier bereits 1864 von ASCHERSON angegeben, 1960 (F.). Tr Ludwigsfelde, am Güterbahnhof 1952 (L.).

- R. omissa* Désegl.: **Pr** Lützlow 1953 (H. SCHMIDT). **Zo** Sperenberg, Gipsbrüche 1941 (L.).
- R. tomentosa* Sm.: **Pr** Weggun 1950; Parmen 1951 (H. SCHMIDT). **Tr** Kiefernwald der Böschung am Priedel 1928, 1931 (L.).
- R. rubiginosa* L.: **Pr** Weggun, mehrfach 1950, 1951 (H. SCHMIDT). **St** Rüdersdorf, mehrfach 1925 und später. **Tr** Klein-Schulzendorf, Wegrand 1931; Ludwigsfelde, an der Autobahnböschung (wohl angepflanzt) und in einer Rosenpopulation vor dem Birkenmoor westl. des Ortes 1948, 1952. **Lw** bei Schöneweide 1927 (L.).
- R. agrestis* Savi: **Zo** Sperenberg, Gipsberge 1941 (L.).
- R. elliptica* Tausch: **Zo** Sperenberg, Gipsbrüche 1941 (L.).
- R. coriifolia* Fr. s. str.: **Pr** Weggun 1950; Parmen 1950; Lützlow 1951 (H. SCHMIDT). **St** Rüdersdorf, am Kalkgraben 1941; am Tiefbau 1941. **Zo** Sperenberg, Gipsberge 1941. **Tr** Ludwigsfelde, Autobahnböschung, sicher Anpflanzung 1950 (L.).
- Genista germanica* L.: **L** Wald südlich Gehren 1960 (F.).
- \**Medicago polymorpha* L. var. *polymorpha* = *M. hispida* Gaertn. var. *macracantha* (Webb et Berth.) Briq. (s. van OOSTSTROOM u. REICHGELT in Acta Bot. Neerl. 7, 1958: 115—116.): **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).
- M. minima* (L.) Grubf.: **Fb** Neuzelle/Oder, an der Wenzelsburg 1922; Hänge am Paradies 1922 (L.).
- Trifolium montanum* L.: **P** Knoblauch, Burgwall 1961; Trebelberg bei Schmergow 1961. **L** südl. Kahnsdorf im Molinietum; Straßenrand nach Frankendorf 1961; Wegrand am Ringwall bei Freesdorf 1960 (F.).
- T. fragiferum* L.: **B** Heiligensee, Grabenrand bei der Schulzendorfer Str., 1960; Spandau, am Aaleman-Kanal und bei der Wannseeaten-Siedlung 1959 (SCH.).
- Lotus siliquosus* L.: **Br** am Wiesenweg zw. Jeserig und der Salzstelle bei Schenkenberg (ULR. u. Vo.).
- Astragalus cicer* L.: **Na** am Chausseerand nördl. Buchow-Karpzow 1960 (F.).
- \**A. ponticus* Pall.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (2) 1961. — Heimat: Vorderasien. (SCH.).
- Coronilla varia* L.: **Te** am Jagdschloß in Mahlendorf 1958; an der Straße von Lychen nach Küstrinchen, am Wurlsee. **P** Trebelberg bei Schmergow 1961 (F.). **Zo** sehr verbreitet, so um Trebbin, bei Ahrensdorf, Großbeuthen, Thyrow, Märkisch-Wilmersdorf, Sperenberg, Mittenwalde, 1922—1953 (L.).
- \**Onobrychis arenaria* (Kit.) Ser.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (2) 1961 (SCH.).
- Vicia dumetorum* L.: **Feldberg** im Forst Jg. 105, zerstreut zw. Schloßberg und Tannengehöft 1951 (STR.), 1958 (F.); Gehölz an der Ruine in Schlicht 1958 (F.).
- Vicia tenuifolia* Roth: **Od** Teufelsberg bei Liepe 1950 (STR.).
- \**V. benghalensis* L.: **B** Kladow, unter Serradella am Ritterfelddamm 1960; Zehlendorf, am Feldrain beim Gut Düppel 1961, leg. ECKERT u. MÜNZEL. — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.).

- \**V. grandiflora* Scop.: **F**eldberg Sandtriften am Plattenberg, zahlreich 1958 (F.). **B** Heiligensee 1958, det. H. SCHOLZ (W. KRÜGER).
- \**V. lutea* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960 (SCH.).
- \**V. pannonica* Cr.: **O**d westl. Brodowin auf Stoppel (JA.). **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960 (SCH.). **L** Freesdorf, im Getreidefeld am Ringwall 1960 (F.).
- \**Lathyrus aphaca* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960 (SCH.); Friedenau, Saarstr., in einem wüsten Vorgarten 1958; Beckerstr. 1958 (SCH.-M.) und Südwestkorso 1959; Steglitz auf dem Ödgelände am „Insulaner“ südl. der Bergstr. 1957 (FRIEDRICH) und am Finanzamt 1959 (SU.).
- \**L. tuberosus* L.: **E**b an der Bahn bei Biesenthal (km 29,7). **O**r nördl. von Mühlenbeck am Rande der großen Tongrube 1961 (WIŚNIEWSKI). **B** Witte-nau, am Feldweg bei der Kolonie Rathenow 1960 (SCH.). **Br** Nähe Bahnhof Gördern (ULR. u. Vo.). **L** Äcker an der Chaussee nach Frankendorf 1960; Äcker östl. Zaacko 1960 (F.).
- \**L. odoratus* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1960. — Zier-pflanze aus dem Mittelmeergebiet. (SCH.)
- \**L. hirsutus* L.: **B** Lichterfelde, Schuttplatz am Stichkanal 1961 (SCH.).
- \**Oxalis corniculata* L.: **B** Schöneberg, an einer Fabrikmauer in der Naumannstr. beim Tempelhofer Weg, 1961 (SCH.).
- \**Geranium phaeum* L.: **H**elmstedt Park in Harbke, zahlreich und eingebürgert 1959 (F.).
- G. pratense* L.: **B** Charlottenburg, am Bahnhof Westkreuz (BENKERT).
- \**G. pyrenaicum* Burm. f.: **P** Stadtspark, am Friedrich-Engels-Ufer auf Gras-plätzen; Wegrand in der Siedlung beim Wasserwerk (SCHONERT). **B** Buch, östl. der Karpfenteiche 1961 (EICHNER); Gatow, Windmühlenberg 1960 (SU.) und Hüllpfuhlenden 1959 (SCH. u. SU.). **P** Wegrand in Petzow (BEN-KERT); Gütersfelde, am Gut 1942 und am Park 1943 (L.). **Je** an der Lichtenburg (STRI.).
- \**G. sibiricum* L.: **B** Eine Nachbestimmung des unter *G. divaricatum* veröffent-lichten Fundes (VBVB 98-100 : 40) ergab die oben genannte Art. (SCH.).
- G. dissectum* Jusl.: **L** Ackerrand östl. Gliechow, zum Wald hin 1961 (F.).
- G. columbinum* L.: **P** Zahlreich am Weg zw. Marnitz und den Marnitzer Buchen 1961 (F.). **F**b Neuzelle, Wellmitzer Höhen und am Fasanenwald 1922 (L.).
- \**G. divaricatum* Ehrh.: **B** Die Art wurde 1959 in Berlin nicht gefunden; siehe unter *G. sibiricum*. (SCH.).
- \**Ruta graveolens* L.: **B** Zehlendorf, 1956 am Teltowkanal bei der Wismarer-Str., aus Gartenkultur verwildert (SCH.).
- Polygala comosa* Schkuhr: **P** Park Sanssouci am Prinzengarten nahe dem Chine-sischen Tempel 1956 (F.); Springbruchwiesen (BENKERT).
- \**Mercurialis annua* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).
- M. perennis* L.: **Sz** Park in Beetzendorf 1959 (F.).
- Euphorbia falcata* L.: **P** Unkraut im Paradiesgarten an der Maulbeerallee, 1957 (F.).

*E. exigua* L.: **L** Äcker zw. Beesdau und Görlsdorf 1960 (F.).

*Callitricha hamulata* Kützing: **B** Heiligensee, in einer feuchten Senke der Baumberge 1959; Rudow, in einem Graben am Fließ 1960. — Neuere Literatur über *Callitricha*: DETTMANN in Archiv Freunde Naturgesch. Mecklenburg 5 (1959): 360—361; DERSCH in Hessische Florist. Briefe 14 (1965): 35—44. (SCH.).

*Impatiens noli-tangere* L.: **Pr** in Gollmitz am Bach (SCHONERT). **Kl** Jemmeritz im Sauren Grund 1959. **Sz** im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959 (F.).

\**I. glandulifera* Royle: **Str** Hoppegarten, nordwestl. des S-Bahnhofes in der Nähe einer nassen Wiese am Wegrand 1960 (WIŚNIEWSKI). **B** Wittenau, auf Gartenauswurf südl. der ehem. Fasanerie 1961 (SCH.).

\**Hibiscus trionum* L.: **B** Schöneberg, auf Schutt an der Bayreuther Str., 1960, (SCH.).

\**Abutilon theophrasti* Med. = *A. avicennae* Gaertn.: **B** Lichterfelde, Schuttplatz am Stichkanal 1960. — Heimat: Südosteuropa und wärmeres Asien. (SCH.).

\**Lavatera thuringiaca* L.: **B** Grunewald, an der Teufelsseehaussee beim Trümmerberg 1961 (SCH.).

*Malva alcea* L.: **Pr** in Ruderargesellschaft an einem Zaun am Kap, Trinkwasserbrunnenanlage (SCHONERT); Parmen, am Bahndamm 1953 (H. SCHMIDT). **Te** hinter der Landesschule 1949 (H. FRITSCH). **B** Flugplatz Tegel 1959, det. H. SCHOLZ (SU.). **P** Groß-Kreutz, Chausseegraben zw. Gr. Kreutz und Deetz; Nähe des Königsberges (ULR. u. VO.). **Tr** Hügel bei der Kliestower Ziegelei (3) 1957. **J** Dorf Werder, Feldweg an der Südseite des Dorfes 1922 (L.). **L** Drehna, Weinberg; Crinitz, Idastr. und Weg nach Babben im Ort; Drehna, Försterwiese am Sandteich (KLIX). **Je** ca. 1,5 km nordwestl. Mauken am Deich; an der Straße Mauken-Kleindröben (STRI.).

\**M. moschata* L.: **Feldberg** bei der Jugendherberge (F.). **B** Gatow, beim Gr. Glienicker Weg beständig (SCH.).

*M. pusilla* Sm.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961. — Autorenbezeichnung der Art nach JANCHEN, Catalogus Florae Austriae 1960: 949. (SCH.). **St** Hirschfelde, Dorfteich (JA.).

\**M. verticillata* L. var. *crispa* L.: **B** Schöneberg, Südgelände 1960. Auch die in VBVB 98-100: 41 gemeldete Pflanze aus Reinickendorf ist var. *crispa*. (SCH.).

*Hypericum humifusum* L.: **Sz** im Wohld zw. Dähre und Diesdorf, auf feuchten Waldwegen 1959. **Or** Liebenberg, in der Lanke mehrfach 1960 (F.). **Be** Wandlitz, Dageförde 1907 (L.). **B** Spandau, an den Rustwiesen 1954 (WERNICK); Spandauer Stadtforst, Weg zw. Jg. 14 und 15, 1957 (BOLZ); Mariendorf, Brachacker nördl. Britzer Str. 1961; Schmöckwitz, am Rande eines Moores Jg. 29 (SCH.). **P** Stahnsdorf, Brache vor dem Vorortbf. 1926; Güterfelde, Kiefernwald zw. den Chausseen nach Saarmund und Trebbin 1946. **Tr** Ludwigsfelde, lehmige Brache an der Nordseite der Autobahn nach Westen 1948; Bahnstrecke nach Birkengrund-Süd 1949; Weg am Sportplatz 1952 (L.). **KöW** Forst Friedershof Jg. 206, feuchter Sandweg 1946 (STR.).

*H. montanum* L.: **Bu** Müncheberg, Revier Radebrück Jg. 12 a, 1961 (F.).

*Elatine alsinastrum* L.: B Mariendorf, an einem Feldtümpel zw. Wildspitzweg und Britzer Str. 1961 (LENZ).

*Helianthemum nummularium* (L.) Mill.: P Königsberg bei Deetz (ULR. u. Vo.).

*Viola stagnina* Kit.: Je südöstl. Listerfehrda; nordwestl. Mauken (STRI.).

*V. hirta* L.: B Grunewald, Jg. 113, 1960, det. SUKOPP (HAMER). L Ringwall bei Freesdorf, Gehölz an der Berste nördl. Beesdau 1960 (F.).

*Daphne mezereum* L.: Od Königsweg Chorin-Brodowin, Jg. 110, ein Expl. weißblühend 1954 (JA.). Ro Brässener Bruch an der Rossel zw. Hundeluft und Bräsen noch ziemlich zahlreich 1960. L Park in Drehna verwildert 1961 (F.).

*Lythrum hyssopifolia* L.: Lb am Wege Schönwalde-Waldow, etwa 200 m hinter der Autobahn auf einem Lein-Brachfeld 1955 (BIALUCHA). L Langengras-sau und Gr. Kraußnigk auf dem Dorfanger in der Gänsefingerkraut-Flur zahlreich (bereits von BOHNSTEDT 1889 angegeben) 1961 (F.). Je Dorfteich in Kähnitzsch (STRI.).

\**Epilobium adenocaulon* Haussknecht: B Hermsdorf, 1960 an einem Baggerloch am Tegeler Fließ bei Str. 183; Steglitz, mehrfach in Vorgärten 1960, 1961; Grunewald, am Hundekehlssee, leg. U. HAMANN 1961; Neuer Schildhornweg in der Nähe des Teufelssees 1961; Bez. Mitte, feuchter Ruinenwinkel auf der Schloßinsel 1961; Bez. Kreuzberg, leg. SCHMACK als *E. spec.* (Herbar SCHMACK, jetzt Herbar Bot. Museum Berlin-Dahlem), ohne Datum und genauere Fundortangabe, aber nach dem Kriege gesammelt. — Mit den Aufsammlungen aus dem Jahre 1960 wurde die Art erstmalig im östl. Deutschland erkannt. (Sch.)

Vermutlich siedelt diese nordamerikanische Art unbeachtet schon längere Zeit in Berlin. Wie neuere Nachforschungen ergaben, findet sich *E. adenocaulon* zerstreut im gesamten Berliner Stadtgebiet, so daß in Zukunft auf die Mitteilung weiterer Fundmeldungen verzichtet werden kann. Es fehlen aber noch Fundortsangaben aus der Mark Brandenburg.<sup>1)</sup> In vielen Ländern Europas, von Russland bis Frankreich und den Britischen Inseln, und auch einigen Provinzen und Landesteilen Deutschlands — Rheinland, Hessen, Harz (eigene Beobachtungen) — hat sich die Art in den letzten Jahrzehnten weit verbreitet; s. LUDWIG in Hessischen Florist. Briefen 11 (1962): 29—32 mit ausführlichen Angaben über weiterführende Literatur. Bezugnehmend auf die Verschlüsselung von *E. adenocaulon* in ROTHMALER, Exkursionsflora von Deutschland, Kritischer Ergänzungsband 1963, sollen hier noch einige ergänzende Bemerkungen über die Polymorphie der Art angefügt werden. Folgende Varietäten wurden in Mitteleuropa beobachtet: var. *adenocaulon*, die typische Form mit abstehenden Drüsenhaaren an Blüten und Blütenstandsachsen (in Berlin nur diese Varietät); var. *parishii* (Trelase) Munz, mit nur angedrückten drüslosen Haaren im Blütenbereich (im Rheinland beobachtet); var. *occidentale* Trelease, mit größeren Blüten (Luxemburg). Vorerst empfiehlt es sich nicht, diese Varietäten im Artrang zu führen. Es muß damit gerechnet werden, daß zukünftig noch weitere Epilobien amerikanischer Herkunft in Deutschland bekannt werden, von denen dann vielleicht einige mit weitaus größerer Berechtigung

<sup>1)</sup> Nach Abschluß des Manuskriptes ging folgende Fundmeldung ein: J Kiesgrube bei der Grünaer Ziegelei 1964, confirm. H. SCHOLZ (Hdz.).

als Arten bewertet werden können. Aus Dänemark und Skandinavien sind schon gemeldet worden und teilweise eingebürgert: *E. americanum* Hausskn., *E. franciscanum* Barbey, *E. glandulosum* Lehm. und *E. halleanum* Hausskn. Das *E. rubescens* der skandinavischen Autoren gehört zu *E. adenocaulon*; echtes *E. rubescens* Rydberg wurde in Europa noch nicht gefunden. — Herrn Prof. Ph. A. MUNZ, Rancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont (California), danke ich für freundliche briefliche Auskünfte (1963) und für die Revision einiger in Deutschland, Luxemburg und Skandinavien gesammelter Epilobien. (SCH.)

*E. adnatum* Griseb. = *E. tetragonum* L. p. p.: B Die Art wurde in den letzten Jahren immer wieder an feuchten, sumpfigen Orten beobachtet und muß als verbreitet angesehen werden. *E. adnatum* ist anthropophil und dürfte erst in jüngerer Zeit an Individuenzahl zugenommen haben. Ältere Schriftsteller, so noch LACKOWITZ 1913 (Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg, 18. Auflg.) verzeichnen die Art als „sehr selten“. (SCH.)

\**Oenothera chicaginensis* De Vries ex Renner: P ehem. Stadtschloßgelände (BENKERT).

\**Oe. ammophila* Focke: P Brachacker östl. Schlänitzsee 1960, det. H. SCHOLZ; Gr. Siegbundberg bei Fahrland (BENKERT); Sandgrube des Krielower Berges (KR., BENKERT).

*Circaea alpina* L.: Feldberg im NSG Heilige Hallen 1958; Jagen 102 am Sprockwitz; Jagen 92. Pr Jungfernheide zw. Poviest und Klöben 1958. P Erlenbruch am Backofenberg bei Tremsdorf 1960 (F.).

*C. lutetiana* L.: B Britz, im Gutspark 1959 (SCH.).

*Myriophyllum verticillatum* L.: B Spandau, Teufelsseekanal 1955 (Koch); Schöneberg, Teich im Stadtpark 1961, schon von BOLLE im Schöneberger Fenn gefunden (ASCHERSON 1864) (SU.); Wannsee, Nordufer des Griebnitzsees 1961 (SCH.).

*Hippuris vulgaris* L.: Bu Buckower See, Ufer in der Röhrichtzone 1958. Br Nordufer des Netzener Sees 1955 (F.); Ufer des Bagower Sees (ULR. u. Vo.). P Golmer Luch südl. Nattwerder 1926 (GÖRITZ); Klostersee bei Lehnin 1957 (BENKERT). Zo Wünsdorfer See 1948 (STR.).

*Sanicula europaea* L.: Feldberg Feldberger Hütte und Conower Werder verbreitet 1958 (F.). Te „Buchheide“ nordwestl. Vietmannsdorf (JA.). Sz im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959. Fi Sonnewalde, am Forsthaus Brehnitz 1961 (F.).

*Eryngium planum* L.: Br Marienberg (ULR.).

*Chaerophyllum bulbosum* L.: Je am Deich zw. Iserbegka und Gallin; nordwestl. Schützberg; nordöstl. und südwestl. Kleindröben; Waldrand östl. Ziegelei Klöden; etwa 2 km südl. Hohndorf; beim Weinberghaus nördl. Prettin (STR.).

\**Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.: Pr Hecke am Stadtpark, Grabowstr. (SCHENKERT).

\**Scandix pecten-veneris* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1961 (SCH.).

\**Caucalis platycarpos* L. = *C. lappula* (Web.) Grande (s. HEYWOOD in *Agromonia lusitana* 22, 1960: 11—13.): B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961 (SCH.).

- \**C. latifolia* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960, 1961.  
**Br** Hauptstr. an der Jahrtausendbrücke 1961 (SCH.); am Weg zur Schiffs-  
werft (ULR. u. VO.).
- \**Coriandrum sativum* L.: **B** Steglitz, Mittel- Ecke Klingsorstr., 1961 (SCH.).
- Conium maculatum* L.: **A** Krähenberg bei Stolzenhagen 1950 (STR.). Je nördl.  
Kleindröben; in Düßnitz; südwestl. Hohndorf (STRI.).
- Apium repens* (Jacq.) Rchb. f.: **Br** Flutrasengesellschaft am Beetzsee bei Grabow,  
zusammen mit *Teucrium scordium* (F.).
- Pimpinella saxifraga* L. subsp. *nigra* (Mill.) Gaud.: **B** Spandau, an der Grenze  
beim Oberjägerweg 1958; Kladow, am Ritterfelddamm in der Höhe des  
Unkenpfuhls 1959. — Neuere Literatur: WEIDE in Fedd. Rep. 64 (1962):  
240—268. (SCH.).
- \**P. anisum* L.: **B** Lichterfelde, Schuttplatz am Stichkanal 1961, det. H. SCHOLZ  
(FRIEDRICH).
- Sium erectum* Huds.: **B** Hermsdorf, Graben am Tegeler Fließ 1960 (SCH.);  
Schildow, Naturschutzgebiet 1947 (KANDELER); Lübars 1959 (PATZKE).
- Silaum silaus* (L.) Sch. et Thell.: **B** Wittenau, Feuchtwiesen südl. der ehem. Fa-  
sanerie bei der Güterbahn 1961 (SCH.).
- Cnidium dubium* (Schk.) Thell.: **Or** Hennigsdorf, Teufelsbruch 1960 (L.). Na-  
bei Paulinenaue 1930 (H. KRÜGER). **B** Wannsee, Pfaueninsel, an der Erd-  
zunge 1961 (SU.). **L** südl. Kahnsdorf, auf Kalkmergel im Eu-Molinietum  
1961 (F.). Je am Deich zw. Iserbegka und Gallin; südöstl. Listerfehrda;  
etwa 1,5 km nordwestl. Mauken; östl. vom Riß nördl. der Straße Mauken-  
Düßnitz; nordöstl. Axien; etwa 1 km östl. Meuselko; nordwestl. Meuselko;  
nordwestl. Waltersdorf (HDZ. u. STRI.).
- \**Heracleum mantegazzianum* Somm. et Lev.: **A** Stolzenhagen, an dem das  
Dorf durchfließenden Bach auf eutrophiertem lehmigem Boden seit einigen  
Jahren in 2—3 Dutzend Exemplaren, bis 3 m hoch werdend (KR.).
- Chimaphila umbellata* (L.) Barton: **Pr** Weggun, Kiefernwälder östl. u. westl.  
vom Schulzensee 1950/51 (H. SCHMIDT). **Te** Wald am Fährsee 1949  
(H. FRITSCH). **Fb** Neuzelle, Wald hinter dem Schützenhaus 1922. **Bz** Brück,  
Kiefernholzwald an der Möllendorfer Str., 1932 (L.).
- Ramischia secunda* (L.) Opiz: **Pr** Weggun, Westseite des Schulzensees vor dem  
Kiefernholzwald 1950 (H. SCHMIDT). **P** Kleiner Ravensberg 1923. **Fb** Neu-  
zelle, Wald hinter dem Schützenhaus 1922 (L.).
- Moneses uniflora* (L.) Alef.: **P** 1 Expl. am Ostufer des Kl. Lienewitzsees (BEN-  
KERT).
- Pyrola virens* Schweigg.: **Pr** Weggun, Ostseite des Schulzensees 1951  
(H. SCHMIDT). **Fb** Kiefernwald südl. vom Wurlsee; Hohe Heide zw.  
Heckenhaus und Küstrinchen 1958. **Te** Ringenwalder Forst südl. des Libe-  
sicke-Sees, im Kiefernwald 1960 (F.); Wald hinter der Landesschule 1949  
(H. FRITSCH). **B** Tegel, Wald bei Villa Klein-Konradshöhe an der Havel  
1907 (BERGER).
- P. rotundifolia* L.: **Pr** Weggun, Westseite des Schulzensees 1950 (H. SCHMIDT).  
**Be** NSG Röntgentaler Ausstich, an etwas trockeneren Stellen des Erlbruches,  
spärlich. Füw zw. Erkner und Alt-Buchhorst an mehreren Stellen, meist  
vereinzelt 1961 (WIŚNIEWSKI). **P** Tausend Expl. in den Glindower Bergen  
in aufgelassenen Tongruben (BENKERT).

*P. minor* L.: **Pr** Weggun, Westseite des Schulzensees 1950 (H. SCHMIDT). **T**e Kiefernwald am Fährsee 1949 (H. FRITSCH). **P** Stahnsdorf, alte Potsdamer Landstr. (Schwarzer Weg), Waldrand am Hang zur Wiese 1923. **Fb** Neuzelle, hinter dem Schützenhaus 1923 (L.).

*Ledum palustre* L.: **Tr** nahe Forsthaus Lenzburg im Bruchwald 1931; beobachtet auch am Teufelssee etwa 1930 (L.). **Fo** Moorwiese am Grenzgraben zw. Mattendorf und Bohnsdorf 1961 (KR.).

*Andromeda polifolia* L.: **P** Hochmoor am Backofenberg bei Tremsdorf 1960 (F.).

*Vaccinium uliginosum* L.: **Ge** Ziesar, Weg nach Dretzen, sandiger Waldboden (ULR. u. Vo.).

*Erica tetralix* L.: **Sz** feuchter, lichter Kiefernwald an der Straße von Diesdorf nach Dähre, zahlreich 1959. **Br** Marzahner Fenn, im Molinietum 1961 (F.); Heide bei Dahmsdorf in Mengen (ULR.). **W** Bräsener Bruch bei Hundeluft, im feuchten *Molinia*-Kiefernwald 1959 (F.). **Fo** zahlreich im feuchten Kiefernwald 2 km südl. Mattendorf 1961 (KR.).

*Primula elatior* (L.) Grub.: **Sz** im Wohld Jg. 46a zw. Dähre und Diesdorf 1959 (F.).

*P. veris* L. em. Huds.: **Füw** Kranichsberge bei Erkner 1949 (HDZ.).

*Lysimachia nemorum* L.: **Sz** im Wohld zw. Diesdorf und Dähre, im Bacheschenwald; erster Nachweis für die Altmark 1959 (F.).

*Trientalis europaea* L.: **Kl** Jemmeritz im Sauren Grund zahlreich 1959 (F.). **Ra** Königsheide, am Krauschengestell (ULR. u. Vo.).

*Centunculus minimus* L.: **Br** zw. Schmerzke und Rietz (ULR. u. Vo.).

*Samolus valerandi* L.: **Na** Salzwiese an der Eisenbahn Nauen-Kremmen südl. des Dechtower Dammes 1961 (KR.). **Br** Südostufer des Wusterwitzer Sees 1960 (F.).

*Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce: **B** NSG Schildow 1947 (KANDELER); Wittenau, Gemüseacker südöstl. der ehem. Fasanerie 1958 (SCH.); Ausstiche bei Wilhelmsruh 1947 (STR.). **L** am Wege Schönwalde-Waldow, etwa 200 m hinter der Autobahn auf einem Lein-Brachfeld 1955 (BIALUCHA).

*Gentiana pneumonanthe* L.: **Or** Hennigsdorf, Teufelsbruch 1960 (H. FRITSCH). **Na** zw. Bhf. Finkenkrug und Kolonie Waldheim 1934, durch Bebauung erloschen (I. SCHULZE). **B** Spandau, 1951 Wiesenstück an der Kuhlake Jg. 31, jetzt Wuchsstand durch Feldkulturen vernichtet (HARTL u. SCH.); Egelpfuhlwiesen 1961 (ECKERT u. MÜNZEL); Köpenicker Forst, Wiese bei Sadowa 1907 (F. BERGER). **Br** auf Wiesen an der Ostseite des Beetzsees (ULR. u. Vo.), 1961 (WIŚNIEWSKI). **Bg** im Rott ziemlich häufig in basiphilem Molinetum 1959 (F.). **Köw** Wennichluch westl. Dubrowberg b. Gräbendorf 1947 (BETHGE). **Tr** Nuthewiesen südwestl. der Stadt 1950 u. 1953 (L.).

*G. cruciata* L.: **Br** verwildert auf dem Marienberg (ULR. u. Vo.).

*G. amarella* L.: **Br** Mühlenfenn am Görtsgraben; Salzstelle bei Schenkenberg (ULR. u. Vo.). — Subsp. *uliginosa* (Willd.) Hegi: **Na** Wiese bei Finkenkrug 1923 (E. FAHRENDORFF).

\**Vinca minor* L.: **Feldberg** häufig im Hullerbusch, Conower Werder 1961. **P** Kemnitz am Gr. Plessower-See, Petzower Park 1961. **Helmstedt** Park in Harbke 1959 (F.).

*Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers.: Br auf der Kanincheninsel im Plauer See in Mengen 1961 (F.).

\**Asclepias syriaca* L.: B Zehlendorf, auf der Bahnböschung bei der Str. 510 der Kleingartenkolonie Königsweg, 1961 (SCH.). Br verwildert auf dem Marienberg (ULR. u. Vo.).

\**Calystegia silvatica* (Waldst.) Griseb. var. *pulchra* (Brummit et Heywood) H. Scholz: B Grunewald, Kühler Weg in Eichkamp, det. H. SCHOLZ (HAMMANN).

\**Cuscuta campestris* Yuncker: B Bahndammböschung beim Bhf. Hermsdorf 1960 (SCH.). Je sandige Ödlandstelle an der Motormühle Klöden (seit 1956, sich alljährlich weiter ausbreitend). Auffällig ist die große Zahl der dortigen Wirtspflanzen, die mit der Vergrößerung des Vorkommens gewiß noch zunehmen wird. Bisher wurden folgende Wirtspflanzen in Klöden festgestellt: *Chondrilla juncea*, *Setaria viridis*, *Melandrium album*, *Achillea millefolium*, *Trifolium arvense*, *Artemisia campestris*, *Rumex acetosa*, *R. acetosella*, *Armeria vulgaris*, *Convolvulus arvensis*, *Polygonum convolvulus*, *Chenopodium album*, *Medicago falcata*, *Helichrysum arenarium* = 14 Arten. (STRI.).

*Asperugo procumbens* L.: Pr an der Brüssower Chaussee (SCHONERT). Te Kappe bei Zehdenick 1949 (H. SCHMIDT). B Lichterfelde, Gartenzaun in der Berliner Str., 1907 (F. BERGER). P Kleinmachnow, Ruderalplatz vor dem Kirchhof 1942 (L.); Weg von Golm zum Golmer Luch Richtung Werder 1956 (RÜFFLE). J Dammvorstadt, Hecken an der Chaussee zum Bhf. 1912/13, jetzt bebaut (L.).

*Lithospermum officinale* L.: St mehrfach am Fahrweg Woltersdorfer Schleuse — Seebad Rüdersdorf 1961 (STRI. u. SEIDEL).

*Myosotis laxa* Lehm.: L Borchelts Busch an den Gräben mehrfach; Fischteichanlage 1 km westl. Drehna 1960 (F.).

*M. silvatica* (Ehrh.) Hoffm.: P Eichenwäldchen an der Michendorfer Chaussee, Jg. 155 (BENKERT). — f. *lactea* Boenn.: B Wannsee, Glienicker Volkspark recht häufig, besonders im Rasen beiderseits des Weges zw. Schinkelschlößchen und Matrosenhaus, aber auch bis weit in den östl. Parkteil 1953—1961 (E. KOCH).

*M. hispida* Schl.: B Wannsee, Trockenrasen auf der Pfaueninsel 1961 (SCH.). P Kleiner Ravensberg 1923; Stahnsdorf, Weg nach Albrechts Teerofen 1925. Tr Acker am Schulzendorfer Kirchsteig vor dem Drehkreuz 1927; Ludwigsfelde an der Autobahn 1948. Bz Brück, mehrfach auf Äckern 1936 (L.).

*M. discolor* Pers.: Gu Neißevorland oberhalb der Schlagsdorfer Brücke 1932 (LADEMANN).

*M. sparsiflora* Mikan: Je nördl. Burg Klöden; westl. und nordwestl. Schützberg; Vorwerk Lug, überall am Deich unter Gebüsch (STRI.).

*Pulmonaria officinalis* L.: Sz im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959. Helmstedt Wald östl. Sommerschenbusch 1959 (F.).

*P. obscura* Dum.: B in der Pferdebucht 1959, det. SUKOPP (VOBACH).

\**Symphytum × uplandicum* Nyman: B Wannsee, auf der Pfaueninsel nördl. der Fähre zahlreich 1961 (SCH. u. SU.).

*Teucrium scordium* L.: Na Wiesen zw. den Kl. und Gr. Jahnbergen (F.). **B** Spandau, an der Kuhlake an zwei Stellen, 1952 (WA.), 1956 (SCH.); auf Kälberwerder 1949 (WA.); Wittenau, zw. ehem. Fasanerie und Bhf. Rosenthal 1959 (SCH.); Müggelsee, Wiesen am Kuhwall 1953 (SU.). **P** Havelufer gegenüber Ketzin (BENKERT); Schlangenbruch bei Marquardt 1960 (F.). **Br** Breitlingsee nördl. Blockstelle Wilhelmsdorf (JA.); häufig am Wusterwitzer See 1960; am Beetz-See bei Grabow 1961 (F.). **Zo** Ostufer des Mellensees 1951 (SU.). **L** zw. Zützen und Jetzsch, im Caricetum elatae 1961 (F.).

*T. scorodonia* L.: **B** Tegeler Forst Jg. 94, 1953 (STR.) und Jg. 91 an der Chausseegabel (REMY); Jungfernheide Jg. 52, noch 1956; Charlottenburg, Scholzplatz noch 1955 (DENCKMANN), vgl. REIMERS in VBVB 76 (1936): 75; Wannsee, vor dem Kriege am jetzigen amerikanischen Schießplatz 1935 (E. ULRICH, Rs.); Forst Düppel, Jg. 25, 1954 (RIECKE). **P** an der Autobahn nahe Bhf. Dreilinden (DENCKMANN). **Bz** im Walde zw. Schmerwitz und Wiesenburg 1954—1962, verbreitet sich immer mehr (SCHM.).

*Scutellaria hastifolia* L.: Je Altwasserrand nordwestl. Meuselko (HDZ. u. STRI.).

*Marrubium vulgare* L.: **Feldberg** Hecke nahe am Stieglitzerkrug 1958. **L** in Gießmannsdorf 1961 (F.). Je in Elster, Abhang zur Elbe (HDZ. u. STRI.).

\**Nepeta cataria* L.: **FbH** Neuglobsow, am Zaun der Limnologischen Station (ehem. Försterei Stechlin) (KR.). **Kl** Dorfstraße in Jemmeritz 1959. **Br** in Netzen 1961 (F.).

*Prunella grandiflora* (L.) Scholler: **Fb** Neuzelle, Wellmitzer Höhen, an der hinteren Schlucht 1922 (L.).

\**Galeopsis angustifolia* Ehrh.: **B** Bhf. Grunewald; zw. den Bhfn. Feuerbachstr. und Friedenau; beiderorts zahlreich auf Eisenbahnschotter 1961 (HDZ.).

*G. ladanum* L.: **B** Gatow, Acker nördl. des Gr. Glienicker Weges 1957; Acker nördl. Mahrzahn 1958 (SCH.).

*G. pubescens* Bess.: **Te** Kappe bei Zehdenick, in der Schorfheide 1949 (H. SCHMIDT). **P** Schuttplatz in der Böcklinstr., 1952; Weg von Golm zum Galliner Damm 1954 (F.). **Fb** Neuzelle, Fasanenwald 1922 (L.); **Je** im Kreis Jessen an der absoluten Westgrenze: in Klöden; Kleindröben; am Deich in Iserbegka, 1957; in Prettin. **Mü** Köttlitz; Weinberge. Überall lediglich innerhalb der Orte (STRI.).

*Lamium maculatum* L.: **Eb** Niederfinow, Graben 1907. **Bz** Brück, im Südteil des Linther Oberbusches 1932. **Lw** im Bürgerbusch 1927, auch in f. *niveum* (Schrad.). **J** Werder, Hecke am Weg zum Bhf. 1922 (L.). **Co** am Tranitzer Fließ zw. Sergen und Gr. Gaglow 1961 (KR.).

*Leonurus marrubiastrum* L.: **Je** Gorsdorf; Windmühle südl. Schützberg; Mauken, an der Fähre (STRI.).

\**L. sibiricum* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Asien. (SCH.).

*Stachys recta* L.: **Ly** Ostufer des Gr. Lychener Sees (F.). **Je** Mühlberg; westl. und nordwestl. Schützberg; Weinberg und Ziegelei südöstl. Prettin (STRI.).

\**Salvia nemorosa* L.: **St** 1 Expl. am Fahrweg Woltersdorfer Schleuse — Seebad Rüdersdorf 1961 (STRI. u. SEIDEL.).

*Calamintha vulgaris* (L.) Halácsy: **B** Spandau, an der Kuhlake bei der Kreuztränke 1958 (SCH.); Spandauer Forst Jg. 62; Grunewald, westl. des Teufelsfenns 1956 und an der Nord- und Westseite des Barssees 1958 (SU.); NSG Schildow 1947 (KANDELER).

*Mentha pulegium* L.: Je am Riß in Kleindöbern (STR.).

\**M. gentilis* L.: B Buckow 1, am Rande einer Laubengesellschaft, aus Kulturen verwildert (SCH.).

\**M. spicata* L. emend. Huds.: B Bez. Tiergarten, Rathenower Str. Ecke Invalidenstr. auf Schutt in ehem. Kleingartengelände 1957 (SCH.).

\**M. niliaca* Jacq. (incl. *M. nemorosa* Willd. u. *M. villosa* Huds.): B Wittenau, bei der Kolonie St. Joseph 1960, an der Güterbahn bei der ehem. Fasanerie 1959 und Dannenwalder Weg 1961; Charlottenburg, Straßenrand am Bhf. Eichkamp 1958; Kladow, nördl. der Fuchsberge bei Str. 217, leg. SUKOPP; Steglitz, Ödgelände des Friedhofes an der Bergstr. 1961; Lichterfelde, am Stichkanal 1959; Britz, Gutschmidstr. 1959 und an der Mittenwalder Bahn 1961. — Diesebastardbürtige, formenreiche Art dürfte in der ganzen Provinz nicht selten sein. In der Vergangenheit sind Formen der *M. niliaca* vielfach unter *M. longifolia* (L.) Huds. = *M. silvestris* L. geführt worden (s. ASCHERSON 1864). Eigentliche *M. longifolia* scheint im Gebiet in neuerer Zeit nicht beobachtet worden zu sein; alle Angaben beziehen sich wohl auf *M. niliaca*. (SCH.).

\**Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander: B Spandau, im Gebüsch nördl. der Freybrücke und an der Uferböschung der Havel 1960, 1961 (SCH. u. SU.); Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).

\**Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).

\**Solanum nigrum* L. subsp. *schultesii* (Opiz) Wessely (s. WESSELY in Fedd. Rep. 63, 1960: 290—321). WESSELY gliedert das *S. nigrum* auf Grund einer unterschiedlichen Behaarung in die stark behaarte subsp. *schultesii* und die kahlere subsp. *nigrum*. Beide Unterarten reichlich in B, selten folgende gelbfrüchtige Formen: Subsp. *nigrum* var. *nigrum* f. *humile* (Bernh.) Lindm. = subsp. *humile* (Bernh.) Hartm. (s. VBVB 98—100, 1960: 44) und subsp. *schultesii* f. *luridum* Wessely. f. *luridum* auf dem ehem. Schuttplatz an der Glienicker Str., 1960. — Var. *nigrum* f. *humile* verdient vielleicht schon allein wegen des niedrigen Wuchses eine subspezifische Kennzeichnung. Vorerst möchte ich subsp. *humile* noch aufrecht erhalten wissen. (SCH.).

\**S. alatum* Moench: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).

\**Sisymbrium officinale* Lam.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961. — Heimat: Südamerika. (SCH.).

\**Datura stramonium* L. f. *tatula* (L.) Blytt = var. *chalybaea* Koch: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.); an anderer Stelle auch schon 1953 (DEQUIN).

*Verbascum phoeniceum* L.: B Zehlendorf, Garystr. Ecke Clayallee 1961 (FRIEDRICH); Wannsee, Glienicker Volkspark ca. 1950 (HENZE).

\**V. blattaria* L.: B Lichterfelde, vor dem Rathaus in der Goethestr. 1961 (LEUKERT). P Grasflächen im Park Sanssouci, besonders in der Nähe der Orangerie (KR.).

*Misopates orontium* (L.) Raf.: Od westl. Brodowin (JA.). L Bornsdorf, Getreidefeld an der Straße nach Bergen 1960 (F.). W Ostrand von Wittenberg an der Straße nach Jessen, 1 Expl. 1954. Je Waltersdorf 1959 (HDZ. u. STRI.); Weinbergsgrundstück nördl. Prettin 1956; südöstl. Prettin beim Einzelhof südl. am Wald, 1 Exempl. 1956 (STR.).

- \**Linaria repens* (L.) Mill.: **B** Lichterfelde, Söhtstr. 1960, det. WAGENITZ (THAMM).
- \**L. spartea* (L.) Hoffm. et Lk.: **Lb** auf sandigem Boden am Rande eines Moores 1 km nördl. Gr. Leuthen, det. H. SCHOLZ (BIALUCHA u. GANTZSCH). Je Sandstellen an der Windmühle südl. Schützberg; bei der Motormühle Klöden und nördl. der MTS; am Radweg Klöden-Kleindröben seit 1956 alljährlich in etwa gleichgroßen Beständen (STRI.).
- \**Cymbalaria muralis* G. M. Sch.: **FbH** Lychen, Mauern in der Stadt 1958. **Sz** Mauern der Burgruine in Beetzendorf 1959. **P** verbreitet, z. B. Ufermauern des Stadtkanals und Mauerwerke in Sanssouci, besonders Orangerie. **Helmstedt** Mauer des Parkes in Harbke 1959 (F.).
- Kickxia elatine* (L.) Dum.: **L** am Wege Schönwalde-Waldow, etwa 200 m hinter der Autobahn auf einem Lein-Brachfeld 1955 (BIALUCHA).
- \**Chaenorhinum minus* (L.) Lange: **P** Mauer zw. Weinberg und Belvedere und an der Steintreppe des Belvedere; Bhf. Potsdam zw. den Gleisen (BENKERT); Bhf. Caputh-Geltow 1961; Sanssouci, als Unkraut im Bot. Garten 1960 (F.).
- Scrophularia alata* Gilib.: **B** NSG Schildow, mehrfach am Tegeler Fließ 1947 (KANDELER); Grunewald, Westseite des Grunewaldsees 1957, 1958 (WERNICK, SU.); Lichterfelde, Grabenrand beim Stichkanal 1959; Zehlendorf, feuchte Wiese beim Kl. Machnower Weg 1958; Wannsee, feuchte Wiese südl. der Hubertus-Brücke am Griebnitz-See 1961 (SCH.).
- Gratiola officinalis* L.: **Na** Nieder-Neuendorf 1908 (F. BERGER). **Br** Feuchtwiesen und Flutrasen am Süd- und Ostufer des Wusterwitzer Sees 1960. **P** Havelwiesen von Tornow bis zum Forsthaus Templin am Ostufer des Templiner Sees 1958 (F.) **Fb** Neuzelle, Wiesen an der Oder 1922 (L.).
- Limosella aquatica* L.: **Pr** Weggun, sumpfiger Waldweg am Schulzensee 1951 (H. SCHMIDT). **St** Hirschfelde, Dorfteich (JA.). **Fb** Neuzelle, Oderufer im Schlamm 1922 (L.). **L** Dorfteich in Gr. Radden, zahlreich 1961 (F.).
- Veronica longifolia* L.: **B** Wannsee, Pfaueninsel an der Kuhbucht 1961 (SCHÖNEFELD, SU.). **Bg** im Rott, in basiphiler Pfeifengraswiese 1959 (F.). **Fb** Neuzelle, Odervorland 1922 (L.). **Je** östl. Hemsendorf; nördl. und nordwestl. Grubo; Altwasserrand nordwestl. Meuselko (HDZ. u. STRI.); nordwestl. Schützberg am Deich entlang bis Gorsdorf; Mühle südl. Schützberg; südöstl. Mauken; südwestl. Kleindröben; jenseits Greudnitz (STRI.).
- Veronica spicata* L.: **Or** Liebenwalde, an der Bahnstrecke 1949 (H. SCHMIDT). **St** Rüdersdorf, mehrfach 1930, 1942 (L.). **Br** Kahler Berg bei Zachow 1961 (F.). **P** Stahnsdorf, Nordufer des Teltowkanals 1923 (L.); Burgwall in Knoblauch 1961 (F.). **Mi** Großmachnower Weinberg 1953 (L.). **Zo** Klausdorf am Mellensee 1925; Märkisch-Wilmersdorf, Weinberg 1953. **Fb** Neuzelle, an den Wiesen vor der Oder 1922 (L.). **T** Dobbrikow, am Weg nach Rieden 1960 (F.).
- V. verna* L.: **B** Gatow, auf Sand zw. Siedlung Habichtswald und der Potsdamer Chaussee 1960 (SCH.).
- V. dillenii* Crtz.: **Pr** Gramzow 1953 (H. SCHMIDT). **Tr** Glauer Berge 1928; Galgenberg 1929; Bohldammberg 1930; Ludwigsfelde an der Bahnstrecke stellenweise, 1953 (L.). **Fb** Neuzelle, an der Bahn bei Wellmitz 1932 (O. LADEMANN).
- V. praecox* All.: **L** Bergen, im Getreidefeld an der Straße zum Forsthaus Weinberg 1961 (F.).

- V. polita* Fr.: B Britz, Parkanlagen beim Fennpfuhl an der Onkel-Bräsig-Str., 1960; Rudow, Acker an der Deutschtaler Str., 1961 (SCH.).
- V. agrestis* L.: B Rudow, Acker an der Deutschtaler Str., 1960 (SCH.). P Stahnsdorf, Feldwegrand 1925. Bz Brück, Stoppelfeld südl. der Bahnstrecke 1932. J Dorf Werder, auf dem Schulgrundstück 1923 (L.).
- V. prostrata* L.: B Spandau, am Kanaldamm bei Nieder-Neuendorf 1953 (SANDER); Westufer des Müggelsees 1957 (SCH.-M.); Spandau, am Elsgraben bei Tiefwerder; Weinmeisterhöhe; Kladow, an der Böschung des Ritterfelddammes beim Unkenpfuhl (SCH.); Müggelheim, am Gosener Kanal 1961 (EICHNER). St Rüdersdorf, am Weg nach Stolp 1942 (L.). Le NSG südl. der Stadt, 4 Stauden in einem Stipetum capillatae (KR.). Br 1 km nördl. Trechwitz, nahe dem Igelpfuhl 1961 (F.). J Rain an der Kleinbahn vor Haltestelle Bürgermühle 1913 (L.).
- V. teucrium* L.: Br 1 km südl. Derwitz, Hang des Gottesberges zur Chaussee, im Brachypodietum 1961 (F.).
- V. montana* Jusl.: **Feldberg** Südwestteil des Conower Werders 1958. Sz im Wohld zw. Diesdorf und Dähre, auf feuchten Waldwegen 1959 (F.).
- V. catenata* Penn.: B Rudow, am Fließ 1961 (SCH.).
- \**Digitalis purpurea* L.: Bz beim Kinderheim Benken, an der Straße von Belzig nach Görzke; am Wege im Walde von Golmenglin nach Reuden; am Wege von Medewitzer Hütten nach den Gorenbergen 1962 (SCHM.).
- Melampyrum arvense* L.: Je jenseits vom Riß östl. Mauken; an der hohen Düne Düßnitz; ehem. Ziegelei nordöstl. Axien (STRI.).
- Orobanche alsatica* Kirsch.: A Abhang zum Odertal bei Zützen südwestl. Schwedt, 1 Expl. August 1957 (BISSE).
- Pinguicula vulgaris* L.: Pr feuchte, moorige Wiese am Dammsee bei Fürstenwerder (SCHONERT).
- Utricularia neglecta* Lehm.: Je Altwasser nordwestl. Meuselko; nordwestl. Waltersdorf; östl. u. südöstl. Meuselko. — Statt der von FREITAG, MARKUS u. SCHWIPPEL (1958) hier lediglich angegebenen *U. vulgaris* L. vermochte ich am 1. 8. 1959 nur *U. neglecta* zu finden und zwar in großer Menge blühend. Nach meinen Beobachtungen ist *U. neglecta* an der mittleren Elbe und unteren Mulde die vorherrschende bzw. allein vorkommende Art. *U. vulgaris* ist viel seltener. Für das Flußgebiet der Mulde oberhalb Grimma hat Herr J. UHLIG-Oederan diesselbe Beobachtung gemacht (1961 mdl.). Es wird sich daher wohl nicht vermeiden lassen, die *Utricularia vulgaris*-Fazies der drei Autoren umzubenennen. (STRI.).
- U. minor* L.: L Bergener Moor, in Torfstichen mit *Sparganium minimum* 1961 (F.).
- U. intermedia* Hayne: L Torfmoor XIII nordwestl. Weissack im Jg. 72, 1960 (F.).
- Sherardia arvensis* L.: **Feldberg** Acker zw. Thomsdorf und Funkenhagen (F.). B Schöneberg, auf unkrautiger Rasenfläche in der Erfurter Str., 1960; Lankwitz, Rasenfläche in der Pädag. Hochschule 1953 (SU.). L Acker östl. Gliechow 1961 (F.).
- Asperula tinctoria* L.: Eb Fernstraße 198 nordöstl. Forsthaus Schorfheide, Trockenrasen (JA.).

- A. cynanchica* L.: T an der Chaussee zw. Treuenbrietzen und Tiefenbrunn mehrfach 1960 (F.).
- \**Galium pumilum* Murr.: B Wannsee, auf der Pfaueninsel am Heidestück 1961 (KOHLER u. SU.).
- G. hercynicum* Weig.: Sz im Wohld zw. Diesdorf und Dähre 1959 (F.). B Spannauer Stadtförst z.B. 1956 u. 1958 in Jg. 14 (SU.), 35, 43 (SCH.) und zw. Großer und Kleiner Kuhlake (SCH.-M.); Grunewald, Nahe Havelufer zw. Schildhorn und Rupenhorn 1946 (STR.).
- \**G. scabrum* L.: Gu Tauernsche Forst beim Forsthaus Eichhorst 1931 (O. LADEMANN).
- G. cruciata* (L.) Scop.: W westl. Griebo am Bach; westl. an Prühlitz; östl. Hohnsdorf (HDZ. u. STR.); Deich westl. Iserbegka. Je östl. Gorsdorf; östl. an Rade; Gebüsch nördl. Rettig; von Klöden bis Gorsdorf überall am Elbdeich; Straße Gorsdorf-Schützberg; um Kleindröben; Straße Mauken-Düßnitz; nordwestl. und südöstl. Mauken am Deich; Fähre Sachau (STR.).
- \**G. tricornе* Stokes: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1961 (SCH.).
- G. spurium* L. subsp. *infestum* (W. K.) Janchen = *G. spurium* var. *echinospermum* (Wallr.) Hayek: B Heiligensee, zahlreich unter Mais und Rüben auf dem Bumfeld 1960 (SCH.).
- Linnaea borealis* L.: P nordwestl. Bhf. Ferch-Lienewitz im Kiefernwalde zahlreich 1958 (BENKERT).
- Lonicera periclymenum* L.: Feldberg Jg. 105 am Weg nach Schlicht, eine kleine Gruppe; Abhang beim Stieglitzenkrug 1958. P Krampnitz im Wald am Nordufer des Krampnitzer Sees, spärlich und wohl nur verschleppt 1961. L im Drehnaer Park verwildert; Wall an der Wanninchener Mühle im Eichen-Hainbuchen-Wald, anscheinend wild 1960 (F.).
- Valerianella carinata* Loisel: B Lankwitz, Treidelweg am Teltowkanal bei der Albrechtstr. 1955, det. WAGENITZ (Rs.).
- Cephalaria pilosa* (L.) Gren.: A im „Faulen Ort“ bei Melzow 1957 (F.).
- \**C. syriaca* Schrad.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1960. — Heimat: Nordafrika, Vorderasien. (SCH.).
- Scabiosa canescens* W. et K.: Je nordwestl. Schützberg; Weinberg nördl. Prettin; ehem. Ziegelei südöstl. der Stadt (STR.).
- S. ochroleuca* L.: W zw. Gallin und Iserbegka überall am Deich. Je Deich zw. den Fähren nach Wörblitz und Greudnitz; Deich westl. und nordwestl. Prettin. Mü östl. Köttlitz; zw. Mühlberg und Weinberge an der Straße (STR.).
- \**Bryonia alba* L.: Br Päwesin, am Riewend-See 1961. P an der Straße nach Kemnitz 1957; Herrmannswerder am Schafgraben 1957 (F.).
- \**Sicyos angulata* L.: B Spandau, verwildert am Brandensteinweg auf Pichelswerder 1960 (SCH.); Mariendorf, beim Tümpel an der Richterstr. 1961; Gatow, Windmühlenberg 1960. — Zierpflanze aus Nordamerika. (SU.).
- \**Thladiantha dubia* Bunge: B Schulzendorf mehrfach in der Nähe von Gärten 1959 (WINDISCH).
- Campanula trachelium* L.: B Dahlem, Fabeckstr. in einer Obstplantage 1955 (SU.); Wannsee, auf der Pfaueninsel mehrfach 1961 (SCH. u. SU.).

- C. persicifolia* L.: **Feldberg** Abhänge zum Schmalen Luzin, in Mengen 1958 (F.). B Tegel, Forst Jg. 91c, 1955, confirm. REIMERS; Spandauer Forst Jg. 11, 1955 (RIECKE); Lübars, Hügel nördl. des Dorfes 1957; Wannsee, Glienicker Volkspark nahe Victoriahöhe 1959 und Pfaueninsel mehrfach 1961 (Su.); Grunewald, im Dachsgrund 1957 (W. KRÜGER). P Havelhänge nördl. Forsthaus Templin; Brauhauseberg 1953; Wildpark am Werdersteig 1957 (F.).
- \**Solidago gigantea* Ait.: **Bz** um Wiesenbürg und Ortschaften bei Wiesenbürg verwildert, aber unbeständig, ähnlich auch *S. canadensis*, 1962 (SCHM.).
- \**Aster novae-angliae* L.: **Bz** in der Umgebung von Wiesenbürg verwildert, aber sehr unbeständig, 1960 (SCHM.).
- \**A. lanceolatus* Willd.: **Bz** verwildert und sehr unbeständig in der Umgebung von Wiesenbürg, 1960 (SCHM.).
- \**A. novi-belgii* L.: Or Kremmen, an der Kreuzung der Luchchaussee im Rhinluch, am Rande der Straße in großen Beständen zw. Weiden-Gebüsch 1960 (KR.). **Bz** in der Umgebung von Wiesenbürg verwildert, aber sehr unbeständig, 1960 (SCHM.).
- \**A. brumalis* Nees: **Br** am Sandfurzgraben, Rand des Kurparks (ULR.).
- \**Erigeron strigosus* Mühlenbg. ex Willd.: **Pr** Lützlow 1953 (H. SCHMIDT). P Beelitz-Heilstätten, Grasstreifen an der Straße zur Stadt 1933 (L.). Fb an der Oderbrücke 1931 (O. LADEMANN). L Crinitz, an der Arzttvilla; Drehna, Pflanzgarten im Park, in starker Ausbreitung (KLIX).
- Antennaria dioeca* (L.) Gaertn.: **B** Schmöckwitz-Werder 1957 (W. KRÜGER).
- Inula salicina* L.: **I.** Luckauer Graben westl. Freesdorf 1960 (F.). **Je** nordwestl. Mauken am Altwasserrest (STRI.).
- I. conyzoides* DC.: **P** Bez. Kreuzberg, massenhaft in einer Ruine in der Lindenstr., 1961 (STR.).
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.: **L** am Dorfteich von Gr. Radden 1961; Dorfeingang von Freienwalde in großen Mengen an den Gräben (F.).
- P. vulgaris* Gaertn.: **L** Langengrassau; Gr. Kraußnigk; Gr. Radden, 1961 (F.). **Je** Gallin; Elster; Kleindröben; Mauken (STRI.).
- \**Ambrosia artemisiifolia* L.: **Bz** 1950 an der Straße von Wiesenbürg nach Neuhütten, wieder verschwunden (SCHM.).
- \**A. psilostachya* DC.: **B** Spandau, Haselhorst, südl. der Brücke nach Eiswerder 1961 (WERNICK); Steglitz, Munsterdamm gegenüber vom „Insulaner“ 1961 (SCH.). P Teltow, an der Chaussee nach Berlin nahe der Bahnunterführung 1960, confirm. H. SCHOLZ (F.).
- \**Xanthium strumarium* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (2) 1961 (SCH.). Zo Dorfstraßen und Anger in Dahlewitz, zahlreich 1957 (HDZ.).
- \**X. riparium* Itz. et Hertsch em. Lasch: **B** Stadtforst Köpenick, Kanonenberg 1960, leg. EICHNER. Über Unterschiede zu *X. albinum* s. VBV 98—100 (1960): 47. (SCH.).
- \**X. spinosum* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960, (2) 1961 (SCH.).
- \**Rudbeckia laciniata* L.: **B** Zehlendorf, am Westufer des Nikolassees eingebürgert 1960 (SCH.).
- \**Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hook.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961, det. WAGENITZ. — Heimat: wärmeres Amerika. (SCH.).

- \**Sigesbeckia orientalis* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961  
— Heimat: wärmere Gebiete beider Hemisphären. (SCH.)
- \**Guizotia abyssinica* (L.) Cass.: B Neukölln, Maybachufer beim Kottbusser Damm, 1961 (SCH.).
- \**Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake: P Gärten am Park von Sanssouci (Kuhtor), seit Jahren zahlreich (KR.). Bz häufiges Unkraut, das stellenweise *G. parviflora* verdrängt, 1950—1962 (SCHM.).
- Anthemis tinctoria* L.: Feldberg Straßenböschung am Dammzollhaus 1958; an der Straße von Lychen nach Küstrinchen, am Wurlsee 1958 (F.). Pr Weg Weggun nach Arendsee 1950; Lützlow, Brache östl. des Dorfes 1953 (H. SCHMIDT). Od Brodowin mehrfach, z.B. Schieferber und westl. von Kl. Rummelsberg (JA.). B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (2) 1961 (SCH.). St Rüdersdorf, Heinitzsee 1942 (L.). P Kleinmachnow, am Spandauer Weg 1932. Tr Ludwigsfelde, Bahnböschung bei Blockstelle Kerzendorf 1952; Chaussee nach Ahrensdorf 1928. Bz Brück, an der Bahn nach Bork 1932 (L.).
- A. ruthenica* M. B.: B Hirschgarten 1957 (W.A.). Tr Chaussee nach Thyrow 1927, später nicht mehr (L.).
- A. cotula* L.: Pr Weggun, Dorfstraße 1950 (H. SCHMIDT). B Wittenau, auf jauchedurchtränktem Boden westl. vom Quickborner Weg 1961; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (1) 1960, 1961 (SCH.). P Stahnsdorf, Dorfplatz 1925. Tr am „Bohdamm“ 1927; Roggenfeld bei Löwendorf 1930. Bz Brück, Weg an der Nordseite der Stadt vor den Wiesen 1935 (L.).
- \**A. mixta* L. = *Ormenis mixta* (L.) Dum.: B unter Serradella bei Gatow 1961.  
— Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.)
- Achillea cartilaginea* Ledeb.: Fb Ufergebüsche an der Oder südl. der ehem. Oderbrücke 1961 (KR.).
- \**A. nobilis* L.: B Bez. Tiergarten, Trümmergeschutt am Lützowplatz, 1960, confirm. WAGENITZ (SCH.).
- \**Chrysanthemum balsamita* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee, mehrere Pflanzen 1961. — Zierpflanze aus Kleinasiens. (SCH.)
- Ch. segetum* L.: B Wittenau, unter Serradella bei der Kolonie Bürgersruh 1961; desgl. bei Gatow und Kladow 1961 (SCH.). Co am Bhf. Peitz-Ost (BISSE). Je an der Straße südl. Seyda 1961; an dieser Straße zw. Gentha und Lüttchenseyda (STRI.).
- \**Leucanthemum myconis* (L.) Giraud = *Chrysanthemum myconis* L. (s. HEYWOOD in Agronomia lusitana 20, 1958: 212): B Wittenau, unter Serradella bei der Kolonie Bürgersruh 1961; Gatow, unter Serradella 1961. — Heimat: Iberische Halbinsel. (SCH.)
- \**Artemisia pontica* L.: B Schöneberger Südgelände 1960 (SCH.).
- A. absinthium* L.: Bz Brück, bei Neuendorf an der Mühle 1932; im Dorfe Rottstock 1932; beim Dorfe Trebitz 1933. Fb Neuzelle, Trift bei Lawitz 1922 (L.).
- \**A. biennis* Willd.: Mü in Koßdorf in der Hauptstraße mehrfach 1958 (STRI.).
- \**A. annua* L.: B Steglitz, auf dem Friedhofsgelände an der Bergstr., dem ehem. dortigen Ödgelände (s. VVB 98—100, 1960: 48), noch 1961 beobachtet (SCH.); Bez. Tiergarten, zw. Tiergarten und Köbisstr., 1961; Schöneberg, Heylstr., 1961, 1965 (Su.). Hv mit *Leonurus marrubiastrum* 1955, Herbar REIMERS, leg. PASSARGE (SCH.).

*Petasites hybridus* (L.) G. M. Sch.: B Lübars, feuchte Wiese am Fließ unterhalb des Dorfes 1959 (KRÜGER); Ruhleben, See am Teltowhang nördl. Haus des Sports 1960 (Su.). — Var. *carneus* Čelak. emend. Šourek: NSG Lichtenfelder Schloßpark. S. J. ŠOUREK in Rozpravy Československé akademie věd, Ročník 72 — Sešit 5, 1962; ausführliche deutsche Zusammenfassung S. 90—112. (SCH.).

\**Doronicum pardalianches* L. em. Scop.: B Wannsee, am Ostufer der Pfaueninsel unter Gebüsch verwildert 1961 (SCH.).

*Senecio tubicaulis* Mansf.: Pr Weggun, Schulzensee, Westufer 1950 (H. Schmidt). Or Birkenwerder, an der Briese 1907 (DAGEFÖRDE). B Gatow, Havelufer 1908 (F. BERGER).

*S. paludosus* L.: Ra Nordufer des Pritzerber Sees 1961 (F.). B Tegel, Havelufer zw. Konradshöhe und Tivoli 1907 (F. BERGER). P Schlangenbruch bei Marquard 1960 (F.).

*S. erucifolius* L. var. *tenuifolius* (Jacq.) Asch. et Gr.: Na Paulinenaue 1930 (H. KRÜGER).

*S. aquaticus* Huds.: Pr Weggun, Westseite des Schulzensees 1950 (H. SCHMIDT). Tr Nuthewiesen im Südwesten der Stadt 1925, 1928. Bz Brück, Wiesen zw. Bahnstrecke und Linther Oberbusch 1937 (L.). Je westl. Gorsdorf an der Straße; ca. 2 km nordwestl. Grubo (STRI.).

\**Calendula arvensis* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961 (SCH.).

\**Arctotheca calendulacea* (R. Br.) Lewin = *Cryptostemma calendula* (L.) Druce: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961, det. WAGENITZ. — Heimat: Südafrika. (SCH.).

\**Echinops sphaerocephalus* L.: P Wiese am Templiner See bei Kl. Wentorf 1951 (F.); Michendorfer Chaussee nahe der Bahnlinie, Wegrand am Drachenberg (BENKERT); Werder, Trockenrasen bei Neu-Plötzin 1953 (KR.). Bz zw. Belzig und Borne am Beginn des Börner Tales in größerer Menge 1959—1962 (SCHM.). W Ostrand der Straße nach Jessen (STRI.).

*Arctium nemorosum* Lej. et Court.: Te Buchheide, vereinzelt 1960 (F.).

\**Carduus acanthoides* L.: Pr Weggun, am Schulgarten 1950 (H. SCHMIDT). P Kemnitz am West-Fuß des Haakberges 1958 (F.); ehem. Schützenplatz (BENKERT); Babelsberger Park an der Fährstelle nach Potsdam 1961 (F.).

*Onopordon acanthium* L.: Te beim Fährkrug 1949 (FRITSCH). B Tegel, Borsigdamm 1961; Kaulsdorf, Chemnitzer Str., 1955; Grunewald, Forsthaus am Barssee (Su.); Rudow, Geflügelsteig Ecke Klein-Ziethener Weg auf Schutt 1959 (SCH.). P Stahnsdorf, Dorfplatz, am Denkmal 1923. Tr zw. den Scheunen 1928—29 (L.) Mü Brottewitz (STRI.).

*Serratula tinctoria* L.: Je nördl. Axien (STRI.).

\**Centaurea nigrescens* Willd.: P Park Sanssouci zw. Chinesischem Teehaus und Orangerie (KR.).

\**Carthamus lanatus* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (2) 1961. — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.).

*Picris hieracioides* L.: Pr Stadtpark, bei der Freilichtbühne auf Anschüttung; Damme (SCHONERT). B Dahlem, Hechtgraben 1960 (SCH.). Zo Mellensee, Weg vom Ort zu den Salzwiesen 1931 (L.). L Ringwall bei Freesdorf 1960 (F.).

- Tragopogon dubius* Scop.: Pr Schenkenberger Str., Wegrand (SCHONERT).
- \**Cicerbita macrophylla* (Willd.) Wallr.: B Wannsee, auf der Pfaueninsel noch 1961, vergl. HEGI Bd. 6 (1929): 1097 (SCH. u. SU.).
- Sonchus palustris* L.: B Zehlendorf, am Teltowkanal bei Schönau, zuletzt 1960 (Rs. u. a.); Lichterfelde, am Stichkanal 1961 (SCH.).
- \**Picridium tingitanum* (L.) Desf. = *Reichardia tingitana* (L.) Roth: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee (3) 1961, det. WAGENITZ. — Heimat: Mittelmeergebiet, Vorderasien. (SCH.).
- Crepis paludosa* (L.) Moench: B NSG Lübars und südl. davon 1957 (SU.); Wittenau, auf den Wiesen nördl. der ehem. Fasanerie 1960 (SCH.).
- C. biennis* L.: B Gatow, an Wiesen und Gräben westl. des Ortes 1957, 1958 (SCH.).
- \**Prenanthes purpurea* L.: B Frohnau, Graben am Hubertussee 1959 (MOLLENHAUER).
- Hieracium auricula* L. em. Lam. et DC.: L Feuchtwiese am Nordufer des Busch-Teiches bei Weissack 1960 (F.).
- \**H. aurantiacum* L.: B Lübars, Tegeler Fließ unterhalb der Seebadstr., 1961 (SU.).
- H. caespitosum* Dum.: L südl. Luckau am Graben nach Freesdorf 1960 (F.). Je an der Straße Kleindröben — Mauken; am Deich nordwestl. Mauken mehrfach; nordöstl. Fähre Greudnitz; jenseits Wörblitz am Deich; Fähre Prettin (STRI.).
- H. laurinum* A.-T.: Bz Brück, Bahngelände nördl. vom Bahnhof 1936; Grasung hinter Gebüsch an der Eisenbahnstr., 1937 (L.).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [102](#)

Autor(en)/Author(s): Scholz Hildemar, Sukopp Herbert

Artikel/Article: [Drittes Verzeichnis von Neufunden höherer Pflanzen aus der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebieten 3-40](#)