

Nachträge zur Flora von Arnswalde.

Von
F. Paeske.

In der von Herrn C. Warnstorf im Jahrgange XIII. der Verhandlungen unseres Vereines veröffentlichten Flora von Arnswalde ist der östliche Theil des Gebietes Etwas stiefmütterlich weggekommen, da Herr Warnstorf aus Zeitmangel grössere Excursionen dorthin nicht unternehmen konnte. In diesen Gegenden nun, in der Nähe des Städtchens Reetz, hat Verfasser vielfach zu botanisiren Gelegenheit gehabt und dabei, trotzdem er noch ein Anfänger der Botanik ist, mehrere für die Arnswalder Flora neue Species gefunden. Für die Richtigkeit der Bestimmungen bürgt wohl der Umstand, dass Herr Prof. Ascherson den grössten Theil der Pflanzen entweder lebend an Ort und Stelle oder getrocknet in meinem Herbar gesehen hat. Ausserdem haben um Reetz botanisirt: Herr Prof. Ascherson, Herr Gymnasiallehrer Heideprim aus Landsberg a. W. und Herr Lehrer Walter, dessen Beobachtungen ich durch Herrn Warnstorf's Güte erhielt. — Die für die Flora neuen Species sind durch den Druck hervorgehoben worden.

Thalictrum flexuosum Bernh. Conradener Kirchhof und zwischen Conraden und Reetz am Wege.

(*Th. angustifolium* Jacq. will der Lehrer Walter in den Kleebergen bei Reetz gefunden haben, was aber Herrn Warnstorf und mir zweifelhaft erscheint.)

Hepatica triloba Gil. Zwischen Reetz und Kleinsilber an der Ihna. Im Nantikower Busche bei der Bergmühle.

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Reetzer und Conradener Kirchhof.
(*Anemone silvestris* L. sah ich, bei Reetz gesammelt, im Herbar des Kantors Glenneberg daselbst.)

Ranunculus lanuginosus L. Auf einem bebuschten Abhange hinter der Bergmühle.

Trollius europaeus L. Conradener Wiesen und (beim Beerenberg bei Reetz viel.)

Corydalis intermedia (L.) Mérat. (Bei der Walkmühle von Reetz)

- und auf der anderen Seite nach Kleinsilber hin. Im Nantikower Busche bei der Bergmühle.
- Barbarea lyrata* (Gil.) Aschs. Conradener Garten. b) *iberica* D. C. Conradener Wiesen.
- + *Camelina microcarpa* Andrzej. In Conraden gebaut u. verwildert.
- Viola epipsila* Led. Sumpf links vor Steinberg.
- Drosera anglica* Huds. Links vor Steinberg. An demselben Standorte befindet sich ein Bastard zwischen *Dr. anglica* Huds. und *rotundifolia* L.
- Tunica prolifera* (L.) Scop. Bei Reetz nach Walter.
- Dianthus Armeria* L. Bei Reetz nach Walter. Ausserdem von mir (vorn im Stavenow-Walde) gefunden.
- D. superbus* L. Vor und hinter Reetz häufig. Auch von Walter gefunden.
- D. arenarius* L. Kleeberge rechts vor Reetz: Walter.
- Silene conica* L. Bei Reetz nach Walter. Um die halbe Stadt viel und beim Schützenhause nach Kantor Glenneberg. Ausserdem am Conradener Wege.
- Viscaria viscosa* Aschs. Weiss blühend zwischen Reetz und Kleinsilber.
- Stellaria nemorum* L. An der Ihna zwischen Reetz und Kleinsilber. (Im Stavenow-Walde viel.)
- St. uliginosa* Murr. An der Ihna.
- Malva Alcea* L. Conradener Feldmark mehrfach.
- Hypericum montanum* L. (Beerenberg), bei Reetz.
- Geranium columbinum* L. Conradener Park.
- G. dissectum* L. Desgl.
- G. pratense* L. Conradener Wiesen, nach Nantikow hin.
- Trifolium alpestre* L. Conraden mehrfach.
- Tr. rubens* L. Steinberg in der Nähe des Luftberges: Walter.
- + *Tr. incarnatum* L. Klosterberg bei Reetz (wohl verwildert).
- Astragalus arenarius* L. Angepflanzte Berge zwischen Conraden und Rathleben.
- + *Onobrychis viciaefolia* Scop. Conradener Aecker stellenweise.
- Vicia silvatica* L. Bei Reetz nach Walter.
- V. cassubica* L. (Im Stavenow).
- Lathyrus niger* (L.) Wimm. (Beerenberg).
- L. silvester* L. Bei Reetz nach Walter.
- Prunus Padus* L. (Im Stavenow): Ascherson.
- Potentilla collina* Wib. Zwischen Conraden und Steinberg am Wege.
- Alchemilla vulgaris* L. Ihnaberge zwischen Reetz und Kleinsilber.

Hinter Steinberg. (Im Stavenow). Var. *glabrata*. Bei der Walkmühle.

Sanguisorba officinalis L. Conradener Wiesen beim Torfstiche.

Pirus Malus L. Conradener Feldmark.

Myriophyllum verticillatum b) *intermedium* Koch. Graben zwischen Reetz und Conraden.

Ribes nigrum L. An der Ihna vor Kleinsilber.

Saxifraga Hirculus L. Conradener Wiesen und (Ihnawiesen beim Pommerschen Hause bei Reetz.)

Pimpinella magna L. Auf allen Conradener Torfwiesen.

Chaerophyllum bulbosum L. Vor und in Buchholz viel. Ihnaberge zwischen Reetz und Kleinsilber. In Rohrbeck. Im Conradener Parke.

Hedera Helix L. (Zwischen Reetz und Ziegenhagen an der Ihna).

+ *Sherardia arvensis* L. Im Conradener Parke. Wahrscheinlich durch Grassamen eingeschleppt.

Galium silvaticum L. Bei Reetz nach Walter. Zwischen Reetz und Kleinsilber und (im Stavenow viel). Im Nantikower Busche, bei der Bergmühle.

G. boreale L. In der Nähe des Luftberges hinter Steinberg nach Walter.

Valeriana sambucifolia Mik. An der Ihna zwischen Reetz und Kleinsilber: Ascherson.

Petasites officinalis Mnh. Ihnawiesen beim Reetzter Kirchhofe.

Anthemis tinctoria L. Conradener Feldmark häufig.

Senecio vulgaris × *vernalis*. Conraden.

Carlina acaulis L. Auf und bei dem Luftberge hinter Steinberg: Walter.

Centaurea Cyanus L. Weissblühend: Conraden.

Onopordon Acanthium L. Chaussée vor Reetz.

Cordus acanthioides L. Links am Wege zwischen Reetz und Conraden.

C. nutans L. Mit weisser Blüthe: bei Steinberg.

Cirsium rivulare (Jacq.) Lk. Conradener Wiesen. Vielleicht nur beim Ansäen der neu angelegten Rieselwiesen verschleppt.

C. arvense (L.) Scop. weissblühend. Zwischen Kleinsilber und dem Stavenow, am Wege nahe der Ihna.

C. acaule (L.) All. var. *caulescens* Pers. In der Nähe der Bergmühle mehrfach.

C. palustre (L.) Scop. weissblühend. Conradener Wiesen mehrfach.

Cichorium Intybus L. weissblühend. Bei Conraden.

- Picris hieracioides* L. Nantikower Fliess bei Rathleben auf Conradener Seite und zwischen Reetz und Kleinsilber an den Ihnabergen.
- Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. Kupferspring bei der Bergmühle Conradener Kirchhof. Zwischen Reetz und Kleinsilber. (Auf dem Beerenberg).
- Hieracium pratense* Tausch. Conradener Wiesen.
- Phyteuma spicatum* L. Bei Reetz nach Walter. Zwischen Reetz und Kleinsilber auf Wiesen. (Im Stavenow viel).
- Campanula latifolia* L. Im Stavenow auf der Grossilber'schen Seite: Ascherson.
- C. glomerata* L. (Am Wege zwischen Kleinsilber und dem Stavenow.)
- Vaccinium Oxycoccus* L. Im Buchholzer Kalkbusche. Zwischen Conraden und Steinberg mehrfach.
- V. uliginosum* L. In einem grösseren Sumpfe zwischen Conraden und Steinberg.
- Andromeda polifolia* L. Ebendort und zwischen Conraden und Kleinsilber.
- Pirola uniflora* L. In der Freudenberger Forst bei Gerzlow.
- P. rotundifolia* L. Unterhalb eines Karpfenteiches bei Conraden in geringer Anzahl.
- Chimophila umbellata* (L.) Nutt. In den Kleebergen bei Reetz: Walter.
- Cynoglossum officinale* L. Zwischen Reetz und Conraden am Wege.
- Symphytum officinale* L. Weissblühend: auf Ihnawiesen unterhalb Reetz nicht selten.
- Echium vulgare* L. Fleischfarben blühend: am Wege nach Denkhäus in der Nähe von Reetz. Bei Conraden, Steinberg und Rathleben.
- Pulmonaria officinalis* L. Bei der Bergmühle. Zwischen Reetz und Kleinsilber diesseits (und jenseits) des Ihna. (Beerenberg). Eine hellrosa blühende Form findet sich im Nantikower Busche bei der Bergmühle.
- Myosotis sparsiflora* Mik. Aecker zwischen Conraden und Kleinsilber: Ascherson.
- Scrophularia alata* Gil. An der Ihna vor Kleinsilber viel. Conradener Wiesen.
- Digitalis ambigua* Murr. In der Nähe von Hertelsaue bei Neuwedel von einem Freunde gefunden und mir vorgelegt.
- Veronica latifolia* L. Klosterberg bei Reetz.
- Lathraea squamaria* L. (Auf dem Beerenberg nach Kantor Glenne-

berg). Im Nantikower Busche bei der Bergmühle nicht gerade selten.

Origanum vulgare L. Ihnaberge zwischen Reetz und Kleinsilber.

Calamintha Clinopodium Spenner. Ihnaberge und Conradener Park.

Lamium maculatum L. An der Reetzter Stadtmauer.

L. Galeobdolon Crtz. Conradener Park. Ihnaberge vor Kleinsilber und (im Stavenow).

Stachys Betonica Benth. (Auf dem Beerenberge).

Scutellaria galericulata L. var. *pubescens* Benth. Zwischen Conraden und Nantikow, in sehr schön ausgeprägter Form mit fast zottiger Behaarung.

Plantago lanceolata L. Mit secundärer Aehre: im Conradener Parke.

Utricularia minor L. (Ihnawiesen beim Pommerschen Hause bei Reetz.)

Trientalis europaea L. In der Freudenberger Forst.

Chenopodium polyspermum L. Conradener Park.

+ *Ch. Botrys* L. Conradener Garten verwildert (1873).

Thesium intermedium Schrad. In der Nähe des Luftberges bei Steinberg: Walter.

Sparganium minimum Fr. Fast in allen Sümpfen zwischen Conraden und Steinberg.

Cephalanthera Xiphophyllum Rchb. fil. In der Freudenberger Forst bei Gerzlow.

Neottia nidus aris (L.) Rich. Freudenberger Forst.

Paris quadrifolius A. (Beerenberg.)

Gagea silvatica (Pers.) Loudon. Zwischen Reetz und Kleinsilber. Bei der Bergmühle am Nantikower Busche.

G. arvensis Schult. Aecker zwischen Reetz und Conraden.

Carex digitata L. Nantikower Busch bei der Bergmühle.

C. caespitosa L. (Im Stavenow viel): Ascherson.

C. Melæna Wimm. Conradener Wiesen.

Milium effusum L. Conradener Park. (Im Stavenow).

Trisetum flavescens P. B. Conradener Wiesen.

Bromus erectus Huds. Am Stavin-See: Ascherson.

+ *Lolium multiflorum* Lmck. Conraden unter Luzerne.

Lycopodium inundatum L. Zwischen Conraden und Kleinsilber.

Botrychium Lunaria Sw. (Beerenberg): Gymnasiallehrer Heideprim.

Conraden bei Reetz, April 1874.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins
Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1873-1874

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Paeske Fritz [Friedrich] Carl Hermann

Artikel/Article: [Nachträge zur Flora von Arnswalde. 37-41](#)