

Weitere Nachträge zur Arnswalder Flora.

Von

F. Paeske.

(Vgl. Verhandl. 1874. S. 37—41.)

Ranunculus lanuginosus L. Ihnaberge zwischen Reetz und Kleinsilber, aber selten blühend, und bei der Bergmühle in mehreren Gebüsch.

Berberis vulgaris L. Ihnaberge bei Kleinsilber.

Corydallis intermedia P. M. E. Um Reetz sehr häufig.

Viola mirabilis L. Am Nantikower Fliesse oberhalb der Bergmühle stellenweise. In Arnswalde hat sich dieses Veilchen von dem schon länger bekannten Standorte am Wall in einige Hausgärten der Klosterstrasse verbreitet.

Drosera anglica Huds. u. *D. anglica* × *rotundifolia*. In einem kleinen, dünn mit Rohr bestandenen Sumpfe an der Conraden-Kleinsilberschen Grenze.

† *Silene conica* L. Um Reetz sehr häufig. Zu den schon bekannten Standorten sind noch hinzuzufügen (die Sandberge beim Pommerschen Hause längs des Ihnathales und) die Ihnaberge bei Conraden, woselbst die Pflanze auf grasigen Abhängen in grosser Ueppigkeit wächst.

Hypericum montanum L. Im Conradener Parke wenige Exemplare.

Ononis spinosa L. Weissblühend in den Ihnabergen bei Kleinsilber.

Melilotus macrorrhizus Pers. Am Nantikower Fliesse bei Rathleben (mit *Picris hieracioides* L.).

Onobrychis viciaefolia Scop. Ihnaberge bei Kleinsilber.

Vicia hirsuta Koch. Conraden an einer Stelle in der Nähe des Hofes. Scheint in der Arnswalder Flora selten zu sein.

Lathyrus silvester L. Beim Bahnhofe Marienwalde.

- † *Fragaria virginiana* Ehrh. und *grandiflora* Ehrh.
Im Conradener Park viel verwildert, besonders die erstere.
- Potentilla collina* Wib. Ihnaberge bei Kleinsilber.
- Alchemilla vulgaris* L. Wege und Wiesen zwischen Steinberg und Nantikow, bei Buchholz, Rathleben etc. Ueberhaupt sehr häufig.
- Pirus aucuparia* Gärtn. Wild im Nantikower Busche bei der Bergmühle.
- Saxifraga Hirculus* L. Am Kürtow-See bei Rohrbeck.
- Lonicera Xylosteum* L. Ihnaberge bei Kleinsilber in zahlreichen, aber nur jungen Exemplaren.
- Galium silvaticum* L. Oberhalb Rathleben.
- Petasites officinalis* Mneh. In der Arnswalder Flora, wie es scheint, sonst nicht sehr verbreitet, findet sich zahlreich an der Ihna unterhalb Kleinsilber und im Steinberger Parke.
- Xanthium strumarium* L. Sehr vereinzelt in den Reetzer Kohlgärten.
- Senecio aquaticus* Huds. Auf einer grossen, jährlich überschwemmten Wiese dicht bei Rohrbeck.
- † *Centaurea nigra* L. (ob wild?) Conraden im Parke auf alten Rasenplätzen und an einer Stelle der sog. Weinberge, aber an beiden Stellen nur wenige Exemplare. Neu für die Mark.
- Cirsium oleraceum* × *palustre*. Auf der Glambecker Wiese unterhalb der Conradener Weinberge.
- Carduus acanthoides* L. Auf der ganzen Conradener Feldmark, aber meist nur vereinzelt.
- Lactuca Scariola* L. An der Kürtower Dorfstrasse nach der Raackower Seite hin nicht selten.
- Picris hieracioides* L. Conraden unter Luzerne hin und wieder.
- Vaccinium Oxycoccus* L. Zwischen Steinberg und Nantikow, bei Rohrbeck u. s. w.
- V. uliginosum* L. Zwischen Rohrbeck und Mürbenfelde und zwischen Nantikow und Steinberg.
- Andromeda Polifolia* L. Zwischen Nantikow und Steinberg und zwischen Steinberg und Conraden.
- Arctostaphylos Uva ursi* Spr. In der Reetzer Stadtforst bei Mürbenfelde sehr viel.
- Vincetoxicum album* Aschs. Conradener Kirchhofsberg wenig.

- Pulmonaria officinalis* L. Häufig. Im Nantikower Busche bei der Bergmühle findet sich hin und wieder eine *P. officinalis*, welche auch im Verblühen die rosafarbene Blüthe behält.
- Solanum villosum* Lmk. b) *miniatum* (Bernh.) 1875. Ein Exemplar auf einem Schutthaufen bei Conraden bemerkt, 1876 vermisst.
- S. nigrum* L. var. *humile* Mch. An der nördlichen Reetzer Stadtmauer.
- Scrophularia alata* Gil. Bei Rohrbeck.
- Linaria minor* Desf. Aecker zwischen Nantikow und Steinberg.
- Lathraea Squamaria* L. Gebüsche am Nantikower Fliesse bei der Bergmühle (mit *Viola mirabilis* L.).
- † *Elssholzia Patrinii* Grcke. Reetz an der nördlichen Stadtmauer u. den Kohlgärten um die Stadt zerstreut.
- Origanum vulgare* L. Ihnaberge bei Conraden.
- Calamintha Clinopodium* Spenner. Conradener Park. (Beerenberg bei Reetz).
- Lamium Galeobdolum* Crntz. Gebüsche bei der Bergmühle häufig.
- Stachys Betonica* Benth. In einem kleinen Gebüsche oberhalb Rathleben.
- Euphorbia Cyparissias* L. An der Chaussée beim Reetzer Schützenhause und der Pamminer Mühle. Scheint auch in unserm Kreise im Vordringen gegen Norden begriffen zu sein.
- Mercurialis perennis* L. Am Grenzfliesse zwischen Steinberg und Nantikow.
- Salix pentandra* L. Zwischen Rohrbeck und Mürbenfelde in einigen Sümpfen und am Körtowsee bei Rohrbeck.
- Potamogeton gramineus* L. In einem Conradener Karpenteiche angeschwemmt gefunden.
- Paris quadrifolius* L. Im Steinberger Parke.
- Polygonatum officinale* All. Im Steinberger Parke und am Grenzfliesse von Steinberg und Nantikow.
- Gagea arvensis* Schult. Conradener Acker, vereinzelt.
- G. silvatica* Loud. Sehr häufig in Gebüschen.
- † *Ornithogalum umbellatum* L. In Steinberg zwischen dem Gutshofe und der Gutsschäferei ziemlich viel.

Carex silvatica Huds. Im Conradener Parke erst seit wenigen Jahren, aber in grosser Zahl.

C. digitata L. Nantikower Busch bei der Bergmühle.

Glyceria fluitans R.Br. var. *lohiacea* Huds. In einem kleinen Sumpfe zwischen Conraden und Steinberg.

Equisetum hiemale L. Ihnaberge bei Kleinsilber und bei der Bergmühle.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1875-1876

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Paeske Fritz [Friedrich] Carl Hermann

Artikel/Article: [Weitere Nachträge zur Arnswalder Flora. 86-89](#)