

Zur Flora von Teupitz.

Von

Dr. Ign. Urban.

Als im Jahre 1864 P. Ascherson's Flora der Provinz Brandenburg erschien, war die Umgebung von Teupitz botanisch noch unbekannt. Das ist leicht erklärlich. Wenn man von Halbe, der nächsten Station der Görlitzer Bahn, aus die eine Meile lange Chaussee zurückzulegen unternimmt, so schreckt man unwillkürlich vor der einförmigen sandigen Gegend zurück. Seitdem ist das Städtchen zwar auch von der Dresdener Bahn her zugänglich geworden; allein der Weg ist noch mühseliger und dabei um das Doppelte weiter. Endlich kann es, was nicht allgemein bekannt sein wird, noch mit Hülfe von Segelbooten unter Benutzung der Spree, Dahme und einer ganzen Reihe von communicirenden Seen, deren Endpunkt eben der Teupitzer See ist, erreicht werden. Hat der Wanderer aber einmal das floristisch wenig interessante Terrain hinter sich und wirft von den Höhen, welche den ziemlich grossen Teupitzer See einschliessen, einen Blick auf das Thal, auf die grünen Ufer und Inseln im See, so findet er sich für die überstandenen Mühseligkeiten schon durch die Reize der Gegend reichlich belohnt. Soweit sich am Ufer die Sumpfe erstrecken oder an den Bergen die aufsteigende Feuchtigkeit Einfluss ausübt, ist eine ziemlich reiche und mannichfältige Vegetation, darüber hinaus freilich so trostloser Sand, dass die Kiefern oft kaum gedeihen, und ein Roggenfeld, dessen Halme die Knien eines Erwachsenen nicht überragen, ohne Nachtheil durchschritten werden kann; streckenweise ist der Boden nur mit *Cladonia* überzogen oder ganz kahl.

Die botanisch wichtigsten Partien der Gegend sind die Wiesen im Nordosten der Stadt, welche eine reiche Ausbeute an Torfmoorplanten liefern; die Egisdorfer Horst, eine dem

Herrn von Parpart gehörige grössere Insel mit etwas Laubwaldvegetation; die unter dem Namen „alte Weinberge“ bekannten gegenüberliegenden Abhänge; endlich der an *Potamogeton*-Arten reiche Mühlenteich bei Egsdorf nebst den benachbarten Wiesen. Wendet man sich aus der nächsten Umgebung von Teupitz nach Süden, so trifft man auf eine Reihe kleiner, in die Hammer'sche Forst eingesprengter Seen, die sich um das Dorf Tornow herumgruppiren und an ihren theils versumpften, theils schlammigen Ufern noch weitere Seltenheiten darbieten. Bemerkenswerth ist besonders der kleine Tütschen-See und das Südufer des Tornower Sees, welches an den steilen, zerrissenen, zum Theil quelligen Abhängen der Klingeberge mehrere Laubwaldpflanzen beherbergt.

Die Erforschung der Flora des Teupitzer Gebietes wurde von Berlin aus begonnen.

Anfang October 1866 unternahmen die Herren Prof. P. Ascherson (A), Dr. M. Kuhn und Dr. O. Reinhardt (R) eine zweitägige Excursion von Halbe nach Teupitz, besuchten die alten Weinberge und gingen über Baruth und Luckenwalde zurück.

Anfang Juli 1875 machten die Herren Prof. P. Ascherson, A. Treichel (T), Döll (D), H. Ritter (Ri) eine ähnliche nur eintägige Tour, untersuchten die Egsdorfer Horst und nahmen ihren Rückweg über Halbe.

In der letzten Hälfte des Juni 1878 bezog das Uebungsbataillon des ersten Garde-Grenadier-Landwehr-Regimentes, welches bis Zossen mit der Militaireisenbahn gefahren war, unter dem Oberstlieutenant von Strantz in Teupitz und Umgebung auf 10 Tage Quartiere. Herr Dr. E. Koehne (K) und der Verfasser (U), welche diesem Regemente angehören, benutzten, von schönstem Wetter begünstigt und durch den militärischen Dienst wenig beschränkt, die vortreffliche Gelegenheit, zur Erforschung der dortigen Flora nach Kräften beizutragen.

Endlich machte der Verfasser noch Mitte August desselben Jahres eine zweitägige Excursion zu den im Juni untersuchten Localitäten, ohne jedoch dem schon Bekannten noch viel Neues hinzufügen zu können.

Die auf diesen Ausflügen gemachten Beobachtungen sind, soweit sie die weniger häufigen und seltenen Pflanzen be-

treffen, als kleiner Beitrag zur Pflanzengeographie, in dem folgenden Verzeichnisse zusammengestellt. Einige kritische Exemplare haben dem Herrn Prof. P. Ascherson zur Begutachtung vorgelegen, welcher auch die Freundlichkeit hatte, seine Aufzeichnungen über die beiden zuerst genannten Excursionen dem Verfasser zur Benutzung zu übergeben.

Thalictrum flexuosum Bernh. zwischen Teupitz und Schwerin (U), am Mühlenberge bei Baruth (A).

T. flavum L. bei Zossen (U), am Teupitzer See (A).

Ranunculus divaricatus Schrk. im Teupitzer See (U u. K).

R. lingua L. am Teupitzer See (A), bei Tornow zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).

R. sceleratus L. am Nicolas-See (U).

Nymphaea alba L. im Teupitzer See (A).

Nuphar luteum (L.) Sm. im Teupitzer See (A), im Tütschen-See (U).

Papaver argemone L. zwischen Halbe und Teupitz (A), bei Egsdorf (K).

P. dubium L. bei Egsdorf (K), am Westufer des Teupitzer Sees (U).

Turritis glabra L. Teupitz am Wege nach Schwerin und an Ackerrändern, bei Egsdorf, auf der Egsdorfer Horst (U), an den alten Weinbergen (Ri).

Arabis hirsuta (L.) Scop. am Westufer des Teupitzer Sees (U).

Hesperis matronalis L. auf der Egsdorfer Horst verw. (U).

Alliaria officinalis Andržj. auf der Egsdorfer Horst (U).

Berteroia incana (L.) D.C. bei Teupitz und Baruth (A), an den Sputendorfer Bergen (U).

Camelina microcarpa Andržj. auf der Egsdorfer Horst (A).

Teesdalea nudicaulis (L.) R.Br. bei Halbe (A), auf der Teupitzer und Tornower Heide (U).

Neslea panniculata (L.) Desv. am Zossener Bahnhofe (U).

Helianthemum guttatum (L.) Mill. an der Strasse zwischen Halbe und Teupitz (D: 4./7. 1875).

Viola palustris L. am Tütschen-See, bei den Kaltwasserteichen (U).

Drosera rotundifolia L. am Tütschen-See, auf den Teupitzer Wiesen (U).

D. Anglica Huds. auf den Teupitzer Wiesen (U), zwischen

- Eggsdorf und Neuendorf (K), zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, an den Tornower Teichen (U).*
- Drosera obovata* M. u. K. auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu unter *D. rotundifolia* und *D. Anglica*, am Briesen-See allein (U).
- D. intermedia* Hayne auf Wiesen bei den Tornower Teichen, am Tornower See, am Tütschen-See (U).
- Polygala vulgaris* L. bei den Tornower Teichen (U).
- Tunica prolifera* (L.) Scop. bei Teupitz (A), auf der Egsdorfer Horst, am Westufer des Teupitzer Sees (U), am Baruther Mühlenberg (A).
- Dianthus superbus* L. zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (K u. U), bei Egsdorf (R).
- Silene venosa* (Gil.) Aschs. bei Teupitz (A), auf dem Jesenberge, der Egsdorfer Horst (U), am Westufer des Teupitzer Sees, südlich von Baruth viel (A).
- S. nutans* L. auf den Klingebergen am Tornower See (U).
- S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. auf der Egsdorfer Horst und am Westufer des Teupitzer Sees (Ri), auf der Neuendorfer Heide (U u. K).
- Sagina nodosa* (L.) Bartl. bei Teupitz, bei Tornow, auf den Neuendorfer Wiesen, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, am Gribok-See, auf der Egsdorfer Horst (U).
- Spergula vernalis* Willd. bei Teupitz, am Tütschen-See (U).
- Spergularia campestris* (L.) Aschs. am Nicolas-See (U).
- Alsine viscosa* Schreb. bei Teupitz, am Tütschen-See (U), am Fusse des Mühlberges bei Baruth (R).
- Stellaria glauca* With. am Teupitzer See (A), Tütschen-See (U).
- S. uliginosa* Murr. auf den Neuendorfer Wiesen (K), am Tornower See, Nicolas-See (U).
- Radiola multiflora* (Lmk.) Aschs. am Nicolas-, Tütschen- und Tornower See (U).
- Malva alcea* L. auf der Egsdorfer Horst (U).
- Hypericum tetrapterum* Fr. auf der Egsdorfer Horst (Ri), bei den Kaltwasserteichen, am Tornower See (U).
- H. humifusum* L. bei Halbe, Lehmgruben nach Teupitz zu (A), am Tütschen-See, auf den Sputendorfer Bergen (U).
- Geranium palustre* L. bei Neuendorf, am Ost- und Westufer des Teupitzer Sees (U).
- G. sanguineum* L. am Mühlberg bei Baruth (R).

Geranium molle L. bei Teupitz (D).

Oxalis acetosella L. bei den Kaltwasserteichen, am Nordabhang der Klingeberge, zwischen dem Tornower und Briesen-See, am Briesen-See (U).

Euonymus Europaea L. am Teupitzer See (U).

Rhamnus cathartica L. bei Teupitz (A).

Frangula alnus Mill. bei Teupitz (A).

Genista tinctoria L. auf der Egsdorfer Horst (D).

Medicago falcata × *sativa* Reichb. im Chausseegraben zwischen Zossen und Zehrensdorf (U).

M. minima (L.) Bartal. am Westufer des Teupitzer Sees (T).

Trifolium alpestre L. am Baruther Mühlenberge (R).

T. medium L. auf der Egsdorfer Horst (A).

T. montanum L. bei den Kaltwasserteichen (U).

Astragalus arenarius L. zwischen Tornow und Teupitz (U).

Coronilla varia L. bei Teupitz (U), auf der Egsdorfer Horst (A), bei Egsdorf (K), am Mühlenberge bei Baruth, am Weinberge bei Halbe (A).

Ornithopus perpusillus L. am Tütschen-See, auf den Sputendorfer Bergen (U).

Vicia angustifolia Rth. bei Teupitz, am Tornower See, auf der Egsdorfer Horst (U).

V. villosa Rth. bei Teupitz (U).

V. Cassubica L. zwischen Halbe und Teupitz (R), am Westufer des Teupitzer Sees (U).

Lathyrus paluster L. am Teupitzer See (U).

Prunus spinosa L. am Mühlenberge bei Baruth (A).

Ulmaria filipendula (L.) A.Br. zwischen Halbe und Teupitz sparsam (R).

Geum rivale L. am Teupitzer See, auf der Egsdorfer Horst (U).

Fragaria collina Ehrh. auf der Egsdorfer Horst (U).

Comarum palustre L. am Teupitzer und Tütschen-See (U).

Potentilla opaca L. am Mühlenberge bei Baruth (R).

Alchemilla arvensis (L.) Scop. bei der Egsdorfer Mühle (K), am Tütschen-See (U).

Rosa centifolia L. zwischen Egsdorf und Neuendorf verw. (K).

Poterium sanguisorba L. am Westufer des Teupitzer Sees (T).

Epilobium angustifolium L. zwischen Halbe und Teupitz (A), zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, auf den

Sputendorfer Bergen (U), am Westufer des Teupitzer Sees (A).

Epilobium hirsutum L. auf der Egsdorfer Horst (A), zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).

E. roseum Schreb. am Tütschen-See (U).

E. obscurum (Schreb.) Rehb. am Klingespring südlich vom Tornower See, von Prof. Haussknecht bestimmt (U).

Oenothera biennis L. zwischen Halbe und Teupitz (A), bei Egsdorf (U).

Myriophyllum spicatum L. im Teupitzer See (Kuhn), im Nicolas- und Tornower See (U).

Sedum maximum (L.) Suter bei Teupitz (A), Egsdorf, Egsdorfer Horst, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).

S. villosum L. am Tütschen-See, an den Tornower Teichen, dem Gribok-See, Tornower See, bei den Kaltwasserteichen, zwischen diesen und Neuendorf (U).

S. reflexum L. am Baruther Mühlenberge (A).

Saxifraga tridactylitis L. bei Egsdorf (K).

S. granulata L. am Hohlwege bei Teupitz (A).

Chrysosplenium alternifolium L. am Klingespring südlich vom Tornower See (U).

Hydrocotyle vulgaris L. zwischen Halbe und Teupitz (A), am Nicolas-, Tütschen- und Tornower See, zwischen den Kaltwasserteichen und Neuendorf (U).

Cicuta virosa L. bei Teupitz, am Tornower See, zwischen den Kaltwasserteichen und Neuendorf, auf den Egsdorfer Wiesen (U).

Apium graveolens L. bei Teupitz am See häufig verwildert (U).

Berula angustifolia (L.) Koch Gräben bei Egsdorf (A).

Oenanthe fistulosa L. am Teupitzer See (A), auf den Tornower Wiesen (U).

Selinum carvifolium L. bei Egsdorf (R).

Angelica silvestris L. bei Egsdorf (R).

Peucedanum cervaria (L.) Cuss. am Mühlenberge bei Baruth (A: 1./10. 1866).

P. oreoselinum (L.) Mnch. bei Halbe (A), Teupitz (U), auf der Egsdorfer Horst, Mühlenberg bei Baruth (A).

Thysselinum palustre (L.) Hoffm. am Teupitzer See (A), an den Tornower Teichen, auf den Neuendorfer Wiesen (U).

- Cornus sanguinea* L. am Teupitzer See (U), auf der Egsdorfer Horst (A.)
- Sambucus nigra* L. auf der Egsdorfer Horst (A).
- Viburnum opulus* L. zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, auf der Egsdorfer Horst (U).
- Asperula odorata* L. auf der Egsdorfer Horst (U).
- Galium uliginosum* L. zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- Valeriana officinalis* L. auf der Egsdorfer Horst (U).
- Valerianella auricula* D.C. bei Halbe (T).
- Scabiosa columbaria* L. auf der Egsdorfer Horst (U), auf dem Mühlenberge bei Baruth (A.).
- Eupatorium cannabinum* L. auf der Egsdorfer Horst, an der Westseite des Teupitzer Sees (A.).
- Tussilago farfara* L. bei Halbe, an Lehmgruben zwischen Halbe und Teupitz (A), auf der Teupitzer Heide, am Teupitzer See (U).
- Erigeron acer* L. zwischen Halbe und Teupitz (A.).
- Solidago virga aurea* L. auf der Egsdorfer Horst (U), am Mühlenberge bei Baruth (A.).
- Pulicaria prostrata* (Gil.) Aschs. in Tornow (U).
- Bidens cernuus* L. b) *radiatus* D.C. am Tütschen- und Briesensee (U).
- Gnaphalium luteo-album* L. am Nicolas- und Tütschen-See (U).
- G. dioecum* L. auf der Teupitzer Heide, den Sputendorfer Bergen (U.).
- Artemisia absinthium* L. Neuendorf (K), Egsdorf (K u. U), Zehrensdorf (U).
- Anthemis tinctoria* L. auf der Egsdorfer Horst (K).
- A. cotula* L. in Halbe (A.).
- Senecio paluster* (L.) DC. bei Teupitz, am Tornower See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- S. viscosus* L. in Lehmgruben zwischen Halbe und Teupitz (A), am Tornower See (U).
- S. silvaticus* L. zwischen Halbe und Teupitz (A), auf der Teupitzer Heide, am Tornower See (U).
- Cirsium oleraceum* (L.) Scop. bei Baruth (A.).
- Carlina vulgaris* L. zwischen Halbe und Teupitz (A), auf der Teupitzer Heide, bei den Kaltwasserteichen, an den alten Weinbergen (U).

- Centaurea panniculata* Jacq. Teupitz (T), am Jesenberge (U), an der Westseite des Teupitzer Sees (A), am Mühlenberge bei Baruth (R).
- Arnoseris minima* (L.) Lk. bei Halbe (A), auf der Teupitzer Heide, nach Tornow zu (U), Egsdorf (K).
- Thrinacia hirta* Rth. in Halbe (A).
- Tragopogon major* Jacq. an den alten Weinbergen (T).
- Hypochoeris glabra* L. bei Halbe (A), nach Tornow hin (U).
- Chondrilla juncea* L. Teupitz am Jesenberge, in der Nähe des Tornower Sees (U), auf der Egsdorfer Horst, auf dem Egsdorfer Mühlenberge (K), an der Westseite des Teupitzer Sees (A).
- Sonchus arvensis* L. b) *laevipes* Koch am Nicolas-See (U).
- Crepis paludosa* (L.) Mnch. zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- Hieracium auricula* L. bei Tornow (U).
- H. praealtum* Vill. c) *hirsutum* Koch auf den Neuendorfer Wiesen (K).
- H. vulgatum* Fr. auf der Egsdorfer Horst (U).
- Xanthium strumarium* L. bei Baruth (A).
- Campanula persicifolia* L. var. *eriocarpa* M. u. K. auf der Egsdorfer Horst (U).
- Vaccinium vitis idaea* L. bei Halbe (R), am Tütschen- und Briesen-See (U).
- V. oxycoccus* L. zwischen der Halber Strasse und dem Nicolas-See, auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu, am Tütschen See und an den Tornower Teichen (U).
- Chimophila umbellata* (L.) Nutt. an den Klingebergen am Abhange zum Tornower See (U).
- Ramischia secunda* (L.) Gke. mit der vorigen (U).
- Monotropa hypopitys* L. am Nordabhang der Klingeberge, var. *glabra* Rth. an den Egsdorfer Bergen (U).
- Vincetoxicum album* (Mill.) Aschs. Teupitz am Jesenberge, an den Sputendorfer Bergen (U).
- Menyanthes trifoliata* L. bei Egsdorf (U).
- Erythraea centaurium* (L.) Pers. Teupitz an der Schiffbauersstelle, am Westufer des Teupitzer Sees (A).
- Asperugo procumbens* L. Teupitz bei den Scheunen am Wege nach Halbe (U), Baruth beim Wegweiser südlich der Stadt (A).
- Pulmonaria officinalis* L. Schlossgarten in Baruth (Kuhn).
- Cynoglossum officinale* L. bei Egsdorf (Kurts), Neuendorf (U).

Echium vulgare L. weiss mit hellblauer Oberlippe: am Egsdorfer Windmühlenberge (K).

Myosotis caespitosa Schultz auf den Egsdorfer Wiesen (K).

M. intermedia Lk. bei Teupitz, auf der Egsdorfer Horst (U).

Solanum nigrum L. b) *chlorocarpum* (Spennner) Teupitz (R).

Hyoscyamus niger L. in Tornow (U).

Datura stramonium L. Halbe (A), in Tornow (U).

Verbascum thapsiforme Schrad. bei Teupitz (A).

V. lychnitis L. bei Halbe, Teupitz (A), auf der Egsdorfer Horst (U).

Scrophularia alata Gil. auf der Egsdorfer Horst (K).

Linaria minor (L.) Desf. bei Teupitz nach Schwerin zu, auf der Egsdorfer Horst (U).

L. arvensis (L.) Desf. bei Halbe (Ri).

Veronica scutellata L. nach Tornow zu (U).

V. anagallis aquatica L. am Südufer des Tornower Sees (U).

V. beccabunga L. am Tütschen See, am Klingespring beim Tornower See (U).

V. officinalis L. zwischen Halbe und Teupitz (A), im Walde am Tornower See, auf den Sputendorfer Bergen (U).

V. latifolia L. auf der Egsdorfer Horst in der typischen Form (U.)

V. spicata L. auf der Egsdorfer Horst (Ri), am alten Weinberge, an den Sputendorfer Bergen (U), am Mühlenberge bei Baruth (A).

V. verna L. bei Halbe (A), Teupitz (U), Baruth (R).

Pedicularis palustris L. auf den Teupitzer Wiesen, bei den Tornower Teichen, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, bei der Egsdorfer Mühle (U).

Galeopsis ladanum L. a) *latifolia* Hoffm. Halbe (D).

G. tetrahit L. b) *bifida* (v. Boenningh.) an den Tornower Teichen (U).

Stachys sylvatica L. bei Teupitz (T).

S. recta L. auf der Egsdorfer Horst (A), bei Egsdorf, auf den Sputendorfer Bergen (U).

Marrubium vulgare L. Halbe (A), Egsdorf (K).

Scutellaria galericulata L. zwischen Halbe und Teupitz (A), zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, bei Egsdorf, auf der Egsdorfer Horst (U).

Ajuga Genevensis L. auf der Egsdorfer Horst (U).

Verbena officinalis L. in Tornow (U).

- Pinguicula vulgaris* L. auf den Teupitzer und Tornower Wiesen (U).
- Utricularia vulgaris* L. auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu, am Briesen See (U).
- Lysimachia thyrsiflora* L. zwischen der Halber Strasse und dem Nicolas-See (U).
- Centunculus minimus* L. am Nicolas-See (U).
- Hottonia palustris* L. am Gribok-See (U).
- Litorella uniflora* (L.) Aschs. im Tütschen-See (U).
- Plantago ramosa* (Gil.) Aschs. bei Teupitz (A), Egsdorf (K), am Tütschen-See, auf der Egsdorfer Horst, am alten Weinberge, zwischen Sputendorf und Egsdorf (U).
- Chenopodium polyspermum* L. am Tornower und Briesen-See (U).
- C. bonus Henricus* L. bei Teupitz (U).
- C. rubrum* L. am Nicolas-See (U).
- Atriplex roseum* L. Halbe (A).
- Rumex maritimus* L. am Nicolas See (U).
- R. hydrolapathum* Huds. zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- Polygonum minus* Huds. am Nicolas-See (U).
- P. dumetorum* L. zwischen dem Tornower und Briesen-See (U).
- Humulus lupulus* L. auf der Egsdorfer Horst (U).
- Salix pentandra* L. auf Wiesen hinter dem Egsdorfer Mühlen-teiche (K).
- Stratiotes aloides* L. bei Teupitz (A), zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- Sagittaria sagittifolia* L. im Teupitzer See (K).
- Scheuchzeria palustris* L. am Tütschen-See und den Tornower Teichen (U).
- Triglochin palustris* L. bei Egsdorf (A), auf den Neuendorfer Wiesen (K. u. U), am Briesen-, Nicolas-See, auf den Teupitzer Wiesen (U).
- Potamogeton alpinus* Balbis im Teiche bei der Egsdorfer Mühle (K), im Graben zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- P. gramineus* L. a) *graminifolius* Fr. im Teupitzer See (U u. K); b) *heterophyllus* Fr. im Nicolas-See (U).
- P. lucens* L. a) *vulgaris* Cham. im Teupitzer See (U).
- P. praelongus* Wulfen im Teupitzer See (K u. U).
- P. perfoliatus* L. im Teupitzer See (A), hier auch in 2 Exemplaren mit verzweigten Aehrenstielen (K), im Tornower See (U).
- P. crispus* L. im Tütschen-See (U).

Potamogeton compressus L. im Teupitzer See (U), Egsdorfer Mühlenteich (K).

P. mucronatus Schrad. im Egsdorfer Mühlenteiche, in Gräben auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu (U).

P. pusillus L. im Egsdorfer Mühlenteiche (K).

Typha angustifolia L. im Tütschen-See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).

Sparganium ramosum Huds. bei Egsdorf, an den Tornower Teichen (U).

S. simplex Huds. am Tütschen-See (U).

S. minimum Fr. in Törfgräben bei den Tornower Teichen und auf den Teupitzer Wiesen (U).

Calla palustris L. bei Tornow, auf den Egsdorfer Wiesen (U).

Orchis incarnata L. auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu, auf den Neuendorfer Wiesen, bei Tornow (U).

O. incarnata var. *ochroleuca* Wüstnei auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu unweit des Hauptgrabens. — Diese aus der Mark Brandenburg bisher nicht bekannt gewesene Varietät wurde vom Verfasser am 25. Juni 1878 aufgefunden. Während die meklenburgische Pflanze sich nur durch die Blüthenfarbe von der gewöhnlichen purpur blühenden unterscheidet, macht die unsrige, besonders durch die Art und Weise, wie sie sich in der Umgebung der gewöhnlichen, durch keine Uebergänge mit ihr verbundenen Form dem Auge repräsentirt, den Eindruck einer selbständigen Species. Dennoch unterscheidet sich die letztere nur durch folgende Merkmale von der typischen Form. Sie hat eine Höhe von 50—80 cm und eine sehr reichblühige Inflorescenz von 10—17, meist 15 cm Länge, so dass sie der *O. purpurea* Huds. an Grösse nicht nachsteht. Das wohlriechende Perigon ist gelblich-weiss, die gelbe, am Rande hellere Unterlippe kurz 3-lappig, der Mittellappen am Vorderrande aufwärts gewölbt oder in der vorderen Hälfte kappenförmig aufwärts gebogen (U).

Epipactis palustris (L.) Crtz. auf den Neuendorfer Wiesen (K u. U), zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, auf den Teupitzer Wiesen (U).

Liparis Loeselii (L.) Rich. auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu, am Tütschen-See (U).

Polygonatum multiflorum (L.) All. Baruth am Mühlenberge (R).

- Convallaria majalis* L. auf der Egsdorfer Horst (U).
- Anthericum ramosum* L. Baruth am Mühlenberge (A).
- Allium vineale* L. bei Teupitz (D).
- Asparagus altilis* (L.) Aschs. bei Teupitz (T), an der Westseite des Teupitzer Sees (A).
- Juncus capitatus* Weigel zwischen Halbe und Teupitz in Lehmgruben (A), am Tütschen-See (U).
- J. silvaticus* Reichard am Nicolas- und Tütschen-See (U).
- J. supinus* Mnch. am Tütschen-See (U).
- J. squarrosum* L. am Tütschen- und Tornower See (U).
- Luzula pilosa* L. am Klingespring südlich vom Tornower See (U).
- L. campestris* (L.) D.C. b) *multiflora* (Ehrh.) Lej. am Tütschen-See, bei Tornow (U).
- L. Sudetica* (Willd.) Presl am Rande des Tütschen Sees (U).
- Cyperus flavescens* L. am Nicolas-, Tütschen- und Tornower See (U).
- Cladium mariscus* (L.) R.Br. in einem Torfgraben auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu (U).
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl am Tütschen-See und den Tornower Teichen (U).
- R. fusca* (L.) R. u. Sch. an den Tornower Teichen (U).
- Scirpus acicularis* L. am Nicolas-, Teupitzer und Tornower See (U).
- S. pauciflorus* Lightf. in den Wiesen zwischen Egsdorf und Neuendorf (U).
- S. setaceus* L. am Nicolas- und Tornower See (U).
- S. Tabernaemontani* Gmel. am Nicolas-See, auf den Teupitzer Wiesen (U), in den Wiesen zwischen Egsdorf und Neuendorf (K und U), auf der Egsdorfer Horst (K).
- S. maritimus* L. am Teupitzer See (A).
- S. silvaticus* L. bei Teupitz, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U), bei Egsdorf (K).
- S. compressus* (L.) Pers. am Tütschen- und Tornower See (U).
- Eriophorum vaginatum* L. zwischen der Halber Strasse und dem Nicolas-See (U).
- *
E. latifolium Hoppe auf den Teupitzer Wiesen, an den Tornower Teichen (U).
- E. gracile* Koch an den Tornower Teichen (U).
- Carex dioeca* L. auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu, an den Tornower Teichen, am Gribok-See, auf den Neuendorfer Wiesen, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).

- Carex disticha* Huds. auf der Egsdorfer Horst (U).
- C. arenaria* L. bei Teupitz (A).
- C. muricata* L. bei Teupitz (A), auf der Egsdorfer Horst (U).
- C. diandra* Rth. bei Teupitz, am Tütschen-See, bei den Tornower Teichen, am Gribok-See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U), auf den Egsdorfer Wiesen (K u. U).
- C. panniculata* L. auf den Egsdorfer Wiesen, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. paradoxa* Willd. auf den Teupitzer Wiesen nach Schwerin zu (U).
- C. echinata* Murr. am Tütschen-See, an den Tornower Teichen, am Tornower See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. leporina* L. am Tornower und Gribok-See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. canescens* L. zwischen der Halber Strasse und dem Nicolas-See, am Tütschen- und Gribok-See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. limosa* L. auf den Teupitzer Wiesen, am Tütschen- und Gribok-See, bei den Tornower Teichen, auf den Neuendorfer Wiesen, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. flacca* Schreb. bei Egsdorf (K).
- C. digitata* L. an den Klingebergen südlich vom Tornower See (U).
- C. flava* L. a) *vulgaris* Döll auf den Teupitzer Wiesen (U), c) *Oederi* (Ehrh.) am Tütschen- und Nicolas-See, an den Tornower Teichen, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen, auf der Egsdorfer Horst (U), bei Egsdorf (K).
- C. pseudocyperus* L. bei Teupitz, am Tütschen-, Gribok- und Tornower See, auf den Neuendorfer Wiesen, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. rostrata* With. auf den Teupitzer Wiesen, am Tütschen-See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. spadicea* Rth. am Teupitzer See, auf der Egsdorfer Horst, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).
- C. riparia* Curt. bei Teupitz (U).
- C. filiformis* L. zwischen der Halber Strasse und dem Nicolas-See, auf den Teupitzer Wiesen, in Torfgräben bei Tornow (U).
- Phleum Boehmeri* Wib. bei Teupitz (A), auf der Egsdorfer Horst, auf den alten Weinbergen, den Sputendorfer Bergen (U), am Baruther Mühlenberge (A).

Agrostis canina L. auf den Neuendorfer Wiesen (K).

Calamagrostis epigeia (L.) Rth. bei Teupitz (A), zwischen Tornow und dem Briesen-See, auf der Egsdorfer Horst (U).

Holcus mollis L. am Tütschen-See, auf den Egsdorfer Bergen (U).

Avena elatior L. zwischen Halbe und Teupitz (A).

A. pubescens L. auf den Teupitzer Wiesen, der Egsdorfer Horst, den Sputendorfer Bergen, zwischen Zossen und Zehrensdorf (U).

Aera praecox L. am Tütschen-See (U).

Sieglungia decumbens (L.) Bernh. zwischen Halbe und Teupitz (A), auf der Teupitzer Heide, am Tütschen-, Tornower und Briesen-See, auf den Sputendorfer Bergen (U).

Molinia caerulea (L.) Mnch. am Tütschen- und Briesen-See (U).

Graphephorum arundinaceum (Liljebl.) Aschs. in mehreren reinen Beständen an der Egsdorfer Horst, sonst am Teupitzer See mehrfach eingesprengt (A, K, U).

Festuca distans (L.) Kth. am Nicolas-See (U).

F. arundinacea Schreb. auf der Egsdorfer Horst und am Westufer des Teupitzer Sees (A).

Brachypodium pinnatum (L.) P.B. am Teupitzer See nach Schwerin zu, auf der Egsdorfer Horst (U), am Mühlenberge bei Baruth (A).

Bromus inermis Leyss. an der Strasse von Teupitz nach Schwerin, auf der Egsdorfer Horst (U), an den alten Weinbergen (Kuhn).

B. sterilis L. oberhalb Neuendorf (U).

Triticum repens L. b) *caesium* (Presl) Teupitz (A).

Nardus stricta L. zwischen Halbe und Teupitz (A), am Tütschen- und Tornower See, zwischen Neuendorf und den Kaltwasserteichen (U).

Equisetum palustre L. auf der Egsdorfer Horst (U).

Lycopodium clavatum L. im Walde am Tornower See (U).

Ophioglossum vulgatum L. zwischen dem Tornower und Briesensee (U).

Osmunda regalis L. am N.O.-Ufer des Tütschen-Sees (U).

Polypodium vulgare L. im Walde am Tornower See, auf den Sputendorfer Bergen (U).

Aspidium thelypteris (L.) Sw. Egsdorf (A).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1877-1878

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Urban Ignatz (Ignatius)

Artikel/Article: [Zur Flora von Teupitz. 51-64](#)