

Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz.

Zusammengestellt von

H. Potonié.

Ursprünglich bestand die Absicht eine Flora der Priegnitz zu bieten, allein da es mir nicht gelungen ist, das zu diesem Zwecke notwendige Material zusammenzubringen, und da ich die Arbeit abschliessen möchte, so sollen im folgenden als Beitrag zur Flora des bezeichneten Gebietes die mir bisher bekannt gewordenen bemerkenswerteren Standorte gegeben werden. Von den in der Mark gemeineren und häufigeren Pflanzen sind nur dann Standorte aufgenommen worden, wenn es besonderes Interesse erwünscht machte. Hin und wieder sind aus besonderen Gründen bereits veröffentlichte Standorte nochmals aufgeführt worden. Die in der in diesem Bande vorhergehenden Arbeit des Herrn C. Warnstorf mitgetheilten Beobachtungen aus der Gegend von Kyritz hier zu wiederholen, schien überflüssig.

Um dem combinirenden Pflanzengeographen, für den doch die Standortsangaben in erster Linie bestimmt sind, eine Vergleichung möglichst zu erleichtern, bin ich in Anordnung und Nomenclatur bis auf wenige untergeordnete Abweichungen der Flora der Provinz Brandenburg von Ascherson gefolgt.

Ausser den wenigen Beobachtungen, die ich selbst in den Umgebungen von Wittenberge und Lenzen im August 1881 gemacht habe, die durch das übliche Zeichen !! gekennzeichnet wurden, enthält die Liste Beiträge folgender Herren:

Bars (abgekürzt Ba.), Lehrer, theilte mir seine Beobachtungen um Havelberg und Kletzke nordöstlich von Wilsnack mit.

Bartsch (Bt.), Subrektor in Wittstock, botanisirte um Wittstock.

Geyger (G.), Lehrer, botanisirte namentlich um Preddöhl bei Pritzwalk.

Lehmann (L.), Lehrer am Joachimsthal'schen Gymnasium bei Berlin, botanisirte namentlich in der Gegend um Perleberg.

Müller (M.), Cantor in Freyenstein, theilte mir seine Beobachtungen aus den Jahren 1861—1873 mit, die er namentlich auf der Feldmark von Beveringen bei Pritzwalk machte.

Schütz (S.), Lehrer, untersuchte vorzugsweise die Flora um Lenzen. Ihm verdanke ich den grössten Beitrag.

Kleinere Beiträge lieferten die Herren Rector Haase (Wittenberge), Subrector Kuhlmeier (K.) (Perleberg), stud. phil. Marquardt (Ma.), Rector Meyer (Wittstock), stud. phil. Ratti (Ra.) und stud. phil. Rulf (Ru.).

Noch nicht erwähnte Abkürzungen sind:

B. = Beveringen.

Lz. = Lenzen.

H. = Havelberg.

Pe. = Perleberg.

K. = Kletzke.

W. = Wittstock.

! bedeutet, dass dem Herrn Prof. Ascherson resp. dem Verfasser von dem bezüglichen Standort getrocknete Exemplare vorgelegen haben.

Clematis recta L. Elbdeich in der Nähe des Kringeldeiches bei Lz. S.

Thalictrum flexuosum Bernh. Pe.: Nur bei Guhlow gefunden L.

T. minus L. Wustrower Berg (Thonmergel) bei Lz. S.; Papenbruch bei W. Bt.

T. angustifolium Jacq. Preddöhl G.; Dossow und Fretzdorf bei W. selten Bt.; Pe.: Torfstich zwischen Neue Mühle und Lübsow L.

Hepatica triloba Gil. Lz. nicht gefunden S.; Pe. nicht bemerkt L.; B. M.; W. Bt.

Pulsatilla vulgaris Mill. Gadow und Bochin bei Lz. S.; Pe.: Bürgerberge bei Bollbrück, Perlhof L.

P. pratensis Mill. Bäckern, Gadow und Sandberge bei Lz. S.; Pe. nicht selten L.; B. M.

Anemone nemorosa L. Lz. S.; Pe. häufig L.; B. M.; W. Bt.; H. Ba. b. *purpurea* E.Gray Lz. S.

A. ranunculoides L. Lz.: Im Oberholz wenig und selten blühend S.; Pe. zerstreut: Landgraben, Rieselei L.; B. M.; W. Bt.; H.: Mühlenholz Ba.

Myosurus minimus L. Lz.: Elbniederung S.; Pe. sehr häufig L.

Ranunculus divaricatus Schrk. Löcknitz, Rudower See u. s. w. bei Lz. S.; Pe. häufig L.; H. Ba.

R. fluitans Lmk. Löcknitz bei Lz. S.; H.: Havel Ba.

R. Lingua L. Rudower See bei Lz. S.; Pe.: Gräben bei Bollbrück L.; B. M.; W. Bt.

R. lanuginosus L. Lz.: Wälder bei Stavenow 50—80 cm hoch S.; Pe.: Junger Laubwald an der Chaussee zwischen Reetz und Vahrnow L.; Preddöhl G.; B. M.; nicht selten im Forst von W. Bt.

R. bulbosus L. Lz. S.; Pe. L.; W. Bt.

R. sardous Crtz. Häufig in der Elbniederung bei Lz. S.; Pe. nicht häufig, Schönfeldt L.; W. Bt.

R. arvensis L. Lz. S.; Pe. zerstreut: Aecker nach Sückow und Blüthen hin L.; B. M.; W. zerstreut Bt.

Nigella arvensis L. Hin und wieder auf Aeckern bei W. Bt.

Actaea spicata L. 1875 beim neuen Forsthouse im Forst von W. in einigen Exemplaren beobachtet Bt.

Papaver dubium L. Lz. S.; Pe. nicht selten L.; W. Bt.

Corydalis intermedia Mérat. Lz.: Rudower See S.; B. M.; am Wall und Canal bei W. Bt.; Pe.: Neue Mühle L.; K.: Kaninchenwald Ba.

Nasturtium fontanum Aschs. Lz.: Rudower See, Treben S.; Dossegräben bei W. Bt.; Pe.: an der Stepenitz L.

N. armoracioides Tausch. (emend.)? oder *N. anceps* Wlhnbg. (= *N. amphibium* × *silvestre*)? Lz.: Elbniederung, kurze Länder am Wege nach Mödlich S.

Barbarea lyrata Aschs. Lz.: Elbwiesen zerstreut S.; Pe.: an der Stepenitz L.; H.: Havelwiesen Ba.

B. stricta Andrzej. Lz.: Elbwiesen häufig S.; Pe.: Platenhof L.; H. Ba.

Turritis glabra L. Elbufer bei Lz. S.; Landgraben bei Pe. L. Wilsnack: zwischen Gnevsdorf und Abendorf Ru.! B. M.; Kirchhof von W., Eichenfelde Bt.; H. Ba.

Cardamine amara L. Rudower See, Quellgrund bei Lz. S.; Pe.: an der Stepenitz nach Lübsow, Rieselei L.; im neuen Jakel Ru.! in Gräben und Bächen des Laubwaldes nördlich von Pritzwalk häufig Ra.! B. M.; W. Bt.; Gr. Welle Ba.

Alyssum calycinum L. Krienitz bei Lz. S.; Pe.: Holzhof, Hamburger Chaussee L.; B. M.; H. Ba.

† *Cochlearia Armoracia* L. Elbchausseegräben bei Lz., in der Gegend nie gebaut, in Gärten als unverilgbares Unkraut S.; zahlreich verwildert an der Hamburger Chaussee bei Pe. L.; an der Elbe bei Wittenberge!! W.: Siebmannshorst Bt.

Camelina sativa Crtz. (emend.) Felder bei Lz. S.; unter Flachs bei Pe. L.

Thlaspi arvense L. Felder bei Lz. S.; Pe. nicht selten: Aecker vor dem Hamburger Thor L.; B. M.; W. Bt.; H. Ba.

T. perfoliatum L. Wie schon in Aschersons Flora angegeben H.: Weinberg Ba. 1881!

† *Lepidium sativum* L. Moor bei Lz. S.; H.: neuer Kirchhof Ba.

L. campestre R.Br. Krienitz bei Lz., einige Exemplare auf einem Kleefeld S.; Pe.: auf dem Eisenbahndamm der Hamburger Eisenbahn bei der Dergenthiner Windmühle einmal in Menge L.; B. M.

L. ruderale L. Pe. nicht häufig L.; H.: Schutthaufen bei der Telitz'schen Ziegelei Ba.

Coronopus squamatus Aschs. Lz. bei den Scheunen S.; bei Pe. nicht bemerkt L.; H.: Steinpflaster vor dem städtischen Schulhause und der höheren Bürgerschule Ba.

Vogelia panniculata Horn. Felder des Rudower Sees S.; Pe. einmal in Menge bei Perlhof L.; W. zerstreut Bt.

Helianthemum Chamaecistus Mill. b. *obscurum* Pers. (sp.) Am Stolper See bei Kyritz Ra.!

Viola palustris L. Torfmoor bei Lz. S.; Bollbrück, Kuhwinkel bei Pe. L.; Wittenberge!! Pritzwalk: Dömnitzufer M.; Hauswiesen bei W. Bt.; H.: Wöplitz Ba.

V. odorata L. Burgberg bei Lz. S.; W. Bt.

V. persicifolia Schreb. a. *elatior*: Kringeldeich, b. *stagnina*: Kringeldeich, Elbwerder bei Lz. häufig S.

Reseda Luteola L. Lz.: Elbdeich aussetzend S. In grosser Menge an der Elbe von Wittenberge bis Cumlosen L.

Drosera rotundifolia L. Gadow bei Lz. S.; Pe.: Wiesen an der Stepenitz, Bollbrück L.; Preddöhl G.; B. M.; W.: Dossow Bt.

D. intermedia Hayne. Pe.: Gräben zwischen der Dergenthiner Windmühle und Kuhwinkel unweit des Eisenbahndammes L.

Gypsophila muralis L. Schweineweide, Kuhblank bei Lz. S.; Pe.: nur Kuhwinkel L.; K., Gr. Welle Ba.

Tunica prolifera Scop. Lanz und Wustrower Berg (Elbabhänge am Hoebeck) S.; Landgraben bei Pe. L.; H. Ba.!

(† *Dianthus barbatus* L. Hitzacker Berge in der Nähe eines Ackerstückes am Waldrande reichlich verwildert S.)

D. Armeria L. Kuhblankgraben bei Lz. S.; Pe.: Quitzower Landgraben spärlich L.; Gr. Welle Ba.

D. Carthusianorum L. Häufig auf Sandfeldern bei Lz. S.!! um Pe. ziemlich selten, nur am Wege nach dem Jägerhause und im Walde dort L.; H. vereinzelt Ba.

D. deltoides L. Elbdeich und Niederung bei Lz. S.; Wittenberge!! B. M.; W. häufig Bt.; Pe. sehr häufig L.; H. häufig Ba.

D. superbus L. Vereinzelt am Waldrande bei W. Bt.

Saponaria officinalis L. Sandberge und Elbfelder bei Lz. S.!! Fischergarten a. d. E. gefüllt S.; Rechtes Elbufer zwischen Wittenberge und Wahrenberg!!

Cucubalus baccifer L. Elbgebüsch bei Lz. oft aussetzend S.; H.: Möwenwerder Ba.

Viscaria viscosa Aschs. Sehr häufig im Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.!! B. M.; Pe.: Landgraben L., Ponitz Ba.

Silene nutans L. Landgraben bei Pe. L.; Freyenstein M.; Hottenburg, Forst von W. Bt.

S. Otites Sm. Lz. S.!! Kiefernwälder bei Pe. zerstreut L.; H. Ba.

† *S. gallica* L. (emend.) Oefter unter Serradella bei Pe. L.

Melandryum rubrum Gke. Lanz bei Lz. S.; Kuckucksbach südlich der Mühle bei Streckentin bei Pritzwalk Ra.! Logengarten, Forst bei W., Jabel Bt.; Pe.: Neue Mühle L.; K. Ba.

Spergula vernalis Willd. Lz. gemein S.

Alsine viscosa Schreb. Pe.: Aecker vor Quitzow L.

Sagina nodosa Fenzl. b. *glandulosa* Besser (sp.) Hopfenhöfe bei Lanz S.

Stellaria nemorum L. Nausdorf bei Lz. S.; Pe.: Junger Laubwald an der Chaussee zwischen Reetz und Vahrnow L., Neuer Jakel Ru.! Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.! M.; Gr. Welle Ba.

S. Holostea L. Lz.: Rudower See S.; Landgraben, neue Mühle, Bollbrück bei Pe. L.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.! B. M.

S. uliginosa Murr. Lz.: Hechtsfurtgraben S.; Pe.: An der Stepenitz nach Lübsow zu L.

S. crassifolia Ehrh. W.: Neuendorf Bt.

Cerastium glomeratum Thuill. Lz.: Rudower See S.

Radiola multiflora Aschs. Quitzow, Kuhwinkel bei Pe. L.; Turnplatz vor Lz. S.; Wittenberge!! B. M.; K. Ba.

Malva Alcea L. Wustrow und Rambow bei Lz. S.; Pe.: Kl. Linde, Rosenhagen, Premslin, L.; B. M.; Papenbruch bei W. Bt.

Hypericum quadrangulum L. Elberwerder bei Lz. S.; Pe. nicht häufig, Perlhof L.; Vehlow bei Kyritz M.; Forst bei W. nicht häufig Bt.

H. humifusum L. Lz.: Stavenow, Rudow S.; Pe. häufig, neue Mühle, Kuhwinkel L.; B. M.

H. montanum L. Forst von W. selten Bt.

H. hirsutum L. Mühlenholz bei H. Ba. noch 1881!

Geranium palustre L. Lz.: Im Gebüsch am Rudower See S.; Pe.: Gräben nach der Bullenwiese L.; Kyritz: östlich von Kollrep Ra.! W. Bt.

G. sanguineum L. Weinberg bei Pe. L.; B. M.

G. dissectum L. Wenig an der Elbchaussee bei Lz. S.

G. columbinum L. Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.

Impatiens noli tangere L. Lanz bei Lz. S.; Pe.: Jägerhaus, Junger Laubwald an der Chaussee zwischen Reetz und Vahrnow L.; Nettelbeck G.; Forst von W., Zaatzke Bt.; Pe.: Laubwald bei der Viasecker Dampfmühle Ba.

Oxalis Acetosella L. Lz.: Rudower See, Gadower Park S.; Pe.: Neuer Jakel Ru., Bollbrück L.; B. M.; W. Bt.

Euonymus europaea L. (ex parte). Feldränder der Kuhblank bei Lz. S.; Perlhof bei Pe. häufig L.; W. am Kanal vereinzelt Bt.; H. Ba.

Rhamnus cathartica L. Lz.: Kuhblank S.; Neue Mühle und zerstreut in Gebüsch und Wäldern um Pe. L.; B. M.

Sarothamnus scoparius Koch. Lz.: sandige Felder und Kiefernwälder gemein S.!! B. M.; W.: Heide bei Wulfersdorf Bt.; H. Ba.

Genista tinctoria L. Landgraben bei Pe. L.; Wilsnack: Plattenburg Ma.! B. M.; Forst von W. Bt.

G. germanica L. Kiefernwälder bei Lz. S.; Pe. nicht bemerkt L.; B. M.

G. anglica L. Gadow, Lz. gemein S.; Pe. gemein L.

Anthyllis Vulneraria L. Lz. am Elbdeich selten S.; Pe. wild nicht häufig; Chausseeegraben der Hamburger Chaussee L.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.; rechtes Elbufer zwischen Wittenberge und Wahrenberg!! B. M.; W. Bt.; am Wege von K. nach Viesecke Ba.

Medicago falcata L. Lz.: Wustrower Berg S.; Pe. L.; H. Ba.

Melilotus officinalis Desr. Lz. Ba.; Hamburger Chaussee bei Pe. L.

Trifolium alpestre L. H. Ba.! Forst von W. Bt.; Pe.: an der Chaussee nach Wittenberge L.

T. medium L. B. M.; Pe. zerstreut L.; H. Ba.

T. fragiferum L. Werder und Elbniederung bei Lz. S.; Pe. nicht bemerkt L.; B. M.

T. montanum L. Pe. nicht bemerkt L.; Forst von W. zerstreut Bt.

T. hybridum L. Elbniederung bei Lz. sehr häufig S.; Rieselei und Gräben bei Pe. L.; K. Ba.

T. agrarium L. Lz.: Rudower See S.; Pe.: Bollbrück, Perlhof L.

Astragalus glycyphyllos L. Rudower See S.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.! Streckenthin M.; Forst von W.: Chausseeegraben Bt.; Landgraben bei Pe. L.

Ornithopus perpusillus L. Lz. S.; Pe. L.; B. M.; Dossow, Papenbruch, Liebenthal Bt.; H. Ba.

Vicia tetrasperma Schreb. Wiese vor dem Wilsnacker Thor von Pe. und Schonung nach der Scharfrichterei hin L.; Wittenberge Haase! H.: Mühlenholz Ba.

Herr Schütz hat eine in der ganzen Kuhblank von Lz., d. h. auf der grossen Fläche der Niederung von Lz. an dem rechten Ufer der Elbe vorkommende Varietät der *Vicia tetrasperma* beobachtet und mir zugesandt, die der *V. gracilis* Loisl. sehr nahe kommt und vielleicht besser mit dieser identifiziert wird. Die Höhe der reich verzweigten Varietät erreicht 50 cm. Der Stengel ist schwach geflügelt. Blättchen lineal bis 16 mm lang und bis 3 mm breit. Die unteren abgerundet mit aufgesetztem Spitzchen, die oberen lang zugespitzt, bis 6-paarig. Blütenstand meist 3-, selten weniger- oder mehr-blütig, sein Stiel häufig länger als das Blatt, sonst gleichlang. Krone 5—7 mm lang, dunkler als bei der typischen *V. tetrasperma* von Lz. Während die Hülsen von *V. tetrasperma* von Lz. 10—12 mm Länge bei 4 mm Breite erreichen, zeigt unsere Varietät bis 15 mm lange Hülsen, ebenfalls bei 4 mm Breite. Zahl der Samen in den Hülsen 5—6; sind nur 4 Samen vorhanden, so ist nach der Angabe von Schütz der 5., wenigstens der Anlage nach, vorhanden, aber nicht zur Ausbildung gekommen.

Ich halte es für das Naturgemässeste die beiden in Rede stehenden Arten zusammenzuziehen.

V. cassubica L. Wustrow S.; Hamburger Chaussee bei Quitzow L. (*V. tenuifolia* Rth. Hitzacker Berge S.)

(*V. villosa* Rth. Hitzacker Berge S.)

V. sepium L. Am Rudower See häufig S.; Forst von W. Bt.

V. sativa L. (ex parte) var. *imparipinnata* H. Potonié,¹⁾ wurde von Herrn Subrektor B. Kuhlmeij, der mir getrocknete Exemplare zusandte, bereits im Juli 1865 an der Chaussee nach Spiegelhagen und nach dem städtischen Forsthause Bollbrück beobachtet und auch im Jahre 1882 wiedergefunden.

Einige Samen, die mir Herr K. mitteilte, wurden in diesem Herbst in einem Gewächshause des Botanischen Gartens ausgesät. Die bis jetzt entwickelten 2-paarigen wenigen Blätter der Keimpflanzen zeigén keine Spuren von Ranken.

V. lathyroides L. Lz. S.; Pe. nicht selten L.; H. Ba.; B. M.; W. Bt.

Lathyrus tuberosus L. Kuhblank, bei der Ziegelei bei Lz., jedoch wieder verschwunden S.; Hottenburg, Forst von W. Bt.

L. silvester L. Lz.: Wustrower Berg S.; Laubwald zwischen Kubbier und Wolfshagen bei Pritzwalk Ra.! Forst von W. Bt.; Pe.: Landgraben L.

L. paluster L. Lz. S.; an der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.

L. vernus Bernh. Forst von W. Bt.

Prunus spinosa L. Lz. S.; W. Bt.; H. Ba.

b. *coaetanea* Wimm. et Grab. Lz.: Rudower Seeufer S.

P. Padus L. Lz.: Lanz S.; Pe.: Bollbrück L.; W. Bt.

Ulmaria Filipendula A.Br. B. M.; Hottenburg bei W. Bt.; H. Ba.

Rubus idaeus L. Torfmoor bei Lz. S.; Forst von W. Bt.; Pe. L.

R. saxatilis L. Pe.: Am rechten Ufer der Jeetze nahe bei Bollbrück L. (*Fragaria moschata* Duchesne. Hitzacker Berge in der Nähe eines Ackerstückes am Waldrande sehr reichlich S.)

F. viridis Duchesne. Kuhblank, Oberholz bei Lz. S.

Potentilla supina L. Lz.: Elbwerder einige Exemplare S.; Pe.: In Sückow und Düpow L.

P. verna L. Lz. S.

P. opaca L. Weinberg bei Pe. L.; B. M.

Alchemilla vulgaris L. Lz.: Stavenow S.; Neue Mühle bei Pe. spärlich L.; B. M.; W.: Chausseeegraben vor dem Kyritzer Thor, beim neuen Försterhause nicht häufig Bt.; K. Ba.

A. arvensis Scop. Lz.: Rambow S.; Pe. gemein L.; B. M.; H. Ba.

¹⁾ Vergl. 1. Verhandl. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. von 1881, S. 138. 2. Monatsschrift des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues. Herausgegeben von Wittmack. Berlin 1881. S. 558.

Sanguisorba officinalis L. Elbdeich bei Lz S.; zwischen Wittenberge und Cumlosen an der Elbe L.; Dossewiesen bei Eichenfelde Bt.

Rosa rubiginosa L. Weinberg, Landgraben bei Pe. L.

Crataegus Oxyacantha L. Lz. S.; H. Ba.

Pirus communis L. Pe.: Mergelgrube in der Nähe des Quitzower Landgrabens L.

P. Malus L. Wie *P. communis* L.

Epilobium angustifolium L. (ex parte). Lz.: Nausdorf S.; Stadtforst von Pe. L.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.! Kloster Techow M.; W. Bt.; H. Ba.

E. hirsutum L. (ex parte). Lz.: Rudower See, Moor'sche Sumpfwiesen (hier ein weissblühendes Exemplar gefunden) S.; Stepenitz bei Pe. L.; B. M.; W. am Canal Bt.; K. Ba.

E. montanum L. Pe.: Zwischen Reetz und Vahrnow L.

E. roseum Schreb. Lz.: Torfmoor bei Nausdorf S.; B. M.; W. Bt.

E. tetragonum L. Lz.: Im Kuhblankgraben häufig S.

Oenothera muricata L. Lz.: Turnplatzberge S., am Bahnhof!!

O. Braunii Döll = *O. biennis* × *muricata* Lz.: am Bahnhof!!

Circaea lutetiana L. Pe.: Junger Laubwald an der Chaussee zwischen Reetz und Vahrnow L.; Pritzwalker Hainholz M.; H. Ba.! Forst von W. Bt.

C. alpina L. Sehr vereinzelt im Forst von W. Bt.

Hippuris vulgaris L. Fehlt nach S. in der Umgegend von Lz. und wurde auch von L. weder bei Pe. noch an der Elbe gefunden. Forst von W. (Elslake) selten Bt.; H. nicht gefunden Ba.

Callitriche stagnalis Scop. (emend.) Lz.: Gräben, Hechtsfurt S.

Lythrum Hyssopifolia L. Lz. S.; an der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.

Peplis Portula L. Gräben der Kuhblank S.; Tangendorf und an der Elbe L., rechtes Elbufer zwischen Wittenberge und Wahrenberg!!

Bryonia alba L. (ex parte). Zäune und Hecken bei Lz. S.; Dransee und Kirchhof von W. Bt.; H., K. Ba.

Montia minor Gmel. Kuhblank, Elbdeich bei Lz. häufig S.; Pe.: Neue Mühle auf Aeckern und an der Stepenitz nach Lübsow zu auf quelligem Wiesengrund sehr üppig L.; Preddöhl G.; B. M.

Corrigiola litoralis L. Elbufer bei Lz. häufig S.; Pe.: auf dem Wege nach der Dergenthiner Windmühle, an der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.!! zwischen Gadow und Bernheide häufig K.!

Illecebrum verticillatum L. Aecker zwischen der Dergenthiner Windmühle und Kuhwinkel L., K.! Wittenberge: am Hamburger Eisenbahndamm Reimann! Haase! Kemnitz bei Pritzwalk M.; K. Ba.

Sedum maximum Suter. Lz. S.!! Pe. L.; Wittenberge!! B. M.; Forst von W. Bt.; H. Ba.

S. reflexum L. (emend.) Lz. S.; Pe. L.; B. M.; W. Bt.; K. Ba.

Ribes nigrum L. Torfmoorgebüsch bei Nausdorf S.; Pe.: an der Stepenitz L.; K. Ba.

Saxifraga tridactylitis L. Pe.: Aecker nach Quitzow hin L.; B. M.; W.: Hottenburg, Jabeler Ziegelei Bt.; K. Ba.

Chrysosplenium alternifolium L. Quellgrund bei Lz. S.; Neue Mühle bei Pe. L.; nordwestlich von Wilsnack, im neuen Jakel Ru.! B. M.; Rothe Mühle, Jabel, Forst von W. Bt.; K. Ba.

Sanicula europaea L. Oberholz von Lz. S.; Pe.: Junger Laubwald an der Chaussee zwischen Reetz und Vahrnow L.; Preddöhl G.; nicht selten im Forst von W. Bt.

Eryngium campestre L. Kuhblank S.; an der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.!! H.: Mühlenholz Ba.

Cicuta virosa L. Lz.: Rudower See, Löcknitz zerstreut S.; an der Stepenitz, Rieselei bei Pe. L.; B. M.; Dosse, Canal Bt.

Falcaria sioides Aschs. Lz.: Rudow S.; H. Ba.; Dossow Bt.; Pe. L.; H. Ba.

Pimpinella magna L. Pe.: Junger Laubwald an der Chaussee zw. Reetz und Vahrnow L.; B. M.

Berula angustifolia Koch. Lz.: Rudower See S.; Pe. nicht selten L.; B. M.; W. Bt.

Cnidium venosum Koch. Lz.: Elbdeich zerstreut, Bullenkamp reichlich S.

Silaua pratensis Bess. Lz.: Elbufer S.; Pe.: Quitzower Wiesen nahe dem einzelnen Gehöft „Hennings auf dem Berg“ L.; H. Ba.!

† *Levisticum paludapifolium* Aschs. Preddöhl G.

Selinum Carvifolia L. Lz.: Pinnow S.; Preddöhl G.; B. M.; Pe. L.

Archangelica sativa Bess. Preddöhl G.; Pe.: an der Stepenitz häufig L.; K. Ba.

Peucedanum officinale L. Elbdeich am Kringeldeich bei Lz. S.

Tordylium maximum L. H.: Weinberg noch jetzt seit Joachimi 1794 Ba.!

Anthriscus Scandix Aschs. Eldenburg bei Lz. S.

Chaerophyllum bulbosum L. Lz.: Ackerränder der Kuhblank häufig S.

Conium maculatum L. Lz. S.; Pe. einzeln auf Schutt L.; B. M.; W. Bt.; H. Ba.

Hedera Helix L. Rudow S.; Bollbrück L.

Viscum album L. Wittenberge M.; Pe. nie bemerkt L.

Adoxa Moschatellina L. Lz. S.; Pe. sehr häufig L.; B. M.; W. Bt.; H., K. Ba.

Sambucus nigra L. Auf der Thurmspitze der Burg in Lz.!!

Viburnum Opulus L. Kuhblank bei Lz. S.; Pe.: Neue Mühle L.; K. Ba.

Lonicera Periclymenum L. Wilsnack: Plattenburg Ma.! Forst von W. Bt.
Sherardia arvensis L. Einmal Kirchplatz von Lz. S.; Einige Male
 einzeln gefunden bei Pe. L.; B. M.; Preddöhl G.; K. Ba.

Asperula arvensis L. Lz.: am Wilberg'schen Garten, Mai 1876,
 später nicht gefunden S.

A. cynanchica L. Lz.: Rudower See, Gadow S.; Wittenberge Haase!
 H.: Sandgruben Ba.

A. odorata L. Lz.: Rudower See häufig S.; B. M.; sehr häufig
 im Forst von W. Bt.

Galium Cruciatum Scop. Elbdeich bei Lz. S.; Wilsnack: Elbdeich
 bei Baelow Ru.! An der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.!

G. boreale L. Lz.: Elbufer S.; Pe. nicht bemerkt L.; Wiesen
 bei W. Bt.; H. Ba.

G. verum L. Lz. S.; W. nicht gefunden Bt.; kommt auch nach
 einer brieflichen Mitteilung des Rectors L. Meyer in Wittstock in der
 Umgegend dieser Stadt nicht vor, jedoch beobachtete Meyer diese Art
 östlich von Dransee; B. M.; Wittenberge!! H. gemein Ba.

G. silvaticum L. Pe.: Bollbrück L.; W. am Kanal Bt.

Valerianella dentata Poll. Lz. S.; mehrfach auf Aeckern um Pe.
 L.; K. Ba.

Dipsacus silvester Mill. Lz.: Elbniederung häufig S.

Cephalaria pilosa Gren. Damm zur Fähre bei Lz. S., Ba.

Scabiosa columbaria L. Pe.: Weinberg, Landgraben L.; W. hin
 und wieder Bt.

S. suaveolens Desf. Pe.: Spiegelhagen L.; H. Ba.! Wittenberge
 Haase!

Tussilago Farfara L. Lz.: Rudow S.; Pe.: Gräben zwischen der
 Hamburger Chaussee und Perlhof L.; B. M.; W.: Gabkes Garten Bt.;
 H., K. Ba.

Petasites officinalis Mch. Gadow an der Löcknitz S.; Pe.: an
 der Hamburger Chaussee L.; B. M.; W.: vor dem Amtore Bt.; K. Ba.

P. tomentosus DC. Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen
 L.!! Lz.: Elbufer gemein S.; Kyritz: östlich von Kollrep Ra.!

Aster salicifolius Scholler. Im Weidengebüsch am Elbufer bei
 Mödlich, Rüterwerder S.

Erigeron acer L. Lz. S.; B. M.; K. Ba.

Inula salicina L. Preddöhl G.; B. M.; Quitzower Wiesen nahe
 dem einzelnen Gehöft „Hennings auf dem Berg“ L.

Pulicaria prostrata Aschs. Elbniederung bei Lz. S.; Pe.: Düpow,
 Schönfeldt L.; Kemnitz M.; rechtes Elbufer zwischen Wittenberge und
 Wahrenberg!!

P. dysenterica Gaertn. Lz.: Pröttlin einzeln S.

Xanthium italicum Moretti. Elbufer bei Lz. S.; Elbufer zwischen
 Wittenberge und Cumlosen L.!!

Bidens cernuus L. (em.) b. *radiatus* DC. Löcknitz bei Lz. S.

† *Galinsoga parviflora* Cav. Lz. S.; B. M.; Wittenberge!! Pe. L.,
Kl. Welle: Schutthaufen Ba.

Filago germanica L. Pe.: Spiegelhagen L.; W.: Kl.- und Gr.-
Hasslow Bt.; K. Ba.

Gnaphalium silvaticum L. Lz.: Kuhblank S.; Pe.: am Wege nach
Sückow L.; K., Viesecke Ba.

G. luteo-album L. Lz. und Gadow S.; Pe.: Kuhwinkel, Sückow
etc. L.; K. Ba.

Anthemis tinctoria L. Pe.: Gühlitz L.

A. Cotula L. Pe.: Schönfeldt und andere Dörfer L.; Gantikow
Ra.! W. Bt.

Chrysanthemum vulgare Bernh. Elbdeich bei Lz. gemein S.; Pe.
sehr häufig L.; Elbufer zwischen Wittenberge und Wahrenberg!! W.
Bt.; H. Ba.

† *C. suaveolens* Aschs. Bei Lz. 1875 einmal gefunden S.

C. inodorum L. Lz. S.; Pe. mehrfach gefunden L.; W. nicht
häufig Bt.; H. Ba.

C. segetum L. Am Bahnhof von Lz. sporadisch S.; W. sehr
selten Bt.; H.: Mühlenholz Ba.

Arnica montana L. Lz.: Gadow beim Försterhause S.; B. M.; Pred-
döhl G.; Schönfeldt, Gühlitz und Bollbrück L.; zwischen Kuhbier und
Wolfshagen und nördlich von Pritzwalk Ra.! W.: Berlinchen, Dransee Bt.

Senecio paluster DC. Lz.: Nausdorfer Torfmoor S.; Freyensteiner
Moor M.; Pe.: Torfstich bei Bollbrück und Lübsow L.; Dosse, Canal,
Hauswiesen bei W. Bt.

S. viscosus L. Rambow S.; Städtisches Forsthaus bei Pe. L.

S. silvaticus L. Lz.: Eldenburg S.; Pe.: städtisches Forsthaus L.;
W.: Karstädtshof Bt.

S. vernalis W.K. Jackel bei Lz., jetzt wieder verschwindend S.;
Dowesee bei Kyritz Ru.! B. M.; Pe.: Aecker links vom Wege nach
Sückow (Tonkithal) L.; K. Ba.

S. aquaticus Huds. Die gemeinste Art der Elbniederung bei Lz.,
im Hainholz ohne Strahl beobachtet S.; Bullenwiese bei Pe. L.; rechtes
Elbufer zwischen Wittenberge und Wahrenberg!!

S. sarracenicus L. Linkes Elbufer bei Lz. S.

S. paludosus L. Rechtes Elbwerder bei Lz. S.

Centaurea Jacea L. forma *tomentosa* Aschs. Elbchaussee bei Lz.
S.; Wittenberge!!

C. Scabiosa L. Lz. S.; Pe. häufig an Ackerrändern L.

C. rhenana Boreau (= *paniculata* Jacq.) Lz.: Marienberg, Wus-
trower Berg, Eisenbahn häufig S.; Pe. selten, nur zwischen dem Wege
nach Lübsow und der Pritzwalker Chaussee beobachtet L.; H. Ba.!

Serratula tinctoria L. Preddöhl G.; Pe.: Tangendorf L.; W.: Mühle bei Dransee Bt.; H. Mühlenholz Ba.

Jurinea monoclona Aschs. Reichlich nordwestlich von Wittenberge auf Sandhügeln unweit des Kirchhofes Haase!! zuerst von Reimann gefunden¹⁾.

Lappa officinalis All. Elbdeich, Oberholz bei Lz. häufig S.; Pe.: junger Laubwald an der Chaussee zwischen Reetz und Vahrnow L.; H., K. Ba.

L. macrosperma Wallr. Oberholz bei Lz. zerstreut S.

L. tomentosa Lmk Oberholz und Elbchaussee bei Lz. S.!! Pe. mehrfach auf Schutt L.; B. M.; K. Ba.

Carduus crispus L. Lz. Oberholz S.; Pe. zerstreut in Hecken L.

Cirsium oleraceum Scop. Lz.: Lanz nicht zu häufig S.; B. M.; K. Ba.

C. acaule All. Quitzower Wiesen L.; B. M.

C. palustre Scop. fl. albo in Menge auf den Rieselwiesen bei Pe. L.

Arnoseris minima Lk. Lz. zerstreut S.; Pe. häufig L.; B. M.; W. Bt.; K. Ba.

Thrinicia hirta Rth. Pe.: Sückow L.

Tragopogon major Jacq. W. selten Bt.; H. Ba.

Scorzonera humilis L. Lz.: Haideboden bei Krienitz S.; Pe.: Jägerhaus am Wege nach Schilde, Schönfeldt L.

Chondrilla juncea L. Kirchhofberge bei Lz. und am Bahnhof häufig S.!! Pe. häufig L.; Wittenberge!! W. Bt.; H., K. Ba.

b. *acanthophylla* Borkh. (sp.) Lz.: Sandberge bei Bobrow S.

Sonchus asper All. Lz. S.; W. Bt.; K. Ba.

Crepis virens Vill. Lz. S.; Pe. nicht selten L.

C. paludosa Mch. Lz.: Rudower See S.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.! B. M.; Pe. häufig im Hagen L.

Hieracium Auricula L. Pe.: Kuhwinkel, Quitzow L.

H. praealtum Vill. (em.) a. *genuinum* Aschs. Pe.: auf einem Wall bei den Quitzower Wiesen nahe dem einzelnen Gehöft „Hennings auf dem Berg“ L.

H. pratense Tausch. Elbniederung bei Lz. gemein S.; H. Ba.! Pe.: zwischen Reetz und Vahrnow L.; H. Ba.

H. sphaeroccephaloides Lange == *H. Pilosella* × *pratense*. Kringeldeich bei Lz. mit den Stammeltern, an mehreren Stellen der Elbniederung bei Lz. S.

H. vulgatum Fr. Kiefernwälder bei Lz. S.

H. boreale Fr. Oberholz bei Lz. häufig S.; W. Bt.

Phyteuma spicatum L. Lz.: Stavenow S.; Freyenstein M.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.! Pe.: im Nadelwalde östlich der Bollbrücker Chaussee L.; Forst von W. nicht selten Bt.

¹⁾ Vergl. Abhandl. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. 1881 S. 128.

- Campanula rapunculoïdes* L. Lz. S.; Pe. L.; B. M.
C. Trachelium L. Lz. S.; W. Forst Bt.; Pe. L.; K. Ba.
C. Rapunculus L. Lz.: nasses Dreieck am Bahndamm und Rudow S.
C. persicifolia L. Pe. Landgraben L.; W. Bt.
C. glomerata L. W. Forst selten Bt.; K.: Gr. Welle Ba.
Vaccinium Myrtillus L. Lz.: Eldenburg S.; B. M.; Forst von W. Bt.; H. Ba.
V. uliginosum L. Zerstreut beim Forsthause bei Gadow S.
V. Vitis idaea L. Pe.: Zwischen Bollbrück und Wilsnack L.; Forst von W. Bt.
V. Oxycoccus L. Lz.: Moorwiesen bei Rambow S.; Birkenbruch bei Pritzwalk M.; W.: Fretzdorf, Neuendorf, Theerofen Bt.
Arctostaphylos uva ursi Spr. Lz.: Bochin, Gadow S.
Erica Tetralix L. Krienitz, Gadow, 1 Exemplar auf dem Turnplatz von Lz. S.; Pe.: Preddöhl G.; B.: Stepenitz M.; Bollbrück zwischen d. Dergenthiner Windmühle u Kuhwinkel L.; Roddahner Forst Ba.
Ledum palustre L. Gadow S.; W.: Neuendorf Bt.; Roddahner Forst Ba.
Pirola rotundifolia L. Forst von W. Bt.
P. chlorantha Sw. Pe.: Lübsow L.
P. minor L. Rudow S.; Gebüsch an der Rieselei nahe dem Schützenhause bei Pe. L.; nördlich von Pritzwalk Ra.! Forst von W. Bt.
P. uniflora L. Forst von W. Bt.
Chimophila umbellata Nutt. Lz.: Rudow, Nausdorf S.; Forst von W. Bt.
Ramischia secunda Gke. Lz.: Rudow S.; zerstreut um Pe. L.
Monotropa Hypopitys L. Lz. S.; Pe. nicht selten L.; Klosterheide bei Tathow M.; Forst von W. Bt.
Ilex Aquifolium L. Lz.: Stavenow S.; Pe.: Düpow L.
Vincetoxicum album Aschs. Wustrower Berg S.
Vinca minor L. Pe.: in einem fast isolirt liegenden Teile der Stadtforst unweit Uenze in ungeheurer Menge ganze Strecken dicht überziehend, jedoch nicht blühend gefunden L.; am Wilmssteig im Forst von W. Bt.
Limnanthemum Nymphaeoides Lk. Lz.: Löcknitz, Elbbracks bei Lz. gemein S.!! Karthane bei Wittenberge L.
Gentiana Pneumonanthe L. Lz.: Rambow S.; zwischen der Dergenthiner Windmühle und Kuhwinkel L.; W.: Eichenfelde Bt.
Cuscuta Epithymum Murr. Lz. häufig S.; B. M.; Pe. L.
C. Epitimum Weihe. Flachsfelder bei Lz. S.; W. Bt.
C. lupuliformis Krocker. 1881 am Elbdeich bei Mödlich entdeckt, auf *Salix viminalis* zwischen *Aster salicifolius* S.!
Asperugo procumbens L. Lz. S.; Pe. L.; H. Ba.! W. Bt.

Cynoglossum officinale L. Lz.: Lanzer Mühle, Bobrow sehr zerstreut S.; B. M.; Preddöhl G.; W. Bt.

Symphytum tuberosum L. An dem seit 1840 bekannten Standort Oberholzweide bei Lz. S.

Pulmonaria officinalis L. B. M.; Preddöhl G.; Forst von W. bei Below Bt.

Myosotis caespitosa Schultz. Elbchaussee bei Lz. S.; W. Bt.

M. versicolor Sm. Lz. S.; B. M.; an der Elbe bei Wittenberge L.; W. Bt.

M. hispida Schlecht. sen. Lz. S; Pe. nicht selten L.; H. Ba.

M. intermedia Lk. Elbterrain bei Lz. S.; Pe. nicht selten L.; H. Ba.

M. sparsiflora Mikan. Lz.: Rudower See, Mödlich am Deich S.

Solanum villosum Lmk. b. *alatum* Meh. Lz.: Marienberg S.

S. Dulcamara L. Lz.: Auf der Thurmspitze der Burg in der Mauer ein grosses Exemplar!!

Hyoscyamus niger L. Lz. Wische, Seedorf S.; Pe. nicht gesehen L.; B. M.; W. Bt.

Verbascum phlomoides L. Lz. S.

V. Lychnitis L. Lz.: Lanz, Rambow S.; H., K. Ba.

V. nigrum L. fl. albo. Lz.: Rambow S.; H., K. Ba.

V. ramigerum Schrd. = *V. thapsiforme* × *Lychnitis*. Lz.: weniger Exemplare am Moor der Rambower Berge, 1877 S.

V. Schiedeanum Koch. = *V. Lychnitis* × *nigrum*. Lz.: Wustrower Berg, 1876 S.

V. Blattaria L. Elbdeich bei Lz. oft aussetzend und sehr zerstreut S.!! H.: Einige Exemplare an Wiesengraben in der Nähe vom Mühlenholz Ba.

Scrophularia alata Gil. Lz.: Nausdorf S.; B. M.; Rieselei bei Pe. L.; Jabel Bt.

† *Linaria Cymbalaria* Mill. An einer Gartenmauer in Lz. S.

Gratiola officinalis L. Elbniederung, Elbchaussee bei Lz. S.; Pe.: an der Hamburger Chaussee L.; Wittenberge M.!! bis Wahrenberg!! W. Bt.

Limosella aquatica L. Elbufer bei Lz. S.; zwischen Wittenberge und Wahrenberg am Elbufer!!

Digitalis ambigua Murr. W.: Schweinerich vereinzelt Bt.

Veronica longifolia L. (em.) An der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.; fl. albo Kringeldeich bei Lz. S.

V. persica Poir. Preddöhl G.

V. agrestis L. Lz. S.; B. M.; H. Ba.

Pedicularis silvatica L. Lz.: Krienitz, Gadow S.; Quitzower Wiesen L.; Preddöhl M.; Kuckucksbach bei Streckenthin Ra.!

P. palustris L. Lz. S.; B. M.; Rothe Mühle bei W. Bt.

Melampyrum cristatum L. Forst von W., Gabkes Garten Bt.

M. arvensis L. Einmal unter Getreide an der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.

M. nemorosum L. Lz.: Jackel am Rudower See S.; Kyritz: Kollrep Ra.! B. M.; Wusterhausen a. D. Dr. O. Hoffmann; Pe. ziemlich häufig L.; Forst von W. Bt.

Orobanche caryophyllacea Sm. Hainholz bei Pritzwalk M.

Lathraea Squamaria L. Pritzwalk Hainholz M.; am Canal bei W. Bt.

Mentha Pulegium L. (em.) Elbufer bei Lz. häufig S.; B. M.; Cumlosen L.

Calamintha Clinopodium Spenner. Jackel bei Lz. S.; B. M.; W. hin und wieder Bt.

Salvia pratensis L. Weinberg bei H. in grosser Menge Ba.!!

Lamium maculatum L. (em.) Lz.: Oberholz, Mödlich am Deich häufig S.; B. M.; am Kuckucksbach bei Streckenthin Ra.! selten bei W. Bt.; Pe. L.

L. dissectum With. Lz.: Treben, auf Ackerländereien an 100 Exemplare S.! Diese so lange gesuchte vielleicht hybride Form (*L. amplexicaule* × *purpureum*) ist nun endlich innerhalb der Provinz gefunden.

L. Galcobdolum Crtz. Oberholz bei Lz., Hopfengärten bei Lanz S.; Hainholz bei Pritzwalk M.; Preddöhl G.; Forst von W. nicht selten Bt.; Bollbrück L.

Galeopsis Ladanum L. Lz.: Rambow S.; Pe. nicht selten L.; B. M.; K. Ba.

G. speciosa Mill. Am Rudower See S.; Wittenberge!! W. nicht selten Bt.

Stachys silvatica L. Lz.: Rudower See S.; Pe.: Rosenhagen L.; B. M.; nördlich von Pritzwalk Ra.! Forst von W. Bt.

S. arvensis L. Preddöhl G.; Pe.: Spiegelhagen L.; W.: Biesen und Zaatzke Bt.; H., K. Ba.

S. recta L. Lz.: Wustrow S.; Wilsnack: Klein-Leppin Ma.!, H.: Weinberg Ba.!!

S. Betonica Benth. Mergelgrube zwischen Pe. und der neuen Mühle L.; B. M.; Preddöhl G.

Chaeturus Marrubiastrum Rehb. Lz.: Feldränder nach der Elbe, Elbdeich sehr zerstreut und aussetzend S.

Scutellaria hastifolia L. Elbniederung, Werder bei Lz. S.; an der Elbe zwischen Wittenberge und Cumlosen L.

S. minor L. Kuhwinkel bei Pe. von L. September 1873 entdeckt K.!¹⁾

Ajuga reptans L. Rosablühend bei Lz. und Stavenow nicht selten S.; in der Forst von W. nicht häufig Bt.; Pe. L.; H. Ba.

¹⁾ Vergl. Sitzungsber. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. 1876, S. 106.

Teucrium Scordium L. Am Rudower See, Werder bei Lz. S.; Pe. an Gräben nicht häufig L.

Plantago ramosa Aschs. Cumlosen häufig K.! H. Ba.! Feldweg hinter dem Hagen bei Pe. L.; Wittenberge und zwischen Wittenberge und Wahrenberg am rechten Elbufer S.!!

Pinguicula vulgaris L. Lz.: Krienitz S.; Preddöhl M.; Rothe Mühle bei W. früher gefunden, jetzt vermisst Bt.

Utricularia vulgaris L. Lz.: Elde bei Moor S.

U. minor L. Lz.: Torfmoor von Nausdorf S.

Centunculus minimus L. Lz. S.; Pe.: zwischen der Dergenthiner Mühle und Kuhwinkel L.; K. Ba.

Trientalis europaea L. Pe.: Bollbrück L.

Lysimachia thyrsoflora L. Lz.: am Rudower See S.; B. M.; Pe. an der Stepenitz L.; W. nicht häufig Bt.

Primula officinalis Jacq. Lz.: am Rudower See S.; Pe.: Landgraben sehr häufig L.; Forst von W. Bt.; H., K. Ba.

Amarantus retroflexus L. H. Ba.

Polycnemum arvense L. Pe. L.; H., K. Ba.

Salsola Kali L. Lz.: Bahnhof aussetzend, Eldenburg S.; Pe.: Kl. Lüben L.

Chenopodium polyspermum L. Elbniederung bei Lz. häufig S.; B. M.; Wittenberge!! K. Ba.

C. Vulvaria L. In mehreren Dörfern um Pe. L.

C. urbicum L. Pe.: Klein Lüben L.

C. glaucum L. Elbstrand bei Lz. S.; in mehreren Dörfern um Pe. L.

C. bonus Henricus L. Lz. S.; B. M.; in mehreren Dörfern um Pe. L.; K. Ba.

Atriplex hortense L. Treben bei Lz. S.; Wittenberge!!

A. roseum L. In mehreren Dörfern um Pe. L.

Rumex maritimus L. Elbufer bei Lz. häufig S.; zwischen Wittenberge und Wahrenberg!!

b. *paluster* Sm. (sp.) Elbufer bei Lz. sehr zerstreut S.; zwischen Wittenberge und Wahrenberg!!

Rumex maximus Schreb. = *R. Hydrolapathum* × *aquaticus*. Hagengräben bei Lz. häufig S.!

Polygonum Bistorta L. Lz.: Hopfengärten bei Lanz S.; Preddöhl G.; Pe.: Hagen, Rosenhagen L.; Kyritz: östlich von Kollrep Ra.! W. Bt.; K. Ba.

P. mite Schrk. Lz.: Bullenkamp in einem Wasserloch S.

P. minus Huds. Oberholz b. Lz. S.; Verschiedene Dörfer um Pe. L.

P. dumetorum L. Lz. S.; W. Bt.

† *Aristolochia Clematitis* L. B. M.; vereinzelt W. Bt.

Asarum europaeum L. Preddöhl M.

Tithymalus Esula Scop. Lz. S.; Wilsnack Ma.! zwischen Witten-

berge und Wahrenberg!! W.: Kyritzer Chaussee nach Fretzdorf Bt.; Pe. L.

T. Cyparissias Scop. Lz.: Bahnübergang am See S.; Kyritz Ra.! B. M.; Bollbrück und Dergenthin selten L.; W. gemein Bt.; H. gemein Ba.

T. exiguus Mch. Preddöhl G.; H. Ba.!

Mercurialis perennis L. Lz.: Gadow S.; Jabel, Forst von W.; bei Below beim Holzwärterhaus Bt.

† *Elodea canadensis* Casp. Lz.: Löcknitz, Rudower See S.; Pe.: neue Mühle, selbst in Mergelgruben, deren Wasser keinen Abfluss hat (um Perlhof) L.

Triglochin palustris L. Lz. S.; um Pe. nicht selten, z. B. Quitzower Wiesen L.; B. M.; W. Bt.

Butomus umbellatus L. Lz. S.; B. M.; Pe.: Rieselei L.; zwischen Wittenberge und Wahrenberg!! H. Ba.

Potamogeton compressus L. (ex p.) In der Stepenitz bei Pe. L.

P. pusillus L. Lz. S.; in der Stepenitz bei Pe. L.

P. pectinatus L. Pe.: Stepenitz L.

Lemna gibba L. Unter den 3 anderen Arten in der Löcknitz bei Lz. S.

Calla palustris L. Moor bei Lz. Eldegräben S.; Preddöhl M.; W.: Zaatze G.; Scharfenberger Mühle Bt.

Orchis Morio L. Lz.: Kubblank einmal beobachtet S.; Pe.: Quitzow L.; Preddöhl G.; B. M.; W.: Jabeler Wiesen (Vogelsang) Bt.

O. maculata L. Lz.: Rudower See Krienitz S.; Pe. nicht selten bei der neuen Mühle L.; nördlich von Pritzwalk Ra.! B. M.

Gymnadenia conopsea R.Br. Preddöhl G.; Pe.: Rosenhagen L.

Platanthera bifolia Rchb. Pe.: Kuhwinkel L.; Preddöhl G.; Freyenstein M.; W. früher, jetzt nicht mehr Bt.

Herminium Monorchis R.Br. Pritzwalk: Schönbeck G.

Cephalanthera rubra Rich. Vereinzelt beim 2. Forsthause von W. 1879 Bt.

Epipactis latifolia All. Lz.: Stavenow S.; Pe. L.; nördlich von Pritzwalk Ra.! H. Ba.

E. palustris Crtz. Unweit Alt-Krüssow M.; Rothe Mühle bei W. Bt.

Neottia Nidus avis Rich. Forst von W. Bt.

N. ovata Bl. et Fing. Lz.: Rudower See S.; nördlich von Pritzwalk Ra.! Forst von W. Bt.; Laubwald zwischen Reetz und Vahrnow L.; K. Ba.

Goodyera repens R.Br. Forst von W. beim Theerofen, Jagen 56 Bt.

Liparis Loeselii Rich. Lz.: Torfmoor bei Rambow S.; W.: Neuendorf Bt.

Malaxis paludosa Sw. W.: Neuendorf Bt.

Leucoium vernum L. K.: Zander'sche Gartenwiese Ba.

- Paris quadrifolius* L. Lz.: Nausdorfer Torfmoor S.; Pe.: Quitzow L.; Pritzwalk M.; Kyritz: östlich von Kollrep Ra.! Forst von W. Bt.
- Polygonatum multiflorum* All. Lz.: Rudower See S.; Pe. nicht selten L.; B. M.; Kyritz: Kollrep Ra.! Wilsnack: Abbendorf Ru.! W. Bt.; K. Ba.
- Convallaria majalis* L. Lz.: Hechtsfurtgraben, Gadow, Stavenow S.; Pe. sehr häufig L.; Pritzwalk Ra.! W. Forst Bt.
- Majanthemum bifolium* F.W.Schmidt. Lz. S.; Pe. häufig L.; Kyritz: Kollrep Ra.! Pritzwalk M.; Forst von W. Bt.; H. Ba.
- Gagea silvatica* Loud. Lz.: Kuhblank S.
- Ornithogalum umbellatum* L. Elbdeich bei Lz. S.; B. M.; Pe.: Quitzow L.; H. Ba.
- Allium Schoenoprasum* L. Beide Elbufer bei Lz., am linken häufig, am rechten seltener S.; Elbufer zwischen Wittenberge und Cumlosen L.
- A. acutangulum* Schrad. Elbufer zwischen Wittenberge und Cumlosen L.
- A. Scordoprasum* L. (ex p) H. Ba.! häufig auf den Elbdeichen bei Lz. S.
- A. vineale* L. (em.) Lz. S.; Pe. nicht selten L.
- A. oleraceum* L. Elbniederung bei Lz. S.; Pe. nicht selten L.; B. M.
- Anthericum Liliago* L. Lz. S.; Pe. nicht bemerkt L.; Hottenburg, Forst von W. Bt.
- A. ramosus* L. H. Ba! Pe.: Weinberg, städt. Forst L.; Hottenburg, Forst von W. Bt.
- Juncus glaucus* Ehrh. Lz.: Rudower See S.; Pe. einzeln an der Stepenitz L.; K. Ba.
- J. filiformis* L. Neue Mühle bei Pe. L.
- J. squarrosus* L. Gadow S.; Pe.: Bollbrück, Kuhwinkel L.; B. M.; K. Ba.
- J. Tenagea* Ehrh. Lz.: Halbstücken, Moor, Deibow, Krienitz S.
- J. capitatus* Weigel. Lz. S.; Pe.: Aecker bei Quitzow und Kuhwinkel L.; zwischen K. und Vieseke Ba.
- J. supinus* Mch. Lz. S.; Pe. Stadtforst L.
- J. alpinus* Vill. Turnplatz von Lz. S.; Kuhwinkel L.
- J. obtusiflorus* Ehrh. Lz.: Nausdorfer Torfmoor S.; Pe.: Kuhwinkel L.
- Cyperus fuscus* L. Pe.: Quitzower Wiesen, Grabenränder L.
- Rhynchospora alba* Vahl (ex p.) Lz.: Gadow S.; Wittenberge Haase!
- Scirpus acicularis* L. Pe. häufig L.; rechtes Elbufer zwischen Wittenberge und Wahrenberg!!
- S. setaceus* L. Lz. häufig S.; Pe.: Gühlitz L.; zwischen Wittenberge und Cumlosen L.
- S. Tabernaemontani* Gmel. Lz.: Am Rudower See S.
- S. maritimus* L. Elbufer bei Lz. S.; Pe.: Sückow L.

S. compressus Pers. Lz.: Rudower See am Leuengarten S.; an der Stepenitz bei Pe. bei der Badeanstalt L.

Eriophorum vaginatum L. Lz.: Gadow S.; Pe.: Gross-Lüben Ru.! sonst ziemlich häufig L.

E. latifolium Hoppe. Lz.: Rudower See S.; am Kuckucksbach bei Pritzwalk Ra.! Pe. ziemlich häufig L.

Carex dioeca L. (ex p.) Lz.: Torfmoor bei Nausdorf S.

C. arenaria L. Turnplatzberge bei Lz. häufig S.!! Pe. gemein L.; H. Ba.

C. ligERICA Gay. Lz. häufig S; Pe.: zwischen Bollbrück und Uenze L.

C. brizoides L. Eichwald südöstlich von Abbendorf Ru.!

C. paradoxa Willd. Pe.: Lübsower Torfstich L.; Wilsnack: nordwestlich von Gross-Lüben Ru.!

C. paniculata L. (ex p.) Lz.: Am Rudower See S.; Kemnitz M.; südöstlich von Abbendorf, nordwestlich von Gross-Lüben Ru.! Pe. meist häufig L.

C. diandra Rth. Lz.: Torfwiesen bei Rambow S.

C. leporina L. b. *argyroglochis* Horn. (sp.) Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.!

C. remota L. Pe.: Katzenbusch bei Bollbrück L.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.!

C. montana L. Pe.: Gühllitz L.

C. limosa L. Nausdorf S.; Pe.: Bruch südlich von Bollbrück L.

C. flacca Schreb. Lz.: Krienitz S.; Pe.: an Mergelgruben bei Quitzow L.

C. pallescens L. Lz. S.; Pe.: Klein-Linde, Lübsow L; nördlich von Pritzwalk Ra.! B. M.

C. silvatica Huds. Laubwald zwischen Reetz und Vahrnow L.

C. Pseudocyperus L. Hechtsfurtgraben bei Lz. S.; Pe.: Lübsow Bollbrück L.

C. rostrata With. Kleine Wiese, Hagen bei Lz. S.; Pe.: Lübsow, Bollbrück L.

C. filiformis L. Zwischen dem Jakel und dem Wege von Pe. nach Wilsnack Ru.!

Milium effusum L. Pe.: Junger Laubwald an der Chaussee zwischen Reetz und Vahrnow, Landgraben bei Perlhof L.; Freyenstein M.; H. Ba.

Stipa pennata L. H. Ba.!

Nardus stricta L. Lz.: Rudower See S.; Pe. an der Stepenitz häufig L.; Wittenberge!! B. M.; K. etc. Ba.

Phleum Boehmeri Wib. Lz.: Wustrow S.; Stadtforst bei Pe. L.; H. Ba.!

Agrostis canina L. Lz. S.; K. Ba.

- Calamagrostis lanceolata* Rth. Pe.: Bollbrück, Kuhwinkel L.; K. Ba.
C. neglecta Fr. Lz.: Torfmoor bei Nausdorf, am Rudower See S.
C. arenaria Rth. Turnplatzberge, Bahnhof bei Lz. S.!! Pe.: Klein-Lüben L.
Holcus mollis L. Lz.: Moor S.; Pe.: Lübsower Heide L.; Wilsnack: Plattenburg Ma.!
Avena elatior L. Elbdeich bei Lz. S.; Wilsnack: am Elbdeich bei Abbendorf. Ru.!
A. pratensis L. H. Ba.!
Trisetum flavescens P.B. Rieselei an der Stepenitz bei Pe. L.; H. Ba.!
Aera caryophyllea L. Kuhwinkel und Stadtforst von Pe. L.; H. Ba.!
A. praecox L. Lz. S.; Kuhwinkel und Stadtforst von Pe. L.; H. Ba.!
A. flexuosa L. Lz. S.; B. M.; zwischen Wilsnack und Forsthaus Plattenburg Ma. Pe. L.; K. Ba.
Sieglingia decumbens Bernh. Krienitz S.; Pe. häufig L.
Molinia coerulea Meh. Lz. S.; B. M.; Pe. ziemlich häufig L.
Melica uniflora Retz. H. Ba.!
Koeleria glauca DC. Lz. S.; Pe. Stadtforst L.; K. Ba.
Poa nemoralis L. Lz. S.; Pe. Landgraben L.; K. Ba.
P. compressa L. Lz.: Rudower See S.; Pe. Stadtmauer L.; K. Ba.
Festuca gigantea Vill. Lz.: Wälder der Elbe S.; Pe.: zwischen Reetz und Vahrnow L.; B. M.
Bromus inermis Leyss. Elbdeich bei Lz. S.; Pe. häufig L.; H. Ba.!
B. sterilis L. Pe. häufig L.; Lz. Bahndamm S.; H. Ba.
Brachypodium pinnatum P.B. Pe. Stadtforst L.; H. Ba.!
B. silvaticum P.B. (em.) Elbdeich bei Lz. S.; H. Ba.
Triticum caninum L. Lz. S.; K. Ba.
Hordeum arenarium Aschs. Bahnhof bei Lz. S.!!
Lolium remotum Schrk. Lz. unter Flachs S.; Pe. unter Flachs L.
Festuca elongata Ehrh. = *F. elatior* × *Lolium perenne*. Kirchhofsmauer bei Lz. S.
Juniperus communis L. Lz. S.; Pe.: Stadtforst, Düpower Viehweide L.; H. Ba.
Lycopodium Selago L. Theerofen bei W., Dossow Bt.
L. annotinum L. Im Nadelwald östlich von der Bollbrücker Chaussee bei Pe. L.
L. clavatum L. Lz.: Krienitzhaide S.; Pe. Stadtforst, Lübsower Haide L.; H. Ba.; Theerofen bei W. Bt.; H.: Langer Berg in der K. Forst Ba.
L. inundatum L. Lz.: Wieblitzpfahl S.; Pe.: an der Stepenitz Lübsow gegenüber L.
L. Chamaecyparissus A.Br. Theerofen bei W. vom Rector Meyer entdeckt Bt.
Equisetum silvaticum L. Lz.: Leuengarten am Rudower See S.; junger

Laubwald zwischen Reetz und Vahrnow L.; Laubwald nördlich von Pritzwalk Ra.!

E. hiemale L. Rudower See S.; Pe.: Düpower Landgraben L.; W.: Goldbeck Bt.

Ophioglossum vulgatum L. Lz.: Rudower See S.; Pe.: Quitzower Wiesen nahe dem einzelnen Gehöft „Hennings auf dem Berg“ L.

Botrychium Lunaria Sw. Lz.: Gadow S.

B. ranosum Aschs. Lz.: Bei der Dergenthiner Windmühle am Wege nach Nebelin spärlich L.

Osmunda regalis L. Lz.: Moor, Bochin, Polz S.; Pe.: am rechten Ufer der Jeetze bei Bollbrück L.; W.: Nattenhaide Bt.

Polypodium vulgare L. Lz. S.; Pe. Wälder häufig L.; Wilsnack: linkes Karthaneufer bei Plattenburg Ma! Canal bei W. Bt.; H. Ba.

form. *auritum* Willd. Lz.: Mödlich auf alten Weidenstämmen S.

Asplenium Ruta muraria L. Strebepfeiler der Wilsnacker Kirche Ma! Stad.mauer von W. Bt.

Phegopteris Dryopteris Fée. Rudower-See S.; Forst von W. sehr häufig Bt

P. polypodioides Fée. Forst von W. Bt.

Aspidium cristatum Sw. Lz.: Bobrow Gadow, Nausdorf S

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Potonié Henry

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz. 159-179](#)