

Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz (II).

Von

Bars, H. Buchholz, A. Hasenow, R. Lauche,
F. Meyerholz, Näther, R. Rietz.

Redigirt von P. Ascherson und H. Potonié.

Seit der Veröffentlichung der in den Abhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 1882 S. 159—179 abgedruckten ersten Sammlung floristischer Beobachtungen aus der Priegnitz hat sich wiederum ein nicht unerhebliches Material aus diesem Landesteile angesammelt, das wir hiermit der Oeffentlichkeit übergeben. Der Mitstifter unseres Vereins, Herr Cantor Buchholz (Bch.) in Eberswalde, hatte auf wiederholten Besuchen seiner Heimat, der Gegend von Kletzke bei Wilsnack, Gelegenheit, die dortige Flora zu erforschen; zur leichteren Uebersicht wurden auch seine in den Sitzungsber. 1882 S. 112 veröffentlichten Notizen wiederholt.

Dieselbe Gegend hat neuerdings in Herrn Cantor Näther (N.) und Herrn cand. phil. Arnold Hasenow (Hw.) zwei eifrige Erforscher gefunden; letzterer hatte die Güte ein vollständiges Verzeichnis der selteneren Pflanzen mitzuteilen und durch seine Vermittelung gingen uns auch weitere Beobachtungen des Herrn Lehrers Bars (Ba.) in Havelberg zu, der schon für das erste Verzeichnis Beiträge geliefert hatte. Die Gegend von Freyenstein wurde durch Herrn Lehrer R. Rietz (R.) erforscht, unter dessen Funden namentlich die nun endlich für die Provinz gesicherte *Gagea spathacea* (Hayne) Schult. Erwähnung verdient (vgl. Verh. 1884 S. XXIII). Die von ihm gesammelten Pflanzen haben sämtlich H. Potonié vorgelegen. Aus der Gegend von Lenzen hatte Herr Pharmaceut F. Meyerholz (Mz.), der sich daselbst von 1874—1876 aufhielt und die botanische Erforschung zuerst in Angriff nahm, den von Herrn Schütz mitgeteilten Fundorten, von denen er einen grossen Teil zuerst aufgefunden hat, noch manche Ergänzungen hinzuzufügen.

Endlich machte Herr Kreis-Obergärtner R. Lauche in Kyritz einige Mitteilungen aus dortiger Gegend, unter denen besonders die Auffindung der in der Provinz so seltenen *Pirola media* Sw. sehr erfreulich ist.

Herr Lehrer G. Lehmann (Kgl. Joachimsthal'sches Gymnasium) teilte noch den vor Kurzem von ihm gemachten Fund der *Viola epipsila* Ledeb. mit. Da Herr Warnstorf dieselbe auch bei Luckau aufgefunden hat, so liegt nur noch der südwestliche Gebietsteil ausser-

halb des jetzt festgestellten Verbreitungsbezirks dieser jedenfalls vielfach übersehenen Art.

Die Abkürzungen der Ortsnamen sind dieselben wie im ersten Verzeichnis: H. = Havelberg, K. = Kletzke, Lz. = Lenzen, Pe. = Perleberg, hinzugekommen ist noch Pu. = Putlitz. Die den Arten vorgeetzten Zahlen sind die laufenden Nummern in P. Aschersons Flora der Provinz Brandenburg.

P. Ascherson. H. Potonié.

1. *Olematis recta* L. H.: Havelabhang bei Toppel (seit Philippi vor 1834) Ba.; südlich von Werben a. E. Hw.

3. *Thalictrum flexuosum* Bernh. H.: Galgenschonung und Aecker in ihrer Nähe Ba.

6. *T. angustifolium* Jacq. K.: Zwischen Grube und Vieseke Bch.

7. *T. flavum* L. Ebendasselbst Bch.

8. *Hepatica triloba* Gil. K.: Nur Buchenberg bei Plattenburg Hw. F.: Massower Forst R.

12. *Pulsatilla pratensis* (L.) Mill. F.: Chausseegraben nach Wittstock und Ochsenkamp R. Kyritz: Kahnstelle am Bantikower See Lauche.

14. *Anemone nemorosa* L. var. *purpurea* Gray. H.: Mühlenholz Ba.

15. *A. ranunculoides* L. F. nicht selten R.

25. *Ranunculus Lingua* L. F.: Massower Forst R.

33. *R. arvensis* L. K.: Gr. Welle Hw.

38. *Nigella arvensis* L. H.: Zwischen Schmokenberg und Toppel, Aecker (seit Dräseke, vor 1841) Ba.

40. *Delphinium Consolida* L. H.: Häufig Ba. K.: Nur auf einem kleinen Fleck nördlich vom Orte, sonst nirgends Hw.

50. *Corydallis cava* (L.) Schw. Pu.: In dem Knicks bei Tacken N. Neu für die Priegnitz.

52. *C. intermedia* (L.) Mérat. K.: Park Hw.

63. *Barbarea stricta* Andrzej. H. (Engelbrecht): Chaussee nach Sandau Ba.

64. *Turrilis glabra* L. F.: Chausseegraben nach Wittstock R.

71 c. *Cardamine pratensis* L. Var. *uniflora* Sternb. et Hoppe. Lz.: Kaninchenhaus Mz.

72. *C. amara* L. Kyritz: Am Stolper See in der Stadtforst Lauche.

88. *Berteroa incana* (L.) DC. Nördlich von H. Hw.; K.: Nur eine Stelle in Gr.-Wertzien Hw. Pe. Auf der Düpower Kirchhofsmauer Hw.

98. *Lepidium ruderales* L. Nur Wittenberge: Eisenbahn N.

101. *Vogelia panniculata* (L.) Horn. H. Ba.

Viola epipsila Ledeb. Pe.: Gräben unweit der Dergenthiner Windmühle mit n. 116 und *Scutellaria minor* L. Lehmann.

115. *Drosera rotundifolia* L. Kyritz: Kahnstelle Lauche.

116. *D. intermedia* Hayne. Lz.: Gadow Mz.; Moorbruch bei Gr.-Schmölen Ba.

123. *Gypsophila muralis* L. K.: Gr.-Welle Hw.; F.: Massow R.
125. *Dianthus Armeria* L. K.: Gr.-Welle, Gänsekoppel Ba., Hw.; Kl.-Leppin, an der Chaussee Hw.
130. *D. superbus* L. Lz.: Gadow Mz.; F.: Freyensteiner Moor R. Kyritz: „See“ bei Grantzow Lauche.
131. *Saponaria officinalis* L. H.: Am Fusse des Weinberges Ba., nördlich der Toppel'schen Ziegelei 1858 Ascherson; K.: Beim Kirchhofe Hw.; Wilsnack vor Lennewitz Hw.
133. *Cucubalus baccifer* L. H.: Quitzöbel innerhalb des Elbdeiches Hw.; Weg von Wilsnack nach Gnevsdorf am Knick (im Inundationsgebiet der Elbe) Hw.
136. *Silene nutans* L. K.: Kronsberg bei Gr.-Wertzien Beh.
142. *Melandryum rubrum* Gke. K. (Ba): Am Graben nördlich der Chaussee Hw.; Lz.: Verbreitet Mz.; F. (Ludwig): Nur an der Dossebrücke R.
157. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl. var. *glandulosa* (Bess.) Lz.: Beim Kaninchenhaus massenhaft Mz.
161. *Stellaria nemorum* L. K.: Park am Bache Hw.
169. *Cerastium glomeratum* Thuill. K.: Nicht selten Hw.
179. *Radiola multiflora* (Lmk.) Aschs. Lz.: Gemein Mz.
180. *Malva Alcea* L. K. Beh.
191. *Hypericum humifusum* L. Lz.: Sehr häufig Mz.
194. *H. hirsutum* L. Lz.: Hainholz am Fusswege Mz.
200. *Geranium palustre* L. Lz.: Nicht selten Mz.; F.: Freyensteiner Moor R.
203. *G. dissectum* L. Lz.: Oberholz, nicht selten Mz.
204. *G. columbinum* L. H.: Bock'scher Weinberg (seit Engelbrecht) Ba.; K.: Kühle Bäk, Buschhorning Hw. F.: Auf dem Wall R.
210. *Impatiens Noli tangere* L. F.: Buchenwald am Massower See R.
- † *Ruta hortensis* Lmk. H. Ba.
- Ulex europaeus* L. Heide bei Quitzow (westlich Pe.) nur drei wohl 6' hohe Exemplare Kuhlmei. Der Apotheker Zuckschwerdt fand *Ulex* im Schlossgarten zu Rühstedt nur angepflanzt. F.: Am Lindengraben ebenfalls nur wenige Exempl., im Febr. 1883 blühend Langwisch! (comm. Kuhlmei).
218. *Genista tinctoria* L. F.: Im Ochsenkamp R.
219. *G. germanica* L. K.: Selten Hw.; F., wie vorige R.
220. *G. anglica* L. K.: Häufig Hw., Beh., z. B. zwischen Vieseke und Rambow Bh.
- * *Lupinus angustifolius* L. K.: Gr.-Leppin weissblühend Hw.
229. *Melilotus altissimus* Thuill.? Wilsnack: Bei Gnevsdorf an der Elbe über 8' hoch Hw.
233. *Trifolium alpestre* L. F.: Chausseeegraben nach Wittstock R.

242. *Trifolium hybridum* L. K. (Ba.): Zernikower Eichen Hw. Zwischen Wilsnack und Gnevsdorf in Menge mit *T. fragiferum* L. Hw.
- 243 *T. elegans* Savi. K.: Vor Gr.-Welle an der Chaussee rechts von N. vor Jahren gefunden; ausgegangen.
245. *T. agrarium* L. Lz.: Nicht selten Mz.; Kyritz (Warnstorf): Zwischen Demmerthin und Gumtow Lauche.
253. *Astragalus glycyphyllus* L. K.: Gr.-Welle, Gänsekoppel Hw.
262. *Vicia cassubica* L. Kyritz: Zwischen Demmerthin und Gumtow Lauche.
270. *Lathyrus tuberosus* L. H.: Aecker bei Toppel (seit Engelbrecht) Ba.
271. *L. silvester* L. Pu.: Gühlitz, Salatwald N.
274. *L. paluster* L. H. Ba.
282. *Ulmaria Filipendula* (L.) A.Br. fehlt bei K. Hw.
300. *Rubus saxatilis* L. Pu.: Hegeholz bei Gühlitz N.
309. *Potentilla collina* Wib.? K.: Gruber Wald, einmal Hw.
312. *P. mixta* Nolte. Pe.: Dergenthin: Silge Hw.
319. *Alchemilla vulgaris* L. K. (Ba.): Wiesen östlich vom Dorfe Hw. F.: Wiesen nach Grabow R.
320. *A. arvensis* (L.) Scop. Lz.: Gemein, im Diluvium Mz.
321. *Sanguisorba officinalis* L. H. Ba.
324. *Agrimonia odorata* Mill. K.: Gebüsch an der Hellkuhle Hw., Beh.
344. *Circaea lutetiana* L. F.: Massower Forst R.
- 345b. *C. intermedia* Ehrh. K.: Zernikower Eichen Hw.
349. *Hippuris vulgaris* L. Um H. und K. gar nicht, aber 1883 Lz. an der Löcknitz-Mündung in Menge gefunden Ba. (vgl. Abh. 1882 S. 166).
358. *Peplis Portula* L. Lz.: Gemein in unmittelbarer Nähe der Stadt, vor den Thüren der Häuser, am Bahnhof, Kirchhof etc. mit n. 501, 1018 und 1040.
- † *Portulaca oleracea* L. K.: Vieseke im Pfarrgarten Hw.
361. *Montia minor* Gm. Lz.: Verbreitet, z. B. auch bei Moor Mz.
363. *Corrigiola litoralis* L. H.: Sandauer Holz (seit Engelbrecht) Ba.
366. *Illecebrum verticillatum* L. K: Acker am Gruber Wald; am Wilsnacker Weg links alles weiss davon Hw.; Zwischen Vieseke und Rambow Beh.; Kyritz: Stolpe auf einem Haferschlage neben dem Siebgraben; östlich von Kyritz am Stolpe-Wusterhauser Wege Lauche.
376. *Sedum reflexum* L. F.: Chausseegraben nach Wittstock R.
379. *Ribes rubrum* L. K.: Zernikower Eichen Hw.
382. *Saxifraga tridactylitis* L. K.: Häufig Hw.
384. *Chrysosplenium alternifolium* L. F. R.
386. *Sanicula europaea* L. Pu.: Gühlitz im Hegeholz N.

388. *Eryngium campestre* L. Am Elbdeich von Quitzöbel bis Lz. Hw.
 392. *Helosciadium repens* Koch. Freyensteiner Moor (Dosse) R.
 396. *Pimpinella magna* L. K.: Gruber und Plattenburger Wald; nicht selten Hw.
 407. *Cnidium venosum* Koch. Zwischen K. und Gr.-Leppin Bch. Lz.: Ziemlich häufig Mz.
 412. *Archangelica sativa* Bess. K. (Ba.): Gräben südlich und westlich vom Orte; häufig Hw.; Cedernbach bei der Vieseker Mühle Bch.
 416. *Thyselinum palustre* Hoffm. Bei K. nicht beobachtet Hw.
 430. *Chaerophyllum bulbosum* L. H.: Gebüsch am Ende des Weinberges (seit Engelbrecht) Ba. Am Schlagbaum zwischen Wilsnaek und Gnevsdorf; im Gehölz daselbst in Menge Hw.
 437. *Adoxa Moschatellina* L. F. Vereinzelt R. Kyritz: Park von Demmerthin Lauche.
 441. *Lonicera Periclymenum* L. Um K. häufig Hw., z. B. Rambow Bch.
 444. *Sherardia arvensis* L. K. (Ba.): Gärten, Gräben Hw. Bch.; Vieseke Hw. Grube Bch. (Gartow: Pevestorf Mz.)
 446. *Asperula cynanchica* L. Lz.: Häufig Mz.
 448. *A. odorata* L. F.: Buchenwald am Massower See R.
 449. *Galium Cruciata* Scop. H.: Elbdeich beim Mühlenholz (seit Voigt 1845) Ba.; Wilsnaek (Rulf): Am Wege nach Gnevsdorf Hw.
 453. *G. boreale* L. K.: Häufig W.; Lz.: Alluvium und Diluvium häufig Mz.
 457. *G. silvaticum* L. F. wie 210 R.
 458. *G. saxatile* L. K.: Gruber Wald Hw. Ba.
 467. *Dipsacus silvester* Mill. H.: (seit Ruthe vor 1827) Toppel; Zwischen Werben a. E. und Räbel Hw.; zwischen Wilsnaek und Gnevsdorf Hw.
 472. *Scabiosa columbaria* L. H. Ba. (Bei K. beide Arten nicht gefunden Hw.); Lz.: Elbhügel Mz.
 473. *S. suaveolens* Desf. Lz.: Diluvium an mehreren Stellen viel Mz.
 477. *Petasites tomentosus* DC. H.: Mövenwerder (seit Engelbrecht) Ba.
 481. *Aster salicifolius* Scholl. Lz.: An beiden Ufern der Elbe massenhaft Mz.
 482. *Erigeron acer* L. F. zerstreut R.
 486. *Inula salicina* L. Lz. (Linkes Elbufer beim Forsthaus Mz.)
 490. *Pulicaria prostrata* Asch. Wilsnaek: Nur an der Elbe Hw.
 491. *P. dysenterica* Gaertn. Um K. häufig Hw.
 492. *Xanthium strumarium* L. Lz.: Nausdorf Mz.
 493. *X. italicum* Moretti. H.: Havelufer (seit Engelbrecht 1858) Ba.
 † *X. spinosum* L. H.: 1883 und 1884 gefunden Ba.
 † *Galinsoga parviflora* Cav. H. Ba. K. (Ba.) Vieseke Hw.

496. *Filago germanica* L. K.: Zwischen Vieseke und Rambow Beh.
 501. *Gnaphalium luteo-album* L. Lz.: Gemein Mz.
 509. *Anthemis tinctoria* L. F.: Rittergut Massow. Ob verwildert? R.
 511. *A. Cotula* L. K. Hw. Lz.: In mehreren Dörfern Mz.
 518. *Arnica montana* L. K.: Buschhorning vereinzelt Hw. Näsemanns Koppel bei Gr.-Wertzien 1885; auf dem Kronsberge, wo sie früher vorkam, vergeblich gesucht Beh. Pe. Dergenthin: Silge, mehrfach Hw. F. (Ludwig): In den „Tannen“ R.; Kyritz: Kahnstelle Lauche.
 521. *Senecio viscosus* L. K.: Häufig, mit 522 *S. silvaticus* zusammen Hw.
 523. *S. vernalis* W.K. K. (Ba.): Hier Wucherblume genannt. Wird auf obrigkeitlichen Befehl im Frühjahr ausgerottet Hw.; Lz.: Gadow Mz.
 524. *S. erucaefolius* L. K.: An der kühlen Bäk Hw.
 527. *S. aquaticus* Huds. K.: Feuchte Wiese im Gruber Wald Hw.
 529. *S. sarracenicus* L. Lz. (Brockmüller): Auch rechtes Elbufer, dort von Mz. zuerst gefunden.
 530. *S. paludosus* L. Lz. (Auch linkes Elbufer Mz.)
 538. *Serratula tinctoria* L. F.: Am Schützenhause R.
 539. *Jurinea monoclonia* Aschs. Lz.: Sandberge bei Gross-Schmölen Ba.
 549. *Cirsium oleraceum* Scop. F.: Freyensteiner Moor R.
 550. *C. acaule* All. K. N., Hw. z. B., bei der Schäferei Beh.
 556. *Arnoseris minima* Lk. Lz.: Gemein Mz.; F.: Freyensteiner Feldmark R. W.: Dorf Zaatzke R. Um Kyritz häufig, besonders zwischen der Stadt und dem Bantikower See Lauche.
 558. *Thrinicia hirta* Rth. Lz.: Triften hinter Mödlich Mz.
 561. *Picris hieracioides* L. K.: Kühle Bäk Hw.; zwischen Krampfer und Guhlsdorf N.
 564. *Scorzonera humilis* L. K.: Gruber Wald, ein Exemplar N.
 580. *Crepis biennis* L. K.: Gemein Hw.
 589. *Hieracium pratense* Tausch. H.: Bock'scher Weinberg; Elbdeich im Mühlenholz Ba.
 594. *H. umbellatum* L. var. *coronopifolium* Bernhardi. K.: Gruber Wald Hw.
 597. *Phyteuma spicatum* L. F. (Ludwig): Ochsenkamp R.
 610. *Vaccinium uliginosum* L. K.: Nadelwälder, nicht selten Hw.
 616. *Erica Tetralix* L. Kyritz: Am Wege nach Stolpe rechts, jenseits der Landwehr Lauche.
 617. *Ledum palustre* L. K.: Laubwald bei Plattenburg N.
 618. *Pirola rotundifolia* L. Kyritz: Grantzow am (zugewachsenen) „See“ Lauche.
 619. *P. chlorantha* Sw. F.: Wald bei Gustavsruh R.
 620. *P. media* Sw. Kyritz: Grantzow am „See“ Lauche.

621. *Pirola minor* L. F., Wald bei Gustavsruh R.
 623. *Chimophila umbellata* (L.) N. F.: Eichenwald bei Gustavsruh R.
 624. *Ramischia secunda* (L.) Gke. F.: Ochsenkamp bei Gustavsruh R.
 625. *Monotropa Hypopitys* L. F.; Massower Forst R.
 626. *Ilex Aquifolium* L. „In einem Walde zwischen Pe. und Lz.“ Ruthe vor 1827. Westlich von Pe. in der Silge häufig Hw.
 634. *Gentiana Pneumonanthe* L. K.: Nur an einer Stelle auf einer Wiese am Gruber Wald Hw.
 636. *G. campestris* L. K.: Wienkes Koppel östlich Gr.-Welle Hw.
 648. *Asperugo procumbens* L. Fehlt bei K. Hw.
 668. *Myosotis silvatica* (Ehrh.) Hoffm. Lz.: Am Rudower See Mz.
 670. *M. sparsiflora* Mikan. H. (Engelbrecht): Alter Stadtkirchhof Ba.
 † 674. *Atropa Belladonna* L. K.: Ottos Garten Hw.
 677. *Verbascum thapsiforme* Schrad. K.: Nur vereinzelt Hw.
 681. *V. Blattaria* L. Zwischen Wilsnack und Gnevsdorf, vor dem Schlagbaum (Elbniederung) Hw.; Lz.: Auch an sumpfigen Gräben zwischen den Gärten Mz.
 684. *Scrophularia alata* Gil. K.: Nicht selten an den Gräben Hw. Pe.: Kuhwinkler Moor Hw. Lz.: Rudower See Mz.
 685. *Antirrhinum Orontium* L. K.: Lehmaccker dicht bei Grosswelle (westlich) Hw.
 † *Linaria Cymbalaria* Mill. An der Plattenburg Hw.
 687. *L. arvensis* Desf. Zwischen K. und Hoppenrade bei der Windmühle links N.
 690. *Gratiola officinalis* L. K.: Zwischen Grube und Vieseke Beh.
 701. *Veronica longifolia* L. Zwischen Gnevsdorf und Quitzöbel innerhalb des Deiches (auch jenseits bei Werben) Hw.
 708. *V. persica* Poir. Meyenburg: Frehne am Wege nach Wittstock Lauche.
 709. *V. opaca* Fr. K.: Lehmäcker, zerstreut Hw.
 718. *Pedicularis silvatica* L. Freyensteiner Moor R.; Kyritz: Mit Nr. 616; Kahnstelle am Bantikower See Lauche.
 722. *Melampyrum nemorosum* L. F., „Herrenbusch“ R.
 733. *Lathraea Squamaria* L. F. (Ludwig): „Herrenbusch“ R.
 734. *Mentha silvestris* L. var. *nemorosa* Willd. K.: Grube im Schulgarten; Plattenburg Wald an der Eisenbahn N.
 737. *M. Pulegium* L. H.: Am Sekenteich Ba.
 740. *Origanum vulgare* L. K.: Plattenburg am Waldrand; Grosswelle am Knick Hw.
 743. *Calamintha Clinopodium* Spenn. F.: Auf dem Wall R.

749. *Lamium maculatum* L. K.: Park und sonstige Gebüsch häufig Hw. Neustadt. Plänitz in den Eichen hinter dem Pfarrgarten, auch die Form *niveum* Schrad. Lauche.

751. *L. Galeobdolum* Crtz. K.: Plattenburg am Buchenberg; Gruber Wald Hw.; Pe.: Gühlitz: Hegeholz; Dergenthin: Silge W. F. (Ludwig): Im „Herrenbusch“ R.; Kyritz: Stadtforst am Stolper See Lauche.

759. *Stachys arvensis* L. K. (Ba.): Aecker dicht bei Gr.-Welle (westlich vom Dorfe) N., Hw.; Lz.: Gärten Mz.

765. *Chaeturus Marrubiastrum* Rchb. H.: Bei Kümmernitz Hw.; Wilsnack: Weg nach Gnevsvorf und in diesem Dorfe massenhaft, über 8' hoch Hw. Lz.: (Jaap, Kuhlme) Elbfähre 1874 und Gebüsch auf dem Elbwerder; wechselt den Standort Mz.

766. *Marrubium vulgare* L. H. Ba. K.: Fehlend Hw.

769. *Scutellaria hastifolia* L. K.: Kühle Bäk, Hellkühle, Gruber Wald, ebenso oft wie *galericulata* N., Hw., Beh.

S. minor L. Pe.: Der Standort, an welchem Herr Lehmann diese Pflanze 1873 zuerst (und bis jetzt allein) innerhalb der Provinz auffand, ist genauer so zu bezeichnen: Zwischen Platenhof und Kuhwinkel, unweit der Dergenthiner Windmühle, in Entwässerungsgräben.

773. *Ajuga pyramidalis* L. Kyritz: Am Wege nach Stolpe rechts, jenseits der Landwehr, spärlich Lauche.

784. *Plantago ramosa* (L.) Aschs. W.: Kl.-Breese Hw. Lz.: Fähre 1876, vereinzelt Mz.

785. *Pinguicula vulgaris* L. Fehlt bei K. nach Hw. Lz.: Gadow Mz.

786. *Utricularia vulgaris* L. H. Ba. K. Hw.

790b. *Anagallis coerulea* Schreb. L. Lehmäcker zwischen Kl.- und Gr.-Welle Hw.

801. *Primula officinalis* Jacq. Kyritz: Stadtforst am Stolper See Lauche.

805. *Amarantus retroflexus* L. K.: Kl.-Welle vereinzelt Hw. Lz.: Nausdorf, Boberow Mz.

806. *Albersia Blitum* (L.) Kth. Fehlt bei K. Hw.

807. *Polycnemum arvense* L. Lz.: Rambow Mz.

808. *Salsola Kali* L. H. (seit Dräseke vor 1841): Aecker bei der Galgenschonung Ba.; Weg nach Kümmernitz Hw.; W. (seit Arndt 1851): Bei Kl.-Breese in Menge mit *Plantago ramosa* und *Eryngium campestre* zusammen Hw.

810. *Chenopodium polyspermum* L. K. (Ba.): In Gärten Hw.

811. *C. Vulvaria* L. Lz.: In mehreren Dörfern auf dem Diluvium Mz.

818. *C. glaucum* L. Lz.: Ueberall, in der Stadt massenhaft Mz.

821b. *Atriplex hortense* L. K.: In Gärten verwildert Hw.

821a. *Atriplex nitens* Schk. F.: Wie 204 R.

825. *A. roseum* L. Lz.: Rambow und andere Dörfer Mz.

832. *Rumex aquaticus* L. K.: Am Landweber Hw.
R. Hydrolapathum - aquaticus = *maximus* Schreb. K.: Graben
am Plattenburger Fussessteig, rechts Hw.; Lz.: Am Rudower See Mz.
841. *Polygonum mite* Schrk. K.: Wiesen am Gruber Wald Hw.
851. *Asarum europaeum* L. Bei Bäck, nördlich von Pe. N.
860. *Tithymalus exiguus* (L.) Mneh. Lz.: Am Rudower See Mz.
861. *Mercurialis perennis* L. Pe.: Bollbrück Hw., F.: Wie 210 und
Wiesen nach Grabow R.
862. *M. annua* L. Pe. (Kuhlmei): In den Gärten gemein Hw.
865. *Parietaria officinalis* L. H.: Kümmernitz Hw.
893. *Stratiotes aloides* L. Wilsnack: Nur an der Elbe Hw.
894. *Hydrocharis Morsus ranae* L. Bei K. gar nicht beobachtet Hw.
903. *Butomus umbellatus* L. Wilsnack: Nur an der Elbe Hw.
914. *Potamogeton compressus* L. Lz.: Löcknitzmündung Ba.
939. *Sparganium minimum* Fr. Lz.: Sumpf bei Rambow am
Boberow-See Mz.
946. *Orchis Morio* L. Kyritz: Verbreitet aber spärlich Lauche.
953. *O. maculata* L. Kyritz: Kahnstelle; See bei Grantzow Lauche.
955. *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. Kyritz: „See“ bei Grantzow
Lauche.
956. *Platanthera bifolia* Rchb. F.: Ochsenkamp R. Kyritz: „See“
bei Grantzow Lauche.
964. *Epipactis latifolia* All. F.: Massower Forst R.
965. *E. palustris* Crtz. Lz.: Nausdorfer Torfmoor mit *Liparis*
(No. 971) (welche bei Rambow nicht beobachtet wurde) Mz. Kyritz:
„See“ bei Grantzow Lauche.
967. *Neottia ovata* Bl. et Fing. Kyritz: „See“ bei Grantzow Lauche.
980. *Narcissus Pseudonarcissus* L. Rambow: (östlich von Pe.)
Wiese am südlichen Dorfende in Menge N.
982. *Paris quadrifolius* L. F.: Am alten Teich R. Kyritz: Park
von Demmerthin, sehr häufig Lauche.
984. *Polygonatum multiflorum* All. F.: Im „alten Teich“ R.
986. *Majanthemum bifolium* Schmidt. F.: Im Herrenbusch R.
Kyritz: Park von Demmerthin Lauche.
- Gagea spathacea* (Hayne) Salisb., eine Art, die zwar in
Aschersons Flora aufgeführt wird, jedoch ohne Beifügung einer laufenden
Nummer. Professor Ascherson selbst hatte die betreffende Art aus
der Provinz Brandenburg noch nicht zu Gesicht bekommen, obwohl er
in seiner Flora mehrere Standorte auf fremde Autorität hin verzeichnet
hat. Vergl. Verhandlungen II. (1860) S. 136, III. (1866) S. 164 und
XXVI. (1884) S. XXIII.

Herr Rietz schreibt über den Standort der *G. spathacea*: „Eine halbe Stunde im Südwesten Freyensteins befindet sich zwischen den nach den Dörfern Halenbeck und Warnsdorf führenden Wegen ein Kiefernwald. In der Mitte desselben liegt eine kleine bruchige Waldwiese, die „Vosskuhle“ (Fuchsgrube) genannt, die dicht mit Erlen, jungen Buchen, Birken und Haselsträuchern bewachsen ist und ein Areal von etwa 2 Morgen einnimmt.“ Dies ist der im Frühling 1883 entdeckte Standort der in Rede stehenden *Gagea*.

Im folgenden Jahre (1884) hat Herr Rietz die *G. spathacea* auch jenseits der Dosse, etwa 2 Minuten ins Meklenburgische hinein in einem Birken-Bruch in grösserer Menge entdeckt.

991. *G. silvatica* Loudon. K.: Park Hw.

994. *Ornithogalum umbellatum* L. K.: Acker, dem Kirchhof gegenüber, in Menge Hw. F.: Wall R.

997. *Allium acutangulum* Schrad. Wilsnack: Bei Gnevsdorf, Quitzöbel; (Werben: Innerhalb des Deiches viel) Hw. N. fand diese Art einmal bei Neu-Schrepkow unweit K.

1001. *A. oleraceum* L. K.: Häufig Hw.

1003. *Anthericum Liliago* L. K.: Gruber Wald Hw.

1010. *Juncus glaucus* Ehrh. Lz.: Verbreitet Mz.

1011. *J. filiformis* L. Lz.: Bei Gross-Schmölen Ba.

1012. *J. squarrosus* L. K., z. B. zwischen Vieseke und Rambow Bch. Lz.: Verbreitet Mz.

1018. *J. capitatus* Weig. Lz.: Verbreitet Mz.

1020. *J. alpinus* Vill. Lz.: Stellenweise massenhaft Mz.

1030. *Cyperus fuscus* L. Lz.: Nausdorfer Sumpfggend Mz.

1040. *Scirpus acicularis* L. K.: Judenkolk zwischen Grube und Vieseke Bch. Lz.: Häufig Mz.

1050. *S. compressus* (L.) Pers. Lz.: Verbreitet Mz.

1052. *Eriophorum vaginatum* L. Lz.: Gadow, Moor, Krienitz etc. Mz.

1056. *Carex dioeca* L. Lz.: Nausdorfer Moor mit *Juncus obtusiflorus* Ehrh. Mz.

1067. *C. paradoxa* Willd. Lz.: Gadow (nach Wittenberge zu) Mz.

1068. *C. panniculata* L. Lz.: Gemein, z. B. Gadow Mz.

1070. *C. leporina* L. b) *argyroglochin* Horn. Lz.: Mehrfach Mz.

1087. *C. flacca* Schreb. Lz.: Verbreitet Mz.

1097. *C. Pseudocyperus* L. Lz.: Nausdorf, Rambow, Gadow etc. Häufig Mz.

1103. *C. filiformis* L. Lz.: Nausdorfer Moor, nur wenig blühend Mz.

1108. *Hierochloa odorata* (L.) Wahlenb. Kyritz: Am Bantikower See in der Stadtforst beim Schiessstand viel Lauche.

1117. *Milium effusum* L. H.: Mühlenholz Ba. K.: Laubwald bei Plattenburg Hw. Lz.: Häufig Mz.

1120. *Nardus stricta* L. Lz.: Allgemein verbreitet Mz.
1124. *Phleum Boehmeri* Web. var. *interruptionum* Zabel. Lz.: Wustrower Berge Mz.
1127. *Alopecurus fulvus* Sm. H. Ba.
- † *Calamagrostis arenaria* Rth. Zwischen Wilsnack und Legde links Hw.
1137. *Holcus mollis* L. K.: Nicht selten Hw. Lz.: Allgemein verbreitet; auf Moorboden bei Moor, Krienitz, Bochin, Gadow (Brüche unter *Betula pubescens* gemein) Lanz, Gadow; auf Alluvium an der Grenze der Lenzener Wische im Gebüsch und auf weiten Wiesenflächen Mz.
1138. *Avena elatior* L. b) *bivariata* (Peterm.) als Art. K.: Kirchhof in Gr.-Welle Hw.
- † *A. orientalis* Schreb. K.: Zwischen *A. sativa* L. Bch.
1140. *A. pratensis* L. K.: Vereinzelt N.
1141. *Trisetum flavescens* (L.) P.B. H.: Mühlenholz Ba. Lz.: Stellenweise massenhaft auf mageren Wiesen der Elbniederung, oft mit *Fragaria collina* Ehrh. Mz.
1142. *Aera caryophyllea* L. K.: Sehr häufig Hw. Lz.: Im Diluvium ganz gemein Mz.
1143. *A. praecoax* L. Lz.: Desgleichen, häufig Mz.
1147. *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh. Lz.: Ebenso Mz.
1166. *Glyceria plicata* Fr. K.: An der Priester-Koppel und am Landweber unter *G. aquatica* Wahlbg. (No. 1167) Hw.
1195. *Hordeum murinum* L. In Wilsnack in Menge, um K. nirgends Hw.
- † *H. arenarium* (L.) Aschs. K.: Hw.; Lz.: Turnplatz von Mz. ausgesät (Vietze) Mz.
1200. *Lolium perenne* L. f. *crisatum* Döll. *compositum* Thuill. K. Haarberg Hw.
1209. *Lycopodium clavatum* L. Kyritz: Kahnstelle, einzeln Lauche.
1210. *L. inundatum* L. Lz.: Gadow, Bochin, Moor, Boberow etc. Mz. Kyritz: Kahnstelle, reichlich Lauche.
1215. *Equisetum silvaticum* L. F.: Im Ochsenkamp R.
1224. *Osmunda regalis* L. Lz.: Seedorf, Gadow Mz.
1228. *Asplenium Trichomanes* L. F.: Feldsteinmauern bei Halenbeck R.
1231. *A. Ruta muraria* L. H. (Engelbrecht): Alte Stadtmauer Ba.
1233. *Phegopteris Dryopteris* Féc. Wie 1228.
1242. *Cystopteris fragilis* Bernh. K.: Plattenburg, Wald an der Eisenbahn N. F.: Wie 1228 R.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August, Potonié Henry

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz. \(II.\) 95-105](#)