

Beiträge zur Flora der Nieder-Lausitz. II.

Von

P. Taubert.

Seit Veröffentlichung der letzten „Beiträge zur Flora der Nieder-Lausitz“ sind sechs Jahre verflossen. Es ist daher wohl an der Zeit, das seit 1879 neu angesammelte Material zur Kenntnis zu bringen.

Zunächst bereicherte Herr Prof. Ascherson durch einige Excursionen in der Umgegend von Spremberg im April 1882 die Flora der Nieder-Lausitz um einige Standorte interessanter Pflanzen.¹⁾ Die Gegend von Alt-Döbern fand in Herrn Haberland einen äusserst eifrigen Beobachter; wir haben diesmal auch diejenigen seiner Beobachtungen mitgeteilt, die mit den 1861 veröffentlichten Wahrnehmungen Holla's²⁾ zusammenfallen; da diese, vor reichlich 30 Jahren angestellt, nunmehr wohl einer neuen Constatirung bedürfen; in dem südwestlich von Dobrilugk gelegenen Friedersdorf machte Herr Dr. Petzold in Braunschweig zahlreiche Funde.³⁾ Herr Riese widmete sich mit regem Interesse der Adventiv-Flora Sprembergs. Aus der Flora von Luckau brachte Prof. Dr. Bohnstedt viele interessante Thatsachen zu unserer Kenntnis, die nur zum Teil bereits in seiner Flora Luccaviensis⁴⁾ nieder-

1) Vgl. Sitzungsberichte 1882 S. 22.

2) Flora der mittleren Niederlausitz. Verh. des Bot. Vereins der P. rov. Brand. III, IV. (1861. 1862.) S. 39 ff.

3) Vgl. Sitzungsber. 1880 S. 87.

4) Luckau N.-L., 1882. C. F. Kutzschers Buchhandlung (Fr. Meissner). Vgl. Sitzungsber. 1882, S. 45, 46. Ueber einige öfter genannte Oertlichkeiten bei Luckau hatte Verf. die Güte, dem Red. folgende Mitteilung zu machen:

„Was die Berste betrifft, so entsteht sie bekanntlich aus einem östlichen und westlichen Wasserlauf, beide gegraben, daher fast schnurgrade, die sich bei Luckau vereinigen; beide heissen bei den Bewohnern der an ihnen liegenden Dörfer ebenfalls „Berste“. Ich habe sie, soweit das Luckauer Gebiet reicht, also bis Beesdau und Gossmar immer als Fresdorfer und Gossmarsches Fliess unterschieden. Ersteres entspringt am Fusse der Höhen südlich Bornsdorf, treibt dort schon mehrere Mühlen, sowie unterhalb die Drauschemühle (zwischen Bornsdorf und dieser *Gagea silvatica*), wendet sich dann nach Beesdau und dann westlich von Görldorf und Fresdorf vorbei nach Luckau. Auf Bornsdorfer Gebiet habe ich mit der Bezeichnung der dortigen Bewohner „Berste“ geschrieben, so auch bei *Corydallis intermedia*. Das westliche Fliess entspringt hinter Gehren, fliesst durch dieses Dorf und Gossmar

gelegt sind. Ausserdem wurden von Seiten unseres Vereins mehreren Herren Aufträge zu Teil, die Flora der Niederlausitz zu erforschen. So unternahm Herr C. Warnstorf im Juli 1874 einen Ausflug in die Gegend von Sommerfeld und Forst, dessen Resultate bereits Bd. XVII. (1875) unserer Verhandlungen veröffentlicht wurden und deshalb hier unberücksichtigt blieben. Im Juli 1885 wurde Herr Warnstorf ausgesandt, die Kryptogamenflora im westlichen Teil der Nieder-Lausitz, besonders in der Umgegend von Luckau und Dobrilugk, zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Reise hat Herr Warnstorf, was die Kryptogamen angeht, bereits in seiner Moosflora der Provinz Brandenburg in gegenwärtigem Bande unserer Verhandlungen publicirt, während die von ihm gefundenen Phanerogamen in dieser Abhandlung mit aufgeführt werden. Schliesslich wurde dem Unterzeichneten vom Vorstande des Vereins im Sommer 1884 und 1885 der ehrenvolle Auftrag zu Teil, einige Gebiete der Nieder-Lausitz zu bereisen, die floristisch wenig bekannt waren.

Im ersteren Jahre handelte es sich um jenen zwischen den Städten Spremberg, Muskau, Triebel und Forst belegenen Teil der Lausitz, der überreich an Seen und Teichen, das Vorkommen einiger Pflanzen wie *Coleanthus subtilis* Seidl und *Bidens radiatus* Thuill. vermuten liess, die, erstere in Böhmen, letztere ausserdem auch in den Nachbarländern Sachsen und Schlesien, sich an Rändern von Fischteichen finden.

Um in dieses mir zur Untersuchung angewiesene Gebiet zu gelangen, begab ich mich zuerst nach Kottbus, wo bei dem nahegelegenen Dorf Gallinchen *Isnardia palustris* vorkommt. Diese interessante Pflanze dort wieder aufzusuchen, war mir von Herrn Prof. Ascherson besonders empfohlen worden; allein trotz aller Mühe gelang es mir nicht, seinen Wunsch zu erfüllen. Durch diesen Misserfolg einigermassen entmutigt, wanderte ich von Gallinchen aus am östlichen Spreewefer weiter stromaufwärts und gelangte nach Frauendorf, in dessen Nähe sich an dem mit Erlen und Ellern bestandenen, feuchten Flussufer *Potentilla*

und dann in gradem Laufe, eingedämmt und mit dem Niveau über das Nachbarterrain erhaben, nach Luckau; die Gebrener nennen es ebenfalls Berste, die Luckauer teils Berste, teils Gossmar'sches Fliess, während die Friesdorfer Berste hier die „Kahnfahrt“ heisst. Beide Wasserläufe werden alljährlich sorgfältigst geräumt, was für ihre Flora nicht eben vorteilhaft ist.

Das Terrain nördlich Luckau wird im Osten von der Berste, im Westen von einem fast ebenso breiten Graben begrenzt, der etwa 1000 Meter davon ihr parallel läuft; es zerfällt in die trockne und die nasse „Viehweide“, erstere (der östliche Teil) liegt höher und ist Acker- resp. Gartenterrain, letztere (früher Teich, Hutung und Wiese) enthält im Nordwesten den Hain, der also etwa 1000 Schritt von der Berste entfernt liegt. Dieser ist mit den Promenaden der Stadt durch einen quer durch die Wiesen führenden Weg verbunden. Links und rechts von demselben liegen lehmige, sehr fruchtbare Wiesen, die ich als Hainwiesen bezeichnet habe, weil sie jetzt meist so genannt werden. Der Hain ist etwa 60 Jahre alt, die alten Bezeichnungen „Viehweide“ hört man aber noch sehr oft.“

mixta Nolte in ziemlicher Menge vorfindet. Nachdem mich alsdann die Eisenbahn nach der bedeutendsten Fabrikstadt jener Gegend, nach Spremberg, geführt hatte und ich dort in zuvorkommendster Weise von einem früheren Mitgliede unseres Vereins, dem um die Flora Sprembergs verdienten Herrn Riese, mit den botanischen Raritäten jener Gegend, speciell mit den auf den Höfen der Tuchfabriken zahlreich eingeschleppten *Medicago*-Arten, bekannt gemacht worden war, wandte ich mich nach dem halbwegs zwischen Spremberg und Muskau gelegenen Dorfe Schleife, dem ich laut Instruktion besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden hatte.

Schleife liegt in einer von Mooren durchzogenen Ebene, die wenigstens auf der Generalstabs-Karte zahlreiche Seen und Teiche aufweist. Kaum hatte ich das Stationsgebäude bei Schleife verlassen und meine Schritte dem 10 Minuten entfernten Dorfe zugewandt, so spähte ich nach rechts und links, um jene Wasserbecken, von denen ein Teil dicht am Wege liegen musste, zu entdecken. Allein vergeblich — denn jene Gewässer sind, wie mir der Schulze des Dorfes, Herr Hantscho-Hano, ein sich für Botanik lebhaft interessirender Mann, (vergl. Sitzungsber. 1882 S. 22) mittheilte, bereits vor einer Reihe von Jahren abgelassen und alsdann mit Birken bepflanzt worden. Dennoch versäumte ich es nicht, diese ehemaligen Teiche zu besuchen und hoffte daselbst noch die eine oder andere interessante Pflanze aufzufinden. Meine Erwartung sollte jedoch arg getäuscht werden, denn auch nicht eine das Mitnehmen lohnende Species konnte ich ausfindig machen. Daher wandte ich mich jetzt den zwischen den Dörfern Schleife, Gross- und Klein-Düben, Halbendorf und Kromlau gelegenen ausgedehnten Mooren zu. Mehrere, für das Seeklima des nordwestlichen Deutschland charakteristische Pflanzen, wie *Drosera intermedia*, *Erica Tetralix*, *Rhynchospora fusca* u. s. f. sind hier neben der prächtigen, weithin leuchtenden *Arnica montana* verbreitet und finden sich in überaus grosser Menge. Im nordwestlichen Teile unseres Vaterlandes gesellen sich zu den genannten Arten noch mehrere andere Species, wie *Myrica Gale*, *Cicendia filiformis*, *Scirpus fluitans*¹⁾, *Pilularia globulifera* u. s. w., deren Vorkommen im östlichen Teil der Niederlausitz umsomehr zu vermuten ist, als sich weiter westlich bei Luckau *Myrica* und *Pilularia* vorfinden und vor kurzem unfern der Grenze in der Ober-Lausitz bei Rietschen von Fiek *Cicendia filiformis* entdeckt wurde. Mein Augenmerk war daher hauptsächlich auf diese, ihrem Verbreitungsgebiet soweit entrückten Arten gerichtet. Am dritten Tage meines Aufenthalts in Schleife gelang es mir zu meiner grossen Freude, wenigstens eine dieser Arten, *Pilularia globulifera*, an zwei etwa $\frac{3}{4}$ Stunden von einander entfernten Lokalitäten aufzufinden und zwar einmal in geringer Menge in einem Graben nordöstlich vom genannten Dorfe und

¹⁾ Neuerdings angeblich bei Elsterwerda in einem Graben zwischen Stadt und Bahnhof gefunden. (Oertel in *Irmischia* 1881 S. 37.)

dann in den Moorgräben der Wolschina-Wiesen zwischen Gross-Düben und Halbendorf, wo der zierliche Wasser-Farn in überaus grosser Menge die wasserhaltigen Gräben völlig ausfüllt oder den Boden der wasserfreien, doch keineswegs trocknen, mit einer dichten hellgrünen Rasenfläche überzieht.

Nachdem ich die Gegend von Schleife innerhalb vier Tage nach allen Himmelsrichtungen durchstreift hatte, begab ich mich über Weisswasser nach Muskau und von dort die Neisse stromabwärts über Köbels nach Gross-Särchen. Zwischen diesen Dörfern findet sich im Flusse selbst *Ranunculus fluitans* in reichlicher Menge, während für die meist mit Weidengebüsch bekleideten Ufer *Scirpus silvaticus* und *Potentilla mixta* charakteristisch sind.

Von Gross-Särchen führte mich mein Weg über die Dörfer Bukoka und Kemnitz nach Triebel, das in einer wenig fruchtbaren, höchst eintönigen Gegend gelegen ist, die dem Botaniker nichts von Bedeutung zu bieten vermag. Nach kurzem Aufenthalt verliess ich daher Triebel, um die Gegend von Forst zu durchsuchen. Da das südlich von Forst gelegene Terrain, besonders die Umgegend der Dörfer Domsdorf und Tschacksdorf schon im Jahre 1874 von Herrn Warnstorff¹⁾ botanisch durchforscht worden war, hatte ich mir die Aufgabe gestellt, die weiter westlich und südlich gelegenen Ortschaften Nossdorf, Gross-Jamno, Jethe, Gari, Gross- und Klein-Kölzig zu besuchen und benutzte auf dem Rückwege die Gelegenheit, den von Herrn Warnstorff nicht aufgefundenen Schigarrenteich bei Tschacksdorf in floristischer Hinsicht zu untersuchen.

Die zweite, im vorigen Jahre vom 22. Juli bis 5. August unternommene Excursion bezweckte, den in botanischer Hinsicht vernachlässigten südwestlichsten Teil der Nieder-Lausitz eingehender zu erforschen. Der Instruktion gemäss begab ich mich zunächst nach Sonnenwalde, um die westlich von der Eisenbahn gelegenen Teiche, besonders den Tzschäker- und Thürmen-Teich zu untersuchen. Ersterer enthielt nur wenig Wasser, bot jedoch auf dem ausgetrockneten Teil grosse Bestände von *Rhynchospora alba* und *fusca*, und am schlammigen Ufer in der Nähe des Wallhauses wenige Exemplare von *Scirpus ovatus* Rth. var. *Heuseri* Uechtr. nebst *Cyperus fuscus*. Der Thürmen-Teich dagegen war gänzlich wasserfrei und hatte nicht eine einzige interessante Pflanze aufzuweisen. Da ich, wie es wohl einem Botaniker geziemt, mich nicht an die Wege hielt, sondern querfeldein durch Dick und Dünn marschirte und also nicht, wie ein bekanntes Mitglied unseres Vereins zu sagen pflegt, da suchte, wo schon der Grossvater botanisirt hat und der Enkel nicht wagt, vom Wege, der zu seltenen Pflanzen führt, nach rechts oder links abzuweichen, so passirte es mir, dass ich die Richtung verlor und anstatt nach dem nahe gelegenen Dorfe

¹⁾ Abhandl. des Bot. Vereins der Prov. Brandenburg. XVII. S. 9.

Trebbus zu gehen gerade entgegengesetzt nach Norden vordrang. So kam ich an den schon 1878 von Prof. Ascherson besuchten Lehmanns-Teich, an dessen sumpfigen Ufern sich *Andromeda Polifolia* zahlreich blühend (22. Juli!) vorfand. Die an der Ostseite des Teiches gelegenen Fichtenwälder bergen in ihrem Dunkel zahlreiche Gruppen von *Blechnum Spicant*, während die Kiefernwälder auf scheinbar trockenem Untergrunde mit zahlreichem *Ledum palustre*, *Rhynchospora alba* und mächtigen Wedeln von *Osmunda regalis* bestanden sind. Nachdem ich über die Dörfer Trebbus und Arenshain die nordwestlich von Dobrilugk gelegenen Wälder erreicht hatte, gelangte ich in die, wie ich sagen möchte, typische Nieder-Lausitz. Hier traten mir als alte Bekannte die lieblichen Glocken der *Erica Tetralix*, sowie die den feuchten Sandboden verratenden Gruppen von *Lycopodium inundatum* in stundenlanger Ausbreitung entgegen.

Dobrilugk selbst, ein Mittelding zwischen Dorf und Kleinstadt, bietet in seiner Umgebung dem Botaniker ein reiches Feld. Besonders bemerkenswert ist der „Buchwald“. Derselbe ist in seinem vorderen Teile Laubwald, im hinteren dagegen teils Fichten-, teils Kiefernwald. Unter den vielen hier vorkommenden Phanerogamen und besonders Kryptogamen, die Freund Warnstorf 14 Tage vor mir unter Leitung des Herrn Rektor Busch, dem ich ebenfalls für gütige Führung zu grossem Danke verpflichtet bin, studierte, ist besonders *Sambucus racemosa* zu nennen, dessen scharlachrote Früchte einen angenehmen Contrast zu dem Dunkel der Nadelhölzer bilden. Aeusserst häufig findet sich an den Wasserläufen im Westen der Stadt *Oryza clandestina*, die, da einige warme sonnige Tage vorhergegangen waren, durch prachtvoll entwickelte Blütenrispen den Botaniker wie den Laien erfreute.¹⁾ Der südlich der Stadt gelegene Hammerteich ist wenig lohnend; die einzige interessante Pflanze desselben ist die Wasser- oder Stachelnuss *Trapa natans*, deren Vorkommen dort bisher unbekannt war.

Von Dobrilugk aus wandte ich mich weiter südwestlich in die Gegend von Liebenwerda, besuchte das sog. Stachelnussloch bei Wahrenbrück, wo *Trapa* in Unmenge wächst, und die bei Rothstein und Prestowitz zu Tage tretenden Thonschieferfelsen, die ausser einem eigentümlichen *Hieracium* nichts Bemerkenswertes boten. Nach Dobrilugk zurückgekehrt, widmete ich nun meine Aufmerksamkeit den zwischen dieser Stadt und Senftenberg liegenden Wäldern. Dieselben werden meist aus Kiefern zusammengesetzt, nur selten finden sich, und zwar an feuchteren Orten, einzelne Fichten ein. Mein Weg führte mich zunächst nach Deutsch-Sorno, in dessen Nähe sich wenige Exemplare

¹⁾ Der verfllossene Sommer war überhaupt der chasmogamen Entfaltung der Blüten dieser Graminee günstig. Auch bei Neuruppin zeigte sie mir Herr Warnstorf in der zweiten Hälfte August desselben Jahres zahlreich mit entfalteter Rispe.

des *Vaccinium intermedium*, leider ohne Blüten, vorfanden. Tags darauf entdeckte ich dieselbe Pflanze, obgleich auch nur steril, in grosser Menge in der Nähe des bei Finsterwalde gelegenen Schneidemühl-Teiches, dessen Ufer mit zahlreichen Exemplaren von *Juncus Tenageia* und des mir neuen *Scirpus multicaulis* besetzt waren (letzterer dort schon früher von Dr. Arth. Schultz gefunden). Quer durch die Wälder, nur dem Compass folgend, setzte ich meine Wanderung fort und gelangte nach mehr als 10stündigem Marsch nach Lauchhammer, dem bekannten Eisenwerk der Nieder-Lausitz, welches seine kunstreichen Erzeugnisse selbst nach Aegypten versendet hat. Kurz bevor ich den Ort betrat, bemerkte ich in dem sonst nur kahlen Untergrund aufweisenden Kiefernwald ein *Vaccinium*, das in grossen Beständen in voller Blüte prangte und einen herrlichen Duft verbreitete: es waren Blütenpflanzen von *Vaccinium intermedium*, dem schon bei Dobrilugk und Finsterwalde beobachteten Bastarde. Nachdem sich das Auge an der Blütenpracht erfreut und die 1 Meter lange Botanisirtrummel, die Herr Inspektor Lindemuth freundlich genug war, mir zu leihen und dadurch meine Untersuchungen wesentlich gefördert hat, mit dieser seltenen Pflanze vollgepfropft worden war, zog ich, vollkommen mit der Ausbeute des Tages zufrieden, in Lauchhammer ein, um nach kurzer den körperlichen Bedürfnissen gewidmeter Ruhe, die eingebrachten Schätze den Drahtpressen, welche die ungeheure Menge der gesammelten Species kaum zu fassen vermochten, einzuverleiben.

Der Umgegend Lauchhammers wurden mehrere Tage gewidmet und manche interessante Pflanze daselbst aufgefunden; dann wandte ich mich wieder nördlich, um das im Walde versteckte und zwischen Hügeln gelegene Dorf Kostebrau zu besuchen. In den das Dorf umgebenden Wäldern waren *Arctostaphylus Uva ursi* und *Vaccinium intermedium*, westlich vom Dorfe spärlich, östlich, besonders an der Thonbahn nach Zschipkau zu, gemein, letztere Art zahlreich blühend und auch fruchttragend. Es war dies der fünfte neue, innerhalb kurzer Zeit von mir entdeckte Standort dieser seltenen Pflanze. Besonders bemerkenswert ist für dieses Dorf ein riesiger *Taxus*, den ausführlich zu besprechen ich mir für später vorbehalte.

Von Kostebrau aus in südöstlicher Richtung zieht sich ein niedriges Bergland, das reich an Braunkohlen ist, die denn auch überall abgebaut werden. Am südlichen Fusse desselben liegt eine Reihe von Mooren und Teichen, die von den Abflüssen jener Berge gespeist werden. Besonders interessant sind unter diesen die Bommelteiche, zwei grosse Wasserbecken, die damals bis auf ein Drittel trocken lagen. Hier trat mir einmal wieder die für die Lausitz so charakteristische Teichflora in voller Entwicklung entgegen. Neben

Tausenden von *Scirpus multicaulis*-Rasen (man könnte besser „Hüllen“¹⁾ sagen), bildeten unzählige Individuen von *Litorella uniflora* einen prachtvoll grünen Teppich, während an den feuchteren Stellen *Pilularia globulifera* weithin den Boden überzog. Noch eigenartiger war die Flora des unweit gelegenen Kaupenteiches. Hier ist ein wahres Eldorado für den Botaniker: *Litorella*, *Pilularia*, *Rhynchospora alba*, *Thrinicia hirta* etc. bedecken in gleicher Weise wie an den Bommelteichen die ausgetrockneten Stellen; daneben finden sich in zahlloser Menge: *Alisma natans*, *Juncus Tenageia*, *Scirpus ovatus* var. *Heuseri* Uechtr., *Centunculus minimus*, *Corrigiola litoralis*, *Illecebrum verticillatum*, *Elatine hexandra*, *Potentilla norvegica* etc.; merkwürdiger Weise fehlt *Carex cyperoides*.

Die Umgegend von Senftenberg bot wenig Bemerkenswertes. Für die unweit der Stadt gelegenen Weinberge, die übrigens schon von verschiedenen Beobachtern besucht worden waren, ist *Cytisus nigricans* charakteristisch, der sich damals gerade in voller Entwicklung befand und schon weithin an den herrlichen gelben Blütentrauben zu erkennen war. Nach kurzem Besuch einiger nordwestlich von Senftenberg bei Dobristroh gelegenen Teiche, die leider nur auf der Generalstabkarte existiren, in Wirklichkeit aber schon seit mehreren Jahren in Ackerland verwandelt worden sind, verwandte ich den Rest meiner Zeit dazu, einige bei der Station Luckaitz, südlich von Kalau liegende Teiche einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Obwohl gerade in dieser Gegend von Herrn Prof. F. Kurtz zahlreiche Funde gemacht wurden, hatte ich die Freude, eine sehr interessante Pflanze, *Galium palustre* var. *umbrosum* Aschs., die bisher nur an wenigen Standorten gefunden worden ist, zu beobachten, der zahllosen Mengen von *Rhynchospora alba* und *fusca*, *Erica Tetralix*, *Lycopodium inundatum*, *Carex pulicaris* etc. sowie der unvermeidlichen *Oryza clandestina* und des *Scirpus ovatus* var. *Heuseri* gar nicht zu gedenken. —

Schliesslich ist es mir noch eine angenehme Pflicht, allen denjenigen, welche diese Arbeit entweder durch wertvolle Notizen, vor allen Herrn Prof. Ascherson und den oben angeführten Herren, oder durch hilfreiche Unterstützung der von Herrn Warnstorf und mir unternommenen Excursionen, in dieser Hinsicht besonders den Herren Riese in Spremberg, Hantscho-Hano in Schleife, Rektor Busch in Dobrilugk und Herrn Lehrer Trübler in Kostebrau, gefördert haben, meinen herzlichsten Dank an dieser Stelle auszusprechen.

Berlin, 10. März 1886.

P. Taubert, stud. rer. nat.

¹⁾ Vgl. Ascherson in Verhandl. I. (1859) S. 84.

A b k ü r z u n g e n.

1. Ortsnamen.

A. = Altdöbern.	L. = Luckau.
Do. = Dobrilugk.	Lb. = Lübben.
Dr. = Drebkau.	Lbw. = Liebenwerda.
F. = Forst.	M. = Muskau.
Fi. = Finsterwalde.	S. = Senftenberg.
G. = Grünwalde.	Sw. = Sonnenwalde.
K. = Kalau.	Tr. = Triebel.
Kb. = Kottbus.	V. = Vetschau.

2. Beobachter.

As. = Ascherson.	Ja. = Jacobasch.
Bo. = Bohnstedt.	Petz. = Petzold.
Bo.F. = Bohnstedt, Flora Luceaviensis.	R. = Rabenhorst, Flora Lusatica.
H. = Haberland.	Ri. = Riese.
Hl. = Holla, Flora der mittleren Nieder-Lausitz.	!! = Taubert.
	Wa. = Warnstorf.

! bedeutet, dass die Pflanze Herrn Prof. Ascherson vorgelegen hat.

Thalictrum flavum L. Sw. Nordostufer des Thürmen-Teichs; Nordufer des Tzschäker-Teiches bei Friedersdorf!! (!) L. Häufig, nächste Standorte: am östlichen Wege nach dem Hain und Fließweg nach Fresdorf Bo. F.

Hepatica triloba Gil. Do. Buchwald Rektor Busch. A. Rettgensdorfer Busch Hl. am grossen Quell und sehr häufig im Erlenbruch bei Peitzendorf H. L. (Bornsdorf R.) Gehren Kühn nach Bo.

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. L. hinter Gehren (R.) und Waltersdorf vereinzelt Bo. F.

Anemone nemorosa L. Do. Buchwald Rektor Busch. A. Rettgensdorfer Busch; Peitzendorf H. L. ziemlich häufig; nächste Standorte Sandow (Grasgärten), besonders zahlreich bei Gossmar (Teiche), Pelkwitz, Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf Bo. F.

A. ranunculoides L. A. Rettgensdorfer Busch Hl.; Peitzendorf, doch seltener als vorige H. L. Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf (R.) Bo. F.

Adonis aestivalis L. L. (R.) Fresdorf, Felder am Borchelt; nördlich der Stadt (Leberecht'sche Baumschule) Bo. F.!!; zwischen der Stadt und Wittmannsdorf (Tschiersch) Bo. F.

Myosurus minimus L. L. Promenade am Stadtgraben; Zöllmersdorf Bo. F.

Ranunculus divaricatus Schrk. L. Pelkwitz Bo.

R. fluitans Lmk. β *Bachii* Wirtg. M., zahlreich in der Neisse zwischen Köbeln und Gross-Särehen!!

R. Lingua L. Do. Südostufer des Hammerteiches!! Sw. am Tzschäker-teich unweit Friedersdorf, östlich vom Wallhaus!! L. Torfsümpfe nicht selten Bo. F.

R. auricomus L. Fi. Wiese halbwegs nach Drössigk Jachan.

- R. lanuginosus* L. L. (Pelkwitz R.) Pickeler Busch zahlreich Bo.!
- R. sardous* Crtz. L. (R.) Chaussee vor Riedebeck (Tschiersch); Bornsdorf, zwischen Waltersdorf, Gehren, Gossmar und Wittmannsdorf häufig Bo.F.
- R. arvensis* L. L. nicht selten Bo.F.
- † *Helleborus niger* L. A. im Neudöberner Schlossgarten angepflanzt H. L. Gärten (Schwochow) Bo.F.
- † *H. viridis* L. Sp. Schleife Hantscho, As.
- † *Eranthis hiemalis* (L.) Salisb. Dr. in einem Garten verwildert H.
- Nigella arvensis* L. L. zwischen Hindenberg und Wilmersdorf (R.) Bo.F.
- † *N. damascena* L. L. Giesmannsdorf am Kirchhof Bo.F.
- † *Aquilegia vulgaris* L. In Grasgärten zu Göllnitz und Rutzke bei Fi., ebenso A. Neudöbern im Schlossgarten verwildert H. Sp. Kirchhof in Schleife Hantscho, As.
- Delphinium Consolida* L. A. unter Weizen bei Reddern in Menge H.
- Berberis vulgaris* L. M. am westlichen Neisseufer bei Gross-Särchen wild!!
- † *Mahonia Aquifolium* (Pursh.) Nutt. L. Kirchhof (Schwochow) Bo.F.
- Nymphaea alba* L. Lbw. im Gemeindeloch bei Theissa; bei Maasdorf in der kleinen Elster!! Do. Küchenteich, Jägerteich, Plumpteiche!!; in der Rade bei Friedersdorf Petz!! Fi. viel im Graben, der an der Südwestecke des Schneidemühl-Teiches einmündet!! Sw. Gräben am Tzschäker- und Thürmen-Teich bei Friedersdorf!! Sp. Hauptgraben zwischen Gross-Düben und Halbendorf!! Ober-Spreewald zwischen Burg und Lehde S. A. (Hl.) im Salzteich; im Mühl- und Schafteich bei Neudöbern (Hl.) H. K. Im grossen Paulsteich bei Buchwäldchen; Teiche nordwestlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. Gossmar'sches Fliess; Teiche bei Görlsdorf (R.), Bornsdorf, Fürstlich Drehna Bo.F.
- Nuphar luteum* (L.) Sm. Lbw. Grosser und Kleiner Teich bei Maasdorf!! Do. in der Rade bei Friedersdorf Petz. Sp. Hauptgraben zwischen Gross-Düben und Halbendorf!! Krio bei Mulkwitz Hantscho. L. Berste; Gossmar'sches Fliess; Schützenteich Bo.F.
- Papaver dubium* L. L. nicht selten, z. B. Zöllmersdorf; Giesmannsdorf Bo.F.
- Corydallis cava* (L.) Schweigg. et Körte. L. Gebüsche zwischen den Gärten nördlich der Stadt, von Schülern 1881 gefunden Bo.F.
- C. intermedia* (L.) Mérat. L. Gebüsche von der Drauschen-Mühle bis Bornsdorf Bo.F.
- Fumaria Vaillantii* Lois. L. (R.) Kahnsdorf, Aecker hinter der Ziegelei Bo.F.! Zöllmersdorf Bo.
- Nasturtium palustre* (Leyss.) DC. Do. Friedersdorf nicht selten Petz. L. Gossmar'sches Fliess, Gräben der Wiesen zwischen Zöllmersdorf und Giesmannsdorf Bo.F.

- Barbarea lyrata* (Gil.) Aschs. Sp. Schleife Hantscho! L. Bäke; Zöllmersdorf; Waltersdorf; Gehren; Fresdorf Bo. F.
- B. stricta* Andrzej. L. Schützenhaus (Schwochow); Bäke, Fresdorf: Grabenränder am Borchelt Bo. F. M. westliches Neisse-Ufer zwischen Köbeln und Gr.-Särchen!!
- Turritis glabra* L. A. auf dem alten Kirchhofe und dem Laas (Hl.) H. L. Prinzessinnensteig; Wall bei Kahnsdorf; in Bornsdorf und Fürstlich Drehna Bo. F.
- Arabis hirsuta* (L.) Scop. L. zwischen der Stadt und Fresdorf bis zum Borchelt; Kahnsdorf; Zaakow Bo. F.
- A. arenosa* Scop. L. Aecker beim Kirchhofe; am Bahndamm zwischen Ukro und Pitschen Bo. F.! Chaussée zwischen Wittmannsdorf und Riedebeck und anderwärts häufig Bo.
- Cardamine impatiens* L. M. Birkenwald am westl. Neisseufer zwischen Köbeln und Gross-Särchen!! (!) L. Gossmar'sches Fliess, Giesmannsdorf; Waltersdorf Bo. F.
- C. amara* L. A. (Hl.) Gräben zwischen Neudöbern und Schöllnitz H. L. Gehren, südlich am Mühlenfliess; Bornsdorf, Paserin Bo. Pelkwitz; Langengrassau (Schwochow) Bo. F.
- † *Hesperis matronalis* L. L. Felder nördlich; Gossmar an der Kirchhofsmauer Bo. F.
- Alliaria officinalis* Andrzej. L. Fresdorf am Wall; Dorfstrasse in Bornsdorf Bo. F.
- † *Diploxaxis muralis* (L.) DC. L. Kies und Pflaster zu der Nicolai-Kirche und Knabenschule (Schwochow) 1880, 81. Bo. F.
- Alyssum calycinum* L. L. (zwischen Gossmar und Bornsdorf R.) an den Chausséen bei Ukro Bo. und vor Wüstemarke Bo. F.
- Berteroa incana* (L.) DC. Do. In und bei der Stadt!! Friedersdorf Petz. Sw. Trebbus!! A. (Hl.) auf dem Schwarzen Damm in Menge H. L. an den Chausseen nach Golssen und Ukro Bo. F.
- † *Cochlearia Armoracia* L. Lübbenau: in den Dörfern, besonders auch in Burg cultivirt As. L. nördlich der Stadt gebaut und verwildert Bo. F.
- Camelina microcarpa* Andrzej. L. Wiese zwischen Fresdorf und Frankendorf Bo. F.
- Thlaspi arvense* L. A. und Umgegend häufig (Hl.) H. L. nördlich der Stadt; Kahnsdorf; Fürstlich Drehna viel Bo. F. Vor Langengrassau; Waltersdorf Bo.
- Teesdalea nudicaulis* (L.) R. Br. Lbw. Felsen bei Rothstein, am 30. Juli blühend!! Do. auf Stoppelfeldern zwischen Lindena und Friedersdorf am 27. Juli blühend!!; bei Friedersdorf in Kiefernwäldern Petz. Sp. Schleife nach Gross-Düben zu W. v. Schulenburg! As. L. Rüdingsdorf bis Waltersdorf und Bornsdorf Bo. F.

- Lepidium ruderae* L. L. bei den Windmühlen (R.); Anger (Schwochow) Bo. F.
- Neslea panniculata* (L.) Desv. Kb. Schorbus Jachan. L. Karche, Zaakow, Kahnsdorf, Beesdau Bo. F.
- Helianthemum guttatum* (L.) Mill. Elsterwerda: Waldrand am Wege nach Kraupa 1861 Joh. Kunze!
- H. Chamaecistus* Mill. L. (Falkenberg, Wüstemarke R.) Waltersdorf (Kalkgruben); Gehren (Königsberg unweit des Teufelsteins) Bo. F.
- Viola palustris* L. Fi. Südrand des Schneidemühl-Teiches im Moor bei der Brücke!! Sp. Kromlau im Park Hantscho! K. viel in Erlenbrüchen am Bahnhof Lukaitz!! L. an der Fresdorfer Kahnfahrt; Sumpfwiese bei Wierigsdorf Bo. F.
- V. epipsila* Led. Do. Torfmoor rechts am Wege nach Fischwasser Wa. L. Drehna, zwischen dem Sandteiche und Gross-Mehssow auf moorigem Waldboden; von *V. palustris* leicht durch die unterseits auf den Nerven deutliche Behaarung der Blätter zu unterscheiden Wa.
- V. hirta* L. L. südlich von Kahnsdorf viel (R.) Bo. F.
- V. persicifolia* Schreb. b) *stagnina* Kit. (als Art). Elsterwerda: Wiese beim Ober-Lausitzer Bahnhof P. Rahn!
- Drosera rotundifolia* L. S. Bommelteiche bei Zschipkau; Kaupenteich bei Hörlitz!! G. Butterteich bei Kl.-Leipisch; Moor östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Lbw. am Grossen und Kleinen Teich bei Maasdorf; Moor bei Theissa!! Do. Tümpel an der Chaussée nach Hennersdorf; an den Plumpteichen; unweit Arenshain am Wege nach Do.!!; bei Friedersdorf viel Petz.!! Fi. Ausstich an der Bahn bei der Försterei A. Schultz. Südrand des Schneidemühl-Teiches bei der Brücke; Mahlens Teich; Seeteich bei Gohra!! Sp. östlich von Schleife häufig!! L. Torfstiche bei Wanninchen; Grosser Teich bei Pademagk; Teiche bei Pressenchen mit der dort zahlreicheren folgenden Art Bo. F. F. an der Chaussée bei Nossdorf, Schigarrenteich bei Tschacksdorf!!
- D. intermedia* Hayne. S. bei Zschipkau im Fenn südlich der Henska-Mühle und äusserst viel an den Bommelteichen, spärlicher am Kaupenteich bei Hörlitz!! Do. Täuberts Mühle bei Friedersdorf!! Fi. Ausstich an der Bahn bei der Försterei A. Schultz; Mahlens Teich; Seeteich bei Gohra!! Sp. östlich von Schleife, häufiger als vorige!! K. Erlenbrüchen am Bahnhof Lukaitz viel!!
- Polygala vulgaris* L. Fi. Südufer des Schneidemühlen-Teiches im Moor bei der Brücke!! Sp. Schleife Hantscho.
- P. comosa* Schk. L. zwischen Bornsdorf und Weissagk auf Wiesen und Waldrändern Bo. F.
- Gypsophila muralis* L. Do. zwischen Lindena und Friedersdorf!! und viel um letzteren Ort Petz. Sw. Aecker zwischen Trebbus und

- Arenshain viel!! Sp. Auf Aeckern nach Kochsdorf zu in Menge H. A. beim sogenannten Schiesshause (Hl.) H. L. Felder um Karche, Zaakow, Kahnsdorf Bo.F.
- † *Dianthus barbatus* L. Sp. auf dem Georgenberg und in einem kleinen Erlenbruch bei Halbendorf verwildert!!
- D. Armeria* L. A. auf Grasrainen beim Vw. Peitzendorf (Hl.) H. L. Prinzessinnensteig Bo.F.
- D. Carthusianorum* L. A. Weinberg, Chransdorf; bei Peitzendorf nicht selten (Hl.) H. L. zwischen Görlsdorf und Wanninchen Bo.F.
- D. superbus* L. L. (Kasel R.) Fresdorf vor dem Borchelt Bo.
- † *Saponaria officinalis* L. Do. beim Kirchhof; Arenshain!! L. Gärten (Schwochow) Bo.F.
- Viscaria viscosa* (Gil.) Aschs. Sp. am Abhang des Georgenberges vereinzelt H. L. Bornsdorf, Höhe im Westen des Parks Bo.F.
- Silene venosa* (Gil.) Aschs. A. und Neudöbern nicht selten (Hl.) H. L. nicht selten, z. B. Kahnsdorf, Frankendorf, Fresdorf am Borchelt Bo.F.
- S. nutans* L. Sp. Schleife Hantscho. L. Höllenberge bei Langengrassau (R.), Gehren hinter der wüsten Kirche (R.) bei Drehna Bo.F.
- S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. L. Waltersdorf (R.) in den Kalkgruben Bo.F.
- † *S. Armeria* L. Sp. Schimko's Busch in der Schleifer Bauernheide Hantscho! L. nördlich der Stadt Bo.F.
- S. gallica* L. L. Wittmannsdorf (R.) Gymnasiast Radestock Bo.F.! Kreblitz Bo. (Paserin R.) Pickel Bo.
- † *S. pendula* L. Sp. Schleife Hantscho, As. L. Aecker im Süden der Stadt 1881 Bo.F.!
- Melandryum noctiflorum* (L.) Fr. A. Neudöbern in Gemüsegärten H. Peitzendorf (Hl.) H. L. (R.) Karche bis Görlsdorf Bo.F.
- Coronaria tomentosa* A. Br. Sp. Kirchhof in Schleife Hantscho, As. L. Gärten (Schwochow) Bo.F.
- Spergula vernalis* Willd. Sp. Wald vor der Unter-Teschnitz Ri., As. L. Ziekau, Wierigsdorf, Fürstlich Drehna Bo.F.
- Alsine viscosa* Schreb. Sp. Georgenberg!! L. (R.) Gr.-Mehssow Schp.!
- Sagina nodosa* (L.) Fzl. Do. Torfwiesen bei Friedersdorf Petz. L. am Gossmar'schen Fliess; Kahnsdorf; Langengrassau Bo.F.
- Moehringia trinervia* (L.) Clairv. Do. Buchwald!! Sw. Gebüsche an der Brücke östlich vom Wallhaus bei Friedersdorf!! Sp. Georgenberg As. Kromlau As. L.; Langengrassau; Fürstlich Drehna Bo.F.
- Stellaria nemorum* L. L. (zwischen Ükro und Pitschen R.); aus Gebüschen bei Ükro und Paserin mir von zwei Tertianern gebracht Bo.!
- S. Holostea* L. L. an der Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf; Graben an der sog. Burg; Busch bei Pademagk Bo.F.
- S. glauca* With. Lbw. Westrand des Grossen Teiches bei Maasdorf!!

- A. nach Neudöbern hin in Gräben (Hl.) H. L. Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf; Kahnsdorf Bo. F.
- Stellaria graminea* L. A. (Hl.) Neudöbern, Rettgensdorf, Schöllnitz, Lukaitz H. L. Langengrassau Bo. F.
- S. uliginosa* Murr. Sw. Grabenränder im Fichtenwald am Ostufer des Lehmanns-Teiches!! Sp. Schleife!! L. Pelkwitz; Langengrassau Bo. F. Sumpfwiesen bei Waltersdorf, Zöllmersdorf, an der Bäke unweit der Chaussée Bo.
- Moenchia erecta* (L.) Fl. Wett. Ukro, an dem Standorte an der Schliebener Strasse seit der Abholzung des Birkenbestandes 1880 fast ausgerottet, dagegen am Fusssteig nach Wüstemarke zwischen den Lehmgruben der vorm. Ziegelei und dem Walde 1881 Bo. F.
- Cerastium glomeratum* Thuill. L. (R.) Waltersdorf, Langengrassau, Ukro, Pitschen Bo.
- Elatine triandra* Schk. L. Sandteich bei Fürstlich Drehna Bo.
- E. hexandra* (Lap.) DC. S. Ungemein viel am Kaupenteich bei Hörlitz!! (!) G. Zahlreich am Südufer des Naundorfer Sees bei Lauchhammer!! (!) L. Sandteich bei Fürstlich Drehna Scheppig!
- Radiola multiflora* (Lmk.) Aschs. S. Nordufer des Kaupenteiches bei Hörlitz; im Lugk-Teich bei Dobristroh!! G. Aecker beim Friedhof Ja. Aecker am Ost- und Westrande des Latken-Teiches bei Kleinleipisch und sehr viel zwischen Kl. Leipisch und Neu-Bockwitz!! Lbw. Nordufer des Kleinen Teiches bei Maasdorf!! Do. Aecker häufig Wa.; Friedersdorf, Waldrand bei Gruhnow Petz.; Aecker an der Lindenaer Mühle!! Fi. in einem trocknen Graben am Fusssteig nach Tanneberg Jachan. Sp. Aecker östlich von Schleife!! K. Buchwäldchener Teiche!! L. Kahnsdorf an der Altenower Grenze viel Bo. F. F. an der Chaussée bei Nossdorf!!
- Malva Alcea* L. G. Abhänge bei Kostebrau!! Kb. Schlossberg in Burg Kurtz. A. (Hl.) auf dem Schlosshofe und im Schlossgarten H.
- M. silvestris* L. Do. an der Plumpmühle!! A. (Hl.) Neudöbern auf dem Hofe H. L. Wierigsdorf, Giessmannsdorf, Kahnsdorf, Frankendorf, Beesdau Bo. F. F. Gutshof in Kl.-Kölzig!!
- † *M. crispa* L. Sp. in Gärten und auf dem Georgenberge verw. H.; Schleife Hantscho!
- Hypericum tetrapterum* Fr. Do. häufig in Friedersdorf Petz!! und in den Teichgärten!! Sw. Gräben nordwestlich vom Bahnhofe Brenitz!! A. (Hl.) in Sümpfen bei Neudorf H. L. an der Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf; Graben vor Kahnsdorf; Langengrassau an der Ziegelei; Fürstlich Drehna Bo. F.
- H. quadrangulum* L. Do. Friedersdorf!!
- H. humifusum* L. S. Kaupenteich bei Hörlitz; zwischen Hörlitz und Senftenberg in Chausséeegräben; Lugkteich bei Dobristroh!! Do. Friedersdorf Petz. Fi. Am Waldrand südlich von der Försterei

- Jachan. Sp. zwischen Kl.-Düben und Kromlau!! L. Kahnsdorf, Fürstlich Drehna Bo. F.
- † *Hypericum Androsaemum* L. L. Drehnaer Park verwildert Bo.!
- Acer campestre* L. mit korkig geflügelten Aesten. L. Bäckedamm zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf Bo. F.
- † *Geranium ibericum* Cav. Do. verwildert Jachan.
- G. pratense* L. L. (Bornsdorf R.) auf einer kleinen Wiese zwischen der Kahnsdorfer Ziegelei und Fresdorf, anscheinend wild Bo.!
- G. palustre* L. Fi. Wiesen nahe der Stadt häufig Jachan. Kb. zwischen Burg und Müschen As. A. (Hl.) in Gärten; bei Neudöbern auf der Wiese hinter dem Mühlteich H. L. Paserin; Langengrassau; Waltersdorf; Görlsdorf etc. Bo. F.; Weissagk Wa.
- G. sanguineum* L. Sp. Georgenberg Ri.!!
- G. columbinum* L. L. Bergen (R.) Bo. F.
- Oxalis Acetosella* L. Do. Wald am Südufer des Hammerteiches!! Sw. an der Brücke östlich vom Wallhaus bei Friedersdorf!! Sp. Kromlauer Park As. A. Schlossgarten; Rettgensdorfer Busch; Chransdorfer Tannenbusch (Hl.) H. K. Wald nordwestlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. Wittmannsdorf; Waltersdorf Bo. F.
- Impatiens noli tangere* L. Do. Buchwald; Birkbusch!! A. Rettgensdorfer Busch (Hl.) H. L. fast in allen Erlengebüschen, besonders zahlreich bei Paserin und Ukro; Langengrassau; Waltersdorf; Andreas-Mühle bei Gehren Bo. F.
- Evonymus verrucosa*** Scop. A. Neudöbern hinter dem Schafteich am Graben in einem einzigen, aber grossen Strauche, der jedoch bisher noch nicht geblüht hat. Wahrscheinlich ist diese Rarität des Gebietes bisher nur übersehen worden, da das Gebüsch bis zur Anlegung des Bahnhofes an jener Stelle ziemlich dicht war. Für angepflanzt halte ich diesen Strauch nicht. 1882 H.
- * *Ulex europaeus* L. Sp. zwischen Lieskau u. Roiten cult. Hantscho, Ri.
- Sarothamnus scoparius* (L.) Koch. Do. Arenshain, am Wege nach Dobrilugk; beim Kirchhof!! Sw. am Hohlweg nördlich von Trebbus!! L. in Pelkwitz viel Bo. F.
- Genista pilosa* L. G. an der Thonbahn zwischen Kostebrau und Zschipkau!! Do. Wald bei Friedersdorf Petz. Fi. an der Chaussée nach Münchhausen Jachan. Sp. Kromlauer Wald Hantscho, As. K. Siehe. L. Langengrassau; Gehren; Weissagk Bo. F.
- G. tinctoria* L. Sp. Moore östlich von Schleife!! K. Siehe. L. Kahnsdorf am Wall; Wannichen; Fürstlich Drehna zwischen Park und Weinberg Bo. F.
- G. germanica* L. S. Wüstemarke Bo.; Höhen bei den Höllenbergen, Rochauer Heide Bo. F., Gehrener Berge Bo. Fi. am Wege nach Lauchhammer!! Sp. Schleife Hantscho. K. Siehe.
- † *Cytisus capitatus* Jacq. Sp. Kromlauer Park Hantscho, As.

- Ononis repens* L. L. Langengrassau; Bornsdorf; Stiebsdorf am Wege nach Bornsdorf; Fresdorf Bo. v. *mitis* Gm. Sp. Hohlweg nördlich von Trebbus!! L. Viehweide; Gehren, Grüner Berg; Waltersdorf unweit der Leberecht'schen Ziegelei; Langengrassauer Wald bei der Ziegelscheune Bo. fl. albo. Lbw. Rothstein, an der Strasse nach Dobrilugk!!
- Anthyllis Vulneraria* L. Lbw. Prestowitz am Weg zum Stein in der Nähe des Teichhauses!! L. Wüstemarke; Frankendorf; Fresdorf wild; zuweilen auf Aeckern cultivirt Bo.F.
- † *Medicago media* Pers. L. Kahnsdorf am Wall Bo.F.
- M. falcata* L. L. Kahnsdorf am Wall Bo.F.
- † *M. hispida* (Gtn.) Urban v. *denticulata* W. Sp. Malades Fabrik!! (!) Wilhelmsthal und Bartzes Gärtnerei Ri.!
- † *M. Aschersoniana* Urb. (*Schimperia* Hochst.) Sp. Wilhelmsthal, noch 1884 Ri. Malades Fabrik!! (!)
- † *M. arabica* All. Sp. Wilhelmsthal, noch 1884 Ri.!
- Melilotus altissimus* Thuill. L. Fresdorf am Borchelt; Gräben bei Frankendorf Wa.!
- M. officinalis* Desr. L. Kahnsdorf am Wall; Görlsdorf nördlich vom Gutshofe Bo.F.
- M. albus* Desr. L. Kahnsdorf am Wall; Frankendorfer Moor; Fresdorf am Borchelt (Schwochow); Görlsdorf; Drehna'er Weinberg Bo.F.
- † *M. coeruleus* (L.) Desr. Sp. Schleife verwildert!!
- Trifolium alpestre* L. Lbw. Rothsteiner Felsen!! L. Wüstemarke, Gehren Bo.
- T. medium* L. L. Thongruben Bo.; Grabenränder nordwestlich von Wüstemarke; westlich von Fürstlich Drehna; Wanninchen Bo.F.!
- T. fragiferum* L. G. an einem Moorwege östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! L. nördlich und östlich von der Stadt häufig; Karche; Zaakow; Kahnsdorf Bo.F.
- T. montanum* L. L. Gr. Schanze; Karche; Kahnsdorf; Fresdorf besonders am Borchelt; Görlsdorf Bo.F.
- T. hybridum* L. Do. Moor östlich von den Plumpteichen; an einem Tümpel zwischen dem Buchwald und Vorwerk Forst; Moore südlich von Friedersdorf!! L. Bäckewiesen zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf; Paserin unweit des Bahndamms; Fürstlich Drehna hinter dem Park Bo.F.
- T. agrarium* L. L. Kahnsdorf (R.) am Dorfe und an der Chaussée nach Lb. (Schwochow); zwischen Fürstlich Drehna und Stiebsdorf Bo.F.
- Lotus corniculatus* L. v. *ciliatus* K. Sp. Teichränder bei Trattendorf Ri. v. *tenuifolius* Rchb. L. Salztriften links a. d. Kalauer Chaussée Wa.
- L. uliginosus* Schk. L. nicht selten; hinter dem Schützenhause; Kahns-

- dorf; Fresdorf; Fürstlich Drehna; Andreas-Mühle bei Waltersdorf; Langengrassau Bo. F.
- † *Colutea arborescens* L. A. Neudöbern im Park verwildert H. K. Altenow 1881 H.
- Astragalus glycyphyllus* L. Sp. Kirchhof in Schleife!! L. Rochauer Pechhütte; Langengrassau in der Schlucht nach Wüstemarke zu in Menge Bo.; Kirchhof in Riedebeck (Tschiersch); Wall bei Kahnsdorf (R.) Bo. F.
- A. arenarius* L. Fi. Am Wege nach Kirchhain beim Waisenhaus Jachan. A. nach dem Weinberge hin (Hl.) H.
- Coronilla varia* L. Herzberg Treichel! Kb. Schlossberg bei Burg viel (Hl.) As. Madlow!! L. (R.) Schanze; Neuendorf an der Lübbener Chaussée Bo. M. an der Neisse bei Gr.-Särchen!! (!)
- Ornithopus perpusillus* L. Do. Weinberg Wa.; Friedersdorfer Wald Petz.; Königl. Dobrilugker Forst bei Deutsch-Sorno!! Sp. Schleife W. v. Schulenburg!! (!) Krömlau Hantscho, As. Kb. bei Madlow und Gallinchen häufig!! L. Gehren; Wanninchen Bo. F.
- † *O. sativus* Brot. Sw. am Bahnhof verwildert!! Kb. zwischen Gallinchen und der Kutzenburger Mühle 1884 viel verwildert!!
- Vicia tetrasperma* Mch. L. Chausséen nach Langengrassau und Ukro Bo.; Waltersdorf Bo. F.
- V. sepium* L. L. am Stadtgraben (Schwochow) Bo. F.
- V. villosa* Rth. L. als Futterpflanze vielfach gebaut, so 1885 z. B. in Frankendorf Bo.
- V. cassubica* L. Lbw. Rothsteiner Felsen!! Sp. Georgenberg!! (!)
- V. lathyroides* L. L. Thongruben zwischen Wittmannsdorf; Schanze; zwischen Wierigsdorf und Giesmannsdorf westl. der Chaussée Bo. F.
- * *Lathyrus sativus* L. L. in Görlsdorf angebaut Scheppig.
- L. tuberosus* L. Sw. H. L. (R.) Felder nördlich vom Prinzessinnensteig Bo. F.! H.
- L. paluster* L. L. (R.) Wiese am Gossmar'schen Fliess; Fresdorf in der Nähe des Borchelt Bo. F.
- L. niger* (L.) Bernh. Sw. Jachan. L. Fürstlich Drehna, Nordseite des Weinbergs im Walde (R.) Bo. F.
- L. montanus* Bernh. S. Rauno'er Weinberge!! L. Falkenberg; Höllenberge bei Langengrassau Bo. F. var. *tenuifolius* Rth. L. Ukro, Berge links von der Chaussée nach Dahme Wa.!
- Prunus spinosa* L. Sp. Georgenberg As. Kb. Schlossberg bei Burg As. Do. Kirchhof!! L. Gebüsch der Bäckewiesen zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf Bo. F. var. *coetanea* Wimm. et Grab. Fi. Weg nach Nehesdorf A. Schultz; Weg nach der Heide-Mühle Jachan.
- P. Padus* L. L. in Erlenbrüchen bei Drehna und Weissagk Wa.
- † *Spiraea salicifolia* L. Kb. Burg viel! As. L. Graben an der sog. Burg Bo. F.

- Rubus plicatus* W. et N. G. Kiefern-schonung am Quellgraben Ja. Eine Form mit grosser, ausgebreiteter Rispe: L. Gahro'er Pechhütte, am Eingang zur Buchheide Wa.
- R. suberectus* Anders. Do. Buchwald Wa. L. An Gräben bei der Stadt; zwischen Ukro und Pickel; Drehna, Weissagk, überhaupt dort allgemein verbreitet Wa.
- R. thyrsoides* Wimm. L. Gahro'er Pechhütte am Eingange zur Buchheide zahlreich Wa.
- R. villicaulis* Köhler. L. Weissagk an Gartenzäunen Wa. G. am Schafteich Ja.
- R. pyramidalis* Kaltenb. G. Koyne Ja.
- R. silvaticus* W. et N. ? Do. Königliche Forst zwischen Fischwasser und der Buschmühle Wa.
- R. Schleicheri* W. et N. G. am langen Teich Ja. Do. Königliche Forst zwischen Fischwasser und der Buschmühle häufig, auch am Wege hinter der Buschmühle Wa. L. Wanninchen; Drehna, am Rande des Erlenbruchs vor dem Sandteiche Scheppig, Wa.
- R. nemorosus* Hayne. G. Schafteich Ja. L. an der Chaussée nach Finsterwalde, Weissagk, Gr. Mehssow u. s. w. Wa.
- R. hirtus* W.K. G. am Quellgraben Ja.
- R. Jensenii* Lge. L. zwischen Görlsdorf und Wanninchen; Erlenbruch bei Drehna Wa.
- R. saxatilis* L. L. westlich vom Gossmar'schen Fliess (Tschiersch); nordöstlich von Wittmannsdorf Bo. F.
- † *R. odoratus* L. A. Neudöbern im Schlossgarten verwildert H.
- † *Fragaria moschata* Duch. L. Görlsdorfer Park Bo. F.
- F. collina* Ehrh. L. Ukro an den Höllenbergen (R.) Bo. F.
- Comarum palustre* L. Sw. Graben östlich vom Wallhaus bei Friedersdorf, Tzschäker- und Thürmen-Teich daselbst!! Do. Friedersdorf Petz. Sp. Schleife, Gräben der Strasse nach der Eisenbahn Hantscho, As.; Gr.-Düben Hantscho, As. A. häufig (Hl.) H. L. südlich der Stadt Bo. F.
- Potentilla supina* L. L. Beesdau, Tümpel am südlichen Dorfende (R.) Scheppig; an der Langengrassauer Chaussée den Mühlen gegenüber Bo. Weissagk, im Dorfe Wa.!
- P. norvegica* L. S. Kaupenteich bei Hörlitz viel!! (!) Sp. Moore zwischen Kromlau und Halbendorf zahlreich!! (!) L. Wiesen am Gossmar'schen Fliess; zwischen Fresdorf, Frankendorf und Görlsdorf viel Bo. F. Lb. zwischen Radensdorf und Alt-Zauche und bei der Polenz-Schenke Ja.
- P. mixta* Nolte. Do. Schlosshof bei der Kirche Wa.! zwischen dem Buchwald und Vorwerk Forst Wa.!!; bei der Buschmühle Wa. Kb. An der Spree zwischen der Kutzenburger Mühle und Frauen-

- dorf!! (!) L Nord- und Südufer des Gr. Mehssower Teiches Wa.! M. Am westlichen Neisseufer zwischen Köbeln und Gr.-Särchen!! (!)
- P. procumbens* Sibth. G. am Moorgraben östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Do. am Tümpel zwischen dem Buchwald und Vorwerk Forst; Tümpel südlich der Hennersdorfer Chaussée; Deutsch-Sorno im Dorfe und in der Königlichen Dobrilugker Forst am Wege nach Dobrilugk viel!! Fi. am Graben, der an der Südwestseite des Schneidemühlenteiches mündet!! L. auf grasigen Waldplätzen verbreitet, z. B. Drehna, Gr.-Mehssow, zwischen Görlsdorf und Wanninchen u. s. w. Wa. Langengrassauer Ziegelei Bo. M. am westlichen Neisseufer zwischen Köbeln und Gr.-Särchen!!
- P. minor* Gil. L. Chaussée nach Ukro Bo.F.
- P. rubens* (Crantz) Zimmeter (*P. opaca* auct.) L. (Langengrassau R.) Chaussée nach Langengrassau bei den Mühlen Bo.F.
- P. arenaria* Borkh. L. Zaakow Bo.F.
- P. alba* L. Höllenberge bei Langengrassau (R.) Bo. F.
- Alchemilla vulgaris* L. G. Abhänge bei Kostebrau!! Sp. Lieskau Hantscho! Kromlau, in Dorfgärten und im Park!! L. Langengrassau, am Fuss der Höllenberge; Gr.-Mehssow Bo.
- A. arvensis* (L.) Scop. G. Um Kl.-Leipisch und Neu-Bockwitz viel!! Do. Aecker bei Friedersdorf häufig Petz. Fi. Aecker am Lichterfelder Wege hinter Rutschmanns Gehöft Jachan. Sw. Aecker nordwestlich vom Bahnhof Brenitz!! A. (Hl.) Getreideäcker, in manchen Jahren häufig H. L. Um Kahnsdorf bis Altenow, Frankendorf und Fresdorf; Zaakow; Fürstlich Drehna Bo.F.
- Sanguisorba officinalis* L. Sp. Schleife, am Fussessteige nach Trebendorf Hantscho, As.
- Agrimonia Eupatoria* L. Do. bei Friedersdorf häufig Petz. Buchwald, spärlich; Arenshain!! L. häufig, nächster Standort Chaussée dem Sandower Kirchhof gegenüber; viel bei Langengrassau und Fürstlich Drehna Bo.F. F. in Jethe und Kl.-Kölzig!!
- A. odorata* Mill. L. in Riedebeck sehr zahlreich Wa.! Ukro: unweit Pickel Bo.
- † *Rosa cinnamomea* L. Lbw. Hecken in Maasdorf!! Do. Ausstich am Kirchhofe Wa. L. Kirchhof halb wild (R.) Bo.F.
- R. tomentosa* Sm. Sw. zwischen Trebbus und Arenshain!! L. vor Wittmannsdorf; Dammweg nach Fresdorf Bo.F.
- R. tomentella* Lém. L. Drehna, am Weg zur „Guste“ Wa.
- R. mollissima* Fr. L. Gräben bei der Stadt Wa.
- R. pomifera* Herm. Do. trockne Trift am Hammerteiche unweit des Bahnkörpers Wa.
- R. rubiginosa* L. L. Schanze und an der Promenade (Schwochow) Bo.F.; Ukro, am Wege, welcher bald hinter dem Bahnkörper links von

- der Dahmer Chaussée in die Berge führt Wa. ; zwischen Langengrassau und Wüstemarke (R.) Bo.F.
- R. dumetorum* Thuill. v. *trichoneura* Ripart. L. Thongruben unweit der Stadt Wa. v. *platyphylla* Rau. L. bei der Gahro'er Pechhütte Wa.
- Crataegus Oxyacantha* L. L. vor Zauche Bo.F.
- Epilobium angustifolium* L. G. Sandgrube bei Neu-Bockwitz!! Do. Plumpsteiche; Tümpel südlich an der Hennesdorfer Chaussée!! Sp. Schleife Hantscho, As.!!; an der Eisenbahn von Schleife bis Weisswasser!! Kromlauer Park Hantscho, As. Lbw. Rothsteiner Felsen viel!! L. Waltersdorf (Schwochow); Höllenberge; Alt-Sorgefeld Bo.F.
- E. hirsutum* L. (Berste R.) am Gossmar'schen Fliess Bo. Hospitalwiese Bo.!
- E. montanum* L. Do. Königliche Forst zwischen Fischwasser und der Buschmühle Wa.! L. Langengrassau; Wüstemarke häufig Bo.F.
- E. roseum* Schreb. L. am Stadtgraben, Müllerhack, Graben bei der Bade-Anstalt; Bäke zwischen Wierigsdorf und Karche; Sümpfe südöstlich von Waltersdorf Bo.F. Drehna im Dorfe an Gräben Wa.
- E. adnatum* Gris. (*tetragonum* aut.) L. am Fresdorfer Fliess Bo.
- E. obscurum* Rehb. L. Gräben bei Gr.-Mehssow Wa.! Gräben an der Andreas-Mühle bei Waltersdorf Bo.!
- E. parviflorum* × *obscurum*. Ukro, Gräben bei der Ziegelei Bo.!
- † *Oenothera biennis* L. G. Lauchhammer!! Do. Friedersdorf Petz.!! Sp. Schleife Hantscho. L. Zöllmersdorf an der Chaussée viel; Pelkwitz (Schwochow) Bo.F.; Weg nach Bornsdorf Radestock! Weissagk Bo.F.
- Isnardia palustris* L. Do. Friedersdorf, Wiesengräben hinter dem Pfarrgarten nicht häufig Petz.!
- Circaea lutetiana* L. Do. Buchwald!! (!) A. Chransdorfer Busch (Hl.) H. L. Erlengebüsche bei der Scharfrichterei unweit Fürstl. Drehna Bo.F.
- C. alpina* L. Do. Königliche Forst zwischen Fischwasser und der Buschmühle Wa. L. (Ukro R.) Erlengebüsche zwischen Paserin und Pitschen Bo.F.
- Trapa natans* L. Lbw. Viel bei Wahrenbrück im „Stachelnussloch“!! Do. Hammerteich!! (!) A. Neudöbern im Dorfteich (Hl.) H.
- Myriophyllum spicatum* L. A. (Hl.) in einem Teich H.
- M. verticillatum* L. L. südlich von der Stadt viel und im Stadtgraben Bo.F. f. *pinnatifida* Wallr. Sp. Quell bei Trebendorf W.v. Schulenburg! L. Wiese westlich vom Gossmar'schen Fliess Bo.F.
- Hippuris vulgaris* L. A. in den Kaseler Teichen H. L. Gräben des Frankendorfer Moores zahlreich Bo.F.
- Callitriche verna* L. f. *caespitosa* Schultz. (rev. Prof. Hegelmaier). S. Kaupenteich bei Hörlitz!! (!) G. Südufer des Naundorfer Sees!!

- C. hamulata* Kütz. f. *trichophylla* Kütz. (nach Prof. Hegelmaier Do. Gräben nördlich von Friedersdorf am Weg nach Lindena!! (!)
- Ceratophyllum demersum* L. L. im Stadtgraben Bo.
- Lythrum Hyssopifolia* L. Do. Tümpel zwischen Buchwald und Vorwerk Forst, 1 Exemplar!! Dorfstrasse in Friedersdorf Petz.!! (!)
- Pepelis Portula* L. S. an den Bommelteichen bei Zschipkau und am Kaupenteich bei Hörlitz!! Do. Ausstiche auf dem Weinberge Wa., am Tümpel zwischen dem Buchwald und Vorwerk Forst!! Friedersdorf im Dorfe!! und an feuchten Stellen am Waldrande Petz. Gräben nördlich vom Dorfe!! in Deutsch-Sorno!! Fi. Bahnausstich bei der Försterei A Schultz. L. Vertiefungen des Angers südlich der Chaussée nach Ukro (Schwochow) Bo.F.; Wierigsdorf, hinter der Mühle Bo.; Dorftümpel in Gr.-Mehssow Wa. F. Gari, nördlich der Mühle am Graben!! f. *fluitans*. Do. Fließgraben südlich von Friedersdorf!!
- Bryonia alba* L. Fi. Hecken in der Stadt Jachan. Sp. Schleife Hantscho! L. nächster Standort Sandow Bo.F.
- † *Sicyus angulatus* L. L. Hecken der Promenade beim Eishause (Schwochow) Bo.F.
- Montia minor* Gm. Fi. Aecker an der Nordseite des Bahnhofes Jachan! A. Aecker bei Neudöbern (Hl.) nach Rettgensdorf hin H. L. am Wege von Zöllmersdorf nach Langengrassau viel; zwischen Waltersdorf und Gehren; Ukro am Busch; Pitschen; Pickel; Golzig; Käsel Bo.
- Corrigiola litoralis* L. S. Kaupenteich bei Hörlitz!! (!) L. (Wüstemarke R.) Langengrassau bei der Ziegelei Bo.F.
- Illecebrum verticillatum* L. S. am Wege zwischen Hörlitz und der Stadt!! G. zwischen Lauchhammer und der Schlackenbrücke am Wege nach Gohra; um Kl.-Leipisch und Neu-Bockwitz zahlreich!! Lbw. Aecker am Prestowitz Stein!! Do. am Weg nach Fischwasser Wa.! Friedersdorf, auf Aeckern an der „Rade“ hinter dem Pfarrgarten und viel am Weg nach Lindena Petz.!! Fi. am Waldrand südlich der Försterei; Heinrichsruh Jachan. Sp. zwischen Schleife und dem „Grossen Teich“ W. v. Schulenburg! auf allen Aeckern um Schleife!! (!) K. viel Siehe. L. bei Gr.-Mehssow alles überziehend Bo.F. zwischen Beesdau und Bergen viel Bo.F. F. Gari, nördlich der Mühle am Graben!!
- Sedum maximum* Sut. Do. beim Kirchhof; bei einer Schenke am Weg nach Hennersdorf!! Sp. Schleife Hantscho, As. L. Zöllmersdorf an der Chaussée sehr zahlreich Bo.F.
- † *S. spurium* M.B. Do. In einem Ausstiche beim Kirchhofe viel Wa.!! (!) Sp. Georgenberg, zahlreich verwildert!!
- S. villosum* L. Sp. Schleife bei Schimkos Busch Hantscho, As.!! A. (Hl.) auf Torfwiesen am Rettgensdorfer Busch H.

- † *S. album* L. L. am und auf dem Kirchhofe in Menge verwildert Bo.; Frankendorf, am Kirchhofe Bo. F.!
- S. reflexum* L. M. an der Neisse (westliches Ufer) zwischen Köbeln und Gr.-Särchen!! Sp. Georgenberg H., As.!! L. Höhen hinter Ukro Bo. var. *viride* Koch. A. im Park H.
- † *Ribes Grossularia* L. Abhandl. XXI. S. 115 lies Welke statt Weltze.
- R. nigrum* L. L. Gebüsch der Promenaden Bo. F.
- Saxifraga tridactylitis* L. L. nächster Standort Felder an der Berste nördlich der Stadt; weite Strecken überziehend westlich der Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf und Fresdorf am Borchelt Bo. F.
- Chrysosplenium alternifolium* L. L. Westlich von Wierigsdorf; Pelkwitz; Paserin; Ukro; Langengrassau am Fuss der Höllenberge viel Bo. F.
- Sanicula europaea* L. L. Drehna, Laubwald südlich von Försters Ziegelei Bo. F.!
- † *Astrantia major* L. L. Gärten in Terpt verwildert Bo. F.
- Eryngium campestre* L. Do. Vorwerk Schulz!!
- † *E. planum* L. L. nordöstlich von der Stadt am Fusssteig nach dem Zaakower Wege 1880 und 1881 (Schwochow), später durch Schüler ausgerottet Bo. F.
- Cicuta virosa* L. Do. Gräben am Südrande der Stadt nach der Buschmühle hin!! Wiesengräben bei Friedersdorf Petz. L. z. B. Teich und Gräben hinter dem Schützenhause; Gossmar'sches Fliess Bo. F.
- Falcaria sivoides* (Wib.) Aschs. L. (R.) nordöstlich der Stadt nicht selten; Schollen; Karche; Kahnsdorf Bo. F.
- Pimpinella magna* L. L. Wierigsdorf (R., Tschiersch); Görlsdorf z. B. am Wege nach Wanninchen; Beesdauer Park (Schwochow); Langengrassauer Heide vor Alt-Sorgefeld Bo. F.
- Sium latifolium* L. L. Gräben vor dem Hain Bo. F.
- Oenanthe fistulosa* L. Do. Teichgärten!! Friedersdorf in Wiesengräben Petz.! und Gräben am Wege nach Lindena!! L. häufig nördlich der Stadt und am Wege nach Kahnsdorf; Pelkwitz Bo. F. F. zwischen Domsdorf und Tschacksdorf am Wege!!
- O. aquatica* (L.) Lmk. Do. Teichgärten!! A. Gräben nach Neudorf und Reddern hin (Hl.) H. L. nächste Standorte Haingraben und Berste; viel bei Paserin Bo. F.
- Silaua pratensis* Bess. Sp. Spreeufer gegenüber der Apothekerinsel Ri. L. Zaakow; hinter Sandow; zwischen Ukro und der Rochauer Pechhütte Bo. F.
- † *Levisticum officinale* Koch. Sp. Graspärten in Schleife Hantscho, As.!! und Kromlau!! L. Kahnsdorf As.
- Selinum Carvifolia* L. Do. an der Rade bei Friedersdorf Petz. Kb.

Burg bei Knuth As. L. Langengrassau am Fuss der Höllenberge, Görlsdorfer Busch; Beesdau Bo.F.

† *Archangelica officinalis* Hoffm. Sp. häufig in Schleife Hantscho!! (!) und Kromlau!!

Peucedanum Cervaria (L.) Cuss. Sp. Georgenberg Ri!!

P. Oreoselinum (L.) Mneh. G. Abhänge bei Kostebrau!! Lbw. Rothsteiner Felsen!! Sw. Hohlweg nördlich von Trebbus!! Sp. Georgenberg!! L. an der Chaussee nach Ukro bei Zöllmersdorf; Wald hinter Gehren; zwischen Trebbinchen und Weissagk Bo.F.

P. palustre (L.) Mneh. Do. Hammerteich!! Sw. beim Wallhaus am Tzschäkerteich!! Sp. Schleife Hantscho, As. L. Stadtgraben und Gossmar'sches Fliess; Hinterbusch bei Fresdorf und Görlsdorf Bo.F.

† *Imperatoria Ostruthium* L. Sp. Schleife, in Grasgärten Hantscho, As.!!

Chaerophyllum Anthriscus (L.) Crtz. L. Giessmannsdorf; Karche; Frankendorf; Fresdorf Bo.F.

† *Lindera odorata* (L.) Aschs. Sp. Grasgarten in Schleife Hantscho!! (!) und Kromlau!!

Conium maculatum L. Fi. Lehrer Kerst. L. Wierigsdorf an der Chaussée; Schollen (Dorfstrasse); Görlsdorf (Gärten) [Schwochow] Bo.F.

Hedera Helix L. A. Rettgensdorfer Busch (Hl.) H. L. Langengrassau, am Fuss der Höllenberge Schwochow.

Cornus sanguinea L. G. Eichwald am Wege von Gohra nach Lauchhammer!!

† *C. stolonifera* Michx. L. Gräben an der sog. Burg Bo.F.

Viscum album L. Fi. bei der Tanneberger Buschmühle auf Kiefern Jachan. Sp. Trebendorfer Wald auf Kiefern nach Hantscho. A. (Hl.) Neudöbern'sche Ziegelei auf Birken; Rettgensdorfer Forst auf Kiefern (H.) L. Rochauer Heide Bo.F.

Adoxa Moschatellina L. L. Wierigsdorf zwischen den Gärten (Schwochow) Bo.F.

Sambucus racemosa L. Do. (Bo.F.) Buchwald, am Pflanzgarten mit *Rubus suberectus* Wa.!! (!) prachtvoll im Birkbusch!! A. Rettgensdorfer Busch (Hl.) As., H.

Viburnum Opulus L. Do. Wald am Jäger- und Kuchenteich!! Sw. beim Wallhaus am Tzschäkerteich!! Sp. Schleife Hantscho, As. L. Graben an der sog. Burg; Beesdau; Fürstlich Drehna Bo.F.

† *Lonicera tatarica* L. L. Graben an der sogenannten Burg Bo.F. *Sherardia arvensis* L. L. Fresdorf; Frankendorf Bo.F. M. Aecker bei Gr.-Särchen!! (!) F. Unter Flachs bei Jethel!

Asperula odorata L. Sp. Kromlauer Park As.!!

Galium Aparine L. var. *Vaillantii* DC. L. Aecker bei der Stadt selten Wa. var. *spurium* L. L. Fürstlich Drehna'er Weinberg Bo. F. unter Flachs an der Mühle bei Gari!! (!)

- G. palustre* L. var. *umbrosum* Aschs. K. Erlenbruch am Bahnhof Lukaitz!! (!)
- G. boreale* L. A. Rettgensdorfer Forst H. L. (Auerbalz R.) Waldblössen zwischen Falkenberg und Alt-Sorgefeld (Schwochow) Bo. F.
- G. silvaticum* L. G. an einer Quelle der Abhänge an der Westseite von Kostebrau!! L. Rochauer Heide Bo. F.
- Valeriana officinalis* L. Do. in Arenshain!! A. am Rettgensdorfer Busch (Hl.) H. L. südlich der Stadt Bo. F.
- V. sambucifolia* Mik. L. Pickel Bo. Fürstlich Drehna, im Erlenbruch links vom Wege nach dem Sandteiche Wa.!
- Valerianella dentata* Poll. L. Gossmar Bo. F. F. unter Flachs bei Jethe!! (!)
- Dipsacus silvester* Mill. L. am Frankendorfer Moor Bo. F.
- Scabiosa suaveolens* Desf. Sp. Bergstrasse auf Schwetas Berg Ri. L. Ukro, Berge links von der Dahmer Chaussée Wa. Alt-Sorgefeld; Waltersdorf (R.) in den Kalkgruben westlich vom Bahndamm viel; vor Wendisch-Drehna (Tschiersch) Bo. F.
- Eupatorium cannabinum* L. Lübbenau zwischen Lehde und Burg R. Virchow. L. Paserin; Ukro; Beesdau; Görlsdorf Bo. F.
- Tussilago Farfarus* L. Sp. Gärtnerei in Trattendorf Ri. Lieskauer Ziegelei Hantscho. Kromlauer Park an den Felspartieen As. L. Thongruben; Wittmannsdorf bei den Ziegeleien; Kahnsdorf; Fresdorf; Frankendorf Bo. F. M. westliches Neisseufer zwischen Köbeln und Gr.-Särchen!!
- Petasites officinalis* Mnch. A. Brautteich bei Neudöbern H. Lübbenau Schlossgarten E. Küster. L. Müllerhack; Kahnsdorf im Park Bo. F. Tr. in Bukoka!!
- † *Aster Novi Belgii* L. Sp. Schleife Hantscho, As.
- † *A. sp.* G. am Oberhammerteich bei Lauchhammer verwildert!! (Nicht blühend beobachtet.)
- † *Stenactis annua* (L.) Nees. L. Kirchhof der Kalauer Vorstadt (Schwochow) Bo. F.
- Erigeron acer* L. L. an den Chaussées nach Ukro, Langengrassau und Wittmannsdorf; Wege der Torfmoore Bo. F.
- Solidago Virga aurea* L. Lbw. Prestowitz Stein!! Sp. Georgenberg H. A. (Hl.) an der Chaussée nach Gr.-Räschen H. L. Rochauer und Langengrassauer Heide Bo. F.
- † *S. serotina* Ait. Sp. Kromlauer Park As.
- † *Inula Helenium* L. Sp. Schleife, in einem Graspark!! Roiten Hantscho. L. (zwischen Ukro und Pitschen R.) Pickel, Gebüsch in der Nähe des Dorfes Bo. Gossmar; Beesdau (Schwochow) Bo. F.
- I. salicina* L. L. (R.) Hutungen an der Bäke Bo.; Fresdorf an der Kahnfahrt; Frankendorfer Moor nordöstlich Bo. F.

- I. Britannica* L. Do. Arenshain!!; am Wege zwischen Lindena und Friedersdorf Petz.!! L. Torfmoore sehr viel; Kahnsdorf Bo. F.
- Pulicaria prostrata* (Gil.) Aschs. G. in Kostebrau!! Lbw. in Maasdorf!! Do. in Friedersdorf Petz.!!; Arenshain und Deutsch-Sorno!! (!) A. Neudöbern (Hl.) H. L. Giessmannsdorf; Pelkwitz; Paserin; Langengrassau; Fresdorf; Görlsdorf Bo. F.
- P. dysenterica* (L.) Gaertn. L. Langengrassau (R.), Weg vor dem westlichen Ausgange des Dorfes viel Bo. F.
- † *Xanthium spinosum* L. Fi. sehr vereinzelt an Tuchfabriken Jachan.
- † *Rudbeckia laciniata* L. S. in Dobristroh!! Sp. Schleife Hantscho! L. Schützenhaus (Schwochow); Kl.-Mehssow Bo. F.
- † *Helianthus annuus* L. A. einzeln auf Aeckern bei Neudöbern vor Rettgensdorf verwildert H.
- † *H. tuberosus* L., wie vorige.
- Bidens cernuus* L. b) *radiatus* DC. L. Torfmoore südlich nicht selten Bo. F.
- † *Galinsoga parviflora* Cav. Sp. Schleife Hantscho. Kb. Burg Magnus.
- Filago germanica* L. K. bei der Reudener Schäferei H. L. Beesdau Schepig; Kahnsdorf Bo.
- F. arvensis* L. Sp. Schleife Hantscho.
- Gnaphalium silvaticum* L. Do. Waldwege bei Friedersdorf Petz. L. Chausséegräben vor Zöllmersdorf; Rochauer, Langengrassauer und Kemlitzer Heide, zahlreich bei der Pechhütte Bo. F.
- G. luteo-album* L. Do. Friedersdorf in der Nähe der Rade Petz. Fi. Aecker am Kirchhainer Wege Jachan. L. Aecker hinter der Schanze; bei Langengrassau viel Bo. F.
- † *Artemisia Absinthium* L. Do. in Lindena viel Petz.; in Friedersdorf und Arenshain!! Sp. Schleife Hantscho. A. (Hl.) beim Schiesshause und in Neudöbern in Gärten H. L. Ukro Bo. F.
- † *A. Abrotanum* L. L. Kahnsdorf, im Schulgarten verwildert (Schwochow) Bo. F.
- Achillea Ptarmica* L. Do. um Friedersdorf häufig Petz. Sw. am Wege östlich vom Wallhause bei Friedersdorf!! L. Torfmoore südlich Bo. F.
- Anthemis tinctoria* L. Sp. Georgenberg (R.) und am Eisenbahndamm im Einschnitt H.
- A. ruthenica* M.B. Liberose: Bahnhof Jamlitz viel Dr. Huth (Verhandl. 1884 S. XXIV.)
- A. Cotula* L. V. Suschow As. L. Pelkwitz Bo. F.
- † *Chrysanthemum majus* Aschs. L. Kirchhof der Kalauer Vorstadt verwildert Bo.
- C. vulgare* (L.) Bernh. S. Raunoer Weinberge!! G. Abhänge bei Kostebrau!! Do. Arenshain, Friedersdorf!! Sp. Schleife v. Schulenburg! am Grossen Teich As. L. vor und bei Kahnsdorf viel Bo. F.

- † *C. Parthenium* (L.) Bernh. Sp. Schleife Hantscho, As.
C. segetum L. Fi. Aecker am Kirchhofe Kerst.
C. Chamomilla (L.) Bernh. L. nach Wittmannsdorf zu; Pelkwitz etc. Bo. F.
C. inodorum L. L. (Trebbinchen R.) Fresdorf etc. Bo.
Arnica montana L. Do. Torfmoor am Wege vor Fischwasser viel Wa. Friedersdorf, hinter Täubertsmühle am linken Ufer des Fliesses Petz. Fi. halbwegs nach Droessigk hin Jachan! Sp. zwischen Schleife und dem grossen Teiche v. Schulenburg! überhaupt um Schleife häufig; ebenso bei Halbendorf und ungemein viel an der Eisenbahn von Schleife bis Weisswasser!! (!) A. Waldwiesen bei Chransdorf (Hl.) H. L. Bornsdorf (R.) Wanninchener Mühle (R., Schwochow) Bo. F.
Senecio paluster (L.) DC. L. Paserin; Ukro; Gossmar; Wittmannsdorf Bo. F.
S. viscosus L. Lbw. Prestowitzer Stein!! Do. bei der Plumpmühle; Lindena am Wege nach Friedersdorf!! Friedersdorf am Waldrande nach Gruhnov Petz. L. Langengrassau; an der Chaussée vor Wüstemarke (Schwochow) Bo. F.
S. silvaticus L. G. Waldlichtungen zwischen Gohra und Lauchhammer!! Do. Wald bei Friedersdorf Petz.; Tümpel südlich an der Chaussée nach Hennersdorf!! L. Gr.-Mehssow (Schwochow) Bo. F.
S. vernalis W. K. L. am Wege nach Frankendorf (Schwochow); Zaa-kow, überall einzeln und unbeständig Bo. F.
S. aquaticus Huds. G. am Latkenteich bei Kl.-Leipisch!! Do. Wiesen am Hammerteich Wa. und vor dem Buchwald!! Moorwiesen südlich von Friedersdorf!! L. zwischen Karche und Wierigsdorf am Grenzgraben (var. c) *pratensis*) Bo. F.!
S. paludosus L. Abh. XXI. S. 121 lies Matzmühle statt Satzmühle.
Cirsium acaule All. Do. zwischen Lindena und Friedersdorf am Wege mit var. *dubium* (Willd.)!! Sp. an einem Graben nordöstlich von Schleife!! A. (Hl.) Peitzendorf häufig H. L. Grabenränder der Kalauer Chaussée häufig Wa. Gehren Bo. F.; var. *dubium* (Willd.) L. Langengrassau bei der Ziegelei Bo. F.
C. canum (L.) M. B. L. Wiese links am Wege nach dem Hain Bo. Vgl. Verhandl. 1884 S. XXIII.
C. oleraceum (L.) Scop. L. Waltersdorf (Schwochow); Wiese an der Bäke links der Golssener Chaussée Bo. F.
C. palustre Scop. fl. albo. L. Wiesen beim Hain Wa.
† *Silybum Marianum* (L.) Gaertn. L. am Gossmar'schen Fliess (Schwochow) Bo. F.
Carduus crispus L. L. Gärten häufig, z. B. an der Promenade Bo. F.
Onopordon Acanthium L. L. Paserin; Ukro am Bahnübergang; Görldorf; Wanninchen Bo. F.
Lappa officinalis All. Kb. Burg As.

L. tomentosa Lmk. L. Pitschen Bo.

Serratula tinctoria L. Sp. Schleife, bei Schimkos Busch Hantscho, As. L. nach Fresdorf hin; Kahnsdorf an der Kalauer Chaussée (Schwochow); Bäkewiesen zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf Bo. F.

Carlina vulgaris L. G. Sandgrube bei Neu-Bockwitz und Abhänge bei Kostebrau!! Do. Vorwerk Schulz!! Sp. Georgenberg As. A. Alte Ziegelei in der Rettgensdorfer Forst (Hl.) H. L. Kahnsdorfer Flur; Wittmannsdorf; Gehren; Langengrassau Bo. F.

Centaurea rhenana Bor. (*panniculata* Jacq.) L. Zöllmersdorf; Kahnsdorf; Wanninchen viel Bo. F.

Thrinacia hirta Rth. S. viel an den Bommelteichen bei Zschipkau und am Kaupenteich bei Hörlitz!! G. am Südufer des Naundorfer Sees!! Do. zwischen Lindena und Friedersdorf am Wege und auf den anliegenden Wiesen viel!! (!) K. im Erlenbruch und an den Teichen südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. Zaakow Bo. F.

Leontodon hispidus L. var. *hastilis* L. L. Berge bei Weissagk; Moor bei Gahroer Pechhütte Wa.

Picris hieracioides L. L. (R.) Berste; Bäkedamm zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf; Fresdorf am Fliesswege nach der Stadt Bo. F.!

Tragopogon pratensis L. zwischen Do. und dem Bahnhof Wa.! L. Berste (Schwochow); Kahnsdorf am Wall; Borcheltwiesen bei Fresdorf Bo. F.

Scorzonera humilis L. Sp. Schleife Hantscho! L. (Weissagk R.) zwischen Görlsdorf und Frankendorf; Fürstlich Drehna Bo.

Taraxacum vulgare Schrk. c) 2. *cornigerum* L. Rüdingsdorfer Berge Bo. var. *paludosum* Scop. 1. *palustre* DC. f. *salinum* Poll. L. Salztriften links an der Kalauer Chaussée Bo. Kahnsdorf (R.); Vorder- und Hinterbusch Bo. F.

Chondrilla juncea L. Lbw. um Rothstein zerstreut!! Do. am Kirchhof!! A. am Weinberge (Hl.) H. L. Ackerraine südöstlich; Bornsdorf Bo. F.

Lactuca Scariola L. L. (R.) Waltersdorf Bo.

L. muralis (L.) Less. L. Görlsdorfer Busch; Waltersdorf an den Quellen Bo. F.

Sonchus asper Vill. L. nicht häufig, nur Fürstlich Drehna; Graben am Mittelteich Bo. F.

S. arvensis L. L. häufig Bo. F. var. *laevipes* Koch. L. Frankendorfer Moor Wa.

Crepis paludosa (L.) Mneh. L. am Gossmar'schen Fliess; östlich von Pelkwitz viel Bo. F.

Hieracium Auricula L. Fi. halbwegs nach Droessigk hin Jachan. Sw. Ackerränder am Wege zwischen dem Bahnhof und dem Wallhaus!! Sp. Moorwiesen bei Schleife (nur 2 Exemplare bemerkt)!! (!)

- A. auf dem neuen Kirchhofe H. K. an den Teichen südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. Torfmoore südlich; Kahnsdorf, an der Lübbener Chaussée (Schwochow); vor Beesdäu (R.) Bo. F. f. *flagellare* Wa. Ausläufer an der Spitze Rosetten bildend und blühende Stengel tragend. L. Weissagk, an Ackerrändern Wa.!
- H. praecaltum* Vill. L. Grabenränder der Kalauer Chaussée Bo. Fresdorf (R.) westlich vom Borchelt und in Grasgärten Bo. F.
- H. pratense* Tausch. L. Poetensteig (Schwochow); bei der Stadt und bei Kahnsdorf zerstreut Bo. F.
- † *H. aurantiacum* L. Sp. Georgenberg, in wenigen Exemplaren Ri.
- H. murorum* L. var. Lbw. am Prestowitzer Stein und auf den Rothsteiner Felsen!! [R. v. Uechtritz schreibt an Red. über diese bemerkenswerte Form: „Vorläufig möchte ich sie doch noch für ein *H. murorum* erklären; die kleineren Köpfe und die spreizende armköpfig verzweigte Inflorescenz, die geringe Drüsigkeit, sowie die an *H. bifidum* erinnernde Beschaffenheit der derberen Blätter bei den kleineren Exemplaren lassen es allerdings von der typischen Form ziemlich verschieden erscheinen.“]
- H. boreale* Fr. Do. Buchwald häufig Wa. A. (Hl.) Neudöbern im Schlossgarten und auf einer Anhöhe in der Rettgensdorfer Forst H. L. Torfmoore südlich viel; Frankendorf Bo. F.; Bornsdorf, Weissagk (R.), Pitschen, Ukro Bo.
- H. tridentatum* Fr. Um Do. und L. gemein Wa.; z. B. zwischen Fürstlich Drehna und Pademagk Bo. F.
- H. umbellatum* L. L. auf dem Bäkedamm; am grossen Graben bei Kahnsdorf viel; Fürstlich Drehna Bo. F. var. *linariifolium* G. F. W. Mey. L. Bornsdorf, am Wege nach Grünswalde, Kahnsdorf Bo.
- Phyteuma spicatum* L. L. südlich von Weissagk (R., Schwochow).
- Campanula rapunculoides* L. L. Frankendorf, Beesdäu Bo.
- C. Trachelium* L. G. Abhänge bei Kostebrau!! Do. in Arenshain!! Sw. in Trebbus!! A. (Hl.) Neudöbern und Schöllnitz H. L. an der Bäke; Wall bei Kahnsdorf; Görlsdorf, Buschwiesen; Waltersdorf; Gehren Bo. F.!
- C. persicifolia* L. L. Weissagk (R.) Bo. M. Wald nördlich von Köbeln am linken Neisseufer!!
- C. glomerata* L. L. Prinzessinnensteig; an der Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf Bo. F.; Chausséeänder nach Ukro hin Scheppig; Graben zwischen Kahnsdorf und der Kalauer Chaussée Bo. F.
- † *Specularia Speculum* L. L. Gärten nördlich verwildert (Radestock) Bo. F.!
- Vaccinium Myrtillus* L. In allen Wäldern zwischen S., Do. und Fi.!! Do. gemein!! Friedersdorfer Wald Petz. Lbw. bei Prestowitz und Rothstein viel!! Sp. Georgenberg H. Schleife v. Schulenburg! Wald südwestlich von Kl.-Düben!! Kromlauer Park As. Teschnitz

Mellen!! L. Wälder auch der westlichen Umgebung Bo. F. F. Wald zwischen Gr.-Jamno und Jethe!!

- V. *uliginosum* L. G. Torfmoor östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Do. Torfmoor rechts vom Wege nach Fischwasser ein grosser Strauch Wa.! Fi. bei der Försterei Jachan!
- V. *Vitis idaea* L. Um S., Do., Fi. und Lauchhammer gemein, stellenweise häufiger als *V. Myrtillus*, spärlicher Lbw. um Prestowitz und Rothstein!! Sp. Schleife v. Schulenburg! Gustk!! Wald südwestlich von Kl.-Düben!! F. zwischen Gr.-Jamno und Jethe!!
- V. *Myrtillus* × *Vitis idaea* (*intermedium* Rthe.) Do. äusserst spärlich auf der Südseite des Weges von Do. nach Deutsch-Sorno, etwa 400 Schritt vor letzterem unter den Eltern!! Fi. zahlreich an einer Stelle am Rande des Grabens, der an der Südwest-Seite des Schneidemühl-Teiches mündet!! Während die Pflanze an den genannten Orten nur steril auftrat und stets mit den Eltern vermischt wuchs, fand sie sich G. bei Lauchhammer am Weg nach Gohra zahlreich und prachtvoll blühend (31. Juli 1885) und oft reine Bestände bildend. Verblühte Exemplare nebst zwei Pflanzen, die völlig reife Früchte (rot mit bläulichem Reif bedeckt) trugen, bemerkte ich ferner G. an der Thonbahn Kostebrau-Zschipkau an mehreren Stellen, sowie spärliche sterile Individuen zwischen Kostebrau und der Sandgrube am Wege nach der Kunschmühle. An allen diesen Orten fand sich die Pflanze stets an Stellen, die entweder durch ihre tiefere Lage reicher an Feuchtigkeit sind als die Umgebung, oder die nach Regengüssen das Wasser länger aufbewahren als der übrige Boden; eigentümlich ist auch ihre Vorliebe, an den Seiten der Wege zu wachsen, was wohl auch auf das Feuchtigkeitsbedürfniss der Pflanze zurückzuführen ist; denn die von Vegetation meist gänzlich entblössten Pfade saugen das Regenwasser bei weitem nicht in dem Masse auf, wie die den Waldboden überziehenden Moose, die den übrigen Gewächsen dadurch ein bedeutendes Quantum Feuchtigkeit entziehen. Wenn ich die Zahl der an den angeführten Orten beobachteten Exemplare addire, so glaube ich nicht zu hoch zu greifen, wenn ich dieselbe auf etwa 8—900 angebe; auch glaube ich, dass sich die Pflanze bei gründlicherer Durchsuchung der an Heidelbeeren so überreichen Wälder, die sich zwischen Dobrilugk, Finsterwalde, Senftenberg und Lauchhammer ausbreiten, noch an vielen Standorten finden wird.
- V. *Oxyccoccus* L. S. Moor südlich der Henska-Mühle und an den Bommelteichen bei Zschipkau!! G. Torfmoor östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Fi. halbwegs nach Droessigk hin, Jachan; Moor am Südwest-Ufer des Schneidemühl-Teiches!! Sp. Schleife,

- Halbendorf!! (!) Kromlauer Park As. L. Torfstiche zwischen Drehna und Pademagk Bo. F.!
- Arctostaphylos Uva ursi* Spr. G. um Kostebrau zahlreich!! (!) L. östlich von Alt-Sorgefeld (R., Schwochow) Bo. F.
- Andromeda Polifolia* L. G. Torfmoor östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Fi. am Mahlens-Teich Jachan. Sw. am Lehmannsteich bei Kl.-Krausnigk; am 25. August 1878 blühend Bloch, As.; auch am 22. Juli 1885 blühend!! Sp. Kromlauer Park Hantscho!
- Erica Tetralix* L. S. zahlreich im Moor südlich der Henska-Mühle bei Zschipkau und an den Bommelteichen daselbst. Sehr viel am Kaupenteich bei Hörlitz und in den Wäldern am Lugkteich bei Dobristroh!! G. einzeln am Waldrande westlich vom Latken-Teich und am Butter-Teich bei Kl.-Leipisch!! Do. Arenshain, im Walde am Wege nach Do. viel mit *Lycopodium inundatum* L.!! (!) Moorige Stellen links am Wege nach Fischwasser einzeln Wa. Ungemein zahlreich im Moor südöstlich von den Plumpteichen!! (!) Wald südwestlich von Täubertsmühle Petz.! Königliche Dobrilugker Forst am Wege nach Deutsch-Sorno sehr einzeln!! Fi. am Graben, der an der Südwest-Seite des Schneidemühl-Teiches mündet; viel am Mahlensteich und am Seeteich bei Gohra!! Sp. Schleife am Fusssteig nach Trebendorf Hantscho, As.; auf allen Mooren von Schleife und Gr.-Düben bis Weisswasser, doch selten zahlreich beisammen!! (!) K. an allen Teichen und moorigen Orten beim Bahnhof Lukaitz!! L. zwischen Fürstlich Drehna einerseits und Beesdau, Wanninchen, Presenchen, Pademagk, Tugam und Gr.-Mehssow andererseits verbreitet Bo. F.
- Ledum palustre* L. S. Moor südlich der Henska-Mühle bei Zschipkau und an den Bommelteichen daselbst und am Kaupenteich bei Hörlitz!! G. Südufer des Naundorfer See; Moor östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Fi. Mahlens-Teich; Wald südöstlich vom Seeteich am Wege nach Gohra!! Sp. zwischen Schleife und dem „grossen Teich“ v. Schulenburg! Kromlauer Park As.; Moor zwischen Kromlau und Halbendorf!! (!)
- Pirola minor* L. Do. Königliche Forst bei Fischwasser Wa. Fi. Nehesdorf am Weg nach Grünhaus Jachan! L. (Borns Dorf R.) in einer Schlucht zwischen Gahroer Pechhütte und Gahro Wa. M. Birkenwald am linken Neisseufer zwischen Köbeln und Gr.-Särchen!! (!)
- P. uniflora* L. L. Krinitz Brandenburger.
- Chimophila umbellata* Nutt. Do. Wald bei Grunow Petz.
- Ramischia secunda* Greke. L. Schlucht zwischen Gahroer Pechhütte und Gahro Wa. M. Birkenwald am linken Neisseufer zwischen Köbeln und Gr.-Särchen!!
- Monotropa Hypopitys* L. G. um Kostebrau zerstreut!! Sp. zwischen

- Klein-Düben und Kromlau!!; zwischen Halbendorf und Kromlau Hantscho!! L. zwischen Neu-Sorgefeld und der Pechhütte; Gehren unweit des Fussessteiges nach Wendisch-Drehna; südöstlich von Fürstlich Drehna Bo. F.
- † *Vinca minor* L. Sp. Georgenberg verwildert H., As.!! Schleife verwildert As. A. Pritzen H.
- Menyanthes trifoliata* L. Do. Friedersdorf Petz. Sp. Schleife Hantscho!, !! L. südlich der Stadt bis Wittmannsdorf in den Torfmooren; Wierigsdorf; Waltersdorf Bo. F.
- Gentiana Pneumonanthe* L. G. Ostrand des Latken-Teiches bei Kl.-Leipisch!! Lbw. nördliches und nordwestliches Ufer des kleinen Teiches bei Maasdorf!! Do. Torfmoor rechts am Wege nach Fischwasser sehr häufig Wa. Wiesen südlich von Friedersdorf Petz.!! Fi. Heidemühle Kerst; bei Oppelhain Jachan. Sp. Schleife Hantscho!, !! K. Siehe; an den Teichen südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! A. Chransdorf H. L. Torfstich zwischen Drehna (R.) und Pademagk, Presenchen, Wiesen am grossen Busch Bo. F.!
- G. Amarella* L. L. (Kahnsdorf R.); Frankendorf Bo.
- Erythraea Centaurium* (L.) Pers. L. Bäkewiesen; Kahnsdorf an der Lübbener Chaussée; Borcheltwiesen bei Fresdorf; östlich von Wanninchen; Langengrassau bei der Ziegelei; Gehren unweit des Teufelssteins Bo. F.
- E. pulchella* Fr. Do. Ausstiche auf dem Weinberge Wa. Feuchte Aecker zwischen Lindena und Friedersdorf und in der Dorfstrasse des letzteren!! (!)
- Cuscuta europaea* L. Do. Kirchhain, auf *Humulus* am Wallgraben Wa. L. Grüne Gasse (*Crataegus*); Giessmannsdorf und Gehren auf *Urtica dioica* L. Bo. F.
- C. Epithymum* Murr. G. am Ostrand des Latken-Teiches bei Kl.-Leipisch, ein Kleefeld völlig überziehend!! (!) Do. Wiesen beim Hammerteiche Wa.; an einem Graben zwischen Friedersdorf und Täuberts-Mühle!! L. nördlich der Stadt (Luzerne); Kahnsdorf (Klee, Luzerne); Frankendorf; Görlsdorf häufig; Fürstlich Drehna, Felder nach Presenchen zu; Wüstemarke (*Sarothamnus*) Bo. F.
- C. Epilinum* Whe. L. an der Berste nördlich der Stadt; Zaakow Bo. F. F. auf Flachs bei Jethe zahlreich!! (!)
- Asperugo procumbens* L. L. (Sandower Vorstadt R.) unweit des Hainweges; Frankendorf am Kirchhof (Schwochow) Bo. F.
- Lappula Myosotis* Mneh. L. Stadtmauer (R.); Bornsdorf östliche Seite des Herrenhofs Bo. F.
- Cynoglossum officinale* L. L. Stadtmauer; Borchelt bei Fresdorf Bo. F.
- Anchusa officinalis* L. L. nur Dorfstrasse in Giessmannsdorf Bo. F.
- Symphytum officinale* L. Sp. Schleife Hantscho. Um L. häufig Bo. F.

- Lithospermum arvense* L. L. blau blühend auf einem Felde unweit der
Chaussée nach Wierigsdorf Bo. F.
- Myosotis caespitosa* Schultz. Lbw. am grossen und kleinen Teich bei
Maasdorf!! Do. Wiesengraben links vom Wege nach Fischwasser
Wa. L. Ukro, Westseite des Bahndamms Bo. F. Gr.-Mehssow Bo.,
var. *laxa* Aschs. L. Laubwald hinter der Drehnaer Ziegelei;
Wiesengebüsche zwischen Borsndorf und Weissagk Bo. F.!
- M. versicolor* (Pers.) Sm. L. Grasplätze nordöstlich von Wittmanns-
dorf; Gehren bei der Schiele-Mühle viel Bo. F.
- † *Nicandra physaloides* Gtn. S. Dobristroh im Lehrgarten!!
- † *Atropa Belladonna* L. Dr. in einem Garten verwildert H.
- Hyoscyamus niger* L. Do. Vorwerk Schulz!! L. Langengrassau
massenhaft Bo. F.
- † *Datura Stramonium* L. Sp. Schleife Hantscho, As. L. besonders nörd-
lich, z. B. Giessmannsdorf; Karche; aber auch Zöllmersdorf,
Fresdorf etc. Bo. F.
- † *Nicotiana rustica* L. L. nordöstlich einzeln verwildert Bo. F.
- Verbascum Thapsus* L. Do. Vorwerk Schulz!! (!)
- V. thapsiforme* Schrad. V. Krieschow H.
- V. Lychnitis* L. Do. Friedersdorf häufig Petz. L. nicht selten, sehr
zahlreich in Zöllmersdorf Bo. F.
- V. nigrum* L. L. Zöllmersdorf; Görlsdorf; Wanninchen Bo. F. fl. albo
Lbw. 1 Exemplar unter vielen gelbblütigen in Maasdorf!!
- V. Blattaria* L. L. (R.) Weissagk, ein Exemplar Bo.
- V. phoeniceum* L. (Grossenhain; Gottesacker zu Oelsnitz 1870
Schulze.)
- Antirrhinum Orontium* L. Do. Aecker am Wege nach Fischwasser Wa.;
in den Teichgärten und auf den Aeckern nach der Buschmühle
hin!! Friedersdorf, fast auf allen Aeckern Petz. F. unter Flachs
bei Jethe häufig!! (!) Fi. Aecker an der Bürgerheide zwischen
der Bahn und dem Kirchhainer Wege Jachan. Sp. Schleife
Hantscho! Kb. (R.) Frauendorf (1 Exemplar)!! (!) L. Karche;
Gehren; Kahnsdorf häufig; Frankendorf Bo. F.
- † *Linaria Cymbalaria* (L.) Mill. L. Stadtmauer vereinzelt (Schwochow)
Bo. F.
- L. Elatine* (L.) Mill. L. Fresdorf; Frankendorf Bo. F.
- L. minor* (L.) Desf. L. Karche; Fresdorf; Frankendorf Bo. F.
- Limosella aquatica* L. Sp. zwischen Halbendorf und Kromlau im Moor
mit *Carex cyperoides* L.!! Kb. an der Spree bei der Kutzenburger
Mühle!! F. am Werwen-Teich bei Kl.-Kölzig!!
- Veronica scutellata* L. Do. Gräben bei Friedersdorf häufig Petz. L.
Torfmoore bei der Stadt; Wittmannsdorf; Fresdorf; Görlsdorf;
Zöllmersdorf; Grosser Teich zwischen Pademagk und Wanninchen
Bo. F.

- V. Anagallis aquatica* L. L. Gräben westlich der Bäke; Gossmar'sches Fliess Bo. F.
- V. Teucrium* L. L. (R.) Gossmar am Kirchhof Sallbach nach Bo.
- V. officinalis* L. G. häufig. Ja. Bei L. selbst sehr einzeln (Prinzessinnensteig); häufig bei Ukro, Langengrassau, Gehren, Wanninchen, Fürstlich Drehna, Bornsdorf Bo. F.
- V. spicata* L. L. Pitschen; Chausséeänder nach Lübben; Tornow; Borchelt Bo. Königsberg bei Gehren; Wälder zwischen Langengrassau und Alt-Sorgefeld häufig Bo. F.
- V. serpyllifolia* L. L. nördlich der Stadt und am Wege nach Kahnsdorf Bo. F.
- V. persica* Poir. L. auf Aeckern nördlich der Chaussée nach Zöllmersdorf Bo.
- V. agrestis* L. A. Rettgensdorf H. L. gemein Bo. F.
- V. opaca* Fr. L. nördlich der Stadt und bei Fresdorf auf lehmigen Aeckern Bo. F.
- Melampyrum arvense* L. L. Aecker zwischen Paserin und Pitschen Bo. Fi. Jachan!
- M. nemorosum* L. G. Abhänge bei Kostebrau!! Do. Buchwald Busch. Sp. vor der Teschnitz Mellen. L. Zöllmersdorf unweit der Chaussée; westlich von Paserin Bo. F.
- M. pratense* L. G. zwischen Gohra und Lauchhammer!! Do. Buchwald häufig Wa.!! Birkbusch!! Sw. östlich vom Wallhaus bei Friedersdorf an der Brücke!! L. fehlt in der Nähe, aber überall bei Langengrassau und Gehren Bo. F.
- Pedicularis silvatica* L. Lbw. Moorbiesen zwischen dem Prestowitzer Stein und den Rothsteiner Felsen!! Do. Moorboden am Wege nach Fischwasser Wa. Moor südöstlich von den Plumpteichen!! Sp. zwischen Schleife und dem „grossen Teich“ v. Schulenburg! überhaupt auf allen Mooren um Schleife, aber sehr vereinzelt!! Fi. gemein Jachan. L. zwischen Zöllmersdorf und Wierigsdorf; östlich von Waltersdorf; Fuchsberg bei Weissagk Bo. F.
- P. palustris* L. Lbw. am grossen und kleinen Teich bei Maasdorf!! Do. Torfsümpfe rechts vom Wege nach Fischwasser Wa. Sw. am Tzschäkerteich!! Sp. Schleife!! L. Torfmoore bei der Stadt, Wittmannsdorf, Gossmar; Bornsdorfer Teiche; zwischen Weissagk und Gahroer Pechhütte Bo. F. F. am See bei Gr.-Jamno!!
- Alectorolophus major* Rehb. var. *angustifolius* Fr. Do. Torfmoor rechts am Wege nach Fischwasser Wa.!
- A. minor* (Ehrh.) Wimm. et Grab. L. Fresdorf; Langengrassau Bo. F.
- Mentha aquatica* L. var. *sativa* L. L. Gossmar'sches Fliess Bo. F.
- * *Origanum Majorana* L. Bei Lübbenau in grossem Maassstabe gebaut; der Bedarf zur Wurstfabrikation wird für einen grossen

- Teil Deutschlands von hier versehen (National-Zeitung vom 10. März 1886 Beilage.)
- Calamintha Acinus* (L.) Clairv. (Das † vor dieser Art Abh. XXI S. 128 zu streichen.) L. Kahnsdorf am Wall und an der Kalauer Chaussée viel Bo. F.
- C. Clinopodium* Spenn. G. Abhänge bei Kostebrau!! L. Kahnsdorf am Wall Bo. F.
- † *Salvia verticillata* L. L. Ukro an der Chaussée vor dem Gasthofe am Bahnhof Bo.
- † *Nepeta Cataria* L. Sp. Schleife, Trebendorf Hantscho. L. Promenade; Gärten Bo. F.
- Lamium maculatum* L. L. Gehren (Schwochow) Bo. F.
- L. Galeobdolon* (L.) Crtz. L. Ukro; Waltersdorf (R.) Bo. F.
- Galeopsis Ladanum* L. Lbw. Aecker am Prestowitzer Stein und am Südrand der Rothsteiner Felsen!! Do. Friedersdorf Petz. Eisenbahndamm beim Bahnhofe!! L. Zöllmersdorf; Ukro; Langengrassau; Fürstlich Drehna Bo. F.
- G. pubescens* Bess. G. Aecker am Westrand des Latken-Teiches bei Kl.-Leipisch!! Do. Friedersdorf Petz.! Kb. Burg As. L. (R.) Gärten und Hecken der südlichen Promenade; Fresdorf; Görldorf Bo. F.
- Stachys silvatica* L. Do. Buchwald!! Sp. Park von Kromlau Ri., As. Kb. Müschen, As. A. Rettgensdorfer Busch, Kaseler Tannenbusch, Ogrosen H. L. schattige Gärten, z. B. Logengarten; zwischen Ukro und Pitschen am Bahndamm; Görldorf (Gebüsch hinter dem Teich) Bo. F.
- S. arvensis* L. Do. Sandäcker hinter dem Friedersdorfer Pfarrgarten Petz. Kb. Frauendorf!! (!)
- S. Betonica* Benth. G. neben einer Dornhecke am Steige über den Mühlgraben (Masers Garten) Ja. L. zwischen der Stadt und Pelkwitz am Fussessteig westlich der Bäke; Waldwiesen am Mittelteich bei Fürstlich Drehna Bo. F. Sonnige Höhen bei Weissagk Wa.
- Marrubium vulgare* L. L. Kahnsdorf; Giessmannsdorf Bo. F.
- Scutellaria galericulata* L. S. Moor südlich der Henska-Mühle bei Zschipkau!! Do. Friedersdorf Petz. Sp. Schleife Hantscho; südwestlich von Kl.-Düben in einem Moor!! (!) Kb. Burg Magnus (weiss blühend.) L. häufig, nächster Standort am Gossmar'schen Fliess Bo. F.
- S. minor* L. G. in der Nähe des Moderteiches Ja.!
- Brunella grandiflora* Jacq. A. (Hl.) Chransdorfer Kalkberge H. L. westlicher Theil des Drehnaer Weinbergs (R.) Bo. F.!
- Ajuga reptans* L. L. häufig, z. B. Wittmannsdorf Bo. F.
- A. genevensis* L. L. nicht selten; bei Zöllmersdorf viel Bo. F.

- Teucrium Scordium* L. Do. Gräben nördlich von Friedersdorf am Wege nach Lindena!! (!) A. Peitzendorf H. L. häufig (R.), nächster Standort: Graben vor dem Hain; Karche; Zaakow; Frankendorf; Görldorf; Garrenchen; Hinterbusch (Schwochow) Bo.F.
- Verbena officinalis* L. Sw. in Trebbus!! L. Promenade Bo.F.
- Pinguicula vulgaris* L. Do. Torfwiesen bei Friedersdorf Petz. Fi. halbwegs nach Droessigk hin Jachan; hinter Gröbitz am Wege nach Breitenau Jachan; bei Gohra auf Wiesen bei den Kohlengruben Kerst. A. Torfstich bei Rettgensdorf (Hl.) H. L. Wiesen zwischen Bornsdorf (R.). Weissägk und Bergen Bo.F.
- Utricularia vulgaris* L. Kb. in einem Teich südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. (R.) Torfwiesen zwischen der Stadt, Wittmannsdorf und Gossmar beiderseits des Fliessess Bo.F. Torfmoor bei Frankendorf Bo., Scheppig, Wa. F. Dorfteich bei Jocksdorf!!
- U. intermedia* Hayne. Fi. am Ableitungsgraben auf den städtischen Torfwiesen Jachan! Sp. Gräben der Wolschina-Wiesen zwischen Gr.-Düben und Halbendorf, mit *Pilularia*!! (!)
- U. minor* L. Sp. Teichränder bei Trattendorf Ri. Gräben der Wolschina-Wiesen mit voriger!! (!) L. Torfmoor bei Frankendorf (hier nicht blühend) Bo. Fürstlich Drehna im Sandteiche, von Scheppig blühend gefunden.
- Lysimachia thyrsiflora* L. L. Torfmoor westlich vom Gossmar'schen Fliess viel Bo.F.
- L. vulgaris* L. Sw. östlich vom Wallhaus bei Friedersdorf!! Sp. Kromlauer Park As. Kb. zwischen Burg und Lehde As. L. häufig, nächster Standort am Prinzessinnensteig Bo.F.
- † *L. punctata* L. L. in Gärten verwildert Schwochow.
- Trientalis europaea* L. Fi. Eichgarten bei Gohra Kerst!
- Centunculus minimus* L. S. am Kaupenteich bei Hörlitz!! (!) G. Aecker um Kl.-Leipisch und Neu-Boekwitz nicht selten!! Do. Aecker zwischen Lindena und Friedersdorf!! L. Waltersdorf Scheppig, Wierigsdorf, Paserin (R.) Bo., auf Aeckern nach der Ernte überall Wa.
- Primula officinalis* (L.) Jacq. L. Zöllmersdorf (R.), Westseite in Grasgärten häufig (Tschiersch) Bo.F.
- Hottonia palustris* L. Do. Wiesengräben bei Friedersdorf Petz. Sp. im Hauptgraben zwischen Gr.-Düben und Halbendorf!! L. Gräben gemein, namentlich im Torfmoor südlich Bo.F.
- Glaux maritima* L. L. (zwischen Kalmsdorf und Frankendorf R.) Auf Salztriften links an der Kalauer Chaussée häufig Wa.! Bo., Scheppig.
- Plantago major* L. var. *nana* Tratt. L. Pitschen Bo.
- P. media* L. L. nicht selten; nächste Standorte Prinzessinnensteig und Chaussée nach Wittmannsdorf Bo.F.

- P. ramosa* (Gil.) Aschs. L. zwischen Wierigsdorf und Giessmannsdorf, sandige Trift westlich der Chaussée Bo. F.
- Litorea uniflora* (L.) Aschs. Fi. am Mahlensteich (Südufer) spärlich!! Lbw. nördliches und nordwestliches Ufer des kleinen Teiches bei Maasdorf viel!! S. in ungeheurer Menge an den Bommelteichen bei Zschipkau und am Kaupenteich bei Hörlitz!! (!)
- Albersia Blitum* Kth. Do. Gärten; in Ahrenshain!! L. (Schwochow) Bo. F.
- † *Amarantus panniculatus* L. L. Karche im Felde; zwischen der Stadt und dem Borchelt Bo. F.!
- A. retroflexus* L. L. Karche im Felde; Dorfstrasse in Zaakow; Felder zwischen der Stadt und dem Borchelt; Kalauer Vorstadt und Aecker südlich Bo. F.!
- Polycnemum arvense* L. Do. zwischen Lindena und Friedersdorf Petz. L. (R.) Aecker bei der Windmühle vor der Stadt an der Finsterwalder Chaussée Wa. Aecker bei Zaakow (nördlich sehr viel); Karche; Wierigsdorf; Paserin Bo. F.
- Chenopodium polyspermum* L. G. Schulgarten Ja. Fi. Gärten in der Stadt Jachan. L. (R.) Gärten, z. B. Logengarten; Schützentich (Schwochow); auf Composthaufen am Gossmar'schen Fliess Bo. F.!
- C. Vulvaria* L. Do. an Gartenzäunen in der Stadt Wa.
- C. hybridum* L. S. Gr.-Räschen!! G. in Lauchhammer, Kl.-Leipisch und Kostebrau!! L. häufig; nächster Standort am Gossmar'schen Fliesswege Bo. F.
- C. Bonus Henricus* L. L. nicht selten, z. B. am Gossmar'schen Fliesswege; Zöllmersdorf; Beesdau; Fresdorf Bo. F.
- C. glaucum* L. G. in Lauchhammer!!
- Rumex maritimus* L. L. an der Badeanstalt (Schwochow); Kahnsdorf, Gräben an der Kalauer Chaussée; Görlsdorfer Busch Bo. F. var. *paluster* Sm. G. Latken-Teich bei Kl.-Leipisch!! L. Kahnsdorf; Thongruben bei der Stadt Bo.
- R. Hydrolapathum* Huds. L. nicht selten, z. B. am Fliess nach Gossmar Bo. F.
- [„*R. aquaticus* L. L. Fresdorf, Graben in der Nähe des Borchelt“ Bo. F. ist zu streichen. Red.]
- Polygonum Bistorta* L. G. quellige Abhänge bei Kostebrau!! Sp. Schleife Hantscho, As. L. Gärten (Räusch); Grasgärten in Wierigsdorf (Schwochow) Bo. F.
- P. amphibium* L. L. gemein. f. *natans* Mnch. Grenzgraben zwischen Viehweide und Gärten Bo. F.
- † *P. orientale* L. L. Schutthaufen am Gossmar'schen Fliess Bo. F.
- P. lapathifolium* Ait. L. z. B. Ukro und Langengrassau Bo. F. var. *incanum* Koch. Fi. Mahlensteich Ja.
- P. minus* Huds. G. „Alte Höfe“ Ja. Fi. Mahlensteich Ja.

- P. dumetorum* L. Do. Friedersdorf Petz.! L. Hecken der Promenaden (Schwochow) Bo. F.
- Fagopyrum tataricum* (L.) Gtn. Lbw. viel unter Buchweizen bei Prestowitz!! (!) Do. Aecker nach der Buschmühle hin mit *F. esculentum*!! A. (Hl.) Reddern unter Buchweizen ziemlich häufig Petz.
- Thesium ebracteatum* Hayne. L. lichte Waldstellen der Höllenberge (Auerbalz R.) und hinter Gehren Bo. F.
- † *Aristolochia Clematitis* L. L. (R.) Hecken der Promenaden, z. B. am Schlossberg Bo. F.
- Euphorbia Cyparissias* L. A. (Hl.) Neudöbern im Schlossgarten H. L. nicht häufig, nächster Standort Chaussée nach Wittmannsdorf Bo. F.
- E. exigua* L. A zwischen der Ziegelei und Peitzendorf (Hl.) H. L. östlich auf Aeckern; Frankendorf; Fresdorf Bo. F.
- † *E. Lathyris* L. Sp. Schleife, bei einem Backofen!! (!)
- Mercurialis perennis* L. A. Rettgensdorfer Busch, nur an einer Stelle, aber daselbst in Menge (Hl.) H. L. Ukro, Busch nach Pitschen zu (R.) Bo.
- Parietaria officinalis* L. a) *erecta* (M. et K.) Sw. Schlosshof (Hl. Jachan.
- Ulmus campestris* L. var. *suberosa* Ehrh. A. Neudöbern im hintern Teile des Schlossgartens wild H. Lübbenau bei Gr.-Beuchow verbreitet Bo.
- † *Alnus incana* (L.) DC. L. (R.) an der Berste (Schwochow) Bo. F.
- Salix pentandra* L. L. Torfbruch bei Beesdau Wa.
- S. pentandra* × *fragilis* L. an Gräben unmittelbar bei der Stadt und am Ufer des Gossmar'schen Fliesses Wa.
- S. fragilis* × *alba* L. an Gräben unmittelbar bei der Stadt Wa.
- S. amygdalina* L. L. häufig Bo. F., z. B. am Ufer des Gossmar'schen Fliesses Wa.
- S. viminalis* L. L. am Ufer des Gossmar'schen Fliesses Wa.; zwischen Stadt und Hain Bo. F.
- S. aurita* L. Sp. Schleife v. Schulenburg! L. häufig, z. B. hinter Riedebeck Bo. F.
- † *S. nigricans* Fr. L. z. B. Beesdau Bo. F.
- S. repens* L. Do. Friedersdorf Petz. L. häufig Wa.; nächster Standort Fresdorf am Borchelt Bo. F.
- S. aurita* × *repens* (*ambigua* Ehrh.) Do. Moorboden bei Fischwasser unter den Eltern Wa.!
- S. viminalis* × *Caprea lanceolata* Fr.) L. häufig an Gräben gepflanzt Wa.
- * *Populus balsamifera* L. Sp. Bahnhof ♂ As. L. Kahnsdorf am Wall (Schwochow) Bo. F.
- Myrica Gale* L. L. Torfmoor bei Trebbinchen und Bergen (R.) Bo. F.
- † *Elodea canadensis* Rich. Lbw. in der Kleinen Elster bei Maasdorf!!

- As. Do. im Fliess bei Lindena!! Kb. zwischen Lehde und Burg Kurtz, Kuhn; Burg v. Schulenburg!
- Stratiotes aloides* L. Lbw. Gemeinloch bei Theissa!! Do. Hammer-teich bei der Hammermühle!! Sw. Gräben des Walles zwischen dem Tzschäker- und Thürmen-Teich!! L. Torfsümpfe bei der Stadt und Wittmannsdorf Bo. F.
- Hydrocharis Morsus ranae* L. Lbw. im Grossen und Kleinen Teich bei Maasdorf!! Do. Gräben der Teichgärten!! Sw. bei der Brücke östlich vom Wallhaus unweit Friedersdorf!! Sp. Hauptgraben zwischen Gr.-Düben und Halbendorf!! Kb. zwischen Burg und Lehde, As. L. Gräben, Schützenteich; Wasserlöcher der Torfinoore bei der Stadt, Wittmannsdorf; Gossmar; Fresdorf; Frankendorf; Kahnsdorf, Görlsdorf Bo. F.
- Elisma natans* (L.) Buchenau. S. Kaupenteich bei Hörlitz zahlreich (f. *terrestris*)!! G. Moorgraben östlich vom Eisenwerk Lauchhammer viel!! Lbw. in den Goldfischeichen am Grossen Teich bei Maasdorf!! Fi. im Graben, der an der Südwest-Seite des Schneidemühl-Teiches mündet!!
- Sagittaria sagittifolia* L. Lbw. im Grossen und Kleinen Teich bei Maasdorf!! Do. Plumpteiche!! Bei Täuberts-Mühle in den Sümpfen der Rade Petz. A. Muckwar (Hl.) Casel H. L. Berste und ihre Zuflüsse, sowie Torfmoore südlich bis Beesdau Bo. F.
- Triglochin palustris* L. Fi. Seeteich bei Gohra!! Sp. auf der Wiese hinter dem Schlosse H. K. an mehreren Teichen südöstlich von Bahnhof Lukaitz!! L. sehr verbreitet, nächster Standort am Gossmar'schen Fliess; sehr viel in Hinterbusch am Fussessteig nach Beesdau; Kahnsdorf; Egsdorf; Frankendorf; Langengrassau Bo. F.
- Scheuchzeria palustris* L. A. Neudöbern im Torfstich H.
- Butomus umbellatus* L. Do. an der Kleinen Elster!!; in Gräben bei Kirehhain zahlreich Wa. Lübbenau in der Spree H. Dagegen um L. fehlend Wa.
- Potamogeton polygonifolius* Pourr. Fi. Gräben im städtischen Torfstich und im Flossgraben in der Grünhauser Forst A. Schultz.
- P. alpinus* Balb. Sp. Schleife, im Graben auf Hantscho's Grundstück!! (!) A. in Torfgräben am schwarzen Damm (Hl.) H. L. in der Berste häufig Bo. Scheppig Wa.
- P. lucens* L. Lbw. in der Kleinen Elster bei Maasdorf!! Kb. zwischen Burg und Lehde As. L. grosser Graben von Fresdorf über Kahnsdorf, Zaakow bis zur Berste Bo. F.
- P. gramineus* L. F. Schigarrenteich bei Tschacksdorf!!
- P. crispus* L. A. in Torfgräben am schwarzen Damm H. L. z. B. Stadtgraben Bo. F.
- P. acutifolius* Lk. L. (R.) in den Gräben um die Stadt häufig Bo.; Thongruben Wa.!

- P. obtusifolius* M.K. (Pickel R.) wie vorige.
- P. mucronatus* Schrad. Lbw. in der Kl. Elster bei Maasdorf!! (!)
L. Buschgraben bei Pelkwitz ? Bo.F.
- P. pusillus* L. Fi. Wassergraben am „Langen Damm“ A.Schultz.
L. Paserin; Pelkwitz Bo.F.
- Zannichellia palustris* L. A. in Teichen (Hl.) H. L. (R.) Tümpel der
Salztriften links von der Kalauer Chaussée Wa.!
- Lemna polyrrhiza* L. L. nicht selten Bo.F.
- L. trisulca* L. L. häufig Bo.F.
- Typha latifolia* L. Do. Hammerteich, Kuchenteich, Jägerteich, beim
Vorwerk Schulz!! Lbw. am Grossen und Kleinen Teich bei Maas-
dorf!! K. in den Teichen südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!!
L. nicht selten Bo.F. F. Schigarrenteich bei Tschacksdorf!!
- T. angustifolia* L. Do. spärlich im Hammerteich!!
- Sparganium simplex* Huds. Do. Hammerteich!! Fi. bei der Brücke
am Schneidemühl-Teich!! Sw. am Tzschäker-Teich beim Wall-
haus!! K. Teiche südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! F. Schneide-
mühl-Teich bei Gr.-Kölzig!! G. Grenzgraben Ja. L. Torfmoore
viel; Kahnsdorf; Görlsdorf; Paserin etc. Bo.F.
- S. minimum* Fr. L. westlich vom Gossmar'schen Fliess in Menge Bo.!
- Calla palustris* L. G. Südufer des Naundorfer Sees!! Do. Frieders-
dorf, versumpfte Gräben am Walde und linkes Ufer der Flösse
hinter Täuberts-Mühle Petz. Sp. in einem Graben zwischen Schleife
und Kl.-Düben Hantscho!! A. und Neudöbern häufig (Hl.) H.
K. Erlenbruch am Bahnhof Lukaitz!! L. am Gossmar'schen Fliess;
westlich von Wierigsdorf viel; Pelkwitz (Schwochow); Langen-
grassau (R.) am Fuss der Höllenberge; Waltersdorf (Schwochow) Bo.F.
Weissagk in Erlenbrüchen Bo. Scheppig. Wa.
- Acorus Calamus* L. Lbw. in der kleinen Elster bei Maasdorf!! Do. im
Hammerteich Wa. Friedersdorf Petz. Sp. zwischen Schleife und
Rohne Hantscho. A. im Salzteich in Menge (Hl.) H. L. Borns-
dorfer und Weissagker Teiche Bo.F.
- Orchis coriophora* L. L. Bäckewiesen zwischen Zöllmersdorf und Wie-
rigsdorf viel; Wiesen bei Paserin am Bahndamm (Pitschen R.);
Görlsdorfer Buschwiesen (R.) Bo.F.
- O. Morio* L. Fi. hinter Gröbitz auf Wiesen Jachan. L. zwischen der
Stadt und Fresdorf am Dammweg; zwischen Beesdau und Bergen;
Paserin Bo.F.
- O. incarnata* L. L. Hinterbusch westlich von Görlsdorf; Fresdorf beim
Borchelt; Frankendorfer Moor südlich und südöstlich von Kahns-
dorf sehr viel; Bornsdorf Bo.F.
- O. maculata* L. Do. Torfmoore am Wege nach Fischwasser Wa.
Fi. häufig Jachan! Sp. Moore östlich von Schleife, auch weiss-

- blühend!! L. beiderseits am Gossmar'schen Fliess (Wittmannsdorf R.); Wanninchen (R.); Bornsdorf; Langengrassau Bo.F.
- Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. Fi. Wiesen hinter Gröbitz Jachan! L. zwischen Zöllmersdorf, Wierigsdorf und Pelkwitz auf allen Wiesen; Paserin; Ukro (R.); Langengrassau (R.); Fresdorf (R.) zwischen Damm und Borchelt Bo.F.
- Platanthera bifolia* (L.) Rchb. G. Eichwald zwischen Gohra und Lauchhammer!! (!) Sp. Moore östlich von Schleife spärlich!! (!) L. Ukro, Berge links von der Dahmer Chaussée Wa. Langengrassau an der Sumpfschenke und am Fusse der Höllenberge; Wanninchen (R.); zwischen Frankendorf und Drehna; Drehnaer Weinberg Bo.F.
- Epipactis latifolia* All. G. „Alte Höfe“ Ja. Do. Buchwald!! (!) Birkbusch (1 Exemplar)!!
- E. palustris* Crtz. Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser häufig Wa. K. einzeln im Moor am Wege vom Bahnhof Lukaitz nach den nordwestlich gelegenen Teichen!! L. („sehr häufig“ R.) Pitschen im Hain am Bahndamm Bo.F.; Wittmannsdorf, Moorwiese westlich der Chaussée nach Finsterwalde Schwochow.
- Neottia ovata* (L.) Bl. et Fing. L. Golzig, Rasenplatz vor dem Schiessstande Bo.F.; Busch bei Pickel (Ukro R.) Bo. Wa. Langengrassau Gebüsche hinter der Ziegelscheune Bo.F.; Waltersdorf Bo.
- † *Crocus vernus* Wulf. L. Wiesen südlich der Stadt Bo.F.
- Iris pseudacorus* L. L. häufig; nächster Standort vor dem Hain Bo.F.
- I. sibirica* L. L. Pitschen (Hl.) Bo.
- † *Leucoium vernum* L. L. (Pelkwitz R.) Gärten der Stadt und in Sandow (Schwochow) Bo.F.
- L. aestivum** L. Elsterwerda: Auf einer Wiese zwischen dem alten Turnplatz und der Elster (unweit des Seminars) Schulze, 16. Mai 1869. Paul Rahn, 16. Mai 1881. Vgl. Sitzungsber. 1881 S. 44.
- Paris quadrifolia* L. A. Rettgensdorfer Busch (Hl.) H. L. Ukro; Langengrassau (R.); Fürstlich Drehna Bo.F.
- Polygonatum multiflorum* (L.) All. L. Ukroer Busch Bo.F.
- Convallaria majalis* L. L. Golzig, Gebüsch unweit des Schiessstandes nicht blühend Bo.F.
- Majanthemum bifolium* (L.) Schmidt. G. Eichwald zwischen Gohra und Lauchhammer; Abhänge bei Kostebrau!! Do. Buchwald!! Sw. an der Brücke östlich vom Wallhaus bei Friedersdorf!! Sp. in wenigen Exemplaren an einem Graben in Schleife!! K. Wald nordwestlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. Prinzessinnensteig, Ukroer Busch Bo.F.
- † *Tulipa silvestris* L. L. (Prinzessinnensteig R.) Grasplätze nördlich der Stadt (Gadegast); Paserin (R.) im Pfarrgarten (G. Holla) Bo.F.
- Gagea pratensis* (Pers.) Schult. L. Prinzessinnensteig; Karche; Gossmar; Zöllmersdorf Bo.F.

- G. arvensis* (Pers.) Schult. L. häufig, z. B. Grüne Weg Bo.F.
G. silvatica (Pers.) Loud. L. Bornsdorf an der Berste Bo.
 † *Muscari racemosum* (L.) Med. Sp. Schleife, Kirchhof Hantscho, As.
Ornithogalum umbellatum L. A. (Hl.) Schlossgarten H. L. zwischen
 Kahnsdorf (R.) und Zaakow (Schwochow); Fresdorf (R.) Felder
 am Borchelt Bo.F.
Allium fallax Schult. Sp. Abhang des Georgenberges (Jänicke) H.
A. vineale L. L. Kahnsdorf Bo.F. var. *compactum* Thuill. L. Kirch-
 hof Bo.
A. oleraceum L. L. Kahnsdorf, Ackerraine an der Egsdorfer Grenze;
 Drehnaer Weinberg Bo.F.
Anthericus Liliago L. L. Gehren Philipp.
A. ramosus L. L. Heide nördlich von Alt-Sorgefeld (Höllenberg R.);
 Königsberg bei Gehren; Weinberg bei Fürstlich Drehna Bo.F.
Colchicum autumnale L. Sp. Superintendentur-Garten H. Gr.-Düben
 (nach Amtmann Röder) Hantscho.
Tofieldia calyculata Whlbg. L. Drehna, Wiesen südlich vom Sandteich
 (zwischen Bergen, Stiebsdorf und Wannichen R.) Bo.F.!
Juncus glaucus Ehrh. L. häufig Bo.
J. effusus × *glaucus* (*diffusus* Hppe.) L. Wittmannsdorf, Tümpel
 westlich von der Finsterwalder Chaussée Wa.!
J. filiformis L. S. am Pissnitzgraben östlich vom Kaupenteich bei
 Hörlitz; südlich von Gr.-Räschen an der Chaussée!! G. am Naun-
 dorfer See; Latkenteich bei Kl.-Leipisch!! Lbw. am grossen und
 kleinen Teich bei Maasdorf; Moorwiesen zwischen dem Presto-
 witzer Stein und den Rothsteiner Felsen!! As. Do. Sumpfwiesen
 zwischen Lindena und Friedersdorf und südlich von Frieders-
 dorf!! (!) Fi. Bahnausstich bei der Försterei A. Schultz. Sp. Schleife!!
 Kb. an der Spree zwischen der Kutzenburger Mühle und Frauen-
 dorf!! (!) L. (R.) Torfwiesen bei Fresdorf (Radestock) Bo.F.!
 F. an der Chaussée bei Nossdorf; Werwen-Teich bei Gr.-Kölzig!!
J. squarrosus L. S. Kaupenteich bei Hörlitz!! Lbw. Westrand des
 Waldes zwischen Prestowitz und der Kleinen Elster!! Do. Frie-
 dersdorf am Waldrande Petz. Fi. häufig Jachan! Sp. Schleife
 häufig; Halbendorf; an der Eisenbahn zwischen Schleife und
 Weisswasser an geeigneten Stellen zahlreich!! (!) K. an den
 Teichen südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. zwischen Gross-
 Mehssow und Tugam; Gr. Teich bei Pademagk Bo.F.
J. compressus Jacq. L. Triften der sog. Viehweide; am Gossmar'schen
 Fliess Bo.F.
J. Tenageia Ehrh. S. Kaupenteich bei Hörlitz!! (!) Fi. am Schneide-
 mühl-Teich!! (!)
J. capitatus Weig. Do. Aecker zwischen Lindena und Friedersdorf!! (!)

- Kb. an der Spree bei der Kutzenburger Mühle!! (!) L. Bornsdorf, Aecker am Grossen Teich Bo.F. F. an der Chaussée bei Nossdorf!!
- J. supinus* Mnch. S. Bommelteiche bei Zschipkau und Kaupenteich bei Hörlitz!! G. am Butterteich bei Kl.-Leipisch!! Lbw. am Grossen und Kleinen Teich bei Maasdorf!! Do. Torfwiesen bei Friedersdorf Petz. Sw. am Tzschäker-Teich beim Wallhaus!! Sp. in allen Moorgräben zwischen Schleife, Gr.-Düben und Halbendorf!! L. Gossmar'sches Fliess; Ukro am Bahndamm Bo.F. var. *uliginosus* (Roth). L. Fürstlich Drehna: Graben im Gehölz vor Pademagk; zwischen Drehna und Wanninchen im Quellgraben bei den Torfstichen Bo.F. var. *fluitans* Lmk. Fi. im Graben, der an der Süd-West-Seite des Schneidemühl-Teiches mündet!! L. Graben am Nordufer des Sandteiches Bo.
- J. alpinus* Vill. Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser Wa. L. Sand-Teich am Ufer gegen Kl.-Mehssow Bo.F.
- J. silvaticus* Reich. L. Bornsdorf an den Teichen Bo.F.
- Luzula pilosa* (L.) W. A. (Hl.) und Umgegend sehr häufig H. L. Alt-Sorgefeld; Wanninchen Bo.F.
- L. campestris* (L.) D.C. b) *multiflora* (Lej.) L. hinter dem Schützenhause Bo.F.
- Cyperus flavescens* L. A. (Hl.) Teiche an der Senftenberger Chaussée; Schafteich bei Ogrosen H.
- C. fuscus* L. Sw. am Tzschäker-Teich beim Wallhaus!! (!) A. mit vorriger H. K. an einem Teich südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. Langengrassau Hutung am Fuss der Höllenberge Bo.F. Gross-Mehssow an Tümpeln im Dorfe Wa.
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl. S. sehr häufig an den Bommelteichen bei Zschipkau!! G. Moor östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Elsterwerda; Lbw.; (Falkenberg) Oertel in Irmischia 1881 S. 37. Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser Wa. Fi. Schneidemühl- und Mahlens-Teich; Seeteich bei Gohra!! Sw. Moor im Walde südlich von Lehmanns-Teich am Wege nach Trebbus mit *Osmunda*!! (!) Sp. Schleife; Gr.-Düben; Halbendorf; zahlreich an der Eisenbahn zwischen Schleife und Neu-Trebendorf!! (!) K. Erlbruch am Bahnhof Lukaitz!! L. Langengrassau am Fuss der Höllenberge (Grönland); (auf dem ganzen Sumpfe zwischen Bergen, Wanninchen und Drehna bis Bornsdorf und Trebbinchen R.) Torfbruch zwischen Beesdau und Stiebsdorf Scheppegg!; zwischen Wanninchen und Stiebsdorf; Grosser Teich bei Pademagk; Moore und Teiche zwischen Pademagk, Presenchen und Drehna Bo.F.
- R. fusca* (L.) R. et S. S. zahlreich an den Bommelteichen bei Zschipkau!! (!) Fi. am Mahlens-Teich!! Sp. zwischen Schleife und Gross-Düben überall; sehr zahlreich an der Eisenbahn von Schleife bis Weisswasser!! (!) K. an den Teichen südöstlich vom Bahnhof

- Lukaitz!! L. Grosser Teich bei Drehna; trockner Teich bei Pre-
senchen Bo. F. Sw. östliches Ufer des Tzschäker-Teiches!! (!) F.
zahlreich am Südrande des Schigarrenteiches bei Tschacksdorf!! (!)
- Cladium Mariscus* (L.) R.Br. L. Frankendorf im östlich der Chaussée
gelegenen Teile des Moores Bo. F.! Wa.
- Scirpus ovatus* Rth. L. Fürstlich Drehna am Pappelteich Scheppig.
var. *Heuseri* Uechtr. S. zahlreich am Kaupenteich bei Hörlitz!! (!)
Fi. Mahlensteich 1874 Ja. Sw. Tzschäker-Teich beim Wallhaus!! (!)
K. an einem Teich südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! (!)
- S. multicaulis* Sm. S. zu Tausenden an den Bommelteichen bei Hör-
litz!! (!)
- S. pauciflorus* Lightf. L. (Viehweide R.) Salztriften links an der Ka-
lauer Chaussée; Torfmoor bei Weissagk unweit Pechhütte Wa.!
- S. acicularis* L. S. Bommelteiche bei Zshipkau und Kaupenteich bei
Hörlitz!! G. Südufer des Naundorfer Sees!! Lbw. am Grossen
und Kleinen Teich bei Maasdorf!! Do. Graben nördlich von Fried-
dersdorf mit *Pilularia*!! K. an den Teichen südöstlich vom Bahn-
hof Lukaitz!! L. Gräben und Torfmoore westlich vom Gossmar-
schen Fliess; Kahnsdorf, Gräben an der Lübbener Chaussée Bo. F.
var. *fluitans*. Sp. im Hauptgraben zwischen Gr.-Düben und Hal-
bendorf mit mehr als 0,3 m langen Halmen flutend!! (!)
- S. fluitans* L. in einem fliessenden Graben zwischen Bahnhof und
Stadt Elsterwerda Oertel. *Irmischia* 1881. S. 37.
- S. setaceus* L. Lbw. feuchte Aecker am Prestowitzer Stein!! Do. am
Tümpel zwischen Buchwald und Vorwerk Forst!! (!) Fi. bei
Massen Jachan; Schneidemühl-Teich bei der Brücke!! K. Teiche
südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! F. Werwen-Teich bei Gross-
Kölzig!!
- S. Tabernaemontani* Gm. L. Kahnsdorf (R.), Pfuhl der Hutung; Fran-
kendorf, Gräben am Moor; Tümpel der salzhaltigen Viehtriften
links an der Kalauer Chaussée Wa.
- S. maritimus* L. L. in der Bäke zwischen Zöllmersdorf und Wierigs-
dorf Bo. F.; an Tümpeln der Salztriften links an der Kalauer
Chaussée Wa.; Teiche westlich von Fürstlich Drehna Bo. F. var.
compactus (Hoffm.) (Kahnsdorf R.) Gräben am Frankendorfer
Moor Bo. F.
- S. silvaticus* L. Do. zwischen Vorwerk und dem Buchwalde am Wege;
Küchenteich; Graben hinter der Plumpmühle!! Kb. an der Spree
zwischen der Kutzenburger Mühle und Frauendorf!! (!) L. z. B.
am Gossmarschen Fliess; Görlsdorf am Teich; Fürstlich Drehna
am Ziegelteich Bo. F. M. zahlreich am linken Neisseufer zwischen
Köbeln und Gr.-Särehen!! (!)
- S. compressus* (L.) Pers. Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser Wa.
L. Triften bei Kahnsdorf nach Frankendorf zu Bo. F.

- Eriophorum vaginatum* L. G. Moor östlich vom Eisenwerk Lauchhammer!! Fi. Mahlensteich Jachan. L. in allen Torfmooren zwischen Bornsdorf, Beesdau, Wanninchen, Pademagk und Pressenchen einer- und Fürstlich Drehna andererseits Bo.F.
- E. latifolium* Hoppe. Do. Tümpel südlich an der Chaussée nach Hengersdorf!! L. Waldsümpfe am Sandteich (Schwochow); Bornsdorf Bo.F.
- Carex dioeca* L. Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser Wa.! Sp. Schleife!! (!)
- C. pulicaris* L. Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser viel Wa.! Fi. Waldrand bei Massen nördlich der Bahn Jachan! K. Moor am Eisenbahnübergang bei Station Lukaitz!! (!) L. Triften am Bornsdorfer Grossen Teich häufig (R.) Wa.
- C. cyperoides* L. Sp. in einem Moor zwischen Kromlau und Halbindorf viel!! (!) K. Seeser Teiche Siehe.
- C. disticha* Huds. Zerstreut, z. B. vor Zaakow; Grenzgraben nach Fresdorf; Gossmar'sches Fliess Bo.F.
- C. arenaria* L. Lbw. zwischen Prestowitz und dem Teichhause!! L. fehlt in der Nähe der Stadt; Sandhügel hinter Gehren Bo.F.
- C. brizoides* L. Sw. Wald am Wege von Lehmanns Teich nach Trebbus!! (!) Kb. Branitzer Park Jachan!
- C. vulpina* L. L. nächster Standort Gräben nördlich der Stadt Bo.F.
- C. muricata* L. L. gemein; nächster Standort am östlichen Weg nach dem Hain Bo.F. var. *nemorosa* Lumn. Do. Buchwald!! (!)
- C. panniculata* L. L. Torfmoore bei Fresdorf; Paserin viel; Bornsdorf; Weissagk; Bergen; Fürstlich Drehna hinter dem Sandteich Bo.F.
- C. leporina* L. L. häufig, z. B. vor Pelkwitz; Kahnsdorf; Frankendorf; Fresdorf, im Hinterbusch am Fussessteig nach Beesdau ganze Flächen überziehend; Beesdau; Trebbinchen; Bornsdorf Bo.F.
- C. echinata* Murr. Do. im Schweinebusch!! Sp. Schleife!! L. Langengrassau am Fuss der Höllenberge; Wanninchen bei der Mühle; Fürstlich Drehna; in der Guste und hinter dem Sandteich Bo.F.
- C. elongata* L. Do. Wald am Jägerteich!! K. Erlenbruch am Bahnhof Lukaitz!! L. Golzig am Park; Pelkwitz im Busch; Weissagk hinter dem Fuchsteich Bo.F. Fürstlich Drehnaer Heide Bo.!
- C. canescens* L. L. östlich von Pelkwitz; Langengrassau; Waltersdorf Bo.F.
- C. remota* L. Do. Buchwald; im Schweinebusch beim Gesundbrunnen!! K. Erlenbruch nordwestlich vom Bahnhof Lukaitz!! L. östlich von Paserin viel; Waltersdorf und Gehren an den Mühlgräben; Fuchsteich bei Weissagk; zwischen Görlsdorf und Wanninchen hinter dem Teich; Wanninchen bei der Mühle; Fürstlich Drehna südwestlich Bo.F.
- C. stricta* Good. L. Schützteich; Fresdorfer Fliess Bo.F.

- C. Goodenoughii* Gay b) *juncella* Fr. 2. *chlorostachya* Rehb. L. nördlich der Stadt; Chaussée nach Kalau vor der Ziegelei; Fresdorfer Fliess; Graben zwischen dem Borchelt und Fresdorf Bo.F.
- C. pululifera* L. L. westlicher Abhang der Thongruben; Langengrassau; zwischen Beesdau und Stiebsdorf; Fuchsteich bei Weissagk Bo.F.
- C. tomentosa* L. L. (R.) Grenzgraben zwischen Kahnsdorf und Frankendorf hinter der Ziegelei Bo.F.!
- C. montana* L. L. Bergabhänge bei Gehren Bo.
- C. ericetorum* Poll. L. Schanze Bo.F.
- C. verna* Vill. Sp. Georgenberg As.
- C. limosa* L. Sp. um Schleife und Halbendorf auf den Mooren häufig!!
- C. flacca* Schreb. L. häufig, Prinzessinnensteig; Kahnsdorf-Egsdorfer Grenze; zwischen Zöllmersdorf und Langengrassau Bo.F. *var. erythrostachys* Hoppe. L. Ziegelei an der Kalauer Chaussée Wa.!
- C. pallescens* L. Do. Birkbusch!! L. Pelkwitz, Busch; zwischen Langengrassau und Kemnitz in den Höllenbergen; Weissagk hinter dem Fuchsteich; Busch zwischen Drehna und Pademagk; hinter dem Sandteich; Gahroer Heide Bo.F.!
- C. digitata* L. M. Wald am linken Neisseufer nördlich von Köbeln!! (!)
- C. distans* L. L. Bäke westlich von Zöllmersdorf; Kahnsdorf, Grabenränder östlich stellenweise fast 1 m hoch; Frankendorf auf dem Wege durchs Moor; zwischen Görlsdorf und Wanninchen hinter dem Teich Bo.F.
- C. fulva* Good. (*Hornschuchiana* Hppe.) Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser häufig Wa.!
- C. fulva* × *flava* (*fulva* Hppe.) Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser unter den Eltern Wa.! L. Drehna, Graben hinter dem Sandteich Bo.F. (?)
- C. flava* L. a) *vulgaris* Doell. L. Langengrassau am Fuss der Höllenberge; Busch zwischen Drehna und Pademagk Bo.F.!: südlich am Sandteich Bo.F.; Gr.-Mehssow im Tannenbusch Bo. Scheppig Wa. K. Teiche südöstlich vom Bahnhof Lukaitz!! b) *lepidocarpa* Tausch. L. zwischen der Stadt und Beesdau; Kahnsdorf; Frankendorfer Moor, zwischen Langengrassau und Kemnitz in Waldstümpfen; zwischen Drehna und Pademagk; Tannenteich bei Gr.-Mehssow Wa.! Waldstümpfe hinter Wanninchen Bo.F. c) *Oederi* Ehrh. S. Bommelteiche bei Zschipkau und Kaupenteich bei Hörlitz!! Lbw. am Grossen und Kleinen Teich bei Maasdorf!! Do. Torfmoor am Wege nach Fischwasser Wa. Fi. am Schneidemühl-Teich, Mahlens-Teich und Seeteich bei Gohra!! Sw. östliches Ufer des Tzschäker-Teiches!! Sp. Schleife!! K. an den Teichen südöstlich von Station Lukaitz!! L. Torfsümpfe südlich; Frankendorfer Moor; Görlsdorfer Busch Bo.F.
- C. silvatica* Huds. L. (R.) Gahro; Weissagk Bo.

- C. Pseudocyperus* L. L. Torfmoore südlich, namentlich an der Gossmarschen Grenze bis Fresdorf, hier oft mit in der Mitte weiblichem Endährchen; östlich von Paserin viel Bo.F. M. Dorfteich in Gr.-Särchen!! (!)
- C. rostrata* With. G. Südufer des Naundorfer Sees!! L. Ukro; Paserin; Fürstlich Drehna Bo.F.
- C. vesicaria* L. Do. Jägerteich!! L. zwischen Gossmar, Waltersdorf und Gehren gemein Bo.F.
- C. acutiformis* Ehrh. L. südlich nicht selten, z. B. an der Gossmarschen Grenze Bo.F.
- C. riparia* Curt. L. Gossmar'sches Fliess und Grenze; Mittel- und Hinterbusch; Poetensteig; Graben an der sog. Burg Bo.F.
- C. filiformis* L. L. (R.) nächster Standort zwischen der Stadt und Fresdorf, halbwegs zum Borchelt; im grossen Graben vom Borchelt zum Hinterbusch häufig; südöstlich von Kahnsdorf Bo.F.
- C. hirta* L. b) *hirtiformis* (Pers.) L. Tümpel der Salztriften an der Kalauer Chaussée Wa.!
- Oryza clandestina* A.Br. S. am Graben zwischen dem Moor südlich der Henska-Mühle und dem kleinen Bommelteich bei Zschipkan (1885 spärlich mit entwickelter Rispe); am Nordufer des grossen Bommelteiches; am Pissnitzgraben östlich vom Kaupenteich bei Hörlitz!! G. Graben an der Südostseite des Naundorfer Sees!! Lbw. am rechten Ufer der Kleinen Elster bei Prestowitz spärlich; Gräben zwischen Prestowitz und dem Teichhause (1885 entwickelt); Moorgräben zwischen dem Prestowitzer Stein und den Rothsteiner Felsen!! Do. viel am Wege zwischen Vorwerk Forst und dem Buchwalde (1885 entwickelt); Gräben zwischen der Stadt und dem Buchwalde (1885 entwickelt; südöstlich von Friedersdorf nach Täuberts-Mühle hin an einem Graben!! (!) Fi. im Graben, der an der Südwest-Seite des Schneidemühl-Teiches mündet!! L. Schützenteich (1881 entwickelt); Graben südwestlich davon (Schwochow) Bo.F.;
- † *Phalaris canariensis* L. L. auf Schutt am Gossmar'schen Fliess Bo.F.
- † *Anthoxanthum Puelii* Lecq. et Lam. Sp.Ri.
- Panicum verticillatum* L. L. Gärten innerhalb des Stadtgrabens Bo.F.!
- P. glaucum* L. Sp. Schleife Hantscho. L. Aecker am Fliesswege nach Fresdorf; Kahnsdorf nördlich vom Altenauer Fusssteige viel; ebenso südlich von Falkenberg Bo.F.
- Milium effusum* L. Do. Buchwald, Birkbusch!! L. (R.) Erlenbruch bei Pickel Wa. Tiergarten bei Weissagk Bo.
- Nardus stricta* L. Do. Waldrand bei Friedersdorf Petz Fi. häufig Jachan. Sp. von Schleife (v. Schulenburg, As.) bis Weisswasser überall!! Kb. zwischen Gallinchen und der Kutzenburger Mühle; Frauendorf!! L. Langengrassau; zwischen Gossmar und Riede-

- beck Bo.F. M. Köbeln; Gr.-Särchen!! Tr. zwischen der Stadt und Kemnitz; Bukoka!!
- Phleum Boehmeri* Wib. L. zwischen der Stadt und Zaakow (Schwochow); Zöllmersdorf unweit der Chaussée; vor Pelkwitz; Drehnaer Weinberg Bo.F.
- Alopecurus geniculatus* L. A. (Hl.) in Gräben nach Neudöbern H. L nächster Standort Grabenränder vor dem Hain Bo.F.
- A. fulvus* Sm. A. (Hl.) mit voriger H.
- Calamagrostis lanceolata* Rth. Do. Schweinebusch!! (!)
- C. epigea* (L.) Rth. Sp. Schleife, Teichdamm As. L. (R.) Görlsdorf südlich und südwestlich vom Teich viel; Heide bei Fürstlich Drehna; in der Guste und am Weinberg Bo.F.!
- Holcus mollis* L. A. Raine nach Neudöbern hin; Neudöbern'scher Schlossgarten (Hl.) H. K. Erlenbruch am Bahnhof Lukaitz!! L. nördlich von Zaakow; an und im Busch vor Pelkwitz; zwischen Pelkwitz und Zöllmersdorf; westlich von Langengrassau; Fürstlich Drehna am Wege nach Gr.-Mehsow Bo.F.
- Avena strigosa* Schreb. L. zwischen Wüstemarke und Waltersdorf unter Hafer (Grönland) Bo.F.
- A. fatua* L. L. häufig auf Aeckern Bo.F.
- A. pubescens* L. L. Müllerback und Prinzessinnensteig; Kahnsdorf am Wall; zwischen L. und Fresdorf viel Bo.F.
- Trisetum flavescens* (L.) P.B. L. Prinzessinnensteig; um Riechs Vorwerk; Poetensteig; Kahnsdorf am Wall (Schwochow) Bo.F.
- Aera caryophyllaea* L. L. Höllenberge bei Langengrassau Bo.F.
- A. praecoax* L. Fi. an der Chaussée nach Münchhausen Jachan. Sp. Schleife, auf dem alten Kirchhofe!! (!) L. häufig in der Falkenberger und Kemlitzer Heide Bo.F.
- A. flexuosa* L. G. Grünwalder Forst vielfach!! Do. Königliche Forst!! Sw. Wald südlich vom Lehmanns-Teich am Wege nach Trebbus!! L. Höllenberge viel; Rochauer Heide; Wüstemarke; zwischen Görlsdorf und Wanninchen (Schwochow) Bo.F.
- Sieglingia decumbens* (L.) Bernh. G. am Wege von Gohra bis zur Schlackenbrücke bei Lauchhammer!! Sw. mit voriger!! L. Kahnsdorf an der Lübbener Chaussée; Fürstlich Drehna; Langengrassau in den Höllenbergen (R.); Wüstemarke an der Chaussée Bo.F.
- Molinia coerulea* (L.) Mnch. Do. Friedersdorf Petz. Sp. Schleife v. Schulenburg! A. und Neudöbern zerstreut (Hl.) H. L. Fresdorfer Fliess; Fürstlich Drehna, namentlich an der Guste Bo.F. var. *arundinacea* Schrk. Gebüsch am Fresdorfer Fliess Bo.F.
- Melica nutans* L. L. (Langengrassau R.); Drehna am grossen Teich bis Wanninchen; Busch zwischen Drehna und Pademagk; am Mittelteich zwischen Drehna und Krinitz Bo.F.!

- Poa bulbosa* L. var. *crispa* Thuill. L. Nordseite der Promenade; Thongruben; Bornsdorf; zwischen Trebbinchen und Bergen Bo.F.
- P. palustris* L. L. (Fließwiesen R.); Hainwiesen; Kahnsdorf südlich bis zur Ziegelei Bo.F.
- P. compressa* L. L. auf Lehm (R.) an trocknen Wegrändern Bo.F.
- Glyceria plicata* Fr. L. an allen Gräben und Tümpeln ebenso häufig wie *G. fluitans* (L.) R.Br. Wa.
- G. aquatica* (L.) Whlbg. Do. Friedersdorf, Gräben Petz. A. (Hl.) im Teiche links von der Senftenberger Chaussée H. L. Stadtgraben, Schützenhaus; Gossmar'sches Fließ Bo.F.
- Festuca arundinacea* Schreb. L. Kalauer Chaussée Bo. Von Kahnsdorf bis Fürstlich Drehna nicht selten Bo. Pitschen; Pickel Bo.F.
- F. gigantea* (L.) Vill. Do. Buchwald!! L. Hain; in allen Laubwäldungen am Fusse des Höhenzuges von Ukro bis Waltersdorf und Gehren; Fresdorf Bo.F.
- F. distans* (L.) Kth. L. (R.) Promenadenwege östlich der Stadt Wa.
- F. sciuroides* Rth. L. Wüstemarker Schlucht (R.) Bo.F.; Langengrassau, Waltersdorf, Wittmannsdorf, Frankendorf, Görlsdorf Bo. Scheppig.
- Bromus racemosus* L. L. (Zöllmersdorf R.) nördlich der Stadt und bei Kirche Bo.F.
- B. arvensis* L. L. (R.) Gehren auf der Höhe bei Leberecht's Ziegelei Bo.F.
- B. sterilis* L. L. Stadtmauer; an der Chaussée nach Wittmannsdorf Bo. F.
- B. tectorum* L. L. z. B. Schanze Bo. F.
- Brachypodium pinnatum* (L.) P.B. L. (Waltersdorf R.) Stiebsdorf, Weg nach Bornsdorf Bo.F.! Weissagk (Schwochow) Bo.F.
- B. silvaticum* (Huds.) P.B. L. Busch zwischen Drehna und Pademagk Bo. F.! (Weissagk R.) Gehren unweit der Bergschenke (Schwochow) Bo. F. In Erlenbrüchen am Fusse des Höhenzuges hinter Langengrassau und Ukro Bo.; Busch bei Pickel Wa.
- Triticum caninum* L. M. linkes Neisseufer, am Waldrande nördlich von Köbeln!! (!)
- † *Lolium multiflorum* Lmk. L. Wiesen am Gossmar'schen Fließ; Görlsdorf unter Klee gesät und verwildert Bo.F.
- L. remotum* Schrk. L. unter Flachs als Unkraut Wa. Bo.
- Picea excelsa* (Lmk.) Lk. Sp. Schleife in der Gustk!! In der Königlich-grünewalder und Dobrilugker Forst nicht selten, ebenso K. nordwestlich vom Bahnhof Lukaitz!! A. den Bestand des Chransdorfer „Tannenbusches“ (Hl., As.) bildend, auch Neudöbern, Reddern, Lipten, Bronkow, Lugk etc. vereinzelt H.
- Juniperus communis* L. in allen Wäldern um Lauchhammer. Do. und Fi. nicht selten!! Sp. Schleife v. Schulenburg! L. Ziekau; Borns-

dorf Bo. F.; Fürstlich Drehna zwischen Sandteich und Gr.-Mehssov in Prachtexemplaren Bo., Scheppig, Wa.

Taxus baccata L. G. in Kostebrau in einem Gragarten ein prachtvoller, circa 40 Fuss hoher Baum, zweifellos wild!! Do. in Ahrenshain und Eichholz (nicht Eichhorst) je 1 grosses Exemplar teste Busch. Vgl. Wiebecke bei Jacobasch in Abhandl. 1884 S. 64.

Pilularia globulifera L. S. viel an den Bommelteichen bei Zschipkau und am Kaupenteich bei Hörlitz; in einem Torfloch zwischen Dobristroh und dem Lugk-Teich!! Lbw. am Grossen Teich bei Maasdorf!! (!) Do. Gräben nördlich von Friedersdorf und südöstlich nach Täuberts-Mühle hin!! (!) an der alten Flösse in der Rade unweit Täuberts-Mühle Petz. (Vgl. Sitzungsber. 1880 S. 88.) Sp. in einem Graben nordöstlich von Schleife; zahlreich in den Gräben der Wolschina-Wiesen zwischen Gr.-Düben und Halbendorf!! (!) K. Moor am Bahnübergang bei Station Lukaitz in einem Wasserloch!! L. (Pitschen R.) Pappelteich bei Fürstlich Drehna Scheppig.

Lycopodium annotinum L. A. Chransdorfer Forst H.

L. clavatum L. Do. Wald bei Grunow Petz. Sp. Moor zwischen Kromlau und Halbendorf!! (!)

L. inundatum L. Do. Moore bei Fischwasser und Ausstiche auf dem Weinberge Wa.!.; dicht bei Ahrenshain am Wege nach Do.!! (!) Fi. Mahlensteich; bei der Försterei A. Schultz. Sp. (R.) zwischen Schleife und dem „grossen Teich“ v. Schulenburg! überhaupt an geeigneten Stellen um Schleife häufig!! (!) zwischen Kromlau und Halbendorf mit voriger!! K. (Werchow R.) Moore bei Station Lukaitz viel!! L. (R.) Weissagk auf Moorboden bei Pechhütte Wa. F. an der Chaussée bei Nossdorf!!

Equisetum arvense L. c) *nemorosum* A. Br. M. linkes Neisseufer, im Wald nördlich von Köbeln!! (!)

E. silvaticum L. G. Quellgraben Ja. Do. Königliche Forst gemein Wa.; vor dem Buchwald und an Gräben südöstlich von Friedersdorf nach Täuberts-Mühle hin!! (!) Waldrand bei Täuberts-Mühle Petz. L. Gross-Mehssov Tannenbusch viel; Waltersdorfer Kalkgruben Bo.!

E. Heleocharis Ehrh. L. häufig, z. B. Thongruben Bo. F.

Ophioglossum vulgatum L. A. Neudöbern auf dem Laas sehr einzeln (Hl.) H. L. (Falkenberg R.) Wittmannsdorf, auf einer quelligen, hochgelegenen Wiese vor der Stadt westlich von der Finsterwalder Chaussée Wa.!

Botrychium Lunaria (L.) Sw. A. (Hl.) Muckwar auf einem Raine H. L. (R.) Ukro unweit der *Moenchia* (Gabriel) Bo. F.

Osmunda regalis L. Lbw. Theissa am Weg nach Hohen-Leipisch rechts im Walde in der Nähe des Grenzgrabens sehr einzeln!! Do. Sümpfe

- an den Ufern der Flösse hinter Täuberts-Mühle Petz. Sw. Wald südlich vom Lehmannsteich am Weg nach Trebbus!! (!) A. Buchwäldchen, am Fuss der Freiberge (Hl.) H. K. Werchow H. L. Wanninchener Mühle (R) mit var. *interrupta* Milde Bo. F.! Drehna, südlich und südöstlich häufig, z. B. Guste (Schwochow), Scharfrichterei, Ziegelei, Försterei im Laubwald Bo. F.
- Polypodium vulgare* L. Lbw. Rothsteiner Felsen!! A. Muckwar H.
- Pteris aquilina* L. var. *lanuginosa* Hook. L. auf sonnigen Bergen bei Ukro; zwischen Gross-Mehssow und Drehna; überhaupt nicht selten Wa.
- Blechnum Spicant* With. Lbw. Theissa, im Grenzgraben am Wege nach Hohen-Leipisch!! G. an der Schlackenbrücke zwischen Gohra und Lauchhammer!! Do. am Gesundbrunnen und anderen quelligen Orten im Schweinebusch Wa.!! (!) Friedersdorf an der Rade Petz. Fi. zahlreich am Graben, der an der Südwestseite des Schneidemühl-Teiches mündet!! Sp. Pastorbrunnen bei Neu-Trebendorf Hantscho!! As. A. Buchwäldchen, am Fuss der Freiberge (Hl.) H. K. (Werchow R.) sehr einzeln nordwestlich von Station Lukaitz unter den Fichten!! L. Rochauer Heide (R.) nördlich der Chaussée nach Schlieben; Wanninchen (R.) bei der Mühle; Drehna, besonders Guste (Schwochow) Bo. F.
- Asplenium Trichomanes* L. G. an der Schlackenbrücke zwischen Gohra und Lauchhammer Kerst. A. Muckwar, am Steiufer des Mühlengrabens H.
- A. *Ruta muraria* L. Do. Kirchhofsmauer und an den Umfassungsmauern des Schlosses Wa. !! (!) L. Stadtmauer (Schwochow) Bo. F.
- A. *Filix femina* Bernh. A. (Hl.) Rettgensdorfer und Chransdorfer Busch; Neudöbern im Schlossgarten H. L. Langengrassau Bo. F.
- Phegopteris Dryopteris* (L.) Fée. L. (R.) Wanninchen, Kiefernwald an dem Grossen Teich bei Drehna Bo. F.!
- P. *polypodioides* Fée. K. Erlenbruch bei Station Lukaitz viel!! (!) L. Weissagk, in einem Erlenbruch häufig (R.) Bo., Schwochow, Wa.!
- Aspidium montanum* (Vogl.) Aschs. L. zwischen Drehna und Babben, Weissagk Gahroer Buchheide (R.) Wa.!
- A. *Filix mas* (L.) Sw. A. im Punix hinter dem Weinberge (Hl.) H. L. Langengrassau in den Höllenbergen; Wanninchen bei der Mühle Bo. F.
- A. *cristatum* (L.) Sw. Sp. Moor zwischen Kromlau und Halbendorf!! (!)
- A. *spinulosum* (Retz.) Sm. I. Höllenberge bei Langengrassau Bo. F.
- Fissidens adiantoides* (L.) Hedw. Fi. Bahnausstiche bei Massen Jachan!
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Taubert Paul Hermann Wilhelm

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der Nieder-Lausitz. II. 128-176](#)