

Die wichtigeren bis zum Juni 1862 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets.

Von

Dr. P. Ascherson.

N. f. B., N. f. M. bedeutet: Neu für die Flora von Berlin, Magdeburg, n der vom Verfasser in seiner Flora der Provinz Brandenburg 2 und 3 Abtheilung angenommenen Begrenzung.

Clematis recta L. Barby: Busch bei Breitenhagen Rother.

Thalictrum minus L. Strausberg: Am Westufer des Lattsees!! (var. b. *silvaticum* Koch als Art). Guben: Kaltenborner Berge mit der var. *silvaticum* Thalheim!!

T. angustifolium Jacq. Barby: Klein-Rosenburg bei der Scheidlache; Breitenhagener Busch Rother! Züllichau: Krummendorf diesseit des Damms; jenseitiges Oderufer bei Tschicherzig Hagedorn! Schwiebus: Mühlbock Golenz! Sorau: Ob. Ullersdorf Starke!

Hepatica triloba Gil. wurde mit gefüllter Blüthe 1859 Librose beim alten Schloss im Stockshof von Frl. Kathe beobachtet. (Busch).

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. Krossen: Bindower Schulzenheide zw. Bindow und Leitersdorf; weisse Berge zwischen Bindow und Deutsch-Nettkow; herrschaftliche Kietztannen zwischen Leitersdorf und der Federmühle Heiland. Guben: Kaltenborner Berge Gallee 1861 (früher von Benkert gefunden aber lange vermisst.)

P. patens (L.) Mill. Trebbin: Bürgerheide Apr. 1862 Lackowitz! Durch die Bestätigung dieses früher nur auf sehr unsicheren Angaben beruhenden Standortes wird die Westgrenze dieser Art für unser Gebiet eine beträchtliche Strecke vorgerückt.

P. vulgaris Mill. Magdeburg: Schnarsleber und Engelsberge; Frohsesche Berge einzeln; Kiefern hinter Gerwisch Schneider.

Anemone silvestris L. Strausberg: Blumenthal bei der Leuenberger Ziegelhütte einzeln Schweinfurth!! Müncheberg: Hinterheide Reichert.

A. nemorosa L. b). *purpurea* J. E. Gray. Brandenburg Neumühle Schramm. Templin: Am Ufer des Lübboseses beim Teufelsgarten F. Peck! Nauen: Bredower Forst Lackowitz. Stadtforst in den Hahnbergen häufig!! Biesenthal: Park von Lanke!! wahrscheinlich allgemein durch das Gebiet verbreitet.

- † *Adonis auctumnalis* L. Arnswalde: Im Rektorgarten unter Mohrrüben Warnstorf!
- A. aestivalis* L. Schönebeck: Fuss der Mühlinger Berge Heuser (Oestr. bot. Wochenblatt 1862 No. 2. S. 38 ff.) Magdeburg: Ziepel Wohlfahrt! Landsberg: Zwischen Hopfenbruch und der Goldbeck Gentz! Driesen: Vorbruch Weise. b.) *citrinus* Hoffm. (als Art). Schwedt: Neue Mühle bei Vierraden am linken Welseufer Seehaus!
- Ranunculus fluitans* Lmk. (Muskau: Neisse Weise).
- R. lanuginosus* L. Koswig: Alte Kirche im Schlesen Preussing. Neuhaldensleben: Hagen; Zernitz M. Schulze! Schwiebus: Johannisthal Golenz! Arnswalde: Klücken; (Sandow) Warnstorf!
- R. polyanthemus* L. Nauen: Chausseegraben aach Wernitz 1862 Grantzow!
- Trollius europaeus* L. Wrietzen: Zw. Prötzel und Prädikow Hermann. Liebenau: Neudörfler Wiesen; Starpeler Neumühle 1862 Golenz. Lagow; Petersdorf Bohna.
- † *Helleborus viridis* L. Triebel: Jocksdorf Nicolai. Gärten von Tzschacksdorf Weiss. Wrietzen: Park von Möglin F. Reinhardt.
- Nigella arvensis* L. Bernburg: Zwischen Lattorf und Pobzig Schneider. Zwischen Beelitz und Elsholz P. Hinneberg!
- Aquilegia vulgaris* L. Spandau: Schulzendorf 1862 Bolle. Lychen: Weggenbusch am Abhang nach dem Wurlsee beim Burgwall F. Peck! Strausberg: Convallarienberg Frau Roellig! Küstrin: Erlicht bei Warnicke Stenzel¹⁾. Charlottenburg: Dem Schlossgarten gegenüber auf dem rechten Spreeufer 9. April 1862 Bolle. Neustadt-Eberswalde: Karutz Kasner. Arnswalde: Petermanns Wiese; Judenberg Warnstorf!
- † *Delphinium Ajacis* L. Bernburg: Aecker vor Lattorf Schneider.
- Actaea spicata* L. Strausberg: Blumenthal am Westufer des Lattsees Schweinfurth!! (bereits von Willdenow in einer handschriftl. Bemerkung in seinem Handexpl. des Prodrromus im Blumenthal angegeben.) Schwiebus: Johannisthal; Raubschloss in der Stadtfurst einzeln Golenz! Liebenau: Flusswerder im Packlitzsee 1862 Golenz.
- Berberis vulgaris* L. Frankfurt: Zw. Treplin und Petershagen 1862 Bolle. (Muskau: An der Wosna wild Weise.)

1) Die in den Verhandlungen, 1. Heft aus der Flora Küstrins von H. Schulze II mitgetheilten Standorte sind nach einem mir von Dr. Stenzel, jetzt in Breslau, mitgetheilten Verzeichnisse fast alle schon von demselben 1855 und 1856 beobachtet worden.

- Papaver hybridum* L. Stassfurt: Rathmannsdorf Hornung (Bot. Zeitung 1861. No. 19.)
- † *P. somniferum* L. c.) **setigerum** D. C. (als Art.) Königs-Wusterhausen: Unter Roggen zwischen Prieros und dem Kolberg Bolle. (Vgl. S. 167 ff.) N. f. B.
- Corydallis cava* (L.) Schw. und K. Oschersleben: Amtsgarten in Schemke Schneider. Züllichau: Grasgarten der Schwiebuser Strasse Hagedorn!
- C. intermedia* (L.) Mérat. Arnswalde: Rietzig; (Schönwerdersche Ziegelei) schon 1859 Warnstorf! Liebenau: Quellmühle Hagedorn, A. Müller!
- C. pumila* (Host) Rehb. Frankfurt: An der Berliner Chaussee Gallus. Küstrin: Reitwein besonders am Wallberg und im Nachtigallengrund; Park von Klessin Gallus und O. Reinhardt! schon früher daselbst von Stenzel beobachtet.
- Fumaria Vaillantii* Loisl. Barby: Lödderitz Schneider. Magdeburg: Aecker vor dem Ulrichsthor Rother. (ob noch jetzt?) Zwischen Langenweddingen und Egelu Schneider. Oschersleben: Hakeborn Schneider. Güsten; Kalkberge bei Bernburg Schneider.
- F. parviflora* Lmk. Magdeburg: Aecker b. Olvenstedt Schneider!
- Nasturtium amphibium* × *silvestre*. Guben: Auf einer Sandbank am rechten Neissenfer oberhalb der Eisenbahnbrücke!!
- Barbarea stricta* Andrzej. Brandenburg: Görigräben Schramm. An einem Sumpf am linken Spreeufer unterhalb Köpnick Kasner! Berlin: Treptow nach dem Eierhäuschen hin 1862 Reymann!
- Cardamine impatiens* L. Potsdam: Römerschanze 1862 Bolle! Kobus: Spreewald unweit der Eichschenke Lehmann! Berlin: Thiergarten beim Jägerhäuschen W. Müller!! und beim Monument Friedrich Wilhelms III Lackowitz!! Es kann kaum angenommen werden, dass diese bei Berlin bisher noch nicht beobachtete Art (der nächste Standort auf dem Hasselwerder bei Tegel) früher übersehen sein sollte; obwohl auch kaum eine Vermuthung sich aufstellen lässt wie und woher sie eingeschleppt sein kann. Triebel: Kemnitzer Mühlengraben Weise.
- C. hirsuta* L. a.) *multicaulis* Hoppe (als Art). Potsdam: Zwischen Templin und Kaput Bolle. Templin: Kirchenheide an einer abgeholzten Stelle F. Peck! Joachimsthal: Schorfheide Ilse.
- C. pratensis* L. c. *uniflora* Sternb. und Hoppe. Berlin: Wuhlewiesen bei Eiche 1862 Jahn! Thiergarten Lackowitz!
- Dentaria bulbifera* L. Templin: Gänselake im städtischen Forstrevier Stempnitz F. Peck!

- † *Erucastrum Pollichii* Schimp. und Spenn. Oschersleben: Hakeborn an der Warte Torges! Berlin: Pankow 1860 Jahn!
- † *E. obtusangulum* (Schleich.) Rehb. Müncheberg: Behlendorf unter Luzerne Höfft!
- † *Diplotaxis muralis* (L.) D. C. Gr. Wanzleben Schneider. Südlich von Kroppenstedt Deicke. Frankfurt: Beim Bahnhofe Jahn!
- Alyssum montanum* L. Küstrin: Podelzig beim Bahnhof Jahn.
- Thlaspi alpestre* L. Barby: Wald südlich von Breitenhagen Rother! N. f. M.
- Lepidium campestre* (L.) R. Br. Berlin: Hohen-Schönhausen 1862 Jahn! Prenzlau: Am Tanger hinter Lübbenow Seel!
- † *Isatis tinctoria* L. wurde im vorigen Jahre mit fremder Saat eingeschleppt bei Magdeburg unweit der Frohseschen Berge unter Luzerne von Rother! am Chausseegraben hinter Buckau, und zwischen Dodendorf und Welsleben unter Esparsette von Banse und Schneider; bei Oschersleben 1862 von Schneider, in der Nähe der Westgrenze ebenfalls unter Esparsette vor dem Huy unweit des Paulskopfes von Banse und Torges gefunden. N. f. M.
- Rapistrum perenne* (L.) All. Südlich von Kroppenstedt Deicke. Egel: Hakeborn Schneider.
- Viola persicifolia* Schreb. a.) *stagnina* Kit (als Art.) Barby: Friedrikenberg Rother!
- Reseda lutea* L. Kalbe a. S.: Wartenberge Rother! Treuenbrietzen: Budorfsche Hufen Pauckert! wahrscheinlich mit fremder Saat verschleppt. Berlin: Weissensee 1860 Jahn! Chaussee nach Tegel 1862 Schneider. Buckow 11. Jun. 1862 F. Reinhardt!!
- R. luteola* L. (Dessau: In Mosigkau Fick.) Berlin: Lustgarten Lackowitz (verschleppt)!! Seelow: Worin auf Aeckern Höfft.
- Drosera anglica* Huds. Spandau: Pechsee im Grunewald Bolle! Templin: Schäferwiese und langer Bruch im Mokrin; Ahrens-dorfer Bruch F. Peck! Strausberg: Nordwestlich vom Bauersee bei Wilkendorf; nördlich vom Kesselsee Schweinfurth! Schwiebus: Galinenluch; Blankenseer grosse Luch; Läsger Wanzen-luche; am Liebger See; an der Mühlbock bei Schönfeld sparsam Golenz! Frankfurt: Georgenthal 1862 Graf Solms!! Müncheberg Faule Seeluch 1862 v. Uechtritz!! Oderberg: Plage-Fenn Ilse.
- D. rotundifolia* × *anglica*. Spandau: Pechsee Bolle! Berlin: v. Schlechtendal! (Vgl. S. 110.); jenseit Waltersdorf Rach! Strausberg: Nordwestlich vom Bauersee bei Wilkendorf Schweinfurth! N. f. B.
- D. intermedia* Hayne. Spandau: Pechsee Bolle! Beelitz: Gr. Röhthsee bei Elsholz Krumbholz! Lübben: Dolgener See Fick.

- (nicht *D. anglica* Huds., wie in der Flora der Provinz Brandenburg I. Abthl. S. 75. angegeben ist.) Liberose: Kotbuser und Teufelslaug Busch! Storkow: In einem kleinen Sumpf am Fusse des Kolbergs Bolle! (Muskau: An der Wosna Weise.) Arnswalde: An einem kleinen See an der Strasse nach Schönwerder Warnstorf! (Hertzsch's Angabe, dass sie bei dem nahen Nörenberg vorkomme, kann ich jetzt um so weniger bezweifeln, als sie auch von Doms bei Bütow! gefunden ist.)
- Polygala comosa* Schk. b.) *poecilantha* Bl. Mittenwalde: Wiese zwischen Gr. Kienitz und Glasow; jenseit Glasow im Chausseegraben Bolle.
- P. amara* L. Schwiebus: Am Liebger und Czernoksee; Wanzenluch in der Stadtforst; Läsger Wiesen westlich am Eichberge Golenz! Krossen: Krämersborner Kalkteich Golenz!
- Gypsophila fastigiata* L. Köpnick: An der Eisenbahn nach Friedrichshagen hin Baltzer. Berlin: Granatenberge Liebe. Schwiebus: Schäferberg bei Blankensee Golenz!
- † *Dianthus barbatus* L. Potsdam: Pfaueninsel!! Petzower Park Bolle. Nauen: Bredower Forst in der Nähe der Eisenbahn A. Barnewitz! Berlin: Schönhauser Park Winkler I.
- D. Armeria* L. Barby: Grüneberger Forst zwischen Lödderitz und dem Diebziger Busch Schneider. Magdeburg: Kiefernwald zw. Pöthen und Vehlitz; Leitzkauer Schlossgarten Schneider. Burg: Vor dem Zerbster Thor sparsam Deicke. Küstrin: Zw. Tucheband und Hathenow Jahn. Schwedt: Neuemühle Seehaus. Brüssow Krumbholz.
- D. caesius* Sm. Krossen: Krämersborner Mittel- und grosse Heide am Fusssteig zwischen der Neuen Mühle und Sawische Golenz!
- D. arenarius* L. Züllichau: Links vom Wege nach Radewitsch Hagedorn! Krossen: Kähler Forst östlich bei Murzig; zwischen Goskar und Rädnitz; zwischen Leitersdorf und Deutsch-Nettkow Golenz!
- D. Carthianorum** × *arenarius* (Vgl. S. 24 ff.) Driesen: Heide hinter Kolonie Eschbruch und Modderwiese; (nach Zirke hin) Lasch!
- Saponaria officinalis* L. Züllichau: Unterweinberge bei Tschicherzig Hagedorn. Krossen: Zwischen Rädnitz und Krämersborn Golenz.
- Vaccaria segetalis* (Neck.) Gke. Nördlich von Kroppenstedt Deicke. Nauen: Wernitz am Wege nach Knoblauch unter Roggen Grantzow! Berlin: Schöneberg am Wege nach Lankwitz unter Wicken Prof. A. Braun! (an diesen beiden Stellen wohl nur verschleppt).

- Angermünde: Krussow unter Flachs Seehaus. Prenzlau: Klein Sperrenwalde Seel.
- † *Silene conica* L. Spandau: Tegel Chaussee nach Berlin 1862 Prof. Braun! Seelow: Zwischen Worin und Trebnitz Höfft! Buckow Spitzberg 11. Juni 1862 Graf Solms!! Landsberg: Schanze an der Friedeberger Chaussee Gentz!
- S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. Schwiebus: Westrand des Galgensees einzeln Golenz! Buckow: Kiefern Schonung nach Sieversdorf hin 1862!! Schwedt: Neue Mühle auf dem linken Welseufer Seehaus.
- S. tatarica* (L.) Pers. Neuzelle: Ratzdorf Weise.
- S. gallica* L. a.) *silvestris* Schott (als Art). Magdeburg: In der Nähe der alten Neustadt in den vierziger Jahren von Peck! gefunden; wohl nur verschleppt. Krossen: Bräschen Drescher! Kähmen unter Serradella 1860 Golenz! c.) *anglica* L. (als Art) Nauen: Markau unter Serradella 1860 Grantzow.
- † *S. hirsuta* Lag. a.) *sabuletorum* Lk. (als Art) Potsdam: Zehendorf unter Serradella mit *Anthemis mixta* L. und *Echium plantagineum* L.!! ganz nahe der Stelle, wo die beiden letzteren Pflanzen 1858 zum ersten Male im Gebiet beobachtet wurden. Berlin: Weissensee Jahn. Krossen: Kähmen unter Serradella 1860 Golenz! N. f. B.
- † *S. Armeria* L. Sorau: (In der herzogl. Saganschen Forst im Hain bei Liebsen auf einem Schlege von 1859 mit *Epilobium angustifolium* L. zahlreich) Starke! Frankfurt: Oderdamm 1862 Graf Solms!!
- Melandryum rubrum* (Weigel) Gke. Koswig: (Linkes Elbufer unweit der Fährstelle) Fick. Barby: Lödderitzer Forst Schneider.
- M. noctiflorum* (L.) Fr. (Dessau: Kl. Kühnau an der Eisenbahn Fick) Schönebeck nach der Bullenwiese hin; Egelu; Güsten; Stassfurt Schneider. Müncheberg: Südseite der Stadtmauer Reichert; zwischen Worin und Trebnitz Höfft! Angermünde: Krussow; Lunow Seehaus. Arnswalde Warnstorf!
- † *Coronaria tomentosa* A. Br. Berlin: Friedrichshain Bolle, Jahn!
- Spergularia segetalis* (L.) Fenzl. Stassfurt: Hecklingen Hornung a. a. O. N. f. M.
- Sagina apetala* L. Berlin: Zwischen Rosenthal und Lübars Paul!
- Stellaria nemorum* L. Sorau: Zwischen Hirschwinkel und Waldschloss; Eichelgarten Baenitz! Triebel Nicolai (Zachan: Hinter der Wassermühle Warnstorf!)
- S. crassifolia* Ehrh. Strausberg: Nördlich vom Kesselsee!! Frankfurt: Georgenthal 1862!! Arnswalde: Stavinsee schon 1860 Warnstorf!
- Ceratium glomeratum* Thuill. Barby: Rosenberg am See und auf den Dämmen Rother! Burg: Bürgerholz Deicke. Nauen: Breddower Forst Prof. A. Braun!! Liberose: Blasdorf Busch!

- Elatine Hydropiper* L. Köpnick: Südliches Ufer des Müggelsees 1860 Jahn! An der alten Oder gegenüber Oderberg Ilse!
- E. Alsinastrum* L. Prenzlau: Steinpfuhl bei Schönwerder Becken!
- Malva Alcea* L. b.) *fastigiata* Cav. (als Art) Barby: Am Damm bei Breitenhagen 1860 Rother!
- † *M. mauritiana* L. Arnswalde Warnstorf!
- M. rotundifolia* L. Zwischen Egelin und Hakeborn Schneider. Küstrin: Reitwein Gallus.
- † *M. crispa* L. Berlin: Schutt beim Humboldtshafen Bolle.
- Althaea officinalis* L. (Aken: Auf Wiesen unweit der Mühle bei Mennewitz Fick.) Brandenburg: Deetz hinter den Wurthen nach den Havelwiesen zu Schramm. Schwiebus: Mühlbock sparsam (wild?) Golenz!
- † *Lavatera trimestris* L. Nauen: Wernitz auf ausgeworfener Gartenerde Grantzow! N. f. B.
- Hypericum montanum* L. Neuwaldensleben: Hasselberger Forst M. Schulze, Drebkau: Schorbus auf dem Pflanzenberge Lehmann. Liberose: Byhle Busch! Strausberg: Westufer des Lattsees!! Gegend von Forsthaus Schlag Schweinfurth!! Königs-Wusterhausen: Dubrow Bolle. Sternberg: Kgl. Forst in der Gegend der Topperschen Schneidemühle Golenz. Neustadt-Eberswalde: Neue Mühle bei Grafenbrück Schweinfurth!! Arnswalde: Klücken; Stadforst; (Schönwerder; Sandow; Zachanscher Buchwald) Warnstorf! Landsberg: Bestensee bei Altensorge Gentz! Liebenau: Am Gastsee Hagedorn.
- H. hirsutum* L. (Zw. Koswig und Wörlitz Prof. Braun!) Barby: Grüneberger und Lödderitzer Forst; Diebziger Busch Schneider.
- Vitis vinifera* L. b.) *silvestris* Gmel. (als Art) Trebbin: Schulzendorf Grantzow. Am Kriensee bei Rüdersdorf früher Hirsch. Neustadt-Eberswalde: Weinberg bei Grünthal Hansmann. (Kommt auch nach Bitschl bei Posen in der Nähe von Murowana Goslin vor.)
- Geranium pratense* L. Nauen: Kirchhof in Wernitz (verw.) Grantzow! Köpnick: Gärten (verw.) Kasner!
- G. silvaticum* L. Strausberg: In einer feuchten Schlucht des Gahmengrundes südlich der Chaussee Schweinfurth!! (Vgl. S. 101.) N. f. B.
- G. dissectum* L. Magdeburg: Rothehorn Schneider. Nauen: Wernitz auf dem Kirchhofe Grantzow!! und beim Vorwerk Grantzow; hier wirklich einheimisch. Sorau: Aecker des Neuvoorwerks Starke. Küstrin: Hathenow; Golzow Jahn. N. f. B.

- G. columbinum* L. Neuhaldensleben: Wellenberge bei Dönnstedt M. Schulze! Krössen: Kienberge; zwischen Kähmen und Murg Golenz. Küstrin: Steig zwischen Tucheband und Hathenow; bei Hathenow Jahn. Landsberg: zwischen Hopfenbruch und der Goldbeck; Wepritz; Horstberg Gentz!
- Dictamnus albus* L. Neuhaldensleben: Wellenberge einzeln M. Schulze!
- † *Cytisus Laburnum* L. Arnswalde: Klückener Wald verwildert Warnstorf!
- C. nigricans* L. Krossen: Krämersborner grosse Heide beim Quellteich sparsam Golenz.
- † *C. capitatus* Jacq. Zerbst: Friedrichsholz Schneider. Buckow: Weinberg Höfft, F. Reinhardt.
- Medicago minima* (L.) Lmk. Burg: Kirchhof Deicke. Strausberg: West-!! und Ostufer des Straussee nördlich der Stadt Schweinfurth! Wilkendorfer Park!! Küstrin: Reitwein Stenzel.
- Melilotus macrorrhizus* (W. K.) Pers. Barby: Diebzig; Leitzkauer Schlossgarten Schneider. Neuzelle: Feuchte Grasraine unterhalb der Schlabener Mühle!!
- Trifolium ochroleucum* L. ist für unsere Flora zu streichen. Das einzige in meinem Herbar befindliche Exemplar von Rhinsmühlen bei Friesack erkannte ich bei einer Revision der *Trifolium* Arten als ein schwächliches, weissblühendes Exemplar von *T. pratense* L., welches die Tracht von *T. ochroleucum* auf täuschende Weise angenommen hatte.
- † *T. incarnatum* L. Magdeburg: Rothehornwiesen einzeln M. Schulze. Bernburg: Unter Flachs zwischen Gramsdorf und Dornbock Schneider.
- T. striatum* L. Barby: Zwischen Rosenburg und Lödderitz Rother!
- † *T. resupinatum* L. Berlin: Lustgarten v. Jasmund!!
- T. elegans* Savi. Treuenbrietzen: Stadtwall Pauckert!
- Lotus corniculatus* L. b.) *tenuifolius* L. Magdeburg: Sülldorf Peck
- Tetragonolobus siliquosus* (L.) Rth. Barby: Diebziger Bruchwiesen Schneider. Magdeburg: Zw. Pöthen und Karith Schneider. Güsten Schneider.
- † *Galega officinalis* L. Neuzelle: Kummerower Mühle Steinert!
- Astragalus Cicer* L. Frankfurt: Bahnhof Podelzig Jahn. Mohrin 1860 Schäde. Gramzow: Blankenburg nach Bertikow hin 1859 Kasner!
- A. hypoglottis* L. Barby: Lödderitz Rother! Magdeburg: Damm an der Bullenbrücke südlich von Gerwisch Schneider.
- A. arenarius* L. Kotbus: Zwischen Fehrow und der Heideschenke

- Busch. Krossen: Königl. Forst zwischen Rädnitz und Krämersborn Golenz. Triebel: Kemnitz Nicolai. Neuzelle: Zwischen der Dielower Ziegelei und Fürstenberg einzeln Steinert!! Zw. Lagow und Schönow Hagedorn.
- Vicia tetrasperma* (L.) Mneh. Brandenburg: Rechts vom Wege nach Kl. Kreuz Schramm. Müncheberg: Stadforst an der Chaussee 1862!!
 † *V. monantha* (L.) Koch. Burg: Rogätz am Seelenhau Schneider. Templin F. Peck! Mittenwalde: Am Fusse des Gr. Kienitzer Berges Bolle!
- V. pisiformis* L. Gramzow: Wald zwischen Blankenburg und Melssow Kasner!
- V. silvatica* L. Arnswalde: Stadforst Warnstorf!
- V. tenuifolia* Rth. Königs-Wusterhausen: Auf einem Lehmberge nach Gräbendorf hin Bolle! Mohrin 1860 Schade.
- V. dumetorum* L. Arnswalde: Am Raduhnsee Warnstorf!
- Lathyrus tuberosus* L. Küstrin: Vor Reitwein Stenzel; wird nach Gallus hier Schweinenuss genannt.
- L. silvester* L. Trebbin: Burgwall Lackowitz! Krossen: Kienberge bei Goskar Golenz! b.) *platyphyllus* Retz. (als Art). Barby: Lödderitzer Forst am Elbdamm Schneider. Buckow: Elysium F. Reinhardt.
- L. vernus* (L.) Bernh. Schwiebus: Raubschloss in der Stadforst; Westseite des Liebger Sees; Buchwald bei Kl. Dammer Golenz! Krossen: Kienberge; Griesel bei den Kollätschteichen Golenz.
- L. niger* (L.) Wimm. Schwiebus: Stadforst am Raubschloss u. im schwarzen Winkel Golenz! Guben: Tauerse Forst Thalheim! Arnswalde: Kinderwerder bei Schulzendorf Warnstorf! Landsberg: Horstberg Gentz!
- † *Prunus insiticia* L. Züllichau: Mühlengrund Hagedorn!
- P. Padus* L. Arnswalde: (Schönwerdersche Ziegelei) Warnstorf!
- † *Spiraea salicifolia* L. b.) *latifolia* Ait. Züllichau: Oblater Damm Hagedorn!
- Geum urbanum* × *rivale*. Lübben: Hain Schade jun.! Berlin: Jenseit Treptow in mehreren Formen 1862 Reymann!!
- Rubus candicans* Bl. und Fing. Arnswalde: Klückener Birkenscho-nung Warnstorf!
- R. fruticosus* × *Idaeus* (*R. fastigiatus* W. und N.) Nauen: Halte-stelle Finkenkrug 1860!! Sorau: Eichelgarten!! N. f. B.
- R. saxatilis* L. Oschersleben: Brandsleber Holz unter Birken nach Eggenstedt hin Schneider. Strausberg: Blumenthal, besonders beim Gahmen- und Lattsee!! Schwiebus: Stadtheide am Wanzen-luche Golenz! Arnswalde: Stadforst Warnstorf!

- Fragaria moschata* Duchesne (1766, *F. elatior* Ehrh. 1792). Barby: Ostseite des Diebziger Buschs Rother! Brandenburg: An der Eisenbahn jenseit Wusterwitz bei Wärterhaus 117 Schramm. Nauen: Chausseeegraben nach Wernitz hin Grantzow! Drebkau: Pflanzenberg bei Schorbus Lehmann! N. f. M.
- † *Potentilla fruticosa* L. Templin: Plessensruh verw. F. Peck!
- P. supina* L. (Elbufer oberhalb Aken Fick.) Barby: Rosenberg im Seegarten Rother! Burg: Mahlpfuhl bei der Kirche Schneider. Arnswalde: Raduhn Warnstorf!
- P. norvegica* L. Kotbus: Lakoma am Chaussee Hause Steinert. Krosen: Torfstich bei Sorge und Pfeifferhahn Drescher! Frankfurt: Ziebingen Gallee. Arnswalde: Raduhn Warnstorf!
- P. rupestris* L. Guben: Waldschlucht jenseit Germersdorf Thalheim!
- † *P. recta* L. Züllichau: Verwildert im Garten des Gasthofs zu den 4 Linden Golenz!
- P. collina* Wib. Fürstenwalde: Am See bei Trebus 1862 v. Uechtritz!! Frankfurt: Zwischen Treplin und Petershagen 1862 v. Uechtritz! Buckow: 1862 v. Uechtritz! Arnswalde: Judenberg Warnstorf!
- P. mixta* Nolte. Guben: Auf einer Sandbank am rechten Neisseufer oberhalb der Eisenbahnbrücke!!
- P. procumbens* Sibth. Potsdam: Am Linowitzer-See; Stolpe gegenüber Bolle. Mittenwalde: Glunsbusch Bolle. Köpnick: Teufelssee!! Sorau: Ober-Ullersdorf Starke!
- P. minor* Gil. (*verna* auct.) Magdeburg: Chausseeegraben bei Dodendorf Schneider. Oschersleben: Am Brandsleber Holze Schneider. Potsdam: Zwischen Templin und Kaput; Ferch Bolle. Spandau: Hasselhorst!! Storkow: Kolberg Bolle. Strausberg: Westufer des Straussees; südlich der Chaussee im Gahmengrunde Schweinfurth!! Schwiebus: Blankensee Golenz! Frankfurt: Zw. Treplin und Petershagen 1862 v. Uechtritz. Müncheberg: Stadtforst an der Chaussee mit *P. minor* × *incana* 1862 v. Uechtritz!!
- P. incana* Mneh. b.) **subacaulis** Wulf. (als Art) Neuhaldensleben: Zwischen Hundisburg und Rotmersleben Torges! Diese auffallende Form mit sämtlich dreizähligen Blättern findet sich vielleicht noch an andern Stellen des Gebiets. N. f. M.
- P. alba* L. Nauen: In und neben dem Chausseeegraben beim Wernitzer Einnehmerhause Grantzow!! Müncheberg: Stadtforst 1862 v. Uechtritz!! Arnswalde: Stadtforst Warnstorf!
- Alchemilla vulgaris* L. Oschersleben: Amtsgarten in Schermke Schneider. Templin: Bürgerheide F. Peck! Schwiebus nicht selten Golenz! Triebel Nicolai. Arnswalde: Schiesshaus; Klükken; (Schönwerdersche Ziegelei) Warnstorf! Liebenau: Ham-

- mer-Mühle Hagedorn. b.) *glaberrima* Schmidt (*glabrata* Wimm.)
 Potsdam: Am Westufer des Teltower Sees Bolle! Schwiebus:
 An der Lanke unterhalb der Beckermühle; Skampe nach der
 Beckermühle hin sparsam; an der Südspitze des Trebachsees
 Golenz! Krossen: Grieselthal Golenz. Sorau: Ob. Ullersdorf
 Starke! Liebenau: Nach Neudörfel hin 1862 Golenz.
- Sanguisorba minor* Scop. Königs-Wusterhausen: Auf einem Berge
 nach Gräbendorf hin; Kolberg Bolle. Krossen: Kienberge Golenz.
- Agrimonia odorata* Mill. Schönebeck: Wald zwischen der alten
 Fäbre und Dornburg 1860 Heuser a. a. O. Altlandsberg: Nörd-
 lich am langen Luch in der Stadtforst Schweinfurth!! N. f. M.
- † *Rosa lutea* Mill. Krossen: Bei der Fabrik unweit Griesel Golenz!
 Arnswalde: Bei Cassners Windmühle Warnstorf!
- † *R. pomifera* Herm. Wrietzner Berge Schäde!
- Epilobium tetragonum* L. Brandenburg: Weseram am Triftwege
 nach Roskow Schramm. Dagegen ist der in der Flora der Prov.
 Brandenburg etc. I. S. 211 angeführte Standort im Schöneberger
 Fenn bei Berlin zu streichen.
- E. obscurum* (Schreb.) Rehb. (Grabow: Graben hinter der Nach-
 koppel Brockmüller!) Warnow Madauss! Potsdam: Westufer
 des Teltower Sees Bolle! Stransberg: An einem Quellgraben
 am nordwestlichen Ufer des Straussees!! an einem kleinen
 Sumpf neben der Chaussee nach Prötzel Schweinfurth! N.
 f. B. Die in der Flora der Provinz Brandenburg a. a. O. auf-
 geführte Form *E. tetragonum* b.) *sessilifolium* Aschs. ist nichts
 anderes als der Typus von *E. obscurum*, mit noch nicht ent-
 wickelten Ausläufern, von welchem ich früher nur im Spätsommer
 Exemplare mit verlängerten Ausläufern gesehen hatte, die bei oft
 schon abgestorbenem Hauptstengel dann eine durchaus andre Tracht
 annehmen. Die dort gegebenen Diagnosen bedürfen einiger
 Verbesserung. An den untersten Stengelgliedern vereinigen sich
 auch bei *E. tetragonum* L. (wozu ich jetzt nur *E. adnatum*
 Gris. rechne) die von den Rändern zweier benachbarten Blätter
 herablaufenden Linien zu einer; doch ist dies bei der (später
 eintretenden) Blüthezeit nicht mehr bemerklich, weil sich die
 oberflächlichen Zellschichten des Stengels weit mehr als es bei
E. obscurum der Fall ist, blättrig abschälen. Die Frühsommer-
 Exemplare von *E. obscurum* haben allerdings den aufrechten
 Wuchs und sonst manche Aehnlichkeit mit *E. tetragonum* L.,
 wodurch mein Irrthum erklärt wird. Die dort erwähnten Ueber-
 gangsformen müssen auf Täuschung beruhen; vielmehr bleiben
 als hinreichende Unterschiede die dunklere Farbe des Laubes,

die breiteren, entfernter gezähnten Blätter, die stärkere Behaarung, die trübere Blütenfarbe des *E. obscurum* (ein sehr passender Name!). Dasselbe blüht schon in der zweiten Hälfte des Juni, während *E. tetragonum* L. Mitte Juli kaum die ersten Blüten geöffnet hat. Letzteres, welches auch durch seinen steifen, meist pyramidenförmigen Wuchs charakterisiert wird, scheint bei uns vorzugsweise Alluvial-, *E. obscurum* Diluvialpflanze zu sein.

† *Oenothera muricata* L. Jerichow: Weinberg; Curthsche Werth Wohlfahrt!

† *Clarkia pulchella* Pursh. Arnswalde: Schulzendorf!

Circaea lutetiana L. b.) *decipiens* Aschs. Templin: Kirchenheide F. Peck!

C. alpina L. Liberose: Stockshof auch noch jetzt Busch. Schwiebus: Am Blankenseer grossen Luche; Erlengrund bei Seelägen Golenz! Krossen: Kolonie Friedrichswalde Drescher; bei der Grieseler Vordermühle; Krämersborner Wildpark am schwarzen und Grenzteich Golenz! Buchwald bei Zilenzig Hagedorn! Landsberg: Bestensee bei Altensorge Gentz! b.) *intermedia* Ehrh. (als Art) Züllichau: Buchwald Hagedorn! Krossen: Krämersborner Wildpark Golenz! Sorau: Tiefteich bei Nieder-Ullersdorf Starke!

† *Lythrum virgatum* L. Züllichau: Im Schwarzschen Garten in Mohsau verw. Hagedorn!

L. Hyssopifolia L. Schönebeck: Döben Heuser a. a. O.

† *Sicyus angulatus* L. Züllichau: Gärten! Dorfstrasse von Palzig Hagedorn!

† *Portulaca oleracea* L. Schwiebus: Schönfeld; Griesel Golenz!

Montia fontana L. Burg: Schartau Schneider. Jerichow: Zwischen Gr. und Kl. Mangelsdorf; nördlich vom Wege zwischen Melkow und Schmitsdorf Wohlfahrt. Brandenburg: Brielow, Peterhof Schramm. Guben: Zw. Klosterbusch und Kupferhammer Thalheim! Neuzelle: Aecker diesseit des Oderdamms Lehmann und Gallee!

Corrigiola litoralis L. Jerichow: Elbdeich nach Kletznick hin Wohlfarth. Triebel: Neisseufer bei Gr. Särchen Weise.

Herniaria hirsuta L. Treuenbrietzen: Birkheide Pauckert. Schwiebus: Schulacker bei Schönfeld Golenz!

Ilcebrum verticillatum L. (Aken: Chörau Rother.) Liberose: Leeskow Luckan!

Sedum purpureum (L.) Lk. Barby: Breitenhagener Busch Rother.

- † *S. album* L. Magdeburg: Durchgang bei der Domschule Schneider. Krossen: Auf der alten Stadtmauer 1862 Golenz.
- Ribes rubrum* L. Neuwaldenleben: Papenberg M. Schulze. Brandenburg: Ellerlake bei der Neumühle Hechel. Nauen: Fasanerie bei Königshorst -H. Schulze! Lübben: Treppendorf Fick. Strausberg: Westl. Ufer des Straussees Schweinfurth!! Neustadt-Eberswalde: Sommerfelde Ilse. in einer Schlucht zwischen Hegermühle und Schöpfungurt Schweinfurth!! Biesenthal: Forsthaus Liepnitz!!
- Saxifraga Hirculus* L. Schwiebus: Seeläsgen Golenz!
- Sanicula europaea* L. Oschersleben: Saure Holz 1862 Schneider. Krossen: Zwischen der Krämersborner alten Schneidemühle und der Grieseler Hintermühle Golenz! Arnswalde: Klückener, (Schönwerderscher und Sandower) Buchwald Warnstorf!
- Astrantia major* L. (Muskau: Englisches Haus ob wild? Weise.)
- Eryngium planum* L. Guben: Oderdamm bei Niemaschleba Thalheim!
- Cicuta virosa* L. b.) *angustifolia* Kit. (1814, *tenuifolia* Froel. 1818)
Potsdam: Am Teltower See; am gr. und kl. Linowitz-See Bolle. Arnswalde: Hohenwalder See Warnstorf!
- Apium graveolens* L. An der Saar bei Gr. Wanzleben 1862; Mühlgraben bei Remkersleben Schneider. Brandenburg: Hinter den Wurthzäunen am Bruchgraben bei Deetz Schramm. Trebbin: Blankensee im Upstall am Wege nach Stücken; Tremsdorf am Wege nach Blankensee Frenzel!
- Helosciadium repens* (Jacq.) Koch. Potsdam: Kladow Fintelmann; am Spring bei der neuen Scheune unweit Ferch O. Reinhardt!
- Pimpinella magna* L. Magdeburg: Werderspitze Schneider. Spandau: Lübars C. Bouché! Schwiebus: Mühlbock; Läsger Wiesen beim Eichberg Golenz!
- Seseli annuum* L. Arnswalde: An einem Abhang vor dem Werder Warnstorf!
- Libanotis montana* All. Frankfurt: Zw. der Buschmühle und der steilen Wand 10. Juni 1862 Bolle und Graf Solms!!
- Cnidium venosum* (Hoffm.) Koch. Burg: Elbwiesen in Blumenthal; am Parchauer See Deicke. Züllichau: Unterweinberge Hagedorn! Oderdamm oberhalb Fürstenberg sparsam!!
- Silaus pratensis* (Lmk.) Bess. Züllichau: Zwischen der Karger Chaussee und dem Bernhardischen Gute in Krummendorf Hagedorn!
- Peucedanum officinale* L. Zerbst: Buschwiesen südl. von Steckby Fick.
- Laserpicium prutenicum* L. Spandau: Lübars C. Bouché!
- Scandix pecten Veneris* L. Barby: Zwischen Werkleiz und Tornitz Rother!

- Chaerophyllum bulbosum* L. Stassfurt: Gänsefurter Busch Schneider.
 Nauen: Gebüsch an den Wernitzer Mittelwiesen!! Guben: Bei
 der Eisenbahnbrücke!! Neuzelle: Dielower Berge!! Küstrin:
 Golzow; Gorgast; Tuchebander Kirchhof; Wuhden Jahn. Gram-
 zow: Blankenburg Kasner!
- † *Myrrhis odorata* (L.) Scop. Driesen Lasch.
- Sambucus racemosa* L. Triebel: Gatka Nicolai.
- Lonicera Periclymenum* L. Koswig: Zwischen Grochwitz und Wei-
 den Preussing.
- L. Xylosteum* L. Gramzower Wald Seel!
- Linnaea borealis* L. Guben: Tauersehe Forst unweit des Forst-
 hauses am kleinen See Thalheim!
- Sherardia arvensis* L. Liberose: Am Wege nach Münchehofe
 Busch! Köpnick: Im Graben der Berliner Chaussee einzeln (ver-
 schleppt mit Grassamen) Kasner! Arnswalde: Gärten Warns-
 torf!
- Asperula glauca* (L.) Bess. Kalbe: Wartenberge Rother.
- A. tinctoria* L. Schwedt: Neue Mühle auf dem linken Welseufer
 Sehaus. Driesen: Bergdorf Weise!
- Galium Cruciata* (L.) Scop. Oschersleben: Saure Holz Schneider.
- G. Aparine* L. c.) *spurium* L. (als Art) Brandenburg: Hinter Brie-
 low Schramm. Arnswalde unter Lein Warnstorf!
- G. parisiense* L. b.) *anglicum* Huds. (als Art) Kalbe: Wartenberge
 Rother.
- G. silvaticum* L. Schwiebus: Stadtheide am Wanzenluche Golenz!
 Krossen: Kienberge; Kollätschteiche bei Griesel; schwarzer
 Teich Golenz. Arnswalde: Stadtforst Warnstorf! Liebenau:
 Haseldamm 1862 Golenz; Starpeler Grunewald Hagedorn.
- G. saxatile* L. Köpnick: Am Wege nach Dahlewitz unweit des
 Bahnhofs Kasner!
- Valerianella Auricula* D. C. Zerbst; Badez; Leitzkau Schneider.
 Magdeburg: Langenweddingen; Burg: Zwischen Mahlwinkel und
 Uchtdorf Schneider. Bernburg: Zwischen Lattorf und Pobzig;
 zwischen Gramsdorf und Dornbock Schneider. Storkow: Zwischen
 Prieros und dem Kolberg Bolle.
- Dipsacus silvester* Mill. Zwischen Egelu und Hakeborn Schneider.
- † *D. fullonum* Mill. Griesel bei der Fabrik Golenz!
- Cephalaria pilosa* (L.) Gren. Prenzlau: Axelberge bei Gollnitz
 Seel!
- Scabiosa Columbaria* L. b.) *ochroleuca* L. (als Art) zwischen Wanz-
 leben und Remkersleben; zwischen Egelu und Hakeborn Schneider.

- Petasites tomentosus* (Ehrh.) D. C. Küstrin: Im Burst H. Schulze II.
Aster Tripolium L. An der Saar bei Gr. Wanzleben 1862 Schneider.
† *A. novae Angliae* L. Züllichau: Bernhardisches Gut in Krummen-
dorf verw. Hagedorn! mit
† *A. brumalis* Nees!
† *A. parviflorus* Nees. Oberhalb Aken am Elbufer Fick.
† *A. tenuifolius* L. Oderufer bei Schwedt 1859 und 1860 Brandt!
(Schultz bip.!)
† *A. laevis* L. Wrietzen: Neu-Küstrinchen Schäde! (Schultz bip.!)
† *Stenactis annua* (L.) Nees. Frankfurt: Oderdamm Paalzow!! Münche-
berg: Park von Trebnitz Höfft. Park von Boitzenburg F. Peck!
† *Solidago canadensis* L. Spandau: Tegeler Park am Weinberge
Bolle!!
† *Inula Helenium* L. Züllichau: Gärten in Krummendorf Hage-
dorn.
I. germanica L. Bernburg: Weinberge bei Aderstedt Preussing.
I. salicina L. Barby: Bruchwiesen bei Diebzig Schneider. Treb-
bin: Bei den Arensdorfer Bergen Laekowitz! Triebel: Kem-
nitz Nicolai.
Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn. Barby: Nuthe bei der Polci-
mühle Rother. Schönebeck: Gnadau nach Döben hin Heuser
a. a. O. Beelitz: Elsholz P. Hinneberg. Trebbin: Wittstock 1860
Bolle.
† *Xanthium spinosum* L. Guben: Am Stadtgraben einmal; Bösit-
Gallee. Driesen Lasch.
† *Rudbeckia laciniata* L. Sorau: Ob. Ullersdorf an der Lubatge
Starke. Triebel: Buchenwald am Kemnitzer Mühlgraben Weise.
† *Helianthus giganteus* L. Züllichau: Bernhardi's Gut in Krum-
mendorf verw. Hagedorn!
† *Galinsoga parviflora* Cav. Gnadau: Nach Döben hin Heuser a.
a. O. (Grabow: Ballbrügges Garten Madauss.) Spandau: Beim
Fischerhause auf Pichelswerder!! Templin: Warthe Becken.
Liberose: Kirchhof in Zaue Buseh. Altlandsberg: Stadtforst an
der Chaussee jenseit Radebrück!! Schwiebus: Ulbersdorf Golenz!
Triebel: Gr. Särchen an der Brauerei Starke. Guben: Ullrichs
Garten!! Prenzlau: Schönwerder Becken!
† *Artemisia pontica* L. Prenzlau: Kirchhof in Hohen-Güstow
Becken.
Achillea nobilis L. Stadtmauer von Kroppenstedt; Chaussee zwischen
Kroppenstedt und Heteborn Deieke.
Anthemis tinctoria L. Templin: Weg nach der Buchheide; Prenz-
lauer Chaussee in der Jungfernheide F. Peck! Sorau: Laubnitz

Starke. Müncheberg: Nach Trebnitz hin Höfft. Mühle b. Worin Reichert. Buckow: Schlossberg!! Prenzlau: Kirchhof und beim Ellinger Chausseehaus mit hellgelbem Strahl Seel!

† *A. mixta* L. Potsdam: Zehlendorf unter Serradella (in der Nähe der Stelle, wo sie sich 1858 — 1860 fand)!! Krossen: Kähmen unter Serradella 1860 Golenz! Sorau: (Zeipau) unter Serradella Starke!

† *Chrysanthemum suaveolens* (Pursh) Aschs. Berlin: Seegerscher Holzpl. Bolle. Frankfurt: B. Karthaus; Dammvorstadt 1862. O. Reinhardt!!

C. segetum L. (Aken: Chörau viel Rother.) Neuwaldensleben: (zw. Hasselburg und Flechtingen) M. Schulze, Schneider. Erleben nach Hörsingen hin Schneider. Berlin: Weissensee unter Serradella mit der sehr schön ausgebildeten var. **Welwitschii** Schultz Bip. Jahn! Seegerscher Holzplatz verschleppt Bolle. Sorau: (Zeipau) unter Serradella Starke! Landsberg: zwischen Fernmühle und Zanziner Grund Gentz!

† *C. Myconis* L. Berlin: Weissensee unter Serradella Jahn! Sorau: (Zeipau) unter Serradella Starke! Ist vielleicht schon öfter unter ähnlichen Verhältnissen vorgekommen, aber mit dem sehr ähnlichen *C. segetum* L., mit welchem es in Gesellschaft wächst, wechselt worden. Unterscheidet sich leicht durch die deutlicher nach dem Grunde verschmälerten, grasgrünen, (nicht fiederspaltigen) Blätter, die kleineren Köpfe, vor Allem aber durch den besonders an den Strahlblüthen sehr grossen, häutigen Pappus. N. f. B.

Arnica montana L. Neuwaldensleben: Uthmöden häufig M. Schulze! Templin: Stempnitz F. Peck! Drebkau: Zwischen Laubst und Leuthen H. Müller II! (Muskau: Wosna Weise.)

Senecio spathulifolius (Gmel.) D. C. Hakel nach Hornung a. a. O. N. f. M.

S. vernalis W. K. (Vgl. S. 150) Spandau: Pichelswerder 1862 wie der (S. Heft II. S. 176) Weise. Liberose: Meilerberg Busch! Strausberg: Aecker westl. am Straussee!! Gahmengrund südl. der Chaussee Schweinfurth!! unweit des Chausseehauses und zw. dem Forsthaus im Blumenthal und Biesow Schweinfurth!! Park von Wilkendorf Schweinfurth!! Berlin: Seegerscher Holzplatz Aug. 1860. 1 Exemplar Bolle; in der Nähe der Kolonie Hohen-Schönhausen 1861 vermisst, 1862 aber wieder bemerkt von v. Jasmund und A. Winkler (I.) Züllichau: Palzig einzeln Hagedorn. Krossen: 1861 nur bei Griesel sparsam, 1862 häufig. Golenz. Guben: Klosterbusch Gallee; Schöneich einzeln Thalheim. Neuzelle: Bahnhof; Eisenbahndamm Gallee! Küstrin:

- Vor dem Burst H. Schulze II.; Reitwein an der Eisenbahn hinter dem Schlossgarten Gallus. Neudamm Rothe. (Pyritz Meyer und Strübing. Vgl. S. 182) b.) *glabratus* Aschs. Frankfurt: Oderd. O. Reinhardt!! Arnswalde: (Schönwerdersche Ziegelei) Warnstorf!
- S. aquaticus* Huds. Barby: zwischen Rosenberg und Breitenhagen Rother! Diebziger Busch Schneider.
- S. paludosus* L. Barby: Rajock Rother. Stassfurt: Neu-Gattersleben Preussing. Berlin: Heinersdorf Jahn. Zwischen Oderberg und Hohensaaten Ilse. b.) *riparius* Wallr. (als Art) Züllichau: Gebüsch am Oderufer bei Tschicherzig Hagedorn! Krossen: Oderaue Golenz!
- † *Echinopus sphaerocephalus* L. Schwiebus: Mühlbock Golenz! Küstrin: Bahnhof Podelzig Gallus.
- Carlina acaulis* L. Triebel: zwischen Zelz und Gr. Särchen am Neisseufer Nicolai.
- Centaurea phrygia* L. Neuhaldensleben: Hasselburger Gehölz M. Schulze.
- † *C. montana* L. Züllichau: Bernhardis Gut Hagedorn!
- C. Scabiosa* L. Arnswalde: Vor dem Werder weissblühend Warnstorf!
- C. panniculata* Jacq. Brandenburg: Marienberg weissblühend Schramm. Schwiebus: Am Birkholzer Heideluch weissblühend Golenz! (Vgl. S. 136).
- C. Calcitrapa* L. Oschersleben: zwischen Egeln und Hakeborn; Güsten Schneider.
- † *C. solstitialis* L. Neuhaldensleben: Chausseeegraben in der Alvensleber Forst Schneider. Frankfurt: An der Eisenbahn nach Küstrin 1860 Steltzner. Müncheberg: Hasenfelde Reichert.
- Jurinea monoclonia* (L.) Aschs. (Aken: Susigke hinter dem Lehrerarten Rother.
- Cirsium bulbosum* (Lmk.) D. C. Neuhaldensleben: Moosbruch Schneider.
- C. canum (L.) M. B.**
- C. oleraceum** × **canum** } Pyritz. (Vgl. S. 184).
- C. acaule** × **canum** }
- C. lanceolatum** × **acaule** Schwedt: Neue Mühle Seehaus! (Vgl. S. 187).
- Thrinicia hirta* Rth. Barby: Rosenberg im Seegarten Rother! Weidenwerder bei Ronnei; Trift zwischen Gödnitz und Dornburg Schneider. Gnadau: Pfingstanger Heuser a. a. O. Berlin: Friedrichshain!! Guben: Neissewiesen oberhalb der Stadt!!

Picris hieracioides L. Trebbin: Burgwall Lackowitz! Küstrin: Westlich von Tucheband häufig Jahn.

† *Helminthia echioides* (L.) Gaertn. Chaussee-graben in der Alvens-leber Forst Schneider.

Tragopogon pratensis L. b.) *minor* Fr. (als Art) Genthin: Vehlen Schramm. Treuenbrietzen: An der alten Stadtmauer Pauckert! c.) *orientalis* L. (als Art.) Treuenbrietzen: Budorfsche Hufen Pauckert! Köpnick: Kalkberge nach Tasdorf hin Lackowitz!

Scorzonera humilis L. Spandau: Zwischen der Hundekehle und dem hohlen See 1862!! Schulzendorf 1862 Bolle. Strausberg: Blumenthal an der Chaussee westlich vom Chaussee-hause Schwein-furth! Schwiebus: Stadtforst am Schlangenberg und nach Möst-chen hin; zw. Schönfeld und Goldbach 1862 Golenz!

S. purpurea L. Krossen: Krämersborner grosse Heide unweit des Quellteichs Golenz! Schwedt: Neue Mühle Seehaus! Zwischen Liebenau und Rinersdorf Hagedorn.

Taraxacum vulgare (Lmk.) Schrk. d.) *paludosum* (Scop.) Schl. 1. *palustre* D. C. (als Art) Nauen: Dechtower Damm!! Berlin: Jungfernheide beim Pfefferluch 1862 Bolle. Sorau: Oestlich vom Eichelgarten Baenitz. Sommerfeld: Beim Stadtbusch Baenitz! Arnswalde: Am Stavinsee Warnstorf!

Chondrilla juncea L. b.) *acanthophylla* Borkh. (als Art) Landsberg: Kirchhof an der Chaussee nach Wepritz Gentz!

Sonchus arvensis L. b.) *uliginosus* M. B. (als Art, var. *laevipes* Koch). 2. *hieracioides* Grantzow. Stengel nur unterwärts beblättert; Blätter sehr sparsam und seicht stachelspitzig gezähnt; Köpfe wenig zahlreich. Diese höchst auffallende offenbar dem *Taraxacum palustre* ** *salinum* analoge Form, welche in der Tracht sehr an *Hieracium praealtum* Vill. erinnert, sammelte der Entdecker bei Nauen auf der Salzstelle am Dechtower Damm! sowie auf den Zeestower Salzwiesen. N. f. B.

Crepis foetida L. Burg: Hohenwarte Mewes früher. Chaussee-graben zw. Gr. Wanzeleben und Remkersleben Schneider. Schwedt: Neue Mühle Seehaus! (Vgl. S. 182).

C. praemorsa (L.) Tausch. Zehdenick: Falkenthal nach Prof. Schultz-Schultzenstein. Rheinsberg: Werder im Tornowsee Prof. Schultz-Schultzenstein!

C. biennis L. Zwischen Langenweddigen und Egehn Schneider. Burg: Kiefern bei Mahlwinkel Schneider. Genthin: Vehlen an Zäunen der Wurtlwiesen Schramm. Züllichau: Heidemühle Hagedorn. Arnswalde: Scharlocks Wiese im Kohlhof Warnstorf!

C. mollis (Jacq.) Aschs. Hakel nach Hornung a. a. O.

- Hieracium praealtum* Vill. Neustadt: Zw. Sommerfelde u. Tornow 1862 Buchholz! Prenzlau: Zw. Schönwerder und Jagow Becken!
- H. pratense* Tausch. Berlin: Friedrichshain Jahn! Charlottenburger Schlossgarten Bolle. Schwiebus: Mühlbocker Walke 1862 Golenz! Krossen: Griesel bei der Hinternühle sparsam Golenz!
- † *H. aurantiacum* L. Potsdam: Gärten der Charlottenstrasse Milcke!
- Phyteuma spicatum* L. Neuwaldenleben: Zernitz M. Schulze. Strausberg: Westufer des Lattsees Schweinfurth!! Schwiebus: Stadtforst am Wanzenluch Golenz! Liebenau: Haseldamm Golenz.
- Campanula bononiensis* L. Burg: Hohenwarte Mewes ob noch jetzt? Potsdam: Baumgartenbrück Krumbholz!! Küstrin: Reitwein; Wuhden Gallus und Jahn. Prenzlau: Gr. Holzendorf Becken.
- C. Trachelium* L. b.) *robusta* Aschs. (*C. Trachelium* der märkischen Floristen von Willdenow bis Ruthe.) Golssen: Gräfl. Torfstich 1862 Graf Solms! Frankfurt: Steile Wand Paalzow!
- C. persicifolia* L. Weissblühend Köpnick: Am Kalksee unweit des Forsthauses Ritter.
- Vaccinium Myrtillus* × *Vitis idaea* ist 1861 seit vielen Jahren bei Berlin zum ersten Mal von Lackowitz! wieder blühend gefunden worden. 1862 ist diese so lange vermisste Pflanze noch an mehreren anderen nahe gelegenen Standorten von Reymann und Schultz und Prof. Braun gefunden worden.
- V. Oxycoccus* L. Koswig: Zwischen Grochwitz und Weiden Preussing. Rathenow: Schollehe Legeler. Brandenburg: Beim Butzower Fenn Schramm. Beelitz: Elsholz P. Hinneberg. Peitz: Preilack Lehmann. Königs-Wusterhausen: Prieresmühle Bolle. Köpnick: Teufelssee Bolle!! Schwiebus: Wanzenluch in der Stadtforst; Läsger Wanzenluche; Galinenluch; Blankenseer grosse Luch; Schönfelder Wiesen an der Mühlbock; zwischen der Kupper- und Beckermühle Golenz! Biesenthal: Forsthaus Liepnitz!! Sophienstedt Schweinfurth!! Liebenau: Am Pinnsee Hagedorn.
- Arctostaphylos uva ursi* (L.) Spr. Sternberg: Toppersche Forst in der Gegend der Tauben-Mühle Golenz!
- Andromeda Polifolia* L. Hoyerswerda: Schwertschicka O. Jaenicke. Templin häufig F. Peck! Neustadt-Eberswalde: Lichterfelde; beim grossen See! zwischen Golzow und dem Althüttendorfer Revier Ilse. Arnswalde Lüdicke! Liebenau: Am Pinnsee Hagedorn. Starpeler Wanzenluch 1862 Golenz!
- Erica Tetralix* L. Roslau: Hundeluft Preussing.
- Ledum palustre* L. Koswig: Zwischen Grochwitz und Weiden

Preussing. Lübben: Krausnick Fiek. Schwiebus: Stadtforst im Wanzenluehe; Läsger Wanzenluehe; Galinenlueh; an der Mühlboeck bei der Kuppermühle auf der Lankener Seite Golenz! Biesenthal: Forsthaus Liepnitz Schweinfurth!! Forsthaus Eiserbude Steinberg!!

Pirola rotundifolia L. Templin: Rohrbruch in der Stempnitz F. Peck! Triebel: Gr. Särchen Nicolai; Tzechacksdorf Weiss. Neustadt-Eberswalde: Karutz Kasner. Gleissen Gentz! Liebenau: Am Pinnsee Hagedorn! Fluss- und Kalkwerder im Packlitzsee Golenz. Dagegen ist der Standort bei Liberose (Heft II. S. 179) zu streichen.

P. chlorantha Sw. Templin: Bürger- und Jungfernheide; Mokrin F. Peck! Lychen: Buchheide; Weggenbusch (Traube bis 9 blüthig) F. Peck! Mittenwalde: zw. Glasow und Jühnsdorf Bolle!! Köpnick: Vor dem Müggelberg Kasner. Schwiebus: Stadtforst am Wanzenluch und schwarzen Winkel; Sawischer Vorderheide Golenz! Triebel: Gr. Särchen Nicolai. Biesenthal: Südlicher Abhang des Liepnitzsees Steinberg!!

P. uniflora L. Templin: Kirchenheide sparsam F. Peck! Köpnick: Erkner 1862 F. Reinhardt. Züllichau: Buchwald einmal Hagedorn. Schwiebus: Schönfelder Mühle Golenz. Guben: Quelle jenseit der Kaltenborner Berge Thalheim!

Chimophila umbellata (L.) Nutt. Rathenow: Lietzenhütte Legeler. Potsdam: Zwischen Schmeerberg und Fereh Bolle. Lychen: Buchheide; Weggenbusch F. Peck. Beelitz: Elsholz Krumbholz! Schwiebus: Schlangenberg; Sawischer Heide Golenz! Krossen: Kollätschteiche bei Griesel Golenz. Sternberg: Toppersche Forst in der Gegend der Taubenmühle Golenz! Neustadt-Eberswalde: Jenseit der Ragöser Mühle Ilse.

Monotropa Hypopitys b.) *glabra* Rth. Templin: Bürgerheide; Mokrin F. Peck! Joachimsthal: Beim Hirtenbruch F. Peck!!

† *Ligustrum vulgare* L. Potsdam: Flottstelle an einem Bache völlig verwildert Bolle.

† *Asclepias syriaca* L. Beelitz: Elsholz P. Hinneberg! Züllichau: Kirchberg der Oberweinberge Hagedorn!

Limnanthemum Nymphaeoides (L.) Lk. Spandau: Am Ausgange des Teufelsgrabens in der Havel Schweinfurth!!

Gentiana Pneumonanthe L. b.) *latifolia* Scholler, deren Blätter, besonders die unteren, länglich-eiförmig bis eiförmig lanzettlich sind, wurde von Rother auch 1861 am Originalstandorte zw. Rosenburg und Lödderitz bei Barby! beobachtet. Ohne Zweifel findet sich diese Form auch anderwärts unter der Hauptart.

G. Amarella L. Prenzlau: Dauer Becken!

- G. ciliata* L. Oschersleben: Steinbrüche bei Heteborn Deicke.
- Erythraea linariifolia* (Lmk.) Pers. Barby: Wiesen bei Diebzig (und Wulfen) Banse!
- † *Phacelia congesta* Hook. Neuzelle: Priorsberg einzeln verwildert Gallee!
- Cuscuta lupuliformis* Krock. Züllichau: Unterweinberge auf *Acer-campestre* L.; Oberweinberge auf *Robinia* Hagedorn!
- Omphalodes scorpioides* (Haenke) Schrk. Magdeburg: Aussenseite des Damms zwischen Grünwalde und Ranies Banse! Jedenfalls durch eine Elbüberschwemmung von Dresden (oder dem Selkethal?) herabgeführt, aber schon seit langer Zeit angesiedelt, da sie sehr zahlreich vorkommt. N. f. M.
- Nonnea pulla* (L.) D. C. Zwischen Langenweddingen und Egelh; Gr. Wanzleben; zwischen Kl. Wanzleben und den sauren Holze; Seehausen; Gr. Oschersleben Schneider.
- † *Echium plantagineum* L. Unter Serradella: Potsdam: Zehendorf!! (Vgl. S. 249 und 259) Sorau: (Zeipau) Starke!
- Pulmonaria officinalis* L. Oschersleben: Brandsleber und saure Holz; Amtsgarten von Schemke Schneider. Templin: Stempnitz F. Peck! Züllichau: Buchwald Hagedorn. Müncheberg: Eintrachshain Reichert.
- P. angustifolia* L. Küstrin: Reitwein b. der grossen Lehmgrube Gallus. Liebenau: Flusswerder im Packlitz-See Hagedorn. A. Müller.
- Lithospermum officinale* L. Küstrin: Zwischen Reitwein und Wuhden Gallus.
- Myosotis palustris* (L.) With. c.) *hirsuta* A. Br. Dahmeufer zw. Köpnick und Grünaue!!
- M. silvatica* (Ehrh.) Hoffm. Koswig: (Am jenseitigen Elbufer unweit der Fährstelle) Fick. Burg: Oberhagen bei Rogätz weissblühend Schneider. Neuhaldensleben: Papenberg 1862 M. Schulze!
- M. sparsiflora* Mik. Magdeburg: Biederitzer Busch weissblühend Schneider. Potsdam: Kirchhof verwildert P. Hinneberg! Frankfurt: Steile Wand 1862 A. Braun!! Küstrin: Reitwein Stenzel.
- Solanum nigrum* L. d.) *humile* Bernh. (als Art.) Potsdam: Werder; Ferch O. Reinhardt. Fürstenwalde: Buchholz Ritter. Schwiebus: Mühlbock; Birkholz; Schönfeld Golenz! Landsberg: Gärten der Armenhausstrasse am Wartheufer Gentz!
- S. villosum* (L.) Lmk. (Garz a. O. Seehaus.) b.) *alatum* Mch. (als Art) Krossen: Beim Grieseler Kalksee Golenz! Schwedt: (Schönow) Seehaus. Landsberg: Zantocher Vorstadt bei der Katholischen Kirche Gentz!
- † *Nicandra physaloides* (L.) Gaertn. (Dessau: Gr. Kühnau 1856 Fick.) Küstrin: Zechin Gallus.

- Hyoscyamus niger* L. b.) *agrestis* Kit. 2. *pallidus* Kit. (als Art.)
Burg: Unter Luzerne vor dem Zerbster Thor Deicke.
- † *Datura Tatula* L. Berlin: Seegerscher Holzplatz Bolle; Lietzower Wegstrasse Doms!!
- † *Schizanthus pinnatus* Ruiz u. Pavon. Müncheberg: Park von Trebnitz verw. Höfft!
- Verbascum Thapsus* L. Barby: Bei der Fährstelle; Grüneberger Forst; zwischen Lödderitz und dem Diebziger Busch Schneider.
Templin: Stempnitz F. Peck! Zw. Vetschau und Kotbus Graf Solms.
- V. thapsiforme* Schrad. Brandenburg: Neumühle weissblühend Schramm.
- V. nigrum* L. b.) *Alopecurus* Thuill. (als Art) Berlin: Buch Jahn!
- V. thapsiforme* × *nigrum*. Nauen: Kirchhof in Wernitz Grantzow!
Berlin: Dicht vor Weissensee westl. der Chaussee O. Reinhardt!!
Driesen: Sehls Grund Lasch. (S. S. 19.)
- V. thapsiforme* × *phoeniceum*. Rhinow: Lüttge Berg Schumann!
- V. phlomoides* × *Blattaria*. Dieser bisher noch nicht bekannte Bastard, dessen Beschreibung wir in Heft V. liefern werden, ist schon vor mehreren Jahren bei Grünwalde unweit Schönebeck von Schneider! beobachtet worden. N. f. M.
- Scrophularia alata* Gil. b.) *Neesii* Wirtg. (als Art.) Strausberg: Quelle am nordwestl. Ufer des Straussees Schweinfurth!!
- Antirrhinum Orontium* L. Gnadau: Döben Heuser a. a. O. Wittenberge: Zw. der Elbe und Gehstgottberg Brockmüller! Trebbin: Blankensee Frenzel!
- Linaria Elatine* L. Mill. Küstrin: Hathenow Jahn.
- L. arvensis* (L.) Desf. z. Th. (Aken: Chörau hinter dem Schulhause Rother.) Magdeburg: Zw. Vehlitz und Leitzkau Schneider.
Burg: Zwischen Mahlwinkel und Uchtdorf Schneider.
- L. minor* (L.) Desf. Oschersleben; Egelu Schneider. Schwiebus: Wiesenland am Wanzenluche; Mühlbock nach dem Czernoksee hin Golenz! Krossen: Krämersborner neue Mühle; beim Grieseler Kalksee Golenz. Küstrin: Hathenow Jahn. Gramzow: Blankenburg Kasner! Brüssow Krumbholz!
- † *Mimulus luteus* L. Krossen: An der Griesel vom Grieseler Dorfteich bis zu Vordermühle viel Golenz! Joachimsthal Buchholz!
- Limosella aquatica* L. (Elbufer oberhalb Aken Fick.) Triebel: Neisseufer bei Gr. Särchen Weise.
- Digitalis ambigua* Murr. Königs-Wusterhausen: Dubrow am Förstersee Bolle! Joachimsthal: Im Walde unweit Altenhof sehr zahlreich Petri!!

- Veronica montana* L. Neustadt-Eberswalde nach dem Zainhammer hin 1862 Seeger! N. f. B.
- V. prostrata* L. Strausberg: * Am Westufer des Straussees!! zw. dem Kesselsee und der Chaussee im Gahmengrunde!! am Mittel- und langen See bei Leuenberg!! Müncheberg: Stadtforst 1862!! * Liebenau Hagedorn.
- V. latifolia* L. Oschersleben: Am Brandsleber Holze Schneider. Libero: Alte Schloss im Stockshof Busch! Krossen: Kienberge; Südspitze der Krämersborner Mittelheide beim Kalkteich Golenz! Müncheberg: Vor Heinersdorf an der Chaussee 1862 Sander. * Mohrin 1860 Schädle.
- V. longifolia* L. Barby: Ronnei; Grüneberger; Lödderitzer Forst; Diebziger Busch Schneider. * Köpnick häufig Kasner. Züllichau: Tschicherzig am linken Oderufer Hagedorn! Krossen: Oderaue Golenz. Triebel: Nicolai. Fürstenberg am Oderdamm!! Küstrin: Von Tucheband bis zur Hattenower Mühle Jahn.
- V. praecox* All. Magdeburg: Olvenstedt; Schnarsleber Berge; Pfuhlmühle bei Gerwisch Schneider. Oschersleben: Neu Brandsleben Schneider. Kalbe: Wartenberge 1862 Rother!
- V. persica* Poir. * Sorau: Ober-Ullersdorf Starke! * Guben: Stadtparzellen Gallee!
- Pedicularis silvatica* L. Burg: Hungrige Wolf Schneider.
- Melampyrum cristatum* L. Barby: Diebziger Busch Schneider, Rother!
- M. arvense* L. Küstrin: Westlich von Tucheband häufig Jahn. * Gerswalde am Mühlbach F. Peck!
- Euphrasia Odontites* L. b.) *serotina* Lmk. (als Art). Oschersleben; zwischen Egelu und Hakeborn auf Aeckern Schneider!
- Orobanche pallidiflora* W. und Grab. b.) *Cirsii* Fr. (als Art). * (Pyritz: Stadtwiesen Meyer, Strübing, Seehaus! Vgl. S. 183).
- O. Bukiana* Koch b.) *Thalheimii* Aschs. Fl. der Prov. Brandenburg I. S. 498). Diese von der Hauptform durch weniger zahlreiche, lockerer stehende, mehr röthlich überlaufene Blüten, deren Oberlippe stets ausgerandet ist, abweichende Abart wurde von Thalheim auf den * Kaltenborner Bergen bei Guben! auf *Coronilla varia* L. gesammelt. Ich benenne sie nach dem um die Gubener Flora hochverdienten Entdecker, von dessen erfolgreicher Thätigkeit diese Blätter hinreichendes Zeugniß ablegen; es war mir vergönnt, im vorigen Sommer unter seiner freundlichen Führung einen Blick in diese so reichhaltige Flora zu thun. — Diese Form verhält sich zur Art wie *O. Cirsii* Fr. zu *O. pallidiflora* W. u. Grab.; wer erstere als Art ansieht, mag auch unsere Pflanze dafür halten. Die Stammform wurde in

verflossenen Sommer an dem *Frankfurter Standorte von Paal-
zow wieder angetroffen u. am 10 Juni 1862 daselbst beobachtet!!
Phelipaea arenaria (Borkh.) Walp. Rathenow: Kirchhof vor 1820
v. Gansauge!

P. ramosa (L.) C. A. Mey. * Beelitz: Elsholz unter Hanf J.
Krumbholz!

Lathraea Squamaria L. * Lübben: Unter-Spreewald Fick. * Buch-
wald bei Züllichau Hagedorn * Krossen: Grieselthal Golenz!
* Triebel: Kemnitz Nicolai. Liebenau: Haseldamm Golenz.

† *Elssholzia Patrinii* (Lepechin) Gke * Arnswalde Lüdicke.

Mentha silvestris L. a.) *nemorosa* Willd. (als Art.) * Templin:
Unterfährsee F. Peck! * Schwiebus: Am Gr. Nieschlitz See auf
der Birkholzer Seite und in Seelägen Golenz! Küstrin: Kirch-
hof von Rathstock häufig Jahn. † b.) *lanceolata* Rehb. fil. L.
2. *viridis* L. (als Art) * Neuzelle: Schlabener Mühle Gallee!

M. Pulegium L. (* Aken: Am Lorf Fick.)

Origanum vulgare L. * Züllichau: (Oderwald) Hagedorn. * Krossen:
Kollätschteiche bei Griesel; Südspitze der Krämersborner Mittel-
heide Golenz! * Arnswalde: Wall; (Schönwerder) Warnstorf!

† *Hyssopus officinalis* L. * Arnswalde: Eisenbahndamm beim er-
sten Wärterhäuschen nach Dölitz hin Warnstorf!

† *Salvia officinalis* L. Buckow: Bollersdorf an Pfühlen an der
Südseite 1862 O. Reinhardt! N. f. B.

Lamium maculatum L. Magdeburg: Zw. Gübs und Wahlitz; Bie-
deritzer Busch Schneider. Luckenwalde: Schönefelder Busch zw.
Schmelze u. Schneidemühle 1862 Bolle! * Lübben: Hain Fick.
* Krossen: Krämersborn; Quellteich und Kollätschteiche bei Griesel
Golenz! * Küstrin: An der Oder zw. Neu-Bleien und dem Burst
H. Schulze II. b.) *lacteum* Wallr. * Barby: Rosenburger Busch
Rother! * Wrietzen: Zw. Vevai und Schulzendorf F. Reinhardt.

L. Galeobdolum (L.) Crtz. * Magdeburg: Zw. Pretzin und Ranics
Banse! * Templin: Kirchen- und Buchheide; Stempnitz F. Peck!
* Krossen: Grieselthal Golenz! * Sorau; Park von Ober-Ullersdorf
Starke! * Triebel: Kemnitz Nicolai; Gatka Weise. * Biesen-
thal: Liepnitzsee nördl.!! * Gleissen Gentz!

Galeopsis Ladanum L. c.) *angustifolia* Ehrh. (als Art.) Kalbe:
Wartenberge Rother!

G. pubescens Bess. * Templin: Bürgergarten F. Peck! * Berlin:
Seegerscher Holzplatz Bolle! * Guben: Ullrichs Garten!! Grüne-
wald Thalheim. Küstrin: Gorgast; Tucheband Jahn. * Wrietzen:
Prötzel Schweinfurth.

- Stachys germanica* L. * Oschersleben: Heteborn an der Chaussee Deicke. Bernburg: Gramsdorf Schneider.
- S. silvatica* × *palustris*. Golssen: Grosser Teich 1862 Graf Solms! Baruth: Zw. Neuhof und Forsthaus Wunder 1862 Bolle!
- S. arvensis* L. (Zwischen Aken und Chörau Rother.) Barby: Zw. der Grüneberger Forst und Gödnitz Schneider. * Beeskow: Glienicke C. Schultze!
- S. annua* L. * Guben: Kirchhof Gallee! * Liebenau: Jenseitiges Ufer des Gastsees beim Weinberg Hagedorn!
- Chaeturus Marrubiastrum* (L.) Rehb. * Triebel Nicolai. Küstrin: Gorgast Jahn.
- † *Sideritis montana* L. * Magdeburg: Zenser Berge früher einmal Rother! jedenfalls mit fremder Saat eingeschleppt.
- Melittis Melissophyllum* L. * Schwiebus: Raubschloss in der Stadforst Golenz! * Driesen: Steinspring Herrmann, Weise!
- Scutellaria hastifolia* L. Fürstenwalde: Spreewiesen bei Wulkow viel 1862 F. Reinhardt! * Köpnick: Schönweide Kasner! am Wege nach Friedrichshagen bei der zweiten Brücke Tietz!
- Brunella grandiflora* Jacq. Frankf.: Tzschetzschnow. Mühlenthal 1862!! Küstrin: Reitwein; Bahnhof Podelzig Jahn.) * Schwedt: Neue Mühle am linken Welseufer Seehaus. * Arnswalde: Abhang vor dem Werder; Weg nach Sandow Warnstorf!
- Utricularia intermedia* Hayne. * Schwiebus: Blankenseer grosse Luch Golenz! * Arnswalde: Stadtziegelei Warnstorf!
- U. minor* L. * Strausberg: Sumpf nördlich vom Kesselsee Schweinfurth!! * Schwiebus: Blankenseer grosse Luch Golenz! * Sorau: Mittelteich bei Ober-Ullersdorf Starke.
- Litorella uniflora* L.) Aesch. (Flora der Provinz Brandenb. I. S. 544, *Plantago uniflora* (L. sp. 1753, *Litorella lacustris* L. mant. 1771) * Teupitz: Westl. Ufer des hölzernen Sees; Schmolte Bolle!
- Plantago maritima* L. * Gnadau: Pflingstanger Heuser.
- Anagallis arvensis* L. b.) *coerulea* Schreb. (als Art) Egel: Hakeborn Schneider. * Drebkau: Schorbus Lehmann! * Triebel: Apothekengarten einmal; hinter Teupitz? Nicolai.
- Trientalis europaea* L. * Sorau: A. d. Lubst b. Mildenau häuf. Finger.
- † *Lysimachia punctata* L. * Templin: Plessensruh F. Peck! * Köpnick: Kirchhof Frenzel! N. f. B.
- Glaux maritima* L. * Gnadau: Döben Heuser a. a. O. An der Saar bei Gr. Wanzleben 1862 Schneider.
- Samolus Valerandi* L. * Gnadau: Döben Heuser a. a. O.
- Androsaces septentrionale* L. Krossen: Krämersborner Mittelheide am Kalkteich 1862 Golenz!

- Amarantus retroflexus* L. • Kalbe: Wartenberge Rother. * Fürstenwalde: Buchholz Ritter. Kersdorf; Briesen Golenz. * Köpnick: Seminarpark 1859 Kasner; nach Grünaue hin bei der Windmühle Kasner!! * Züllichau: Neue Welt; Mohsau; Trebschen Hagedorn. * Fürstenberg!! * Landsberg: Concordienkirchhof (1860) Gentz!
- Salsola Kali* L. Fürstenwalde beim Bahnhof 1862 v. Uechtritz!!
- Chenopodium polyspermum* L. (* Dessau: Georgium; Möst Fick.) * Nauen: Wernitz Grantzow! * Fürstenwalde: Buchholz Ritter. * Berlin: Zw. dem Buschkrug und Ober-Rixdorf Reymann!! * Wrietzen: Prötzel Schweinfurth. * Arnswalde Warnstorf!
- C. urbicum* L. * Luckenwalde: Jaenickendorf Bolle. * Mittenwalde Bolle. * Guben: Kaltenborn!! * Neuzelle: Lawitzer Thal Gallee! Joachimsthal: Altenhof Graf Solms!! * Arnswalde: Raduhn Warnstorf!
- C. opulifolium* Schrad. * Brandenburg: Stadtmauer, der Insel gegenüber Schramm. * Guben: Promenade nördlich der Stadt Thalheim!!
- C. ficifolium* L. Berlin: Boxhagen v. Uechtritz.
- † *C. foliosum* (Mnch). Aschs. (Flora d. Prov. Brandenb. I. S. 572. *Blitum virgatum* L., *Morocarpus foliosus* Mnch.) * Guben: Dorfstrasse in Germersdorf Thalheim! * Arnswalde: Klücken beim Schulhause!
- Atriplex hortense* L. a.) *nitens* Schk. (als Art.) * Magdeburg: Steinbruch vor dem Kröckenthore Rother. * Züllichau: Alte Kirchhof Hagedorn!
- Rumex sanguineus* L. Barby: Grüneberger Forst; Diebziger Busch Schneider. *(Grabow: Beckentiner Horst Madauss!)
- R. aquaticus* L. Bernburg: Ilberstedt a. d. Wipper Schneider.
- Polygonum mite* Schrk. Barby: Grüneberger Forst Schneider. * Potsdam: Neue Garten schon 1860 O. Reinhardt! Diese Art wird von Dietrich ohne näheren Standort bei Berlin angegeben, welche Notiz ich in meiner Flora, 2. Abthl. übergehen zu müssen glaubte, weil ich sie durch keinen speciellen Fund belegen konnte.
- Daphne Mezereum* L. * Koswig: Zw. Grochwitz und Weiden Preussing!
- Thesium intermedium* Schrad. * Nauen: Graben neben der Chaussee unweit des Wernitzer Einnehmershauses Grantzow!! * Königsberg: Nordhausen 1860 Schäde. Liebenau: Kalk- und Flusswerder im Packlitzsee 1862 Golenz!
- T. alpinum* L. * Genthin: Zw. der Ziegelei und Redekien; zw. Redekien und Jerichow der Amtsbreite gegenüber Wohlfarth.

Bei Genthin zuerst in unserem Gebiet von Schiede gefunden, (Königl. Herbar!) dessen näherer Standort aber nicht bekannt geworden ist.

Tithymalus platyphyllus (L.) Scop. Barby: Kl. Rosenburg an Gräben Rother! Stassfurt: Am Gänsefurter Busch Schneider.

T. dulcis Scop. * Oscherleben: Amtsgarten in Schermke Banse!

T. paluster (L.) Kl. und Gke. * Küstrin: Golzow; Gorgast; Tucheband Jahu.

T. salicifolius (Host.) Kl. und Gke. erw. a.) *lucidus* (W. K.) Kl. und Gke. (als Art, *Euphorbia salicifolia* Host 1797,, *E. lucida* W. K. 1802). * Züllichau: Oderdamm bei Glauchow; bei der Schanzbrücke; Oderufer bei Tschieherzig Hagedorn! * Guben: Oderdamm bei Niemaschkleba Thalheim!

T. Cyparissias × **salicifolius**. * Neuzelle: Schiedlow Gallee!

Mercurialis perennis L. Luckenwalde: Schönefelder Busch zw. Schmelze u. Schneidemühle 1862 Bolle. Schwiebus: Johannisthal; Buchenwald bei Kl. Dammer 1862 Golenz! * Krossen: Kolonie Friedrichswalde Drescher! * Arnswalde: Klücken; (Schönwerder; Sandow) Warnstorf! Liebenau: Haseldamm 1862 A. Müller.

M. annua L. * Züllichau: Garten des Gasthofs zu den vier Linden; bei Wachners Garten Hagedorn. * Schwiebus: Bei Friebels Garten Golenz! Müncheberg: Hasenfelde Reichert.

Salix pentandra L. * Liberose: Wiesen bei der Fasanerie Busch. * Beeskow: Lindenberg-Glienicker Grenze C. Schultze! * Arnswalde: Stavin-See: (Schönwerder) Warnstorf!

S. cinerea × **aurita** (nach Bauers Bestimmung.) * Guben: Wiese am Klosterbusch Thalheim!!

S. purpurea × *cinerea*. * Berlin: Treptow früher Bauer! * Arnswalde: Kohlhof Warnstorf!

S. purpurea × **aurita**. * Fürstenwalde 1860 Strehlow! (von Bauer mitgeteilt) N. f. B.

† *S. hippophaefolia* Thuill. * Arnswalde: Kohlhof am Wege nach Cassners Windmühle Warnstorf!

S. aurita × *repens*. * Fürstenwalde Strehlow! 1860 * Liebenau: Am Pinnsee 1862 Golenz!

Populus nigra L. * Spandau: Sandwerder, anscheinend völlig wild Bolle. (Vgl. Heft II. S. 134.)

Echinodorus natans (L.) Englm. * Fürstenwalde Strehlow 1860!

Scheuchzeria palustris L. * Strausberg: Nördl. vom Ilandsee Schweinfurth! * Köpnick Teufelssee!! * Neustadt-Eberswalde: Plage-Fenn Ilse. Liebenau: * Pinnsee Hagedorn; Starpeler Wanzenluch 1862 Golenz!

- Triglochin maritima* L. Liebenau: Neudörfel-Wiesen nach dem Dietrichsee zu 1862 Golenz!
- Potamogeton polygonifolius* Pourr. (*oblongus* Viv.) * Neustadt-Eberswalde Ilse! N. f. B.
- P. fluitans* Rth. Bei * Oscherleben kommt, wie ich mich nach wiederholter Untersuchung der Schneiderschen Exemplare überzeugte, nur die typische Form dieser Art vor, nicht *P. spathulatus* Schrad. Dagegen gehören die unter den Namen *P. fluitans* in der 3. Abtheilung meiner Flora, S. 103 aufgeführten Exemplare vom Butterdamm bei Zerbst zu *P. alpinus* Balb.
- P. alpinus* Balb. (* Dessau: Taube unweit der Chaussee nach Quellendorf Fick.) * Potsdam: Kaputer Fliess Bolle!
- P. gramineus* L. Frankfurt: Zwischen Georgenthal und Arensdorf v. Uechtritz! Neustadt: * Teufelssee Buchholz. Grimnitzsee Graf Solms!! * Arnswalde: Gleser-See bei Hohenwalde Warnstorf!
- P. praelongus* Wulf. * Potsdam: Kaputer See Bolle!
- P. compressus* L. * Potsdam: Kaputer Fliess Bolle! * Köpnick: Wernsdorfer See!! * Berlin: Kanal vor der Jungfernheide Bolle!
* Neustadt-Eberswalde: Graben beim Kupferhammer Ilse!
- P. obtusifolius* M. und K. * Oderberg: Alte Oder Ilse!
- P. mucronatus* Schrd. * Neustadt-Eberswalde: Graben beim Kupferhammer Ilse! Werbellinsee 1862!!
- P. marinus* L. * Teupitz: Hölzerne See Bolle! N. f. B.
- Zannichellia palustris* L. * Burg: Schartauer See Deicke. * Nauen: Wernitzer Viehtränke Grantzow! * Fürstenwalde: Buchholz im Dorfteich Ritter! * Köpnik: Müggelsee an der Südseite Jahn!
* Küstrin: Wuhden in einem Teich Jahn!
- Arum maculatum* L. Oscherleben: Amtsgarten in Schermke Schneider.
- Sparganium minimum* Fr. * Templin: Graben im kl. Arensdorfer Bruch F. Peck! * Nauen: Dechtower Heide H. Schulze I!
* Strausberg: Nördl. vom Ilandsee Schweinfurth! * Neustadt-Eberswalde: Plage Fenn Ilse. Arnswalde Warnstorf!
- Orchis Rivini* Gouan. * Nauen: Chausseeegraben nach Wustermark (Diluvium!) Grantzow! * Beclitz: Elsholz P. Hinneberg. Berlin: * Jungfernheide beim Pfefferluch Bolle. Rosenthal Jahn!
- O. ustulata* L. * Königsberg: Nordhausen Schäde jun.
- O. coriophora* L. * Burg: Zwischen Mahlwinkel und Tangerhütte; Väthen Schneider! * Beclitz: Elsholz P. Hinneberg. * Zilenzig: Beim Judenkirchhof Bohna. Liebenau: Neudörfel-Wiesen nach Möstchen zu A. Müller.
- O. laxiflora* Lmk. * Rathenow: Gegend von Seelensdorf Legeler;

- Nennhausen. Oenicke. * Brandenburg: Gr. Wusterwitz Schramm.
Hermínium Monorchis (L.) R. Br. * Liebenau: Neudörfel-Wiesen
 nach Möstchen hin A. Müller.
- Cephalanthera rubra* (L.) Rich. * Lychen: Buchheide F. Peck.
 * Mittenwalde: Zw. Glasow und Jühnsdorf nahe der krummen
 Lanke Bolle!! — * Schwiebus: Stadtheide am Wanzenluche und
 schwarzen Winkel; Mühlbocker Kirchenheide sparsam; Sawischer
 Heide Golenz! * Küstrin: Forsthaus H. Schulze II!
- Neottia Nidus avis* (L.) Rich. * Potsdam: Wildpark 1862 O. Reinhardt.
 * Züllichau: Buchwald Hagedorn. * Schwiebus: Stadtheide am
 Wanzenluch sparsam Golenz! * Reppen Stelzner! * Biesenthal:
 Nördl. am Liepnitzesee Schweinfurth!!
- Goodyera repens* (L.) R. Br. * Schwiebus: Sawischer Hinterheide
 Golenz!
- Liparis Loeselii* (L.) Rich. * Liberose: Wiese am Eichgarten Busch!
 * Strausberg: Torfsumpf nördl. vom Kesselsee Schweinfurth!!
 * Schwiebus: Läsger Wanzenluche 1861; Keilwiese am Eichberge
 1862; Golenz. * Krossen: Torfstiche bei Sorge und Pfeifferhahn
 Drescher. * Frankfurt: Georgethal unweit der Chaussee 1862
 Graf Solms!! * Angermünde: Krussow Seehaus!
- † *Iris pumila* L. * Bernburg: Lehmmauern in Pobzig und Ilberstedt
 verwildert.
- I. sibirica* L. * Stassfurt: Rathmannsdorf Hornung. Gänsefurt Rother!
 † *Narcissus Pseudonarcissus* L. * Auf einer Wiese im Klostergar-
 ten bei Hadmersleben 1861 Schuster.
- Leucoium vernalis* L. * Neuhaldensleben: Bischofswalde Frl. v. Na-
 thusius. * Guben: Döbern Thalheim.
- Polygonatum officinale* All. * Lübben: Jenseit der Hartmannsdorfer
 Berge Fick. * Strausberg: Convallarienberg Frau Roellig! (dort
 wird diese Pflanze „Convallarie“ genannt, während *Convallaria*
majalis L. wie überall bei uns Maiblume heisst.) Chausseegraben
 beim Gahmensee!! * Triebel: Särchen Nicolai. * Küstrin:
 Reitwein unweit der Lehmgrube Gallus. * Liebenau: Quell-
 mühle Hagedorn! Flusswerder im Packlitzsee 1862 Golenz!
- † *Tulipa silvestris* L. * Berlin: Thiergarten beim Försterhause 1859
 W. Müller!
- Lilium Martagon* L. * Oschersleben: Amtsgarten in Schemke
 Schneider. * Frankfurt: Südlich der Steilen Wand O. Reinhardt.
- Ornithogalum umbellatum* L. * Jerichow: Auf der Brack Wohlfarth.
 * Drebkau: Schorbus hinter dem Schloss Lehmann. * Berlin:
 Monbijou!! * Züllichau: Kadachs Garten Hagedorn * Landsberg:
 Gr. Kirchhof Gentz!

- † *O. nutans* L. * Potsdam: Petzower Park Bolle.
- † *Scilla amoena* L. * Nauen: Unweit des Bredower Forsthauses einzeln Barnewitz!
- Gagea saxatilis* Koch. * Oschersleben: Alter Steinbruch am sauern Holze 1862 Schneider. * Küstrin: Zw. Reitwein und Klessin, wahrscheinlich in der Gegend von Wuhden, nur ein Expl. Mitte Apr. (Ausgang der Blüthezeit) von Gallus und O. Reinhardt! gefunden. Wir machen die Botaniker der Gegend auf diesen wichtigen Fund, der vielleicht weitere veranlasst, aufmerksam.
- G. silvatica* (Pers.) Loud. * Templin: Weg nach der Ziegelei am Kanal F. Peck! * Nauen: Wernitz; Bredower Forst Grantzow. * Liberose: Alte Schloss im Stockshof Busch! * Guben: Schiesshausgarten Thalheim! * Gramzow: Pfarrgarten in Blankenburg Kasner!
- Allium acutangulum* Schrad. * Barby: Bruchwiesen bei Diebzig Schneider. * Chausseeegraben zw. Langenweddingen und Egelu Schneider. * Züllichau: Beim Bernhardischem Gute sparsam; Oderufer bei Tschicherzig Hagedorn! * Krossen: Oderaue häufig Golenz! * Neuzelle: Ratzdorf Weise.
- A. fallax* (Don.) Schult. (* Grabow: Bei der Bäckerlache Madauss! in Boll's Archiv Heft 7. wahrscheinlich als *A. acutangulum* aufgeführt.) * Neustadt: Zw. Brunnen und Schützenhaus Buchholz.
- A. scorodoprasum* L. * Stassfurt: Am Gänsefurter Busch Schneider. * Bernburg: Kalkberge; Krumbholz Schneider.
- A. schoenoprasum* L. * Barby: Ronnei nach der Grüneberger Forst hin Schneider; Tochheim mit *Biscutella* (Diluv.) Rother! * Jerichow: Auf der Brack Wohlfahrt; Ferchland 1860 Schramm.
- † *Muscari racemosum* (L.) Mill. * Potsdam im Petzower Park Bolle.
- Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb. * Schwiebus: Wiesen zw. Möstchen und Neudörfel südl. am Dietrich-See A. Müller.
- Juncus effusus* × *glauca*. * Kriensse bei Rüdersdorf Lackowitz! N. f. B.
- J. filiformis* L. * Fürstenwalde: Spreenhagen 1862 F. Reinhardt! * Sorau: Ober-Ullersdorf im Frauen- und Gerichtsteich, Torfwiesen, Schlund-Wiese etc. Starke!
- J. obtusiflorus* Ehrh. * Neuhaldensleben: Moosbruch Schneider.
- J. gerardi* Loisl. * Gnadau: Döben Heuser a. a. O. Berlin: Falkenberg 1862 Jahn.
- J. ranarius Perrier und Songeon.** * Nauen: Salzstellen bei Zeestow!! und am Dechtower Damm!! Mangelshorst, auch an feuchten, salzhaltigen Rübenäckern H. Schulze I! Diese zuerst an Salz-

stellen der Landschaft Tarentaise (Dep. Savoie) bemerkte Form unterscheidet sich von dem allerdings sehr ähnlichen *J. bufonius* L. ebenso wie *J. Tenagea* Ehrh. von *J. sphaerocarpus* Nees. die äusseren Perigonblätter sind so lang oder wenig länger, die inneren etwas kürzer als die reife Kapsel; bei *J. buf.* sind alle beträchtlich länger als die Kapsel. Ohne Zweifel wird diese Form, welche ich schon ehe dieselbe publicirt wurde, bei Salzkotten in Westphalen, Prof. Braun 1861 bei Heringsdorf sammelte, an allen unseren Salzstellen vorkommen. Ich glaube Reichenbachs Abbildung (Icon. fl. germ. cent. IX. fig. 881. (tab. CCCXCVI), ein Exemplar aus Sicilien darstellend, auf eine fasciculirte Form des *J. ranarius* beziehen zu dürfen.

† *Luzula angustifolia* (Wulf.) Gke. *Berlin: Schönhauser Park Jahn!
***L. sudetica* (Willd.) Presl. a.) *pallescens* (Wahlenb.) Bess. (als Art¹)**
 * Rhinow: Prietzen am Graben nach Wolsier Paaizow! * Beeskow: Glienicke: Kienen am faulen Pfuhl C. Schultze! von den Brüdern v. Klinggräff in meinem Herbar als solche erkannt. * Berlin: Weissensee an der Oranke v. Jasmund!! Tempelhof) v. Schlechtendal! (vgl. S. 222); an einem Waldsumpf, südl. von

1) *Juncus sudeticus* Willd. (1799) ist nach in seinem Herbar befindlichen, von Franz Wilibald Schmidt gesammelten Exemplaren mit der von Celakowsky (vgl. S. 222) beschriebenen *Luzula nigricans* Pohl identisch, und muss nach den Prioritätsregeln dieser Willdenowsche Name vor angestellt werden (Willdenow hatte die Pflanze bereits in seinem Herbar *Luzula sudetica* genannt, welcher Name indess erst 1819 durch die Brüder Presl in ihrer Flora Cechica für dieselbe Pflanze aufgestellt wurde. Ich kann in letzterer nur eine dunkel gefärbte Gebirgsform unserer *L. pallescens* sehen, welche immerhin als b.) *nigricans* Pohl. (als Art) bezeichnet werden mag. Bemerkte mag hier noch werden, dass *L. pallescens* (Wahlenb.) Bess. sich auch im Willdenowschen Herbar No. 6835 Fol 4 unter dem Namen *L. pallescens* befindet, unter welchem sich indess auch mehrere Expl. der *Luzula campestris* b.) *multiflora* Lej. (als Art) 2. *pallescens* Hoppe. (als Art), vorfinden. Diese mithin von Willdenow noch nicht unterschiedene *L. pallescens* (Wahlb.) Bess. ist von ihm ohne Zweifel bei Berlin gesammelt worden. Als weitere noch nicht bekannte Standorte derselben nenne ich: Dresden (Groh in Herb. Bauer!) und Pirna (Bauer!) ferner sah ich Expl. aus der Flora von Petersburg, wo bereits Ruprecht (Diatribe p. 55) dieselbe als eine Varietät, welche „*jacile species propria*“ sein könne, anführt, von Körnicke auf der Kreuzinsel (Krestowskij Ostrow) und bei Pargola gesammelt. Ueber die richtigen Bestimmung der preussischen S. 190 und 193 erwähnten Pflanze kann nach den jetzt bekannten Thatsachen wohl kein Zweifel mehr obwalten.

Lichtenrade 1860 Bolle! vor Treptow 1862. Jahn! Nach freundlicher Mittheilung von Prof. v. Schlechtendal befindet sich unter den von Weihe herausgegebenen Gräsern ein Exemplar von * Kunersdorf bei Wrietzen jedenfalls von Walter gesammelt. * Müncheberg: Stadforst, besonders im faulen Seeluch!! Ohne Zweifel wenigstens im östl. Gebiet noch an zahlreichen Standorten zu finden. Die Westgrenze dieser Art geht schwerlich weit über unser Gebiet hinaus; die Nachforschungen im westl. Gebiet würden daher pflanzengeographisch von grösstem Interesse sein. N. f. B.

Cladium Mariscus (L.) R. Br. * Neustadt-Eberswalde: Wiesen beim Stadtsee; See südlich der Weitlage Ilse.

Rhynchospora alba (L.) Vahl. * Spandau: Pechsee Bolle * Templin: Grosse Torfmoor F. Peck! * Liberose: Teufelslaug; Meierei Busch! * Schwiebus: Galinenluch; Birkholzer Fabrik Golenz! * Sorau: Albrechtsdorf; Mildenaу Starke.

R. fusca (L.) R. und Sch. * Fürstenwalde: Spreenhagen 1862 F. Reinhardt! Storkow: * In einem kleinen Sumpf südl. vom Kollberge Bolle! * Sorau: Lehmteich bei Nieder-Ullersdorf Starke! N. f. B. (Die Ruthesche Angabe am Wannsee bei Potsdam bezieht sich ohne Zweifel auf die vorige Art.)

Scirpus pauciflorus Lightf. Nauen: Bei der Salzstelle am Dechto- wer Damm!! * Strausberg: Nördlich vom Kesselsee Schwein- furth!! * Schwiebus: Blankenseer grosse Luch; Läsger Wiesen beim Eichberge; Birkholzer grosse Luch Golenz! * Liebenau: Kalkwerder des Packlitzsees 1862 Golenz.

S. Tabernaemontani Gmel. * Gräben bei Stassfurt und Hecklingen Schneider. * Potsdam: Teltower See Bolle. * Trebbin: Am Glauer Dämmchen Lackowitz! * Köpnick: Kalksee beim Forst- hause Ritter. * Wrietzen: Möglin 1860 Schädle!

S. Holoschoenus L. * Magdeburg: Kiefernwald bei Pöthen Schneider.

S. silvaticus × *radicans* (S. S. 236.) * Guben: Neisseufer oberhalb der Eisenbahnbrücke mit den Eltern von Thalheim! schon 1861 bemerkt, 1862 ziemlich zahlreich gesammelt.

Eriophorum gracile Koch. * Strausberg: In einem kleinen Sumpf westl. am See!! nordwestl. vom Bauersee bei Wilkendorf Schwein- furth! * Schwiebus: Blankenseer grosse Luch 1861; Kupper- winkel und Mühlbock 1862 Golenz! * Neustadt-Eberswalde: Nordrand des Plage Fenns Ilse. * Joachimsthal: Grinnnitzsee!!

Carex dioeca L. * Liberose Busch! * Strausberg: Luch nördlich vom Strausse!! nordwestlich vom Bauersee bei Wilkendorf Schweinfurth! nördlich vom Kesselsee Schweinfurth!! * Schwie-

- bus: Blankenseer grosse Luch; Keilwiese; Schönfelder Wiesen an dem Mühlbock Golenz! * Frankfurt: Georgenthal unweit der Chaussee 1862 Graf Solms!! * Biesenthal: Beim Forsthaus Liepnitz Schweinfurth!! Prenden zwischen dem Bauer- und Mittelprenden-See!! * Arnswalde: Hinter Cassners Windmühle sparsam; Stavinsee viel Warnstorf! * Prenzlau: Tiesort Seel! * Liebenau: Kessel-See; Flusswerder im Packlitz 1862 Golenz.
- C. pulicaris* L. * Rathenow: Semlin Legeler.
- C. diandra* Rth. (1788, *C. teretiuscula* Good. 1794) * Mittenwalde: Lange Luch bei Glasow Bolle. * Strausberg: Luch nördlich am Straussee!! in einem kleinen Sumpf westl. vom Bauersee bei Wilkendorf Schweinfurth. * Frankfurt: Georgenthal unweit der Chaussee!! * Buckow!! * Arnswalde: Petermanns Wiese; Stavinsee Warnstorf! * Landsberg: Heinersdorf Gentz!
- C. paradoxa* Willd. * Spandau: Pechsee Bolle. Lieberose: Stockshof Busch! * Fürstenwalde: Trebus am See 1862 v. Uechtritz. * Strausberg: Luch nördlich am Straussee!! nördlich vom Kesselsee Schweinfurth!! * Schwiebus: Wanzenluch in der Stadtforst 1862 Golenz! * Müncheberg: Faule Seeluch v. Uechtritz!! * Arnswalde: Schulzendorf; links vom Wege nach Stargard sparsam Warnstorf!
- C. brizoides* L. * Lenzen: Oberholzschonung Brochmüller!
- C. caespitosa* L. * Köpnick: Wiesen bei Glienicke!! * Arnswalde: Wiesen beim Kinderwerder unweit Schulzendorf Warnstorf!
- C. Buckii** Wimm. * Barby: Elbufer oberhalb Breitenhagen (schon 1860) Rother! Gewiss auch im übrigen Gebiet zu finden. N. f. M.
- C. limosa* L. * Strausberg: Nordwestlich vom Bauersee bei Wilkendorf Schweinfurth! * Köpnick: Teufelssee!! * Schwiebus: Galinenluch; Blankenseer grosse Luch; Läsger Wanzenluch Golenz! * Nenstadt-Eberswalde: Nordrand des Plage-Fenns Ilse.
- C. obtusata* Lilj. Der von Reichenbach und Garcke (S. dies Heft S. 157) vorgenommenen Vereinigung dieser Art, als abweichender Form mit dem durch unsere *C. supina* Wahlenb. vertretenen Typus stimme ich um so lieber bei, als auch bei mir durch die völlige Uebereinstimmung der vegetativen Organe der Leipziger und der Früchte der schwedischen Pflanze mit der *C. supina* diese Ansicht einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit schon vor mehreren Jahren gewonnen hatte. Garcke's Mittheilung, dass er öfter unter *C. supina* einzelne Exemplare mit einfachem Blütenstande bemerkt habe, veranlasste mich zu einer Durchmusterung meiner märkischen Exemplare, und in der That fand ich ein Exemplar bei * Potsdam auf dem Drachenberge im Mai

1855 von Boss gesammelt, das seinen Merkmalen nach nicht von *C. obtusata* b.) **spicata** Schk. (als Art) getrennt werden kann. Beide Halme desselben tragen nur eine, unten weibliche, oben männliche Aehre. An den meisten Lokalitäten mögen solche Exemplare sehr selten sein. Am 13 Apr. 1862 gelang es mir auf *Pichelswerder bei Spandau unter unzähligen Exemplaren der normalen Pflanze nur eins mit einer unten weiblichen, oben männlichen Aehre zu finden; dagegen waren Exemplare ohne ausgebildete weibliche Aehre, mit einer nur männlichen Gipfelähre, nicht allzuseiten. Allerdings ist die Identität mit gut entwickelten Exemplaren der Leipziger Pflanze insofern nicht vollständig, als letztere gewöhnlich eine viel grössere Anzahl von Blüthen zeigt; unsere Exemplare sind offenbar eine zufällige, die Leipziger und ölandische Pflanze eine typische Abweichung von *C. supina*. Einen weiteren Unterschied finde ich noch in der Farbe der Blüthentragblätter, die bei der Leipziger Pflanze nicht so lebhaft rothbraun, mehr einen Stich ins Gelbliche zeigt; doch ist darauf gewiss nichts zu geben, da der Unterschied lange nicht so gross ist als z. B. zwischen *C. leporina* L. und *argyroglochin* Horn. Noch weniger stichhaltig ist, wie Reichenbach mit Recht bemerkt, die Gestalt dieser Blätter. Beim Typus (*C. supina* Wahlenb.) läuft der Nerv der unteren Tragb. gewöhnlich in eine Stachelspitze aus, während bei der Leipziger Pflanze oft auch die untersten ganz stumpf sind. Doch findet man nicht selten auch stachelspitzige, ja zuweilen unter der Aehre ein lineales Hochblatt, gleichsam als Tragblatt einer nicht vorhandenen Seitenähre. Es wäre von der grössten Wichtigkeit, wenn an der Leipziger Pflanze das wirkliche Vorkommen einer solchen beobachtet würde; alsdann würde die letzte Lücke in der Reihe der Uebergangsformen ausgefüllt. — Neuer Standort der typischen Form *C. obtusata* Lilj. a.) *supina* Wahlenb. (als Art.)
* Küstrin: Reitwein Gallus und O. Reinhardt.

- C. tomentosa* L. * Barby: Rosenburg im Seegarten Rother! * Nauen: Lindholz Lackowitz und H. Schulze I.!
- C. montana* L. * Nauen: Ribbecksche Heide C. Bouché sen. * Arnswalde: Schulzendorf im Kinderwerder Warnstorf!
- C. humilis* Leyss. * Oschersleben: Emmeringer Steinbruch Schneider. * Küstrin: Reitwein Gallus und O. Reinhardt. * Müncheberg: Stadtforst an der Chaussee 1862!!
- C. digitata* L. * Neuhaldensleben: Hagen M. Schulze! * Züllichau: Buchenwald bei Padligar 1862 Golenz. * Schwiebus: Raubschloss in der Stadtforst 1861; Eichberg am Gr. Nieschlit See 1862

- Golenz. * Krossen: Grieselthal am Rande der Kollätschteiche; Höllenschlucht, schwarzer Teich 1862 Golenz. * Biesenthal: Hellmühle!! Lanke im Park!! und am Obersee Schweinfurth!! sehr häufig um den Liepnitzsee!! * Arnswalde: Klückener See und Buchwald; (Schönwerdersche Ziegelei) Warnstorf!
- C. fulva* Good. * Berlin: Zwischen Friedrichsfelde und den Fuchsbergen 1862 v. Uechtritz!
- C. silvatica* Huds. * Stassfurt: Gänsefurter Busch Schneider. * Liberose: Alte Schloss im Stockshof Busch! * Liebenau: Haseldamm 1862 Golenz.
- C. nutans* Host. * Burg: Deichwall Schneider.
- C. filiformis* L. * Nauen: Meisterkoppel bei Königshorst H. Schulze I! * Königs-Wusterhausen: Korbiskrug; am Fusse des Kollberges Bolle. * Schwiebus: Läsger Wanzenluche Golenz! * Müncheberg: Faule Seeluch 1862 v. Uechtritz!! * Wrietzen: Nordwestlich von Prötzel 1862 O. Reinhardt! * Neustadt-Eberswalde: Nordrand des Plage-Penns Ilse. * Arnswalde: Hinter der Stadtziegl. Warnstorf! * Liebenau: Starpeler Wanzenluch 1862 Golenz.
- † *Panicum capillare* L. * Potsdam: Vor dem Nauener Thor in der Nähe eines Gartens verw. Milke! Dies Gras, sowie *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., *Avena elegans* (Gaud.) Aschs. u. *Briza minor* L. war dort jedenfalls zu Trockenbouquets kultivirt worden.
- Hierochloa odorata* (L.) Wahlenb. * Nauen: Zw. Mangelshorst und dem Lindholz Lackowitz!
- Oryza clandestina* (Web.) A. Br. * Rheinsberg: Spring bei Schultzenstein; Reiherholz am Sabin-See Prof. Schultz-Schultzenstein! Guben: Neisseufer oberhalb der Eisenbahnbrücke!!
- † *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. * Potsdam: Vor dem Nauener Thor verwildert Boss!
- Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Fr. * Potsdam: Am Wege nach Werder beim Entenfang Griewank!! * Nauen: Meisterkoppel und Jahnberge bei Königshorst H. Schulze I.! * Trebbin: Priel Lackowitz! * Müncheberg: Faule Seeluch 1862 v. Uechtritz!! * Arnswalde: Beim Wall Warnstorf! * Joachimsthal: Am Grimnitzsee 1862!!
- C. crundinacea* (L.) Rth. * Nauen: Stadtforst R. Spieker. * Alt-Landsberg: Stadtforst an der Nordseite des langen Luchs Schweinfurth! * Joachimsthal: Am Hirtenbruch 1862!!
- Milium effusum* L. * Bernburg: Krumbholz Schneider. * Nauen: Apfelhorst!! * Lübben: Gr. Hain Fick. * Strausberg: Grenzgrund und Gahmengrund südlich der Chaussee!! * Berlin: In Monbijou einzeln!! jedenfalls verschleppt.

- Stipa pennata* L. * Berlin: Unweit der Scharfrichterei 1862 Jahn!
* Küstrin: Reitwein bei der grossen Lehmgrube Gallus.
- St. capillata* L. * Burg: Südlich von Pitzpuhl Deicke. * Neu-
haldensleben: Wellenberge bei Dönnstedt M. Schulze. * Küstrin:
Reitwein Gallus. * Schwedt: Neue Mühle am linken Welseufer
Seehaus.
- Avena pratensis* L. * Magdeburg: Bei den Kiefern an der Chaussee
jenseit Gerwisch Schneider. * Potsdam: Am Krampnitzsee östlich
1862 Bolle. * Nauen: Beim Wernitzer Chausseeause Grantzow!
* Müncheberg: Stadtforst an der Chaussee 1862!! * Buckow:
Schlossberg 1862 v. Uechtritz!
- A. flavescens* L. * Magdeburg: Nasse Wiese bei Diesdorf Schnei-
der. * Spandau: Rhinmeistersee (sicher wild) Prof. Braun!!
* Nauen: Chausseeegraben nach Wustermark 1862 Grantzow!
* Berlin: Rauhe-Berge n. Lankwitz zu 1831 C. Bouché sen.! * Arn-
walde: Kohlhof am Wege nach Cassners Windmühle Warnstorf!
- † *A. elegans* (Gaud.) Aschs. (*A. capillaris* M. und K., *Aira elegans*
Gaud. 1811. *A. capillaris* Host. 1814.) * Potsdam vor dem Nauener
Thor verwildert Boss! (War bereits früher einmal 1852 bei
Wilmersdorf unweit Berlin von Koch! gefunden worden.)
- Glyceria plicata* Fr. * Zerbst: Am Wege nach dem Friedrichsholz
Schneider. * Barby: (Graben zwischen Pobzig und Drosa
Schneider.) * Magdeburg: Diesdorf; Gräben zw. Pöthen und
Vehlitz und zwischen Vehlitz und Leitzkau Schneider. * Stass-
furt: Am Gänsefurter Busch Schneider. * Strausberg: Quelle
nordwestlich am Straussee!! * Frankfurt: Graben an der Chaussee
nach Müllrose Paalzow! Steile Wand 1862!! * Neustadt-Ebers-
walde: Schleifmühle; Weidend.; alte Gesundbr. Buchholz! N. f. M.
- G. distans* (L.) Wahlenb. * Barby: Kl. Rosenberg bei der Ziegelei
Rother! zwischen Dornbock und Diebzig Schneider. * Güsten:
Am Wiesengraben südlich von der Stadt Schneider. * Kalbe:
Vor dem Brumbyer Thor; Gritzehne Rother. * Brandenburg:
Damm auf den Havelwiesen bei Deetz 1860 Schramm.
- † *Briza minor* L. * Potsdam: Vor dem Nauener Thor verwildert
Boss!
- † *Cynosurus echinatus* L. * Köpnick: Graben der Berliner Chaussee
einzeln, jedenfalls mit *Lolium multiflorum* Poir. ausgesät Kasner!
- Festuca Myurus* Ehrh. * Magdeburg: Zw. Vehlitz und Leitzkau
Schneider. * Neuahaldensleben: Trift beim schwarzen Pfuhl; zw.
Bülstringen und Kalvörde Schneider. * Berlin: Vor Weissensee
westlich der Chaussee Prof Braun! * Sternberg: Topper; Top-
persehe Schneidemühle. Golenz.

- F. sciuroides* Rth. * Nauen: Zeestow Grantzow.
- F. duriuscula* L. syst. * Nauen: Lietzower Luch Grantzow! Königs-Wusterhausen: Dubrow Bolle! * Neudamm: Ziegelbrücke Rothe!
- Bromus racemosus* L. * Buckow 1862 v. Uechtritz!!
- B. asper* Murr. * Strausburg: Blumenthal östlich vom Chaussee-hause!! Grenzgrund Schweinfurth! b.) *serotinus* Beneken (als Art). * Bredower Forst im hohen Holz Lackowitz!! Lindholz H. Schulze I! * Liberose: Alte Schloss 1862 Busch!
- B. erectus* Huds. * Magdeburg: Nasse Wiese bei Diesdorf, sicher wild Schneider.
- Triticum caninum* (L.) Schreb. * Dessau: Georgium Fick. * Stassfurt: Gänsefurter Busch Schneider. * Arnswalde: An der Stadtmauer beim Pförtchen Warnstorf!
- † *Elymus arenarius* L. * Potsdam: Bei der Ziegelei Löcknitz O. Reinhardt.
- Hordeum secalinum* Schreb. * Barby: Weggraben zw. Kl. Rosenberg und Alt-Tochheim Rother! Breitenhagen Schneider. * Magdeburg: Vehlitz Schneider. * Güsten Schneider.
- † *Lolium multiflorum* Poir. * Oschersleben: Chausseegraben bei Meien-dorf; Wiese südlich von Güsten Schneider. * Nauen: Kirchhof in Werwitz Grantzow! * Köpnick: Gräben der Berliner Chaussee!! * Arnswalde: Scharlocks Wiese im Kohlhof Warnstorf!
- Picea excelsa* (Lmk.) Lk. * Schwiebus: Läsger Forst bei Blankfeld in Menge und sicher wild Golenz.
- Equisetum silvaticum* L. * Templin: Alte Buchholz F. Peck! * Lübben: Pfuhl Fick. * Königs-Wusterhausen: Beim Forsthaus Wüstemark Bolle! * Schwiebus: Neudörfel nach Mötschen hin 1862; an den Läsger Wanzenluchen Golenz! * Guben: Aecker bei der Walkmühle Thalheim! * Arnswalde: Lehacker links von der Strasse nach Schulzendorf Warnstorf!
- E. pratense* Ehrh. * Nauen: Schuhmacherberge 1862 Grantzow! * Berlin: Unweit der weissen Taube 1862 v. Jasmund!
- E. hiemale* L. b.) *paleaceum* Schleich. (als Art.) * Potsdam: Bei der Friedrichs-Wilhelms-Brücke; Sandwerder Bolle. * Schwiebus: Kutschlau nach Lanken hin Golenz!
- Salvinia natans* (L.) All. * Fürstenwalde: Spree Ritter.
- Lycopodium Selago* L. * Liberose: Teufelslaug Busch!
- L. annotinum* L. * Brandenburg: Zw. dem Gördensee und der Räuberbrücke Schramm. * Schwiebus: Bei den Läsger Wanzenluchen Golenz!
- L. inundatum* L. * Köpnick: Am Wege vor Glienicke rechts Kasner!! * Berlin: Zw. Rosenthal und Lübars Paul!

- L. complanatum* L. * Triebel: Teuplitz Nicolai. * Zilenzig: Ostrow Baenitz!
- L. Chamaecyparissus* A. Br. Zilenzig: Ostrow Baenitz!
- Botrychium rutaceum* Willd. * Köpnick: In der Nähe des Bahnhofes Kasner.
- Ophioglossum vulgatum* L. * Gnadau: Anger bei Döben Heuser a. a. O. * Potsdam: Bei der Ablage; Griebnitz bei Kohlhasenbrück P. Hinneberg. Wildpark 1862 Quasig. * Köpnick: Vor den Müggelsbergen Kasner. * Schwiebus: Am Wanzenluch in der Stadtforst; Möstcher Wiesen nach Seeläsgen hin; Kuppermühle nach der Beckermühle hin Golenz! * Joachimsthal: Hirtenbruch Buchholz 1862!! * Arnswalde: Am Stavinsee Warnstorf!
- Osmunda regalis* L. Der Heft II. S. 194. angeführte Standort (Gr. Kühnau bei Dessau) ist sehr fraglich, da Fick, dem derselbe zugeschrieben wurde, die Pflanze nicht gefunden hat. * Neuhaldensleben: Wolfshausen Frl. v. Nathusius. * Zehdenick: Zw. Kamp u. Wesendorf F. Peck 1862. * Triebel: Gatka; Kl. Särchen Nicolai.
- Polypodium vulgare* L. Die S. 132 erwähnte eingeschnittene Form, von Golenz * Krossen: an den Kollätschteichen bei Griesel gefunden, ist ein höchst beachtenswerther Fund; es kommt diese Form der var. *cambricum* nahe.
- Onoclea Struthiopteris* (L.) Hoffm. * Sorau: (Zeipau Starke.)
- Blechnum Spicant* (L.) With. * Koswig: Hundeluft Preussing. * Neuhaldensleben: Wolfshausen Frl. v. Nathusius. * Luckenwalde: Dümde am Fusse des langen Horst 1862 Bolle. * Sorau: Ober-Ullersdorf; (Zeipau) Starke. * Neuzelle: An der Dorche zwischen Schwerzkow und Göhlen Steinert!
- Asplenium Trichomanes* L. * Potsdam: Mauern in Sanssouci 1862 Quasig; an der Chaussee nach Baumgartenbrück ein einzelnes kleines Exemplar O. Reinhardt!! Ravensberge Boss! * Krossen: Griesel an den Kollätschteichen und in der Schlucht bei der Hintermühle Golenz! * Neuzelle: Nach Lawitz hin einzeln; zw. Schwerzkow und Göhlen Steinert! * Prenzlau: Dorfmauer in Kuhz F. Peck! Seel!
- A. Ruta muraria* L. * Neuhaldensleben: Mauern in Hundisburg und b. Althaldensleben M. Schulze. * Stadtmauern von Templin und Lychen F. Peck! * Luckenwalde: Ruinen der Wallfahrtskapelle auf dem Golmberge Bolle. * Stadtmauer von Mittenwalde Bolle! Neuzelle: Möbiskrüge Gallee. * Südseite der Müncheberger Stadtmauer Reichert. * Prenzlau: Dorfmauer in Kuhz Seel!
* Liebenau: Baderberg an der Ruine 1862 A. Müller, Golenz!
- Phegopteris polypodioides* Fée. * Drebkau: Zwischen Leuthen und

- Klein Osnik Lehmann. * (Muskau: An der Wosna Weise.)
 * Neuzelle: An der Dorche zw. Schwerzkow und Göhlen Gallee und Steinert.
- P. Dryopteris* (L.) Fée. * Potsdam: Wildpark 1862 O. Reinhardt.
 * Spandau: Barschsee 1862 Bolle. zw. der Hundekekle und dem Hohlensee 1862!! * Drebkau: Zw. Leuthen und Kl. Osnik Lehmann. * Lieberose: Meierei Busch! * Schwiebus: Sawischer Hinterheide Golenz! * Krossen: Höllenschlucht am Grieselthal 1862 Golenz. * Guben: Tauersche Forst beim kleinen See Thalheim! * Müncheberg: am faulen Seeluch 1862 v. Uechtritz!!
 * Buckow: Haselkehle!! Joachimsthal: Bären dicke!!
- P. Robertianum* (Hoffm.) A. Br. * Potsdam: Mauern der Terrassen von Sanssouci schon früher von Scheppig bemerkt, 1862 von Quasig und O. Reinhardt! wiedergefunden. * Peitz: An der alten Kirche Doms (schon 1859), Lehmann und Steinert!
- Aspidium Thelypteris* (L.) Sw. b.) *Rogaetianum* Bolle. * Nauen: Bütenheide Grantzow!
- A. cristatum* (L.) Sw. * Schwiebus: An der Mühlbock; Galinenluch Golenz! * Müncheberg: Am faulen Seeluch 1862 v. Uechtritz!!
 * Biesenthal: Sophienstedt!!
- A. cristatum* × *spinulosum*. * Müncheberg: Am faulen Seeluch 1862 v. Uechtritz!!
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. * Jerichow: In Brunnen Wohlfarth!
 * Strausberg: Ostufer des Gahmen-Sees Schweinfurth!! und des Mittelsees!! * Krossen: In Brunnen der Vorstadt Berg Golenz!
 * Sorau: Ober-Ullersdorf; (Zeipau) Starke. * Neuzelle: Hohlwege der Dielower Berge Gallee und Steinert!! * Biesenthal: Südufer des Hellsees bei Lanke!! * Arnswalde: Klückener Buchwald sparsam Warnstorf!

Verbesserungen.

Heft III. IV.

Cardamine impatiens L., von Hagen in der *Chloris borussica* ohne Fundort als preussische Pflanze aufgeführt, aber seitdem in Preussen nicht gefunden, wurde von Prof. Caspary nicht bei Allenstein, wie in den Verhandlungen des botan. Vereins der Provinz Brandenburg u. s. w. III u. IV S. 189 angegeben ist, sondern auf einer Insel im Resau-See bei Drengrfurt in Menge angetroffen und nicht *Naias minor*, wie a. a. O. S. 190 berichtet ist, sondern *Naias maior* wurde von Prof. Caspary in dem von Gelgühen bei Allenstein gesammelt. *Naias minor* fand derselbe jedoch im Mauersee bei Steinort in einer Tiefe von 14 Fuss. S. 393 und 94 ist l. c. stets statt „Ranuker Forst“ Ramucker Forst zu lesen, eine der ausgedehntesten Waldungen Preussens zwischen Allenstein, Hohenstein und Passenheim.

S. 273 Z. 11 v. u. lies: Kriensee statt: Kriensse.

S. 288. *Arrhenatherum elatius* var. *biaristatum* ist bereits von Petermann (Flora 1844 S. 229) so benannt worden, desgleichen

S. 289. *Alopecurus pratensis* L. var. *glaucus* 1851 von Sonder (Flora Hamburgensis S. 32).

S. 325 Z. 1 v. o. lies: 1826 statt 1862.

S. 377 Z. 15 v. o. lies: 1861 statt 1862.

Heft V.

S. 51 Z. 16 v. o. lies: *Trichodon* statt: *Trychodon*.

S. 51 Z. 12 v. u. lies: *cyclophyllum* statt: *cyclophillum*.

S. 51 Z. 4 v. u. lies: *Neckera* statt: *Beckera*.

S. 103 Z. 12 v. o. lies: Luckow statt: Lucknow.

S. 106 Z. 21 v. o. lies: Luckow statt: Lucknow.

S. 108 Z. 16 v. u. lies: *gracilis* statt: *gravelis*.

S. 109 Z. 16 v. o. lies: *pityrea* statt: *petyrea*.

S. 113 Z. 4 v. u. lies: *Baeomyces* statt: *Baornyces*.

S. 119 Z. 11 v. o. lies: Waldenburg statt: Waldenberg.

S. 121 Z. 1 v. o. lies: Bischwitz statt: Bischeritz.

S. 121 Z. 8 v. u. lies: nach statt: in.

S. 124 Z. 1 v. u. lies: Buchenwalde statt: Bachenwalde.

S. 125 Z. 6 v. u. lies: Goinzor statt: Gvinzor.

S. 126 Z. 5 v. u. lies: Biadauschke statt: Biadanschke.

Verbesserungen von Druckfehlern.

Heft II.

Seite 10. Zeile 6. v. o. lies *Caprifoliaceae* statt *Canrifoliaceae*.
„ 169. „ 1. v. o. „ 169 statt 691 (bei nicht allen Exemplaren).

Heft III. und IV.

Seite III. Zeile 12. v. o. fehlt L. hinter *Lupinaster*.
„ 70. „ 10. v. u. lies *citrullifolium* statt *citrallifolium*.
„ 77. „ 18. v. u. „ 595 statt 295.
„ 193. „ 6. v. u. „ (Pers.) Loud. statt (Loud.) Pers.
„ 195. „ 21. v. o. „ *Elsholtzia* statt *Elsholia*.
„ 198. „ 11. v. u. „ *Aquilegia* statt *Aquileja*.
„ 210. „ 6. v. u. „ *laciniatum* statt *laciniata*.
„ 216. „ 15. v. u. „ S. statt G.
„ 230. „ 2. v. u. „ *Stenactis* statt *Steuactis*.
„ 249. „ 3. v. u. „ *Cerastium* statt *Ceratium*.
„ 393. „ 13. v. u. „ *Artemisia* statt *Artesmisia*.
„ 394. „ 9. v. u. „ Tilsit statt Tllsit.

Heft V.

Seite III. Zeile 4. v. o. lies W. G. statt G. W.
„ III. „ 3. v. u. „ *leucosperma* statt *leacosperma*.
„ IV. „ 4. v. o. fehlt das Bastardkreuz-Zeichen zwischen *daphnoides* und *argenteo-repens*.
„ 115. „ 1. v. o. lies *olivacea* statt *olivacca*.
„ 119. „ 13. v. u. „ *aquilegiaefolium* statt *aquilegifolium*.
„ 126. „ 1. v. o. „ Desp. statt Derp.
„ 131. „ 13. v. o. „ *Lythrum* statt *Lytrum*.
„ 249. „ 13. v. o. „ 394 statt 94.

VI. Jahrgang.

Seite 296. Zeile 3. v. u. lies *R. Spruce* statt *G. Spruce*.
„ 306. „ 1. v. o. „ *Salix* statt *Solix*.

VII. Jahrgang.

Seite III.	Zeile	4. v. o.	lies Juni statt Juli.
„	IV.	„	9. v. u. „ 207 statt 206.
„	XVIII.	„	14. v. u. „ südlicheren statt sädlicheren.
„	36.	„	1. v. o. „ Crtz. statt Ctrz.
„	60.	„	18. v. o. „ <i>tataricum</i> statt <i>tatarica</i> .
„	75.	„	17. v. u. „ Casp. statt Carp.
„	145.	„	14. v. o. „ <i>Pirola</i> statt <i>Pirula</i> .
„	155.	„	2. v. o. „ <i>Chamaejasme</i> statt <i>Chumaeiasme</i> .
„	199.	„	20. v. o. „ <i>Scaphyfera</i> statt <i>Scgphyfera</i> .

VIII. Jahrgang.

Seite III.	Zeile	16. v. o.	fehlt Schpr. hinter <i>icmadophila</i> .
„	20.	„	21. v. o. fehlt Scop. hinter (L.)
„	70.	„	16. v. u. lies <i>serratum</i> statt <i>sevratum</i> .
„	78.	„	1. v. o. „ <i>Cardamine</i> statt <i>Cardumine</i> .
„	80.	„	21. v. o. „ <i>Pilosella</i> statt <i>Pillosella</i> .
„	108.	„	7. v. u. „ <i>bulbosa</i> statt <i>balbosa</i> .
„	115.	„	6. v. u. „ <i>luteus</i> statt <i>lutens</i> .
„	118.	„	1. v. u. fehlt (Mnch.) hinter L.
„	119.	„	14. v. o. lies <i>tenuifolia</i> statt <i>tennifolia</i> .
„	127.	„	9. v. o. „ <i>Cicuta</i> statt <i>Cicata</i> .
„	134.	„	10. v. u. „ Huds. statt Hads.
„	138.	„	20. v. u. „ L. statt A.
„	167.	„	14. v. u. „ <i>Carex</i> statt <i>C</i> .
„	171.	„	13. v. o. „ <i>fatua</i> statt <i>factua</i> .

IX. Jahrgang.

Seite III.	Zeile	3. v. u.	setze L. hinter <i>Calceolus</i> und Schr. hinter <i>thapsiforme</i> .
„	III.	„	6. v. u. setze Rich. hinter <i>autumnalis</i> .
„	III.	„	7. v. u. lies 85. statt 84. und setze L. hinter <i>minor</i> .
„	41.	„	8. v. u. „ 11. Mai statt 10. Mai.
„	104.	„	13. v. u. „ Wild. statt Wlld.
„	106.	„	10. v. o. „ <i>Potamogeton</i> statt <i>P</i> .
„	107.	„	10. v. u. „ <i>epigeios</i> statt <i>epigejos</i> .
„	142.	„	2. v. u. „ <i>riparium</i> Lasch statt <i>rip</i> .
„	150.		füge hinzu das Zahlzeichen 150 auf der Seite hinter 149.
„	150.	Zeile	7. v. o. lies III. statt IV.

X. Jahrgang.

Seite	38.	Zeile	4. v. o.	lies <i>pumila</i> statt <i>punila</i> .
„	51.	„	10. v. o.	„ <i>macalosa</i> statt <i>nuculosa</i> .

Seite	56.	Zeile	18.	v. o.	lies	Neuhaldensleben	statt	Neuhaldsusleben.
„	86.	„	18.	v. u.	„	<i>Achilla</i>	statt	<i>Achillca</i> .
„	93.	„	3.	v. o.	und	Zeile 20.	v. o.	lies <i>Coronopus</i> statt <i>coronopus</i> .
„	99.	„	17.	v. o.	lies	<i>Alchemilla</i>	statt	<i>Alchemilla</i> .
„	103.	„	14.	v. o.	„	<i>Berteroana</i>	statt	<i>Berteroiana</i> .
„	112.	„	11.	v. o.	„	<i>truncata</i>	statt	<i>truncata</i> .
„	125.	„	2.	v. u.	„	<i>dasyglados</i>	statt	<i>dasyglados</i> .
„	126.	„	1.	v. o.	„	<i>dasyglados</i>	statt	<i>dasyglados</i> .
„	126.	„	14.	v. u.	„	<i>gramineus</i>	statt	<i>grumineus</i> .
„	141.	„	12.	v. u.	„	<i>Rhacomitrium</i>	statt	<i>Rhcomitrium</i> .
„	147.	„	17.	v. o.	„	Schk.	statt	Schn.
„	149.	„	11.	v. u.	„	Nestl.	statt	Nertl.
„	153.	„	8.	v. u.	„	<i>G. sudeticum</i>	statt	<i>H. sudeticum</i> .
„	166.	„	16.	v. o.	„	Sauter	statt	Santer.
„	166.	„	19.	v. u.	„	(Schult.)	statt	(Schalt.)

XI. Jahrgang.

Seite	V.	Zeile	8.	v. o.	lies	erste	statt	achte.	} (Bei nicht allen Exemplaren.)
„	V.	„	10.	v. o.	„	tagende	statt	liegende.	
„	XVI.	„	4.	v. o.	„	X.	statt	IX.	
„	XVI.	„	13.	v. u.	„	19.	statt	18.	

XII. Jahrgang.

Seite	112.	Zeile	13.	v. o.	lies	<i>Tetralix</i>	statt	<i>Tetraxil</i> .
„	134.	Anm. Zeile	6.	v. u.	schalte ein hinter	„Vogesen“:	(statt	„Wasgenwald“).
„	137.	Zeile	4.	v. o.	lies	Standort	statt	Boden.
„	140.	„	19.	v. o.	„	<i>Ceratozamia</i>	statt	<i>Ceratosamia</i> .
„	143.	„	10.	v. u.	„	Juen-nan	statt	Jiin-nan.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1861-1862

Band/Volume: [3-4](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: [Die wichtigeren bis zum Juni 1862 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 244-282](#)