

Verzeichnis

derjenigen von mir bei Berlin beobachteten **Weiden**, welche in der Flora der Provinz Brandenburg von P. Ascherson mit keinem Standort bei Berlin oder überhaupt nicht angegeben sind.

Von

Otto von Seemen.

Die nachstehenden Nummern ohne Kreuz sind in der Ascherson'schen Flora für andere Standorte als Berlin angegeben. Die Nummern mit Kreuz sind zwar nicht in der Ascherson'schen Flora angegeben, waren aber bereits im Deutsch-Oesterreichischen Florengebiet bekannt.

Die mit †† bezeichneten Nummern waren bisher in dem Deutsch-Oesterreichischen Gebiet nicht bekannt. Die mit ††† waren bisher überhaupt nicht bekannt.

1. *Salix triandra* L., f.: *S. semperflorens* Host und zwar bei beiden Formen: *vulgaris* und *angustifolia* Wimmer; blüht bis in den September hinein; mehrfach in Treptow und Wilmersdorf.

S. triandra L., f. *androgyna* = *S. androgyna* Hoppe = *S. Hoppeana* Willd.; bei Treptow.

S. triandra L. mit birnenförmigen Kätzchen, hervorgerufen durch *Cecidomya heterobia* Loew (bestimmt durch Herrn Professor Magnus); im Schlossgarten zu Charlottenburg, ein Exemplar alljährlich mit dieser Gallenbildung an sämtlichen Kätzchen.

2. *S. alba* L., f. *vitellina* L. (a. A.); auch weiblich, bei Treptow.
3. *S. fragilis* L.; mit Uebergangsformen von einem Geschlecht zum andern; Treptow 2 Exemplare, Tiergarten 1 Exemplar.
4. *S. pentandra* L., f. *nana* Bolle; bei Charlottenburg.
5. † *S. incana* Schrank; mehrere alte Exemplare bei Charlottenburg; wohl früher angepflanzt.
6. *S. purpurea* L., f. *androgyna* = *S. mirabilis* Host; mehrere Exemplare bei Treptow und zwar auch in der Form *sericea*.
7. *S. longifolia* Host = *S. dasyclados* Wimmer; bei Treptow, Charlottenburg, Moabit angepflanzt.
8. *S. aurita* L.; mit Uebergangsformen von einem Geschlecht zum andern; bei Treptow.

S. aurita L., f. *cordifolia* Wimmer; bei Treptow, Charlottenburg,

Wilmersdorf, Trebbin, Rüdersdorf-Kalkberge; hier auch mit Uebergangsformen von einem Geschlecht zum andern.

9. †*S. fragilis* × *triandra* Wimmer = *S. speciosa* Host; bei Treptow und Wilmersdorf, mehrere männliche und ein weibliches Exemplar.
10. †*S. pentandra* × *alba* Ritschl; ein männliches Exemplar bei Charlottenburg-Wilmersdorf.
11. ††*S. pentandra* × *triandra* = *S. Schumanniana* v. Seemen; mehrere weibliche Exemplare bei Wilmersdorf. („Deutsche bot. Monatsschrift“ 1889 Nr. 3).
12. ††*S. purpurea* × *fragilis* = *S. Margaretae* v. Seemen; ein weibliches Exemplar bei Charlottenburg („Deutsche bot. Monatsschrift“ 1889 Nr. 8).
13. †*S. Caprea* × *purpurea* Wimmer; ein weibliches Exemplar bei Treptow.
14. ††*S. nigricans* × *purpurea* Wimmer = *S. vaudensis* Forbes; zwei männliche Exemplare bei Treptow.
15. †*S. repens* × *purpurea* Wimmer = *S. Doniana* Smith; mehrere männliche und weibliche Exemplare bei Treptow, Charlottenburg, Rüdersdorf; ein Exemplar mit Uebergangsformen von dem einen Geschlecht zum andern bei Charlottenburg.
16. *S. viminalis* × *purpurea* Wimmer, f. *sericea* Koch = *S. elaeagnifolia* Tausch und f. *Forbiana* Wimmer = *S. Forbyana* Smith; mehrere weibliche Exemplare bei Treptow.
17. *S. cinerea* × *viminalis* Wimmer; zahlreich bei Treptow.
18. *S. aurita* × *viminalis* Wimmer; ausser weiblichen Exemplaren bei Treptow auch ein männliches bei Charlottenburg.
19. †*S. Caprea* × *cinerea* Wimmer; mehrfach bei Treptow, Charlottenburg, Wilmersdorf, Rüdersdorf-Kalkberge.
20. *S. Caprea* × *aurita* Wimmer; mehrfach bei Treptow, Charlottenburg, Wilmersdorf, Rüdersdorf-Kalkberge.
21. *S. aurita* × *cinerea* Wimmer; vielfach bei Treptow, Charlottenburg, Wilmersdorf, Rüdersdorf-Kalkberge; auch mit verwachsenen Staubfäden (f. *cladostenma*) und mit Uebergangsformen von einem Geschlecht zum andern.
22. ††*S. tephrocarpa* Wimmer; bisher nur weiblich bekannt aus dem Bot. Garten zu Berlin (Wimmer: *Salices Europaeae*) und aus Schweden-Norwegen als *S. cinerea phyllicifolia*; ein männliches Exemplar bei Treptow.
23. *S. phyllicifolia* × *nigricans* Wimmer; ein männliches Exemplar bei Treptow.
24. †*S. cinerea* × *nigricans* Wimmer; mehrere weibliche Exemplare bei Treptow.
25. ††*S. aurita* × *nigricans* Smith; mehrere weibliche und ein männliches Exemplar bei Treptow und Charlottenburg.

26. †*S. Caprea* × *nigricans* Brunner; zwei weibliche Exemplare bei Treptow.
27. †*S. livida* × *nigricans* Brunner; ein weibliches Exemplar bei Treptow.
28. *S. aurita* × *repens* Wimmer; auch mit Uebergangsbildungen von einem Geschlecht zum andern, bei Treptow.
29. *S. cinerea* × *repens* Wimmer; ein männliches Exemplar bei Treptow. Das in dem Königl. Herbar zu Berlin befindliche, von Ruhmer bei Treptow gesammelte weibliche Exemplar ist *S. cinerea* × *viminalis* Wimmer.
30. †*S. aurita* × *cinerea* × *repens* Straehler = *S. Straehleri* v. Seemen; in mehreren Exemplaren, auch mit Uebergangsformen von einem Geschlecht zum andern, in Rüdersdorf-Kalkberge.
31. †*S. viminalis* × *repens* Lasch; bei Treptow. f. *foliis lanceolatis* etc. Wimmer; ein männliches Exemplar bei Charlottenburg.
32. †*S. aurita* × *livida* Wimmer; ein altes weibliches Exemplar bei Treptow.

Den Herren: Professor Dr. Magnus, Dr. Schumann, Oberförster Straehler und Rektor Floederus zu Upsala sage ich für die mir so freundlich gewährte Unterstützung bei meinen Weiden-Forschungen den verbindlichsten Dank.

November 1890.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Seemen Otto v.

Artikel/Article: [Verzeichnis derjenigen von mir bei Berlin beobachteten Weiden. 46-48](#)