

# Verzeichnis der auf Island und den Faer-Øern im Sommer 1883 von Dr. Konrad Keilhack gesammelten Pflanzen.

Von

**Dr. F. Kurtz in Córdoba, Argentinien.**

Im Sommer 1883 überbrachte mir mein Freund Dr. K. Keilhack eine Pflanzensammlung, welche er kurz vorher während eines hauptsächlich geologischen Studien gewidmeten Aufenthaltes auf Island zusammengebracht hatte. Auch auf den Faer-Øern gelang es ihm, während eines kurzen Besuches eine Anzahl Pflanzen zu erbeuten, von denen die bisher nur aus West-Irland (Ben Bulben, Co. Sligo) bekannte *Polygala vulgaris* L. var. *grandiflora* Babington die bemerkenswerteste ist. — Von dem Reiseweg, den Keilhack in Island verfolgte, kann ich leider keine Schilderung geben, da die betreffenden Berichte mir hier bei einer Ueberschwemmung verloren gegangen sind.

Wenn unter den 179 von Keilhack in Island aufgenommenen Arten auch keine für die Insel neuen Formen enthalten sind, so bilden sie doch einen wesentlichen Beitrag zur Standortskunde Islands. In der Anordnung des Materials bin ich durchweg in der Benennung desselben fast ganz Chr. Grønlunds Islands Flora (Kjøbenhavn 1881) gefolgt.

Was die Pflanzen von den Faer-Øern betrifft, so kann ich nicht mit genügender Sicherheit ausmachen, welche von ihnen schon von den Inseln bekannt und welche neu sind, da mir hier nur die Angaben von Nyman (Conspectus Flor. europ. nebst Suppl.), J. Lange (Conspectus Flor. Groenland. I. 1880) und Klinggräff (zur Pflanzengeographie des nördlichen und arktischen Europas, Marienwerder 1875) zur Verfügung stehen.

Das letzte Verzeichnis der Faer-Øer-Flora dürfte wohl das von E. Rostrup in der Botanisk Tidsskrift IV. 1870. S. 5—109 veröffentlichte sein, von dem ein Auszug sowie die Liste der Pflanzen sich im Journal of Botany Brit. and Foreign. 1875 S. 213—221 sich findet. In diesen Schriften finde ich folgende Arten nicht für die Faer-Øer angegeben, welche Keilhack daselbst gesammelt und von

## Verzeichnis der auf Island und den Faer-Oern gesammelten Pflanzen. 151

diesen fehlt die gesperrt gedruckte auch auf Island (nach Grönlands Flora):

*Polygala vulgaris* L. var. *grandiflora* Babington.

*Pedicularis palustris* L. f. *pumila* m.

*Myosotis arenaria* Schrad.

*Galeopsis Tetrahit* L. var.

*Plantago borealis* J. Lge.

*Potamogeton alpinus* Balb. (*P. rufescens* Schrad.)

Auch *Hypericum pulchrum* L. fehlt auf Island.

A. Island.<sup>1)</sup>

1. *Trifolium repens* L. — W: Reykir, fl.
2. *Vicia Cracca* L. — W: Reykjavík, fl.
3. *Lathyrus maritimus* (L.) Big. — W: Brýnjudalr, fl.
4. *Rubus saxatilis* L. — W: Svinadalr, fol.; Reykjavík, fl. — I: Húsafell, stolo.
5. *Rosa pimpinellifolia* L. — S: Seljaland, fragm.
6. *Potentilla alpestris* Hall. fil. (*P. maculata* Pourr.) — S: Seljaland, fl. — O: Seydisfjördur, fl. defl.
7. *P. Anserina* L. — W: Thýrill, fl.
8. *Comarum palustre* L. — W: Reykholt, fl.
9. *Sibbaldia procumbens* L. — W: Berg Baula, fl.
10. *Fragaria vesca* L. — W: Skorradalsvatn, fl. — I: Húsafell, fl.
11. *F. collina* Ehrh. (?) — W: Skorradalsvatn, defl.
12. *Dryas octopetala* L. — N: Saudakrókr, fl.
13. *Geum rivale* L. — W: Skorradalsvatn, Berg Baula, fl.
14. *Sanguisorba officinalis* L. f. foliolis basi manifeste cordatis, parvis. — W: Thýrill, fol.
15. *Alchemilla vulgaris* L. — O: Eskifjördur, fl.
16. *A. alpina* L. — I: Seydisfjördur, fl.
17. *Hippuris vulgaris* L. — W: zwischen Holt und Skógar, fl.
18. *Epilobium alsinefolium* Vill. — Fl. fr.
19. *E. palustre* L. f. *putata* Hausskn. Mon. Epilob. S. 130. — W: Reykholtsdalr, fl. fr.
20. *Geranium sylvaticum* L. — I: Húsafell; O: Eskifjördur, fl. fr.
21. *Empetrum nigrum* L. — I: Húsafell, fl. ♂.
22. *Silene maritima* With. — S: Seljaland, fl.

<sup>1)</sup> Die Buchstaben: N, S, O, W und I bedeuten Nord-, Süd-, Ost-, West- und Inner-Island

23. *S. acaulis* L. — W: Reykjavík, fl.
24. *Viscaria alpina* (L.) Fzl. — S: am Fusse des Gletschers, am Fulilaekr., fl.
25. *Arenaria verna* L. var. *rubella* (Whlb.) Hook. f.? fl.
26. *A. verna* L. var. *hirta* (Wormsk.) S. Watson. (Cf. Bibliogr. Index to N.-Am. Bot. I, S. 98.) — ?, fl.
27. *A. ciliata* L. var. *humifusa* Whlb.) Rink. (*A. norvegica* Gunn.) — ? fl.
- 27a. *A. ciliata* L. var. *humifusa* (Whlb.) Rink. f. *laxa* m. — ? fl. et fr. — Hierzu gehört *A. gothica* Fries vom Kinnekullen.
28. *Cerastium alpinum* L. — ? fl.
29. *C. alpinum* L. var. *lanatum* Lindb. — O: Seydisfjördur, fl. — Entspricht am meisten Exemplaren der als *C. squalidum* Ram. bezeichneten Form aus den Pyrenäen.
30. *C. trigynum* Vill. — ? frag. fructif.
31. *C. caespitosum* Gil. — ? fl.
32. *C. caespitosum* Gil. var. *alpestre* Hartm. — ? defl.
33. *Sagina nodosa* (L.) Fzl. — ?, fl.
34. *S. procumbens* L. — ?, fl. fr.
35. *S. procumbens* L. f. *pumila* m. — ? fl. — Habituell an *S. nivalis* Liljebl. erinnernd.
36. *Spergula arvensis* L. — W: Reykholt, fl.
37. *Montia rivularis* Gm. f. *terrestris*. — W: Reykholt, fr.
38. *Viola palustris* L. — W: Reykir, fl.
39. *V. silvatica* Fries. — W: Reynivellir, fl.
40. *V. canina* L. — W: Reynivellir, fl.
41. *V. tricolor* L. f. *vulgaris* Koch. — N: Aukreyri, fl.
42. *Parnassia palustris* L. — N: Sandakrókr, fl.
43. *Cochlearia officinalis* L. — N-W: Patreksfjördur, fl., fr. immat.
44. *Draba incana* L. em. (incl. *hirta* L.) — S: fl. fr.
45. *D. incana* L. var. *hirta* (L.) m. f. *rupestris* (R. Br.) Hartm. Blütt. — ?, fl.
46. *D. stellata* Jacq. var. *nivalis* (Liljebl.) Regel. — ?, fl. fr.  
J. Langes Phrase (Consp. Fl. Groenl. 1880 S. 39): foliis . . . non ciliatis“ trifft nicht zu; man müsste denn die nordische Pflanze zu *D. stellata* Jacq. vera (foliis ciliatis) stellen, zu der dann am besten auch *D. androsacea* Whlb. gezogen würde.
47. *Capsella Bursa pastoris* (L.) Mnch. f. foliis subintegerrimis. — W: Reykjavík, fl. fr. jun.
48. *Arabis petraea* (L.) Lam.  $\alpha$  *glabrata* Koch. — ? fol. fr.
49. *A. petraea* (L.) Lam.  $\beta$  *hirta* Koch. — ? fol. fr.
50. *Cardamine pratensis* L. — S: fl. Eine niedrige Form (8—18 cm hoch).
51. *C. hirsuta* L. — ? fol.
52. *Cakile maritima* Scop. — W: Hvalfjördur, fl.

## Verzeichnis der auf Island und den Färöern gesammelten Pflanzen. 153

53. *Papaver nudicaule* L. — W: Skorradalsvatn, fl.  
Der Verbreitung dieser Art entspricht es am meisten, den Namen *P. nudicaule* L. voranzustellen und den Namen *P. alpinum* L. und dessen Derivate für die südlichen Formen des *P. nudicaule* L. anzuwenden. (Vgl. P. Ascherson in Bot. Zeit. 1869 Sp. 121 ff.)
54. *Caltha palustris* L. — S: Holt, fl.  
55. *Ranunculus glacialis* L. — W: Berg Baula, fl.  
56. *R. reptans* L. — W: Reykholt; Thingnes, fl.  
57. *R. hyperboreus* Rottb. — O: Seydisfjördr, defl. fr.  
58. *R. pygmaeus* Whlbг. — W: Berg Baula, subdefl.  
59. *R. acer* L. f. flor. majusculis. — I: Húsafell; O: Eskifjördr, fl.  
60. *R. repens* L. — W: Reykholt, fl.  
61. *Thalictrum alpinum* L. — W: Reykholt, fl.  
62. *Saxifraga Cotyledon* L. — O: Seydisfjördr, defl.  
63. *S. nivalis* L. forma minor. — ? fl.  
64. *S. stellaris* L. f. *vulgaris* et f. ad f. *paucifloram* Engl. transeuntes. — O: Seydisfjördr, fl.  
65. *S. stellaris* L. f. *pauciflora* Engl. Mon. S. 133. — ? fl.  
66. *S. oppositifolia* L. — S: Hekla; W: Stafholt, fl.  
67. *S. Hirculus* L. — W: Reykholt, fl.  
68. *S. aizoides* L. — O: Seydisfjördr; Eskifjördr, fl.  
69. *S. decipiens* Ehrh. f. *typica*. — ? fl.  
69a. *S. decipiens* Ehrh. — W: Saurbaer, fl.  
70. *S. hypnoides* L. f. *typica*. — ? fl.  
70a. *S. hypnoides* L. var. — O: Seydisfjördr, fl.  
71. *Sedum Rhodiola* DC. — W: Almannagjá, fl.  
72. *S. villosum* L. — W: Reykir, fl.  
73. *S. acre* L. — W: Reykjavík, subdefl.  
74. *Carum Carvi* L. — ? fl.  
75. *Angelica silvestris* L. — W: ?, fol.  
76. *Hydrocotyle vulgaris* L. — W: Reykholtsdalr, fol.  
77. *Calluna vulgaris* (L.) Salisb. — O: Eskifjördr, fl.  
78. *Cassiope hypnoides* (L.) Don. — I: Langarfell am Geysir, fl.  
79. *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv. — W: Almannagjá, fl.  
80. *Arctostaphylos Uva ursi* Spr. — O: Eskifjördr, fl.  
81. *Vaccinium Myrtillus* L. — W: Grjótháls, fol.  
82. *V. uliginosum* L. --- S: Egisida, fl.  
83. *Pinguicula vulgaris* L. — N: Saudakrókr, fl.  
84. *Solanum tuberosum* L. — W: Reykholt, fol.  
85. *Limosella aquatica* L. — W: Reykholt, subdefl.  
86. *Pediculiflora flammula* L. — W: Berg Baula, subdefl.  
87. *Alectrolophus minor* (Ehrh.) Wimm et Grab. — W: Reynivellir, fl.  
88. *Bartsia alpina* L. — I: Húsafell, fl.  
89. *Euphrasia officinalis* L. var. *latifolia* (Pursh) Lge. — W: Reykir, fl.

90. *Veronica Beccabunga* L. — W: Reykir, subfl.  
 91. *V. officinalis* L. — ?, fl.  
 92. *V. saxatilis* L. — ?, fl.  
 93. *V. alpina* L. — ?, fl.  
 94. *V. serpyllifolia* L. — Thingnes, defl. fr.  
 95. *Mertensia maritima* (L.) J. E. Gray. — W: Thýrill; Hvalfjördur, fl., defl.  
 96. *Myosotis arenaria* Schrad. — N: Hvammr, fl.  
 97. *Prunella vulgaris* Mnch. — N: Sandakrókr, fl.  
 98. *Thymus Serpyllum* L. — O: Eskifjördur, fl.  
 99. *Gentiana serrata* Gunn. — N: Mývatn, fl.  
 100. *G. aurea* L. — N: Saudakrókr, fl.  
 101. *G. nivalis* L. — N: Holtavördahaedi; W: Reykjavik, fl.  
 102. *G. tenella* Rottb. — N: Mývatn, fr.  
 103. *G. campestris* L. — N: Sigrufjördur; O: Seydisfjördur, Eskifjördur; fl.  
 103a. *G. campestris* L. fl. albo. — W: Reykjavík, fl.  
 104. *G. Amarella* L. — N: Saudakrókr, fl.  
 105. *Pleurogynne rotata* (L.) Griseb. — N: Mývatn, fl.  
 106. *Menyanthes trifoliata* L. f. *longistyla* et f. *brevistyla*. — W: zwischen Holt und Skógar; fl.  
 107. *Galium boreale* L. — W: Svínadalr, subfl.  
 108. *G. verum* L. — N: Saudakrókr; O: Seydisfjördur, fl.  
 109. *G. silvestre* Poll. — W: Svínadalr, fl.  
 110. *G. uliginosum* L. — ? fl.  
     Eine dem *G. saxatile* L. sehr ähnliche Form; aber sie besitzt feine rückwärts gerichtete Stacheln am untern Teil des Stengels.  
 111. *Campanula rotundifolia* L. — O: Seydisfjördur, Eskifjördur, fl.  
 112. *Taraxacum vulgare* (Lam.) Schrk. — W: Reykjavík, fl. fr.  
 113. *Leontodon auctumnalis* L. f. *asperior* (Whlb.) J. Lge. — O: Seydisfjördur, fl. — N: Aukreyri, fl. fr.  
 114. *Hieracium floribundum* Wimm. var. *islandica* J. Lge. — O: Eskifjördur, Seydisfjördur, fl.  
     In Nym. Consp. Fl. Europ. S. 453 für Island nicht angeführt.  
 115. *H. murorum* L. — I: Húsafell, fl.  
 116. *Gnaphalium norvegicum* Gunn. — W: Westfuss des Berges Baula, fl.  
 117. *G. uliginosum* L. — W: Reykir; I: Geysir, fl.  
 118. *Erigeron alpinus* L. — N: Saudakrókr, fl.  
 119. *Achillea Millefolium* L. var. *setacea* (W. et K.) Ascherson Fl. d Prov. Brandenburg S. 323. — N: Aukreyri, fl.  
 120. *Matricaria inodora* L. β. *phaeocephala* Rupr. f. *pumila* m. — W: Reykjavík, fl.  
 121. *Armeria maritima* W. — W: Reykjavík, fl. — S: Seljaland, fl.  
 122. *Plantago major* L. — W: Reykholt, subfl.

## Verzeichnis der auf Island und den Faer-Oern gesammelten Pflanzen. 155

123. *P. media* L. — W: Reykholt. — S: Seljaland, fl. defl.  
 124. *P. lanceolata* L.  $\beta.$  *dubia* (Liljebl.) Ascherson l. c. S. 545. — S: Seljaland, defl.  
 125. *P. maritima* L. var. *borealis* (J. Lge. sp.) m. — S: Höfdabrekka fl. defl.  
 126. *Rumex Acetosa* L. — O: Seydisfjördr, fl. et fr. immat. — I: Húsafell, fl.  
 127. *Oxyria digyna* Campd. — S: Seljaland, subdefl.  
 128. *Polygonum viviparum* L. — O: Seydisfjördr, defl.  
 129. *P. aviculare* L. — N: Saudakrókr. — W: Reykjavík, fl. defl.  
 130. *Koenigia islandica* L. — Eskifjördr, fr.  
 131. *Salix lanata* L. — ?, ♂ defl. ♀ fl.  
 132. *S. glauca* L. — W: Svínadalr ♂ et ♀ fl. — O: Eskifjördr; Blätter mit *Melampsora salicina*.

Die Griffel sind länger als Andersson in seinen Salices Lapponicae abbildet.

133. *S. ovata* Ser.  $\alpha.$  *latifolia* Andersss. in DC. Prodr. XVI. 2. S. 288 (*S. pyrenaica-norvegica* Fries). — W: Berg Baula, ♂ fl. ♀ fr. — ?, ♂ et ♀ fl.

Von *S. sarmentacea* Fr.  $\beta.$  *rotundifolia* Andersss. l. c. S. 298 nur durch folia concolora und capsulae sessiles verschieden.

134. *Urtica urens* L. — W: Reykjavík, fr.  
 135. *Betula nana* L. — Hestr an der Grimsá, defl.  
 136. *B. intermedia* Thomas. — I: Húsafell, fl. ♂ et ♀.  
 137. *Callitricha verna* L. e. p. f. *terrestris* (*C. caespitosa* Schultz). — W: Ellidaá bei Reykjavík, fr.  
 138. *Orchis maculata* L. — W: Svínadalr, fl.  
 139. *Habenaria albida* R. Br. — I: Húsafell, fl.  
 140. *Platanthera hyperborea* (L.) Lindl. var. *minor* J. Lge. — W: ? — S: Holt, fl.  
 141. *Peristylus viridis* (L.) Lindl. — S: Holt, fl.  
 142. *Corallorrhiza innata* R. Br. — I: Selsund (Hekla) ?, fl.  
 143. *Luzula spicata* Desv. — ?, fl.  
 144. *L. arcuata* Whlb. — I: ?, defl.  
 145. *Juncus lamprocarpus* Ehrh. f. *pauciflora*. — I: ?, defl.  
 146. *J. supinus* Mnch. — ?, defl.  
 147. *J. bufonius* L. — ?, defl. fr. immat.  
 148. *J. trifidus* L. — ?, defl.  
 149. *J. biglumis* L. — ?, fl.  
 150. *Tofieldia borealis* Wahlbg. — N: Saudakrókr, fl. fr.  
 151. *Triglochin palustre* L. — W: Reykholt, fl.  
 152. *Eriophorum Scheuchzeri* Hipp. — S: fl.  
 153. *E. angustifolium* Roth. — S: fl.

Boeckeler (die Cyperaceen des Kgl. Herbariums zu Berlin, I S. 633) giebt auch *E. latifolium* Hppe. für Island an; bei Grönland findet sich diese Art nicht aufgeführt.

154. *Carex rigida* Good. — S.; fl.
155. *Carex pulla* Good. f. *graciliscescens* m. — S.; fl.
156. *C. vaginata* Tausch. — ?, fl.
157. *C. capillaris* L. — ?, fr.
158. *Elymus arenarius* L. — ?, defl.
159. *Anthoxanthum odoratum* L. — ? fl.
160. *Phleum alpinum* L. — ?, subdefl.
161. *Agrostis alba* L. f. *pumila* m. — ?, defl.
162. *Aira caespitosa* L. — ?, fl. defl.
163. *Poa annua* L. — ?, defl.
164. *P. alpina* L. — ? fl.
165. *P. glauca* M. Vahl (*P. caesia* Sm.). — N: Saudakrókr, fl.
166. *P. Balfourii* Parn. — ?, defl.

Diese Pflanze ist mir nicht ganz klar geworden; am besten passen noch auf sie die Beschreibungen der *P. Balfourii* (Grönl. Fl. v. Island S. 132; Babingt. Man. Ed. VII. S. 425). Vielleicht ist diese Form, trotz ihrer frisch-grünen (nicht blau-grünen oder grau-grünen!) Farbe am besten mit *P. glauca* Vahl zu verbinden. Die Stengel sind seitlich zusammen gedrückt, wie die der *P. compressa* L.

167. *Festuca ovina* L. f. *vivipara* L. — ?, fl.
168. *F. rubra* L. f. *aristis brevibus*. — ?, fl.
169. *F. rubra* L. f. *arenaria* (Osb.) Fr. — ?, fl.
170. *Juniperus communis* L. var. *nana* (W. sp.) Hartm. — W: Almannagjá; subfl.
171. *Lycopodium Selago* L. — W: Almannagjá, fr.
172. *Selaginella selaginoides* (L.) Lk. — O: Seydisfjördr, fr.
173. *Equisetum palustre* L. — O: Seydisfjördr, ster. — ?, fert.
174. *Polypodium vulgare* L. — ?, fr.
175. *Phegopteris Dryopteris* (L.) Fée. — W: Svinadalr, ster.
176. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. — O: Seydisfjördr, fr. — ?, ster.
177. *Woodsia ilvensis* R Br. — W: Almannagjá, ster.
178. *Blechnum Spicant* (L.) Roth. — ?, ster.
179. *Botrychium Lunaria* (L.) Sw. — ?, fr.

An einem Exemplar tragen auch die untersten Abschnitte des unfruchtbaren Wedels einzelne Sporangien.

#### B. Faer-Øer<sup>1)</sup>.

1. *Trifolium repens* L. — Str., Syd., fl.
2. *Potentilla silvestris* Neck. — Str., Syd., fl. fr.

<sup>1)</sup> Str. = Strømøe; Syd. = Syderøe.

## Verzeichnis der auf Island und den Faer-Oern gesammelten Pflanzen. 157

3. *Polygala vulgaris* L.  $\gamma$  *grandiflora* Bab. Man. of Brit. Bot. Ed. VII, 1874, S. 44 (Journ. of Bot. Brit. and Foreign 1877, S. 168—174, tabl. 189, 190; *P. Balkii* Nyman, Cosspect. Fl. Europ. I, S. 83; *P. buxifolia* Ball in herb. non alior.) — Str., Syd.; fl. fr.  
Ändert mit tiefblauen und carminroten Blüten ab.
4. *Hypericum pulchrum* L. f. *pumila* m. — Str., Syd., fl. fr. Die Exemplare sind 3,5—16 cm hoch (ohne Wurzel) und die Kelchdrüsen sind nicht so ausgeprägt, wie an continentalen Pflanzen.
5. *Linum catharticum* L. — Str., defl. fr.
6. *Cerastium trigynum* Vill. — Syd., fl.
7. *Spergula arvensis* L. — Syd., fl. fr.
8. *Montia rivularis* Gmel. — Syd., fr.
9. *Viola sylvatica* Fr. var. *arenaria* (DC. sp.) Ascherson Fl. d. Prov. Brand. I, S. 72 Str. fr.
10. *Ranunculus Flammula* L. f. *minor*. — Str. Syd., fl. fr.
11. *R. repens* L. — Str., fl.
12. *Angelica silvestris* L. — Str., fl.
13. *Pedicularis palustris* L. f. *pumila* m. — Syd., fl. Eine 3,5—6 cm hohe Pflanze an Formen von der Stschutschja und dem unteren Jenissei erinnernd.
14. *Euphrasia officinalis* L. — Str., Syd.; fl. fr. Steht zwischen den Formen  $\alpha$  *glabrescens* J. Lge. und  $\beta$  *latifolia* (Pursch) J. Lge. (Consp. Fl. Groenl. 1880, S. 79) in der Mitte, indem sie die Blattform und Behaarung der ersteren mit den Kapseln der zweiten verbindet.
15. *Veronica officinalis* L. — Str., fl.  
Eine kleine zierliche Form (4—11 cm hoch).
16. *Myosotis arenaria* Schrad. — Syd., fl. fr.
17. *Galeopsis Tetrahit* L. — Syd., fl. fr.  
Gedrungene, 11—21 cm hohe Exemplare mit behaarten, hellrosa Blüten, deren Röhre den Kelch mehr oder weniger an Länge übertreffen. Alle Achsen sind steif rückwärts behaart; die gelblichweissen, besonders unter den Knoten sehr dicht stehenden Haare sind bis 3,2 mm lang. Der Behaarung nach gehört diese Form zu *G. pubescens* Bess., die Grösse und Farbe der Blüten bringen sie eher zu *G. Tetrahit* L. — Das Naturgemässeste ist *G. pubescens* Bess. und *G. speciosa* Mill. (*G. versicolor* Curt.) als südlische Formen zu *G. Tetrahit* L zu stellen, wie dies Kunth und Bentham schon gethan haben. Die einzigen südliecheren Formen, die der Faer-Oer-Pflanze ähnlich sind, sind *G. acuminata* Rehb. genannte Pflanzen von Berlin und Königsberg i. P.
18. *Brunella vulgaris* Muh. — Syd., fl.
19. *Galium saxatile* L. — Str., fl.

158 F. KURTZ: Verzeichnis d. a. Island u. den Faer-Øern gesammelten Pflanzen.

20. *Leontodon autumnalis* L. f. *minor gracilis*. — Str., Syd., fl.
21. *Bellis perennis* L. — Str., fl.
22. *Succisa pratensis* Mnch. — Syd., fl.
23. *Plantago maritima* L. var. *borealis* (J. Lange) m. — Str., defl. fr.  
Eine niedrige, 1,5 bis 4 cm hohe Form, mit 0,5 bis 1,2 cm langen Blättern und kopfförmigen, wenigblättrigen (3—5—6) Blütenständen. Die Samen sind schwarzbraun, stumpf und mehr oder weniger häutig berandet.
24. *Atriplex hastatum* L. var. *Babingtonii* (Woods sp. Babington Man Brit. Bot. Ed. VII, S. 296) m. — Str., fr.
25. *Juncus lamprocarpus* Ehrh. — Str., Syd., fl. immat.
26. *Narthecium ossifragum* (L.) Huds. — Str., Syd.; fl.
27. *Triglochin palustre* L. — Str., defl.
28. *Potamogeton alpinus* Balbis. — Str., fl. fr.
29. *Carex flava* L. — Str., fl. fr. — Kleine Form, 6—12 cm hoch.
30. *Alopecurus geniculatus* L. — ?, fl.
31. *Poa annua* L. — Syd., fl.
32. *Festuca ovina* L. f. *vivipara* L. — Syd., fl.
33. *Lycopodium Selago* L. — Str.
34. *Selaginella selaginoides* (L.) Lk. — Str., fr.
35. *Blechnum Spicant* (L.) Roth. — Syd. ster.

Córdoba, Juni 1893.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Kurtz Fritz

Artikel/Article: [Verzeichnis der auf Island und den Faer-Øern im Sommer 1883 von Dr. Konrad Keilhack gesammelten Pflanzen. 150-158](#)