Erster Beitrag zur Pilzflora der Umgegend von Eberswalde.

Von

P. Hennings.

Die Umgegend Eberswaldes ist in mykologischer Beziehung bereits in früheren Jahren durch die Funde zahlreicher interessanter und neuer Pilzarten seitens Prof. Dr. R. Hartig, sowie besonders seitens Prof. Dr. Brefeld bekannt; doch ist bisher eine systematische Aufzählung der in diesem Gebiete beobachteten Pilze nicht gegeben worden. Auf mehrfachen Excursionen, die ich sowohl im August und September 1896 als besonders im August und September 1897 in der Umgegend Eberswaldes ausführte, habe ich eine grosse Anzahl Pilzarten daselbst gesammelt. Am 1. August d. J. wurde mit Herrn Dr. Lindau und Dr. Bitter unter freundlicher Führung des Herrn Oberförster Dr. A. Möller der Wald in der Umgegend der Stadt nach Pilzen abgesucht. Zu mehreren Malen führte ich im August d. J. Excursionen in der Umgegend von Eberswalde aus, auf denen ich eine besonders reiche Ausbeute machte. Ausserdem wurden mir verschiedene seltene Pilze zu verschiedenen Zeiten vom Herrn Oberförster Dr. Möller freundlichst zugesandt, für die ich ihm hier meinen besten Dank ausspreche.

Nachstehend gebe ich ein erstes Verzeichnis dieser Arten, hoffend, in den nächsten Jahren eine vollständigere Aufzählung geben zu können. Die bereits von Hartig, Brefeld, Magnus u. s. w. publicierten Arten habe ich dieser Aufzählung nicht eingefügt.

Myxomycetes.

Ceratomyxa mucida (Pers.). An faulenden Aesten beim Wasserfall.

8. August 1897.

Tubulina cylindrica (Bull.) Rost. Auf einem Baumstumpfe im Forst.

1. August 1897.

Cribraria rufa (Roth) Rost. Auf faulendem Brückengeländer im Forst.

8. August 1897.

Perichaena corticalis (Batsch) Rost. An einem morschen Baumstumpfe im Walde. 1. August 1897.

- Arcyria punicea* Pers. Auf feuchtem Brückengeländer in der Nähe des Wasserfalles. 1. August 1897.
Trichia chrysosperma (Bull.) Rost. Ebenda. 8. August 1897.
Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost. Ebenda. 8. August 1897.
Amaurochaete atra (A. et Schw.) Rost. Auf der Schnittfläche eines Kiefernstumpfes. 8. August 1897.
Reticularia Lycoperdon Bull. An einem Erlenstumpfe. 8. August 1897.
Stemonitis fusca Roth. Auf modernem Holz im Forst. 8. August 1897.
Leocarpus fragilis (Diels.) Rost. Auf Nadeln und Blättern im Walde. 8. August 1897.
Physarum sinuosum (Bull.) Rost. Ebenso. 1. August 1897.
Badhamia hyalina (Pers.) Rost. Auf Holz daselbst. 1. August 1897.
Fuligo septica (L.) Gmel. Am Grunde der Stämme, auf Laub u. s. w.

Protomycetaceae.

- Protomyces macrosporus* Ung. Auf Blattstielen von *Aegopodium* in der Umgebung des Wasserfalles. 8. August 1897.

Ustilaginaceae.

- Ustilago major* Schröt. In Blüten von *Silene Otites*, oberhalb des Bahnhofes in Menge. 8. August 1897.
U. Caricis (Pers.) Fuek. In Fruchtknoten von *Carex arenaria* daselbst. 8. August 1897.
Entyloma Ranunculi (Bonord) Wint. Auf Blättern von *Ranunculus repens* in der Nähe des Wasserfalles. 15. August 1897.

Uredinaceae.

- Uromyces Trifolii* (Hedw.) Lev. Auf *Trifolium arvense*. Auf Sandfeldern hinter dem Bahnhofe. 8. August 1897.
Puccinia Cirsii lanceolati Schröt. Auf *Cirsium lanceolatum* daselbst. 8. August 1897.
P. Prenanthis (Pers.) Fuek. Auf *Prenanthes muralis* im Forste. 15. August 1897.
P. Lampanae (Schultz) Fuek. An Aekerrändern jenseits des Bahnhofes. 8. August 1897.
P. Violae (Schum.) D.C. Auf *Viola silvatica* im Forst. 1. August 1897.
P. Pimpinellae (Strauss) Link. Auf *Pimpinella Saxifraga* am Wegrande. 15. August 1897.
P. Rubigo-vera (D.C.) Aecidien auf *Lycopsis arvensis*, oberhalb des Bahnkörpers. 8. August 1897.

Bei zahlreichen Keimlingen, an denen meist nur die Cotyledonen, vereinzelt 1 oder 2 Blättchen entwickelt waren, zeigten sich die ersteren mit vollkommen ausgebildeten Aecidien bedeckt, während letztere nicht damit behaftet waren. Bei dem

anhaltend feuchten Wetter anfangs August ist es wahrscheinlich, dass diese Keimlinge erst wenige Tage alt waren. Eine Infizierung derselben durch Teleutosporien dürfte daher ausgeschlossen sein und ist es annehmbar, dass das Mycel des Pilzes bereits im Samen der Pflanze vorhanden gewesen ist und sich die Aecidien bereits bei der Keimung entwickelt haben.

Puccinia Poarum Niels. Aecidien auf *Tussilago Farfara* am Wasserfall. 8. August 1897.

P. oblongata (Link) Wint. Auf *Luzula pilosa* im Forst. 8. August 1897.

P. argentata (Schultz) Wint. Auf *Impatiens Noli tangere* im Forst 15. August 1897.

P. Aegopodii (Schum.) Link. Auf *Aegopodium* nahe dem Wasserfall. 15. August 1897.

P. Circaeae Pers. Auf *Circaea lutetiana* im Forst. 1. August 1897 (Dr. Lindau).

Triphragmium Ulmariae (Schum.) Link. Auf *Ulmaria* im Erlenbruch im Forst. 15. August 1897.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint. Am Waldwege. 8. August 1897.

Melampsora Circaeae (Schum.) Wint. Auf *Circaea lutetiana* im Walde. 1. August 1897.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lev. Auf *Sonchus arvensis* an einem Feldwege. 8. August 1897.

Tremellineae.

Ecidia plicata Klotzsch. Auf modernem Brückengeländer nahe dem Wasserfall. 1. August 1897.

E. glandulosa (Bull.) Fr. Dasselbst. 1. August 1897.

Ulocolla foliacea (Pers.) Bref. Auf einem Kiefernstumpf. 15. August 1897.

Tremella indecorata Sommerf. Auf morschem Brückengeländer im Walde. 1. August 1897.

Tremellodon gelatinosus (Scop.) Fr. An einem morschen Baumstumpf. 1. August 1897.

Bereits früher von Prof. Brefeld und Dr. A. Möller beobachtet.

Dacryomycetaceae.

Dacryomyces deliquescens (Bull.) Fr. Auf faulendem Brückengeländer im Walde. 1. August 1897.

Calocera cornea (Batsch) Fr. Ebendort. 1. August 1897.

C. viscosa (Pers.) Fr. An einem Kiefernstumpf im Walde. 8. August 1897.

Exobasidiaceae.

Exobasidium Vaccinii (Fuck.) Wor. Auf *Vaccinium Vitis Idaea* im Walde. October 1897 (Dr. A. Möller).

Thelephoraceae.

- Corticium comedens* (Nees) Fr. An abgefallenen Zweigen im Walde. 15. August 1897.
C. sanguineum Fr. An einem modernden Kiefernstumpf im Walde. 1. August 1897.
C. giganteum Fries. In einer Lehmgrube bei Schönholz. November 1897 (Dr. A. Möller).
Stereum hirsutum (W.) Fr. An faulendem Brückengeländer im Walde. 1. August 1897.
St. purpureum Pers. An einem Baumstumpf im Walde. 1. August 1897.
St. album Quel. Auf einem Baumstumpf im Walde. 15. August 1897.
Thelephora laciniata Pers. Auf einem Waldwege. 15. August 1897.
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. An Anhöhen im Walde in grosser Menge. 30. August 1896.

Clavariaceae.

- Clavaria inaequalis* Müll. Im Walde. October 1894 (Dr. A. Möller).
C. argillacea (Pers.) Fr. Am Waldrande auf Sandboden. 15. August 1897.
C. cinerea Bull. Unter Kiefern im Walde. September 1896.
C. cristata Holmsk. Ebendort. September 1896.
C. suecica Fr. An der Promenade an einem Garten. September 1896.
C. apiculata Fr. An einem morschen Kiefernstamm. 15. August 1897.
Sparassis ramosa (Schaeff.) Schröt. An einem Kiefernstumpf im Walde. 1. August 1897 (Dr. Lindau).

Hydnaceae.

- Grandinia granulosa* (Pers.) Fr. An einem abgefallenen Ast. 1. August 1897 (Dr. Lindau). Im Innern eines Baumstumpfes im Walde. September 1897 (Dr. A. Möller).
Hydnum repandum L. Im Walde häufig. 30. August 1896. September 1897.
H. imbricatum L. Dasselbst spärlich. 15. August 1897.
Irpex obliquus (Schrad.) Fr. An abgefallenen Zweigen. 1. August 1897.
I. fusco-violaceus (Schrad.) Fr. An Kiefernholz im Walde. 15. August 1897.
I. lacteus Fr. An einem Buchenstamm rasig. 30. August 1896.

Polyporaceae.

- Merulius lacrymans* (Wulf.) Schum. An einem Buchenstumpf hinter dem Brunnen im Walde. Januar 1897 (Dr. A. Möller).
 Ein derartiges Vorkommen dieses Pilzes dürfte bisher noch nicht beobachtet worden sein und ist äusserst interessant.
M. tremellosus Schrad. An einem Birkenstumpf im Forst. 8. August 1897.

- Polyporus fragilis* Fr. An einem modernden Kiefernstumpf im Walde. 15. August 1897.
- P. spumeus* (Sow.) Fr. An einem kranken Apfelbaum im Garten der Oberförsterei. September 1896 (Dr. A. Möller).
- P. amorphus* Fr. An einem Kiefernstumpf im Walde. 8. August 1897.
- P. adustus* (Willd.) Fr. An einem Laubholzstamm. 1. August 1897.
- P. croceus* Fr. Häufig an faulenden Aesten des Brückengeländers in der Umgebung des Wasserfalles. 1. und 8. August 1897.
- P. giganteus* (Pers.) Fr. An einem Baumstumpf im Forstgarten Chorin. August 1896 (Dr. A. Möller).
- P. elegans* (Bull.) Fr. An modernden Zweigen. 1. August 1897.
- Polystictus radiatus* Fr. An Erlenstämmen in der Nähe des Wasserfalles. 8. August 1897.
- P. circinalis* Fr. Auf einem Kiefernstumpf im Walde. 15. August 1897.
- P. velutinus* Fr. An einem Buchenstumpf. 1. August 1897.
- P. perennis* Fr. An Anhöhen am Walde. 15. August 1897.
- Fomes annosus* Fr. (= *Trametes radiciperda* Hart.) An Kiefernstumpfen und Wurzeln häufig. August und September 1897.
- F. applanatus* Fr. An einem Laubholzstamm im Walde. 1. August 1897 (Dr. Bitter).
- Die Oberfläche des Hutes war mit Conidienpulver bedeckt.
- Trametes gibbosa* Fr. An Stämmen im Walde. 1. August 1897.
- Daedalea unicolor* (Bull.) Fr. An einem Birkenstumpf im Walde. 1. August 1897.
- Lenzites betulina* (L.) Fr. Ebendort. 1. August 1897.
- L. saepiaria* (Wulf.) Fr. An kieferner Latte im Walde. 8. August 1897.
- Tylophilus felleus* (Bull.) Karst. An Anhöhen unter Kiefern. 15. Aug. 1897.
- Boletus scaber* (Bull.) Fr. Häufig unter Birken. September 1896. 15. August 1897.
- B. bulbosus* Schaeff. (= *B. edulis* Fr). Vereinzelt im Walde. 15. August 1897.
- B. luridus* Schaeff. Im Walde nach dem Forsthause zu. 1. August 1897.
- B. subtomentosus* L. An Waldwegen. 1. August 1897.
- B. badius* Fr. Unter Kiefern. 15. August 1897.
- B. piperatus* Bull. An Waldwegen. 1. August 1897.
- B. luteus* L. Ebendort. 15. August 1897.

Agaricaceae.

- Cantharellus cibarius* Fr. Im Walde vereinzelt bemerkt.
- C. aurantiacus* (Wulf.) Fr. Zwischen Moosen im Walde. 15. August 1897.
- C. tubaeformis* (Bull.) Fr. Heerdenweise an Anhöhen im Walde. 30. August 1896.
- C. infundibuliformis* (Scop.) Fr. Daselbst. 30. August 1896. An Wegrändern beim Wasserfall. 8. August 1897.

- Paxillus involutus* (Batsch) Fr. Unter Birken am Waldwege. 1. August 1897.
- Coprinus lagopus* Fr. Zwischen Laub im Walde. 15. August 1897.
- Gomphidius viscidus* (L.) Fr. In der Nähe des Wasserfalls. 8. August 1897.
- Limacium eburneum* (Bull.) Fr. Ebendort zwischen Laub. 8. August 1897.
- Lactaria seriffua* (DC.) Schröt. Im Walde. 15. August 1897.
- L. subdulcis* (Bull.) Schröt. Ebendort. 15. August 1897.
- L. glyciosma* (Fr.) Schröt. Zwischen Moosen. 8. August 1897.
- L. blennia* (Fr.) P. Henn. Ebendort zwischen Laub. 8. August 1897.
- L. necator* (Pers.) Schröt. Unter Birken am Wege. 8. August 1897.
- Russula fragilis* (Pers.) Fr. Im Walde. 8. August 1897.
- R. emetica* (Schaeff.) Fr. Ebendort 8. August 1897.
- R. pectinata* (Bull.) Fr. Ebendort. 1. August 1897.
- R. foetens* Pers. Unter Birken. 8. August 1897.
- R. rubra* (DC.) Fr. In der Nähe des Wasserfalles. 8. August 1897.
- R. adusta* (Pers.) Fr. An einem Waldwege. 15. August 1897.
- Russulina decolorans* (Fr.) Schröt. Auf einem Waldwege nahe dem Wasserfall. 15. August 1897.
- R. puellaris* (Fr.) Schröt. An einer feuchten Stelle im Walde. 8. August 1897.
- R. alutacea* (Pers.) Schröt. An Anhöhen im Walde. 8. August 1897.
- R. lutea* (Huds.) Schröt. Im Walde häufig. 1. August 1897.
- R. chaemaeleontina* (Fr.) Ebenso. 8. August 1897.
- R. aurata* (Fr.) An Anhöhen zwischen Laub in der Nähe des Wasserfalls mehrfach. 8. August 1897.
- Marasmius alliatus* (Schaeff.) Schröt. An einem Buchenstumpf und auf dürrem Sandboden. 8. August 1897.
- M. caryophyllus* (Schaeff.) Schröt. An einem Waldwege. 1. August 1897.
- M. urens* Fr. Zwischen faulem Laub. 8. August 1897.
- Hypholoma appendiculatum* (Bull.) Fr. Zwischen Laub in der Umgebung des Wasserfalles. 15. August 1897.
- H. fasciculare* (Huds.) Fr. Rasig an Baumstämmen im Walde. 1. August 1897.
- H. lateritium* (Schaeff.) Schröt. Ebenda. 15. August 1897.
- Stropharia viridula* (Schaeff.) Ebenda. 8. August 1897.
- St. albo-cyanea* Fr. Zwischen Moosen an Waldwegen. 8. August 1897.
- Psalliota silvatica* (Schaeff.) Fr. Am Bach nahe dem Wasserfall.
- Crepidotus mollis* (Schaeff.) Fr. An einem faulenden Ast. 1. August 1897.
- Galera Hypni* (Batsch). Zwischen Moosen nahe dem Wasserfall. 8. August 1897.
- Hebeloma crustuliniformis* (Bull.) Fr. Am Waldwege. 1. August 1897.
- Inocybe geophylla* (Sow.) Fr. An Wegrändern beim Wasserfall und unter Eichen. 8. August 1897.

- Inocybe rimosa* (Bull.) Fr. Ebendort. 1. August 1897.
I. cristata Scop. Auf dürrem Sandboden oberhalb des Bahnkörpers.
 8. August 1897.
Cortinariu8 obtusus Fr. An Waldwegen. 8. August 1897.
C. decipiens (Pers.) Fr. Auf Sandboden beim Bahnhofe. 8. August 1897.
C. albo-violaceus (Pers.) Fr. Unter Buchen im Walde. 15. August 1897.
Naucoria pediades Fr. Am Wege vor der Försterei. 1. August 1897.
Flammula carbonaria Fr. Auf einer kleinen Brandstelle am Wald-
 wege. 8. August 1897.
Pholiota mutabilis (Schaeff.) Fr. Rasig an Baumstümpfen. 1. August
 1897.
Nolanea pascua (Pers.) Fr. Zwischen Moosen im Walde. 1. August 1897.
Clitopilus Prunulus Scop. Am Waldwege. 1. August 1897.
C. cancerina Fr. Auf einem dürrer Sandfeld oberhalb des Bahnhofes.
 8. August 1897.
Pluteus cervinus (Schaeff.) Fr. forma *nigricans*. An einem Baumstumpf
 im Walde. 8. August 1897.
P. nanus Fr. An einem Birkenstumpf im Walde. 15. August 1897.
Russuliopsis laccata (Scop.) Schröt. Im Walde häufig in verschiedenen
 Formen beobachtet.
Omphalia Fibula (Bull.) Fr. Zwischen Gräsern im Walde. 1. August 1897.
 var. *Swartzii* Fr. Ebendort.
O. Campanella (Batsch) Fr. Rasig an einem Kiefernstumpf. 1. August
 1897.
O. muralis Fries. Auf einem Dache bei der Oberförsterei. October 1896
 (Dr. A. Möller).
Mycena corticola (Pers.) Fr. Auf faulenden Aesten des Brücken-
 geländers nahe dem Wasserfall heerdenweise. 1. August 1897.
M. epipterygia (Scop.) Fr. Zwischen Moosen im Walde. 15. August
 1897.
M. sanguinolenta (A. u. Schw.) Fr. Zwischen Laub daselbst. 15. August
 1897.
M. filipes (Bull.) Fr. Ebendort. 8. August 1897.
M. rosea (Bull.) Fr. Ebendort. 15. August 1897.
M. galericulata (Scop.) Fr. Rasig am Baumstumpf. 1. August 1897.
Collybia butyracea (Bull.). Zwischen Laub. 1. und 15. August 1897.
C. fusipes (Bull.) Fr. Zwischen Laub nahe der Försterei. 1. August
 1897.
C. macrourus (Scop.) (= *C. radicans* Relh.) Zwischen Laub. 1. August
 1897.
Clitocybe candicans (Pers.) Fr. Zwischen Laub. 1. August 1897.
C. odora (Bull.) Fr. Ebendort. 1. August 1897.
C. infundibuliformis (Schaeff.). Ebendort. 8. August 1897.
Tricholoma sulfureum (Bull.) Fr. Ebendort. 15. August 1897.

- Tricholoma nudum* (Bull.) Fr. Ebendort. 8. August 1897.
T. equestre (L.) Fr. Unter Kiefern. October 1897 (Dr. A. Möller).
Armillaria mellea (Vahl) Fr. Häufig an Baumstümpfen.
A. mucida (Schrad.) Fr. An abgestorbenen Buchenästen. 15. August 1897.
Lepiota granulosa (Batsch) Fr. Zwischen Moosen, 15. August 1897.
L. cristata (Bolt.) Fr. Zwischen Laub im Walde. 15. August 1897.
L. procera (Scop.) Fr. Am Waldwege. 30. August 1897.
L. gracilentata Kalchbr.? Im Walde. 30. August 1896 (Dr. A. Möller).
Amanitopsis plumbea (Schaeff.) Schröt. Unter Birken im Walde. 15. August 1897.
Amanita pustulata (Schaeff.) Schröt. (= *A. rubescens* Fr.) Im Walde. 8. August 1897.
A. porphyria (Alb. und Schw.) Fr. Ebendort. 15. August 1897.
A. phalloides Fr. An Waldwegen. 30. August 1896.

Phallaceae.

- Phallus impudicus* L. Im Forst. 12. September 1897 (Dr. A. Möller).
 Eins der von Dr. Möller gesammelten Exemplare trug auf einem etwas verbreiterten Stiel 2 Hüte, die mit einander verwachsen waren.

Lycoperdaceae.

- Lycoperdon piriforme* Schaeff. Rasig an einem Buchenstumpf. 30. August 1896.
L. caelatum Bull. Auf Waldplätzen. 8. August 1897.
L. gemmatum Batsch. Ebendort. 8. August 1897.
L. constellatum. Auf einem dünnen Sandfelde oberhalb des Bahnhofes. 8. August 1897.

Nidulariaceae.

- Cyathus striatus* (Huds.) Hoffm. Zwischen faulenden Zweigen nahe dem Wasserfall. 1. August 1897.
Crucibulum vulgare Tul. Ebenda. 8. August 1897.

Helvellaceae.

- Morchella elata* Pers. forma *lacunosa*. Ein riesiges Exemplar wurde nebst kleineren Exemplaren unter Gebüsch im Garten der alten Akademie zu Eberswalde am 4. Juni 1897 von Herrn Oberförster Dr. A. Möller gesammelt und mir freundlichst übersandt. Dasselbe ist 35 cm hoch, der kegelförmige nach oben zugespitzte, am Grunde vom Stiel nicht getrennte Hut ist von sehr stark hervortretenden Längsrippen und welligen Querleisten durchzogen, olivenbraun, 17 $\frac{1}{2}$ cm hoch, 12 cm breit. Der

- Stiel ist cylindrisch, am Grunde bauchig verdickt, von hervorragenden gewundenen Falten kraus und tiefgubig, im Innern hohl, 17 $\frac{1}{2}$ cm hoch, 13 cm dick, blass. Die grössten Exemplare dieses Pilzes sind bisher aus Schlesien bekannt geworden; diese sind nach Schröter 30 cm hoch, 10 cm breit. Vorliegendes Exemplar dürfte diese noch um ein bedeutendes überragen und wohl das grösste der bisher beschriebenen sein. Von *M. conica* Pers. ist der Pilz kaum unterscheidbar und als Varietät zu betrachten.
- Helvella crispa* (Scop.) Fries. Unter Buchen unweit des Wasserfalles. 15. August 1897.
- H. lacunosa* Afz. Unter Kiefern nahe der Promenade. 27. September 1896.

Pezizaceae.

- Sepultaria* cfr. *arenosa* (Fink.) Rehm. Am Wege nahe dem Aussichtsturm im Sande. 27. September 1896.
- Humaria scutellata* Fuek. Auf faulendem Holz beim Wasserfall. 8. August 1897.

Mollisiaceae.

- Mollisia cinerea* (Batsch) Karst. Auf morschen Aesten eines Brückengeländers. 1. August 1897.

Bulgariaceae.

- Orbilbia coccinella* (Sommf.) Karst. Auf faulenden, entrindeten Zweigen im Walde. 1. August 1897.
- Bulgaria polymorpha* (Fl. Dan.) Wettst. Auf Stammstücken von Buchen im Walde. 1. August 1897.

Ascoboleae.

- Ascophanus pyronemoides* Rehm. An einem Waldwege auf Menschenkot. 1. August 1897.

Phacidiaeae.

- Coccomyces coronatus* (Schum.) De Not. Auf faulenden Eichenblättern im Walde. 1. August 1897.

Chaetomiaceae.

- Chaetomium elatum* Kunze. Heerdenweise auf faulenden Halmen von *Aira flexuosa* im Walde. 8. August 1897.

Melanommaceae.

- Melanomma Pulvis pyrius* (Pers.) Fuek. Auf faulenden Holzstücken im Walde. 1. August 1897.
- Bertia moriformis* (Tode) De Not. Auf faulenden Stümpfen daselbst. 1. August 1897.

Sphaerelloideae.

Stigmatea Robertianae Fr. Auf Blättern von *Geranium Robertianum* nahe dem Wasserfall. 15. August 1897.

Hypocreaceae.

Nectria consanguinea Rehm. Auf morschem Holze. 1. August 1897.

N. Pezizae (Tode) Fr. Auf faulenden Holzstücken. 1. August 1897.

Hypocrea fungicola Karst. Auf einem Fruchtkörper von *Fomes igniarius* am Wasserfall. 8. August 1897.

H. gelatinosa Fr. Auf der Schnittfläche eines Kiefernstumpfes. 19. September 1897.

Sordarieae.

Sordaria humana Wint. In einem Waldwege auf Menschenkot mit *Ascophanus pyronemoides* Rehm. 1. August 1897.

Xylariceae.

Ustulina vulgaris Tul. Am Grunde eines Stammes im Walde. 1. August 1897.

Hypoxylon multiforme Fr. An faulenden Aesten eines Brückengeländers. 1. August 1897.

Xylaria Hypoxylon (L.) Fr. An Baumstümpfen im Walde. 1. August 1897.

X. digitata Grev. Ebendort. 1. August 1897 (Dr. Lindau).

X. polymorpha (Pers.) Tul. Ebendort. 8. August 1897.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Hennings Paul Christoph

Artikel/Article: [Erster Beitrag zur Pilzflora der Umgegend von Eberswalde. 108-117](#)