

# Beitrag zur Pilzflora des Waldes am Liepnitzsee.

Von

**P. Hennings.**

Von Herrn H. Paul wurde auf einer am 3. November d. J. in Begleitung der Herren Loeske und Hees ausgeführten bryologischen Excursion ausser zahlreichen z. T. seltenen Moosen, reichlich 50 Pilzarten in schönen und meist reichlichen Exemplaren gesammelt, welche sämtlich von mir präpariert der Sammlung des botanischen Museums einverleibt worden sind. Es finden sich einzelne seltenere Arten dabei und will ich dieselben hier in Kürze namhaft machen:

*Tremella mesenterica* (Schaeff.) an Buchenzweigen; *Calocera viscosa* (Pers.); *Thelephora laciniata* (Pers.); *T. palmata* (Scop.); *Craterellus cornucopioides* (L.); *Clavaria cristata* (Holmsk.); *C. abietina* (Pers.); *C. argillacea* (Pers.); *Sparassis ramosa* (Schaeff.); *Irpex fusco-violaceus* Schrad f. *resupinata*; *Merulius tremellosus* Schrad.; *Polyporus fragilis* Fr.; *P. mollis* (Pers.); *P. adustus* (W.); *P. radiatus* (Sow.) e. forma *resupinata*; *Boletus subtomentosus* L.; *B. variegatus* Sw.; *Boletopsis luteus* (L.); *Gomphidius viscidus* (L.); *Hygrophorus niveus* (Scop.); *Limacium Vitellum* (Alb. et Schw.); *Lactaria torminosa* (Schaeff.) in einem Exemplar von 13 cm Durchmesser; *L. minima* Smith. mit Hüten von 1—2 cm Durchmesser und exentrischem Stiel, mit Abbildung in Cooke Illustr. Br. Fungi t. 986 b und Beschreibung gut übereinstimmend, für Deutschland bisher nicht bekannt; *L. vellerea*; *L. deliciosa* (L.); *Lentinus (Panus) stypticus* (Bull.); *Marasmius peronatus* (Bolt.); *Psilocybe sarcocephala*; *Cortinarius (Dermocybe) caninus* Fr.; *C. (Telamonia) flexipes* (Pers.); *Pholiota mutabilis* (Schaeff.); *Pluteus cervinus* (Schaeff.); *Omphalia Campanella* (Batsch); *Mycena atrocyanea* (Batsch); *M. rosea* (Bull.); *Collybia maculata* (Alb. et Schw.); *Clitocybe angustissima* (Lasch); *C. cyathiformis* (Bull.) var. *cinerascens*; *C. vibecina* Fr.; *C. phyllophila* (Pers.); *C. odora* (Bull.) form. *cinerea*; *Tricholoma bicolor* (Pers.); *T. sulfureum* (Bull.), *T. saponaceum* (Fr.); *T. equestre*; *T. portentosum* (Fr.); *Cortinellus imbricatus* (Fr.); *Armillaria mucida* (Schrad.); *Lepiota Carcharias* (Pers.); *Amanita muscaria* (L.); *Lycoperdon piriforme* (Schaeff.); *Helotium virgultorum* (Vahl.); *Otidea onotica* (Pers.); *Plicaria pustulata* (Hedw.).

---