

Uebersicht

neuer, bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefässpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus den Jahren 1900 und 1901.

Von

P. Ascherson und W. Retzdorff.

(Vergl. Jahrgang XLII. S. 284—294.)

Fettdruck bezeichnet für das Gebiet neue Formen und zwar **antike** Schrift einheimische, *cursive* eingeführte Pflanzen.

A. u. G. Syn. Ascherson und Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Lief. 10—17. Leipzig.

BAP. Zeitschrift der Botanischen Abteilung des Naturwissenschaftlichen Vereins der Provinz Posen. Herausgegeben von F. Pfuhl.

BC. Botanisches Centralblatt

Br. Brandenburgia. Monatsblatt d. Gesellsch. f. Heimatkunde d. Prov. Brandenburg zu Berlin.

B. z. R. Fl. Beiträge zur Ruppiner Flora von C. Warnstorf in den Schriften des Naturwissenschaftl. Vereins des Harzes (Wernigerode). Jahrg. 1892 S. 63—90 (s. bei *Equisetum*).

BV. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.

DBG. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

DBM. Deutsche Botanische Monatsschrift von Leimbach.

H. Helios, Organ des Naturwissensch. Vereins des Regier.-Bezirks Frankfurt. Herausgegeben von H. Roedel.

La. bei der Gattung *Carex* = W. Lackowitz, Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg. 12. Aufl. Berlin 1901. Vervollständigt durch schriftliche Mitteilungen des Verfassers.

NVM. Abhandlungen des Naturwissensch. Vereins in Magdeburg.

SG. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

T. z. B. d. P. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und Formen von M. Goldschmidt-Geisa (s. bei *Equisetum*).

Literatur (ausser A. u. G. Syn. und La.).

Ascherson, P., Bericht über die 72. (42. Frühjahrs-) Haupt-Versammlung zu Neu-Strelitz am 10. Juni 1900. (BV. XLII S. I—VII.)

— Bericht über die 74. (43. Frühjahrs-) Haupt-Versammlung zu Lehnin am 2. Juni 1901. (BV. XLIII S. I—X.)

- Ascherson, P., Ueber die Verbreitung von *Myrica Gale*. (BV. a. a. O. S. VIII.)
- Vorlage von *Empetrum nigrum* und *Carex heleonastes*. (a. a. O. S. XXIV, XXV.)
- Becker, W., *Ajuga genevensis* und *reptans* und ihre Hybriden. (DBM. XIX S. 33—36.)
- Behrendsen, W., Teratologische Beobachtungen bei einigen *Carex*-Arten. (BV. XLIII (1901) S. 107—111.)
- Berdrow, H., Die Eiben der Buch'schen Fasanerie. (Br. IX S. 327.)
- Brand, A., Nachträge zu Huth's Flora von Frankfurt. (Helios Band 15 S. 55—66, Band 16 S. 67, 68)
- Fitschen, J., Kleine Beiträge zur Flora Magdeburgs. (Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Magdeburg 1898—1900 u. 1900—1902.)
- Friedel, E., Ueber Hauslaub (Hauslauch) *Sempervivum soboliferum* und *S. tectorum*. (Br. IX S. 328.)
- Der Elsbeerbaum und seine nächsten Verwandten. (Br. IX S. 330—335.)
- Hermann, F., Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietsteilen. (BV. XLIII S. 147—151.)
- Höck, F., Studien über die geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs VI. (BV. XLIII S. 1—14.)
- Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts. (BC. Beihefte Band IX S. 241, 321, 401, Band X (1901).)
- Schulz, Roman, Die Achilleen der Berliner Adventiv-Flora. (BV. XLIII S. 72—79.)
- Torka, V., *Anthericum Liliago*. (BAP. VII S. 44)
- Mitteilungen zur Flora der Umgegend Paradies-Jordan und Schwiebus. (BAP. VII S. 55—60, 65—67.)
- Zschacke, H., Beiträge zur Flora Anhaltina. VIII. (DBM. XIX S. 23—25, 72—74, 108—109, 131—133.)
-
- Haberland, M., Flora von Neustrelitz. 1901.
- Krause, Ernst H. L., Floristische Notizen XI. Centrospermae. (BC. Band 82 S. 102 ff.)
- XII Tubiflorae. (BC. Beihefte Band IX S. 481—510.)
- Miller, Zur Flora der Umgegend von Tirschtiegel im Kreise Meseritz. (BAP. VII S. 1—16.)
- Schlube, Th., Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen- und Gefäßkryptogamen-Flora im Jahre 1900. (SG. Band 78 II. Abt. S. 94—115.)
- desgl. im Jahre 1901. (SG. Band 79 II. Abth. S. 23—37.)
-

Aspidium cristatum × *spinulosum*. Potsdam: Moosfenn am Fusse der Rabensberge, daselbst auch m. *furcatum*. H. Wolff und Paul F. F. Schulz. Storkow. H. Wolff. Landsberg a. W.: Stolzenberg. 1894. Hirte.

Pteridium aquilinum.

f. *umbrosa* Luerss. Spandau: schattige Stellen im Park von Neu-Cladow. Prager. (A. u. G. Syn. S. 83.)

f. m. *furcatum* Prager. Spitze der Spreite gegabelt. Einmal in der Sackrower Forst bei Potsdam gefunden. Die Normalform 1901 sehr zahlreich in Frucht. Prager und Boas.

Polypodium vulgare.

m. *furcatum* Milde. In den verschiedensten Gabelungen.

m. *geminalum* Lasch. Ein Exemplar.

m. *bifidum* Woll. Spandau: an einem Abhänge des Kiefernwaldes bei Cladow, seit einigen Jahren an derselben Stelle beobachtet. Prager

Pitularia globulifera. Brandenburg: Marzahner Fenn. F. Hoffmann.

Equisetum arvense f. *nigricans* Warnst. Spandau: Ziegelei von Gr. Glienicke, auf Wiesen. Prager. (B. z. R. Fl.)

f. *distachya* Klf. Spandau: Abhänge der Havel bei Cladow 1902 in wenigen Exemplaren; 2 Aehren übereinander. Prager. (T. z. B. d. P. S. 47)

f. *annulata* Klf. Spandau: Abhänge der Havel bei Cladow. An einem Exemplar 3 Ringe. Prager.

var. *campestre* Schultz.

f. *nuda* Milde. Völlig astlos, bisher einmal in wenigen Exempl. Prager. (A. u. G. Syn. S. 130 und B. z. R. Fl.)

f. *pauciramosa* Warnst.

f. *genuina* Milde.

f. *ramulosa* Prager. Aeste verzweigt.

f. *prolifera* Milde. In den verschiedensten Stufen, zuweilen war die Durchwachsung ein vollkommen entwickelter Ast. (B. z. R. Fl.)

Alle Formen von var. *campestre* von Prager bei Spandau: Cladow, Abhänge der Havel beobachtet.

E. palustre var. *verticillatum* Milde f. *ramulosa* Milde. Berlin: Gebüsch in der Jungfernheide. Prager. Zum ersten Male bei Wannsee 1894. (Conrad und Prager BV. XXXVI 1894 S. 64. A. u. G. Syn. S. 133.)

E. heleocharis f. *prolifera* Milde.

f. *distachya* Milde. Spandau: Wiesengräben an der Havel bei Cladow. 1901. Prager. (A. u. G. Syn. S. 136.)

m. *polystachyum*. Straussberg: Südostufer des Ihland-Sees. 1893. Hirte.

- Equisetum arvense* × *heleocharis* = *E. litorale*. Landsberg a. W.: Nördliches Warthe-Ufer bei der Lorenzdorfer Fähre. 1889. Hirte. f. *ramulosa* Warnst. Potsdam: Pfaueninsel. Prager. f. *humile* Milde. Spandau: Abhänge der Havel bei Cladow in wenigen Exemplaren. 1901. Prager. (A. u. G. Syn. S. 138 und B. z. R. Fl.)
- Potamogeton fluitans*. Coethen: im Graben der Pissdorfer Lehmgrube. Zschacke. (DBM. XIX S. 23.) Diese Pflanze war früher von Zschacke zu *P. natans* B. *prolixus* gerechnet worden. (DBM. XVIII S. 20.) Küstrin: Mietzel bei Neumühl. 1901. Hirte.
- P. praelongus*. Landsberg a. W.: Viehtrift am Kanal. 1894. Hirte.
- P. nitens* var. *curvifolius*. Schwiebus: Südufer des Packlitz-Sees. Torka.
- P. rutilus*. Rathenow: im neuen Kanal. 1900. Plöttner.
- Ruppia rostellata*. Magdeburg: in der Sülze bei Dodendorf in Menge. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 148.) Durch diesen Fund für das Gebiet wieder gesichert.
- Zannichellia palustris* f. *repens*. Lychen: Wurl-See. 1899. Conrad.
- Najas minor*. Köpenick: Wupatz-See in der Rüdersdorfer Forst. 1891. Hirte. (Dasselbst auch *N. major*.)
- † *Panicum Italicum* f. *longisetum*. Magdeburg: Hafengelände 1898; am Hohendodelebener Wege 1899. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 149.)
- P. verticillatum*. Magdeburg: Wilhelmstadt. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 149.)
- Stupa pennata* A. Joannis. Cönnern: oberer Rand des wilden Busches. Hermann. (BV. XLIII S. 147.)
- † *Phleum Graecum*. Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. 1898. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 149.)
- † *Polypogon Monspeliensis*. Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. 1898. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 149.)
- Agrostis alba* var. *flavida*. Bernburg: nach Cüstrena zu. Hermann. (BV. XLIII S. 148.)
- A. vulgaris* m. *vivipara*. Lychen: im Weggenbusch. 1899. Conrad.
- Avena elatior* B. *subhirsuta*. Bernburg: am Hecklinger Busche. Zschacke. (BV. XLIII S. 148.)
- Trisetum flavescens* Unterart *T. pratense* var. *glabratum*. Die Formen *lutescens* und *variegatum pauciflorum* bei Bernburg: Hohes Saaleufer bei Dröbel. Hermann. (BV. XLIII S. 148.)
- † *Melica altissima*. Dessau: Luisium. Hermann (BV. XLIII S. 148.)
- Koeleria cristata* B. *gracilis* var. *pallida*. Bernburg: Hohlweg vor Drosa. Hermann. (BV. XLIII. S. 148.)
- † *Eragrostis Caroliniana* (*E. Purshii*). Berlin: alter Botanischer Garten als unvertilgbares Unkraut. (A. u. G. Syn. II 1. S. 374.)

- † *Eragrostis minor*. Potsdam: Bahnhof Wannsee zwischen den Schienen, September 1901. P. Gräbner!! Rotenburg a. O.: am Bahnhof. Hellwig. (Schube, SG. 79 II. Abteil. S. 26.)
- Poa palustris* m. **vivipara**. (Graebner Naturf. Ges. Danzig N. F. IX 1. 343). Nauen: Haltestelle Finkenkrug!! (A. u. G. Syn. II 1. S. 419.)
- P. trivialis* m. **vivipara**. Bernburg: zwischen Baalberge und Poley. Hermann. (BV. XLIII S. 148.)
- Festuca elatior* × *gigantea* (*F. Schlickumii*). Baruth: im „Busch“ bei Dornswalde. 1901. Conrad.
- F. ovina* Unterart *eu-ovina* var. **psammophila**. (Hackel Monog. Festuc. S. 96, 1882.) Provinz Brandenburg. (A. u. G. Syn. II 1. S. 473.)
B. *Vallesiaca*. Bernburg: am Hecklinger Busche. Zschacke. Hang des Fuhnesteinbruches. Hermann. (BV. XLIII S. 148.)
- † *Cynosurus echinatus* unter Esparsette bei Gerswalde, Pinnow und Prenzlau: Sternhagen. 1880. Grantzow! (A. u. G. Syn. II 1. S. 570.)
- † *Bromus brachystachys* ist bei Aschersleben noch jetzt spärlich in der Eine- und Wipper-Niederung vorhanden. Preuss. (A. u. G. Syn. II 1. S. 613.) Templin: Petznick unter Klee. 1872. Grantzow! Bei der Unzuverlässigkeit dieses letztgedachten Beobachters sehr fraglich. (A. u. G. Syn. II 1. S. 613.)
- † *B. macrostachys* mit Wolle eingeschleppt. Neuruppin: bei der Ebelschen Fabrik. 1885. K. Warnstorf u. Ascherson. (A. u. G. Syn. II 1. S. 626.)
- † *B. unioloides*. Zossen: Rangsdorf, beim Bahnhof. Piotrowski u. Ascherson. 1897. (DBG. XVIII 1900 S. 63.)
- Brachypodium pinnatum* var. **rupestre**. Lychen: Höhen nördlich am Wurl-See. 1899. Conrad.
- B. silvaticum* var. **cristatum**. Conrad. (Allg. Bot. Zeitschrift 1901 S. 199.) Baruth: im „Busch“ bei Dornswalde. 1901. Conrad.
- Triticum repens* B. *genuinum* var. **majus**. Bernburg: Saaleufer nach dem Parforcehause zu. Hermann. (BV. XLIII S. 148.)
var. **glaucum**. Bernburg: Aderstedter Weinberg. Hermann. (wie vor.)
- T. repens* B. **biflorum**. Eine dieser bisher nur in den Alpen beobachteten Unterart jedenfalls nahestehende Form. Potsdam: im nassen Erlenbruche dicht neben der Caputer Fähre. Graebner!! (A. u. G. Syn. II 1. S. 656.)
- † *T. prostratum*. Magdeburg: am Hohendodelebener Wege 1898. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 149.)
- Carex dioeca* var. **Metteniana**. Birkenwerder: am Boddensee. La.

- Carex obtusata*. Rhinow: Gollenberg Plöttner! Zweiter Fundort, vgl. BV. XXXIX (1897) S. XXVIII.
- C. cyperoides*. Berlin: Neu-Anlage des Botanischen Gartens in Dahlem 1900—1902. Axel Lange!! Graebner.
- C. disticha*
 var. *abbreviata*. Spandau: grosse Lake bei Finkenkrug. La.
 var. *bracteata*. Nauen: Ceestower Wiesen. La.
 var. *luxurians*. Strausberg: am Ihlandsee. La.
 var. *minor*. Nauen: Ceestower Wiesen. La.
- C. praecoœ*
 var. *monostachys*. Friesack: Teufelsberg bei Landin!! Nauen Bredower Forst. La.
- C. vulpina*
 var. *interrupta*. Berlin: Heinersdorf. La.
 var. *minor*. Nauen: Gräben am Ceestower Damm. La.
- C. paradoxa*
 var. *gracilis*. Spandau: Haltestelle Finkenkrug. Paul F. F. Schulz.
 var. *simplex*. Berlin: Jungfernheide. La.
- C. diandra* (*C. teretiuscula*)
 var. *major*. Birkenwerder: am Sandsee. La.
 var. *tenella*. Berlin: Grunewald, Fenn hinter Paulsborn. La.
- C. leporina*
 var. *longibracteata*. Rathenow: Stadtforst. La.
 var. *robusta*. Rathenow: Stadtforst; Lychen: Tangersdorf. La.
- C. elongata*
 var. *heterostachys*. Berlin: Neuer Krug an der Oberspree. La.
- C. canescens*
 var. *bracteata*. Templin: Annenwalde. La.
- C. heleonastes*. Sommerfeld: am Kulmer See. R. Schultz, Juni 1901. (BV. XLIII S. XXV.)
- C. stricta*
 var. *bracteata*. Berlin: Jungfernheide. La.
 var. *humilis*. Berlin: Mühlenbecker Forst. La.
 var. *mascula*. Spandau: Stadtforst. La.
 var. *subrotunda*. Nauen: Ceestower Wiesen. La. Baruth: Dornswalde. 1901. Conrad.
 var. *fallax*. Baruth: Wiesen des Baruther Thals bei Dornswalde. 1901. Conrad.
 var. *nigrans*. Ebenda. Conrad.
- C. caespitosa*. Luckenwalde: „Neue Wiesen“ zwischen Berkenbrück und Dobbrikow. 1901!! (Ascherson, BV. XLIII S. IX.) Spandau: Wiesen am Kienhorst. Paul F. F. Schulz.
 var. *retorta*. Berlin: Jungfernheide. La.

Carex caespitosa f. *retorta*, in dem Sinne, wie Fries in Bot. Not. 1843 verstanden: *flaccida, spicis gracillimis, subpendulis, rarifloris, C. acutae personatae analoga*. Da die älteren schwedischen Botaniker Bastarde in der Gattung *Carex* nicht kannten oder doch nicht anerkannten, so wurden mit dieser *retorta* bald ähnliche der zahlreicheren hybriden Formen vermischet, und der Charakter der ursprünglichen Fries'schen Form verwischte sich, so dass Andersson in seinen Cyper. Scand. 1849 schreiben konnte: *Forma retorta inter C. strictam et caespitosam quasi media videtur*, und nun eine kurze Beschreibung folgt, die sofort erkennen lässt, dass er nicht die ursprüngliche Form, sondern einen der *stricta*-Bastarde im Auge gehabt hat. Solche Vermischung ist jedoch, nachdem nun die Kreuzungen auch in der Gattung *Carex* allgemein Geltung gewonnen haben, unschwer zu vermeiden, da ja der Form *retorta* auch die so eigentümlichen Basalscheiden der *C. stricta* und aller ihrer Bastarde gänzlich fehlen. Infolge dieser Vermischung macht nun zwar Kükenthal (brieflich) den Vorschlag, dass es vielleicht besser wäre, den Namen *retorta* ganz fallen zu lassen; indessen sehe ich dazu keine Veranlassung, da die Form durchaus charakteristisch ist und ähnliche Bastardbildungen leicht davon getrennt gehalten werden können. Zu bemerken ist noch, dass die Form, wenn sie aus dem schattigen Elsenbruch auf die freie Wiese hinausrückt, zwar den ganzen Habitus beibehält, die langen, äusserst schmalen Aehrchen aber den *personata*-Charakter verlieren, eine Form, die man als *leptostachys* bezeichnen könnte, wenn man ihr sonst einen Namen geben will. W. Laekowitz.

C. Buekii. Dessau: zwischen Brambach und dem Akenschen Thorhause. Hermann. (BV. XLIII S. 149.) Zweiter Fundort im Gebiet.

C. gracilis

- var. *angustifolia*. Spandau: Stadtforst. La.
- var. *amblylepis*. Spandau: Finkenkrug. La.
- var. *compacta*. Spandau: Finkenkrug. La.
- var. *fluviatilis*. Berlin: Tegeler See. La.
- var. *fuliginosa*. Spandau: Finkenkrug. La.
- var. *humilis*. Berlin: Jungfernbeide. La.
- var. *personata*. Berlin: Buch; Spandau: Finkenkrug. La.
- var. *pseudoaquatilis*. Spandau: Finkenkrug; Baruth: Dornswalde. La.
- var. *rudis*. Rathenow: Nennhausen. La. Baruth: Dornswalde. Conrad. 1901.
- var. *seminuda*. Spandau: Finkenkrug; Baruth: Dornswalde. La.
- var. *strictifolia*. Spandau: Finkenkrug. La.
- var. *tricostata*. Berlin: Buch; Spandau: Finkenkrug. La.
- — *praticola*. Oranienburg: am Lehnitzsee. La.

Carex gracilis

var. *zygostachys*. Nauen: Brieselang; Baruth: Dornswalde. La.

C. gracilis × **stricta**. Berlin: Tegel. La.

C. caespitosa × **stricta**. Köpenick: Wuhlewiesen. La.

C. stricta × *Goodenoughii*. Spandau: Wiesen im Brieselang. H. Wolff.
f. **superstricta**. Berlin: Fenn zwischen dem Hundekehlen- und
Grunewald-See. 1893. Hirte. (ABZ. 1901 S. 57, Thür.
Bot. Verein X S. 34—41.)

C. Goodenoughii (= *vulgaris*)

var. **ramifera**. Baruth: Dornswalde. La.

var. *densicarpa*. Spandau: Stadtforst. La.

var. *juncella*. Berlin: Tegel. La.

C. Buxbaumii. Aschersleben: im früheren See zwischen Nachterstedt und Friedrichsaue. Bernburg: Wipperwiese bei Giersleben, an beiden Orten ganz vereinzelt. Hermann (BV. XLIII S. 149.) Diese seit Jahren in der Berliner Flora nicht mehr beobachtete Art (auf den Rudower Wiesen dürfte sie wohl, wie fast die gesamte interessante Flora dieser früher so ergiebigen Oertlichkeit, der Ausdehnung der Spaethschen Baumschulen zum Opfer gefallen sein) hat sich in der Umgebung der Nachbarstadt Spandau unvermuteterweise als sehr verbreitet herausgestellt. 1901 wurde sie von Ascherson und Graebner auf den Wiesen im Süden der Stadtforst, den sogen. Sandwiesen nördl. vom Forstort Hinter-Kissel, von H. Wolff auf den Teufelsbruchwiesen im Nordwesten der Stadtforst südwestlich vom Schönwalder Wege in grosser Zahl und Verbreitung festgestellt und von dort bis zu dem altbekannten Fundorte bei Brieselang verfolgt (z. B. auf den Lasszinswiesen beim Finkenkrug und am Kienhorst).

var. *australis*. Nauen: Colonie Brieselang auf Waldwegen.

H. Wolff. Spandau: Wiesen am Kienhorst. Paul F. F. Schulz.

C. pilulifera

var. **major**. Erkner. La.

var. *longibracteata*. Rathenow: Stadtforst. La. Spandau: Stadtheide. Paul F. F. Schulz.

C. montana

var. **monostachys**. Nauen: Bredower Forst. La.

C. verna

var. **globuliflora**. Lychen: Tangersdorf. La.

var. *basigyna* (= *gynobasis*). Potsdam: Wildpark; Lychen: Tangersdorf. La.

var. **longivaginata**. Strausberg. La.

var. **pedunculata**. Lychen: Tangersdorf. La.

C. limosa

var. **laxiformis**. Spandau: Stadtfort. La.

*Carex limosa*var. **monostachys**. Spandau: Hackenfelde. La.var. **robustior**. Berlin: Tegel. La.*C. limosa*f. *acroandra*.f. *hypogyna*.f. *basigyna*.f. *subbasigyna hypogyna*.f. *monostachya mascula*.f. *monostachya hypogyna*.f. *mascula*.

sämtlich unter der Stammart Berlin: Grunewald, im Moor zwischen dem Hundékehlen- und Grunewald-See. Behrendsen. (BV. XLIII S. 109.)

*C. panicea*var. *refracta*. Spandau: Finkenkrug. La.var. *robusta*. Nauen: Brieselang; Spandau: Hackenfelde. La.*C. pallescens*var. *pygmaea*. Berlin: Jungfernheide. La.var. *undulata*. Spandau: Stadtheide. Paul F. F. Schulz.

C. pendula (= *maxima*) bei Spandau von H. Wolff und Bartke stets vergeblich gesucht.

C. digitata. Berlin: auf der jetzt nicht mehr vorhandenen Umfassungsmauer der Dorotheenstädtischen Kirche. October 1853. Helmrich!

var. *brevifolia*. Strausberg: zwischen Schlagmühle und Herrensee.

Paul F. F. Schulz.

*C. distans*var. **pendula**. Nauen: Ceestower Wiesen. La.*C. fulva* (= *Hornschuchiana*)var. **approximata**. Spandau: grosse Lake bei Finkenkrug. La.var. **longibracteata**. Spandau: Wiesen hinter Finkenkrug. La.;

Wiesen am Kienhorst. Paul F. F. Schulz.

C. flava B. *Oederi* var. *elatior*. Baruth: im „Busch“ bei Dornswalde bis 72 cm hohe Exemplare. 1901. Conrad.

var. **cauliculata**. Lychen: Fenn am „Werder“. 1899. Conrad.var. **cyperoides**. Lychen: am kleinen „Lychen“. 1899. Conrad.*C. flava* × *lepidocarpa*. Baruth: Dornswalde häufig. 1901. Conrad.*C. flava* × *Oederi*. Baruth: Dornswalde häufig. 1901. Conrad.*C. lepidocarpa* × *Oederi*. Baruth: Dornswalde häufig. 1901. Conrad.

C. fulva × *flava*. Meseritz, schon auf Brandenburgischem Gebiet t. Ascherson. Torka. (BAP. IV S. 76—78.)

C. fulva × *lepidocarpa*. Spandau: Wiesen an der Stadtforst. H. Wolff.*C. fulva* × *Oederi*. Spandau: Grosse Lake bei Finkenkrug. La.

Carex Pseudocyperus

- f. *acroandra*.
- f. *hypogyna*.
- f. *acrogyna*.
- f. *mesoandra*.
- f. *mesogyna*.
- f. *subbasigyna*.
- f. *cladostachya*.
- f. *bifurca*.

sämtlich mit der Stammart Spandau: Ufer des Schweine-
kutengrabens zwischen Dorf Döberitz und dem Barackenlager.
Behrendsen. (BV. XLIII S. 109.)

C. rostrata

- f. *acroandra*.
- f. *acrogyna*.
- f. *mesoandra*.
- f. *mesogyna*.
- f. *alternans*.
- f. *basigyna*.
- f. *diastachya*.
- f. *diastachya acroandra*.
- f. *diastachya acrogyna*.
- f. *diastachya mesogyna*.
- f. *diastachya feminea*.
- f. *monostachya acrogyna*.
- f. *monostachya mesogyna*.
- f. *monostachya feminea*.
- f. *cladostachya*.

sämtlich unter der Stammart Spandau: auf einer Sumpfwiese
am Schweinekutengraben nahe südlich vom Döberitzer Baracken-
lager. Behrendsen. (BV. XLIII S. 107.)

C. acutiformis

- var. *abbreviata*. Spandau: Hackenfelde; Baruth: Dornswalde. La.
- var. *minor*. Spandau: Finkenkrug. La.

C. hirta

- var. *major*. Nauen: Kl. Hüllpfuhl bei Kl. Behnitz. Paul F. F. Schulz.

Luzula nemorosa (*L. angustifolia*). †Schwiebus: zwischen Jordan und
Rinnersdorf häufig, warscheinlich verschleppt. Torka. (BAP. VIII
S. 67.)

Anthericus liliago. Das Vorkommen dieser in der Provinz Posen bisher
noch nicht beobachteten Art im Grenzgebiet des Kreises Schwiebus
wird von Torka (BAP. VII S. 44) bestätigt, nur ist die Fundort-
Bezeichnung Jordan (BV. XLI S. 224) in Neuhöfchen zu berichtigen.

- Cypripedium calceolus*. Templin: Auf Hügeln in einer Wiese der Kirchenheide (Laatz) 1900. Ahlenstiel. — Retzdorff erhielt schon 1894 von Unruh Nachricht über das Vorkommen, doch konnten Belagsexemplare erst 1900 beschafft werden.
- Orchis incarnatus* var. *ochroleucus*. Schwiebus: am grossen Raden bei Paradies und an der Paklitz nach Schindelmühl zu. Torka. (BAP. VIII S. 66.)
- O. tridentatus*. Schwiebus: Flusswerder im Packlitz-See bei Neuhöfchen. 1900. Torka.
- Salix nigricans* f. *grandis*. Landsberg a. W.: Wall hinter der Kahnbauerei. 1889. Hirte.
- S. aurita* var. *cordifolia*. Strausberg: am Ihland-See. 1891. Hirte.
- S. viminalis* × *cinerea*. Landsberg a. W.: Zechower Berge. 1889. Hirte.
- S. viminalis* × *caprea*. Landsberg a. W.: Wepritzer Berge. 1889. Hirte.
- S. caprea* × *cinerea*. Landsberg a. W.: Zechower Berge. 1889. Hirte.
- S. caprea* × *aurita*. Landsberg a. W.: Zechower Berge. 1889. Hirte.
- S. aurita* × *cinerea*. Landsberg a. W.: Zechower Berge. 1889. Hirte.
- S. viminalis* × *repens*. Spandau: Havelufer bei Nieder-Neuendorf. 1891. Hirte.
- S. cinerea* × *repens*. Landsberg a. W.: Wall hinter der Kahnbauerei. 1889. Hirte.
- S. viminalis* × *purpurea*. Landsberg a. W.: Wall hinter der Kahnbauerei. 1889. Hirte.
- S. repens* × *purpurea*. Landsberg a. W.: Zechower Berge. 1889. Hirte.
- Myrica Gale*. Luckenwalde: Am Rande der „Neuen Wiesen“ zwischen Berkenbrück und Dobbrikow im April und Mai 1901. Höck!! Neu für das Havelgebiet. (Ascherson, BV. XLIII S. VIII)
- Polygonum nodosum* var. *prostratum* (*P. danubiale*). Berlin: Neuanlage des Botanischen Gartens in Dahlem. 1901. Graebner!!
- Chenopodium album* var. *microphyllum*. Küstrin: Göritzer Damm. 1901. Hirte.
- C. album* B. *hastatum*. Bernburg. Zschacke. (DBM. XIX S. 25.)
- C. album erosum* Zschacke. Bernburg. Zschacke. (a. a. O.)
- C. album pseudostriatum* Zsch. Bernburg und Coethen: Zehnitz. Zschacke. (a. a. O.)
- C. pseudo-Borbasii* (*striatum* × *album*). Bernburg. Zschacke. (a. a. O.)
- C. superopulifolium* × *album* und zwar die Formen *C. Preissmanni* Murr., *C. Zschackei* Murr. (a. a. O. S. 72) und *C. populifolium* Zsch. Bernburg. Zschacke. (a. a. O. S. 73.)
- † *Atriplex litorale*. Wittenberge mit Seegrass vor mehreren Jahren auf einem Schutthaufen eingeschleppt. O. Jaap.
- A. oblongifolium*. Küstrin: ziemlich verbreitet, besonders am Wege nach der Kurzen Vorstadt; beim Bahnhof; am Göritzer Damm; beim Städt. Schlachthaus u. s. w. seit 1891. Hirte.

- Atriplex oblongifolium* var. *campestre*. Küstrin: am Wege nach der Kurzen Vorstadt zahlreich. Hirte.
- †*A. calotheca* bei Schwiebus angegeben (BAP. VI S. 71), ist jedoch nicht diese Art.
- †*A. Tataricum* (*A. laciniatum*). Magdeburg: Ausstich an der Berliner Chaussee 1894; am Hohendodelebener Wege 1898. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 148.)
- †*Corispermum hyssopifolium*. Zossen: Bahnhof Rangsdorf. Kammann! Werneuchen: Bahnhof Tiefensee und auf einer Sanddüne am Waldrande in einiger Entfernung davon. Gallasch!
- Silene Tatarica*. †Berlin: Ringbahnstation Putlitz-Strasse auf Brachland. 1901. R. Schulz.
- S. Gallica*. †Tegel: Humboldt-Mühle. 1899. R. u. O. Schulz. Schwiebus: Brätzer-Wiesen bei Jordan, wahrscheinlich verschleppt. Torka! (BAP. VIII S. 56.)
- Melandryum noctiflorum*. Rathenow: zwischen Gränigen und Nennhausen. 1900. Plöttner.
- Saponaria officinalis* var. *alluvionalis*. Berlin, Tegeler-Strasse seit 1896. R. u. O. Schulz.
- Sagina apetala*. Rathenow: Brielow, Felder südlich des schwarzen Berges. 1900. Plöttner.
- Stellaria media* var. *neglecta*. Magdeburg: Biederitzer Busch. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 145.)
Unterart *S. pallida*. Dessau: Donantsbusch bei Reppichau. Zschacke. (DBM. XIX S. 73.) Mehrfach, z. B. in den „Kienfichten“. Hermann. (BV. XLIII S. 149.) Potsdam: östlich am Wildparkzaun 1897. Hirte. Spandau: Tegel. 1898. Hirte.
- Cerastium glomeratum* var. *apetalum*. Magdeburg: zwischen Königsborn und den Heyrothsbergen. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 145.)
- C. caespitosum* var. *nemorale*. Dessau: Rösling. Zschacke. (DBM. XIX S. 73.) Fürstenberg (Meckl.): Peetsch-See. Haberland!! (BV. XLII S. II.)
- Spergularia media*. Bernburg: am Werder. Zschacke. (BV. XLIII S. 149.)
- Herniaria hirsuta*. Sagan: beim Oberdorfe von Schönbrunn. Matzker. (Schube, SG. 79 II. Abt. S. 29.) Kreis Meseritz: südlich der Chaussee Dürlettel—Brätz ein Exemplar. Miller. (BAP. VII S. 6.)
- Scleranthus annuus* × *perennis*. Berlin: Leutnantsberge. 1877. Ernst H. L. Krause. (BC. 82 S. 106.)
- †*Delphinium Orientale*. Oranienburg: Dampfmühle 1893. Ascherson (nach Höck BC. Beihefte IX S. 246.)
- Clematis vitalba*. Bernburg: Hohes Saaleufer in Nienburg. Zschacke. (DBM. XIX S. 73.)

- Thalictrum flexuosum* var. *capillare*. Driesen: Altsorge am „Quell“. 1889. Hirte.
- Anemone ranunculoides* var. *subintegra*. Bernburg: Krumbholz und Dröbelscher Busch. Cöthen: Biendorfer Busch. Zschacke. (DBM. XIX S. 74.)
- Ranunculus Illyricus*. Bernburg: Pfingstberg. Hermann. (BV. XLIII S. 150.) Magdeburg: Rothehornwiesen. Schmeil. (NVM. 1898—1900 S. 144.) Erster Fundort im Alluvium.
- R. arvensis* var. *mieranthus*. Magdeburg: in einem Kornfelde hinter der Friedrichstadt. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 144.)
- Fumaria Vaillantii*. †Küstrin: Göritzer Damm. 1900. Böschung der Festungswerke beim Berliner Thor. 1901. Hirte.
- F. tenuiflora* (*F. officinalis* var. *tenuiflora*). Magdeburg: Im Glacis zwischen dem Ulrichsthor und dem Friedrich Wilhelms-Garten. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 144.)
- Nasturtium amphibium* var. *auriculatum*. Küstrin: Wiesen nach Göritz zu. 1901. Hirte.
- N. amphibium* × *silvestre*. Küstrin: an allen Oderufeln in mehreren Formen. 1901. Hirte.
- N. amphibium* var. *auriculatum* × *silvestre* = *N. Murrianum*. Bernburg: an der Saale. Zschacke. (DBM. XIX S. 74.)
- †*Barbarea intermedia*. Gr. Lichterfelde. 1901. Koehne!
- †*Arabis albidula*. Rüdersdorfer Grund: an Kalksteinmauern. Ascherson u. Graebner. Brandenburg: in der Harlunger Strasse. Dubian!
- Cardamine parviflora* bei Schwiebus angegeben (BAP. VI S. 68), ist unrichtig bestimmt.
- C. hirsuta* Unterart *C. silvatica*. Sternberg: Springmühle. Lagow: Buchspring. (H. XV S. 55—66.)
- †*Erysimum repandum*. Magdeburg: Hafengelände 1894. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 144.)
- †*Brassica elongata* var. *armoracioides*. Bernburg: Grönaer Steinbruch. Hermann. (BV. XLIII S. 150.)
- †*B. lanceolata* (*Sinapis juncea*). Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. 1899. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 144.)
- †*Hirschfeldia* (= *Brassica*) *incana*. Magdeburg: Sudenburger Bahnhof. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 144.)
- Diploxis muralis*. †Rathenow: Bahnböschung, mit Kies dorthin verschleppt. 1900. Plöttner.
- †*Eruca eruca* (*E. sativa*). Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 144.)
- †*Alyssum campestre* var. *hirtum*. Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 145.)
- Erophila verna* var. *praecox*. Magdeburg: Eisenbahndamm hinter der Friedrichstadt. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 145.)

- † *Jonopsidium acaule*. Berlin: alter Botan. Garten. Ascherson.
(Nach Höck BC. Beihefte IX S. 252).
- † *Lepidium apetalum*. Magdeburg: Rothehorn. Fitschen. 1898.
(NVM. 1898—1900 S. 145.) Dort schon 1866 gefunden. Gerland.
Ob seitdem stets vorhanden gewesen? (nach Ascherson BV.
XXXIII S. 120.) Birkenwerder. 1894. Hennings. (nach
Höck BC. Beihefte IX S. 253.)
- † *Isatis tinctoria*. Magdeburg: Hafengelände. 1894. Fitschen. (NVM.
1898—1900 S. 145.)
- † *Cakile cakile*. Wittenberge: mit Seegras vor mehreren Jahren
auf einem Schutthaufen eingeschleppt. O. Jaap.
- † *Chorispora tenella*. Frankfurt: Proviantamt. (H. XV S. 55—66)
Reseda lutea. Bei Bernburg findet sich selten eine Form mit dünnen,
langen, zugespitzten, an *R. luteola* erinnernden Trauben. Zschacke.
(DBM. XIX S. 108.)
- Drosera intermedia*. Köpenick: Am Förster- (Heidereuter-) See in der
Rüdersdorfer Forst. 1898. Hirte.
- † *Sedum spurium*. Luckenwalde: in der Nähe der Kirchhöfe. Höck.
(BC. Beihefte X S. 292.)
- Sempervivum soboliferum*. †? Hauslauchberg bei Buchs-Mühle. 1900.
H. Lange. (Br. IX S. 328.) Rüdersdorf: in der Nähe des
Turnplatzes bei Alte Grund ein Exemplar. E. Friedel jun.
(Br. a. a. O.)
- † *Physocarpus (Spiraea) opulifolius*. Frankfurt: Matschdorf. Seehaus.
(nach Höck BC. Beihefte IX S. 415.)
- † *Prunus serotina* (Nordamerika). Dessau: Wald zwischen dem Thier-
garten und Kleutsch. Engel. (nach Höck BC. Beihefte IX
S. 411.) Berlin: Tegeler Forst. Bolle.
- Rubus Scanicus*. Zerbst: Rosselgebiet zwischen Meinsdorf und Mühl-
stedt am Waldsaum. Zschacke (DBM. XIX S. 131.)
- † *Potentilla intermedia* var. *Heidenreichii*. Bernburg: Weinberg am
Felsenkeller. Zschacke. (BV. XLIII S. 150.)
- P. collina*. Strausberg: Raine nördlich der Stadt. 1899. Hirte.
- P. reptans* var. *ramosa*. Köpenick: am Promenadenweg südlich der
Woltersdorfer Schleuse. 1899. Hirte (t. Zimmerer.)
var. *microphylla*. Spandau: Havelufer südlich von Pichels-
berg. 1898. Hirte. (t. Zimmerer.)
- P. reptans* × *procumbens* (*P. mixta*). Köpenick: Rüdersdorfer Forst
häufig, besonders oberhalb der Woltersdorfer Schleuse und am
Förster- (Heidereuter-) See. 1899. Hirte. Küstrin: am Göritzer
Damm mehrfach (auffallender Standort, da *P. procumbens* in der
Nähe fehlt). 1901. Hirte. Landsberg a. W.: Kladower Wald
beim Grävensee; Stolzenberg mehrfach, besonders am Osterwitz-
See. 1894. Hirte.

- Potentilla silvestris* var. **fallax**. Köpenick: Rüdersdorfer Forst am Förster- (Heidereuter-) See. 1899. Hirte. Berlin: bei Hohen-Schönhausen. 1896. Hirte. Landsberg a. W.: Stolzenberger Forst am Nierim-See. Hirte. (t. Zimmerer.)
- P. procumbens* × *silvestris*. Köpenick: Rüdersdorfer Forst am Förster- (Heidereuter-) See. 1899. Hirte. Landsberg a. W.: Stolzenberg am Osterwitz- und Nierim-See. 1894. Hirte. (t. Zimmerer.)
- Rosa tomentosa* var. **umbelliflora**. Küstrin: Viehtrift an der Oder nach Göritz zu. 1901. Hirte.
- R. corifolia*. Küstrin: Viehtrift an der Oder nach Göritz zu ein Strauch. 1901. Hirte.
- Pirus torminalis*. Oderberg: ausser an den bekannten Standorten auf dem Paelitz-Werder im Paarsteiner-See und an den westlichen Abhängen des Gaisberges, auch auf den Blocklehmhöhen bei Lunow festgestellt. E. Friedel. (Br. IX S. 332.)
- † *Medicago Aschersoniana*. Neuruppin: bei der Ebellschen Fabrik. 1884. C. Warnstorf. Luckenwalde mehrfach um die Stadt und in der Hetzheide. 1890. Bernau und Höck. (nach Höck BC. Beihefte IX S. 405.)
- † *Trigonella foenum Graecum*. Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- † *Melilotus parviflorus*. Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. 1898—99. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- † *Vicia melanops*. Oranienburg: Dampfmühle. Neubauer u. Ascherson. (nach Höck BC. Beihefte IX S. 410.)
- Geranium pratense*. Charlottenburg: Nonnenwiesen. 1900. Lehmann u. P. Schulz! Durch diesen Fund für die nähere Umgebung Berlins wieder gesichert.
- † *G. Pyrenaicum*. Magdeburg: Festungswälle am Ulrichsthor. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- † *Linum perenne*. Magdeburg: Dodendorr 1896. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 145.)
- † *Ailanthus glandulosa*. Freienwalde: Falkenberg an der Chaussee nach Fr. zu vollständig verwildert, Ascherson u. Graebner.
- Euphorbia cyparissias*. Ruhland: jetzt verbreitet. Barber. (Schube, SG 79 II. Abt. S. 32.)
- E. esula* × *lucida*. Küstrin: Göritzer Damm in mehreren Formen, teils mehr nach *esula* teils mehr nach *lucida* hinneigend. 1901. Hirte.
- E. esula* × *cyparissias*. Küstrin: Göritzer Damm mehrfach. 1901. Hirte.
- Empetrum nigrum*. Putliz: am Treptow-See bei Redlin, August 1901. O. Jaap. (BV. XLIII S. XXIV.) Zweiter Fundort in der Provinz.

- † *Parthenocissus quinquefolius*. Lehnin: Mittelheide. 1901. Graebner. (BV. XLIII S. II.)
- † *Malva Mauritiana*. Tegel: Humboldt Mühle. 1899. R. u. O. Schulz.
M. rotundifolia. Schwiebus: um Jordan häufig. Torka. (BAP. VIS 69.)
- † *M. parviflora*. (Mittelmeergebiet.) Neuruppin: Wilke'scher Garten 1868. C. Warnstorf. (nach Höck BC. Beihefte IX S. 326.)
- † *Onothera grandiflora*. Kreis Beeskow-Storkow: Kirchhof in Ahrensdorf. Graebner. (nach Höck BC. Beihefte X S. 288.)
- Isnardia palustris*. [Im Kreise Schweinitz bei Wendisch-Linde, Puschkunsdorf und Alt-Sorgefeld. 1901. Conrad.] Kreis Beeskow-Storkow: auf einer Sandbank am rechten Spreenfer zwischen Werder und dem Drobsehsee. 1900. Graebner!!
- Circaea alpina*. Rathenow: Grünauer Forst. 1900 H. Schultze.
- † *Carum (Ptychotis) copticum*. Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. 1899. Fitschen. NVM. 1898—1900 S. 146.)
- Bupleurum tenuissimum*. Magdeburg: westlich von der Neuen Neustadt. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- Seseli annuum*. Schwiebus: Flusswerder im Packlitz-See. Torka.
- Libanotis libanotis (L. montana)*. Jordan: Flusswerder im Packlitz-See. Torka!
- Silaus pratensis*. Küstrin: Wiesen südlich vom Pappelhorst einzeln. 1901. Hirte.
- Ostericum palustre*. Charlottenburg: Nonnenwiesen. 1900. Lehmann u. P. Schulz! Durch diesen Fund für die nähere Umgebung Berlins wieder gesichert.
- † *Turgenia latifolia*. Magdeburg: Hafengelände. 1898. Hobendodelebener Weg. 1899. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- Lysimachia nemorum*. Salzwedel: im Wohld zwischen Diesdorf und Dähre. Hülsen. Neu für die Altmark.
- Samolus Valerandi*. Luckenwalde: Lindenbergraben an einem Teiche. Höck!
- Erythraea pulchella* var. *Meyeri*. Landsberg a. W.: Triften am Kanal; an der Goldbeck. 1898. Hirte.
- † *Anchusa officinalis* var. *ochroleuca*. Berlin: Tegeler Strasse. 1897. Tegel: Humboldt-Mühle. 1899. R. u. O. Schulz.
- † *A. Italica*. Ausser bei Rüdersdorf 1896 R. u. O. Schulz (BV. XXXVIII S. XLVIII) noch 1897 Berlin: Tegeler Strasse und Tegel: Humboldt-Mühle. R. u. O. Schulz.
- † *A. procera*. Ausser bei Rüdersdorf und Köpenick (Behrendsen, BV. XXXVIII S. 89) nach Berlin: Tegeler Strasse 1897 und Tegel: Humboldt-Mühle. 1900. R. u. O. Schulz.
- † *A. hybrida*. Berlin: Tegeler Strasse 1896 und am Eisenbahndamm beim Bahnhof Jungfernheide. 1894. R. u. O. Schulz.
- † *A. ochroleuca* MB. Berlin: Tegeler Strasse. 1897. Borsig-Mühle. 1896. R. u. O. Schulz.

- Lycopus exaltatus*. Magdeburg: an der Berliner Chaussee. 1895. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 147.)
- †*Nepeta Ucranica*, Unterart *N. parviflora*. Tegel: Humboldt-mühle. 1900. R. Schulz.
- †*Dracocephalum Moldavica*. Sagan: am Friedhofe von Schönbrunn. Matzker. (Schube SG. 79 II. Abt. S. 34.)
- Leonturus marrubiastrum*. †Bernburg: Saaleufer, einmal eingeschleppt. Hermann. (BV. XLIII S. 150.)
- Ajuga Genevensis* var. *longifolia*, ferner
- A. hybrida* und *A. Osswaldiana* (Formen der Kreuzung *A. genevensis* × *reptans*) sämtlich früher von Lasch bei Driesen gesammelt. (Becker, DBM. XIX S. 36.)
- †*Solanum rostratum*. Bernburg: Saaleufer. Zschacke. (BV. XLIII S. 150.) Magdeburg: im Hafengelände ein Exemplar. 1899. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 147.)
- Veronica scutellata* var. *pilosa*. Bernburg: Eisenbahnausstiche an der Strasse nach Nienburg. Zschacke. (DBM. XIX S. 132.)
- V. aquatica*. Magdeburg: bei der Neustadt. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 147.)
- var. *dasypoda*. Bernburg: Eisenbahnausstiche an der Strasse nach Nienburg. Zschacke. (DBM. XIX S. 132.)
- V. Chamaedrys* × *Teucrium* (= *V. amphitoba*). Berlin: Kirchhof in Schöneberg. (Hausknecht, Florist. Beiträge in Mitt. des Thür. Bot. Ver. NF. VI S. 22—37.)
- V. opaca*. Bei Schwiebus angegeben (BAP. VI S. 70.) ist *V. agrestis*.
- Melampyrum cristatum*. Kreis Beeskow—Storkow: Kiefernwald an der Westseite des Drobischsees nördlich von der Schugge. Graebner 1900!! Zweiter Fundort im Spreegebiet.
- M. pratense* var. *purpurascens*. Rheinsberg: im Walde an der Strasse nach Menz. 1900. Retzdorff.
- †*Asperula Orientalis*. Luckenwalde: Ruhlsdorf. Koebe. (nach Höck BC. Beihefte X S. 300.)
- †*Rubia tinctorum*. Bernburg: Alter Friedhof, verwildert. Hermann (BV. XLIII S. 151.)
- Galium Wirtgeni*. Schwiebus: bei Gräditz. Torka. (BAP. VIII S. 58.)
- †*Symphoricarpos racemosus*. Berlin: Teufelssee im Grunewald. Graebner. (nach Höck BC. Beihefte X S. 299.)
- Valeriana excelsa* (*V. sambucifolia*). Luckenwalde: Elsthal. 1901. Ascherson!! Lindenberg. 1896. Höck. Strausberg: am Fänger-See. 1899. Hirte. Küstrin: Mietzel bei Neumühl. 1899. Hirte.
- †*Centranthus macrosiphon*. Luckenwalde: Frankenfelde. Höck. (BC. Beihefte X S. 300.)
- Campanula Bononiensis*. Kr. Teltow: Kirchhof in Gr. Kienitz. Kammann!

- Aster salicifolius*. Mittenwalde: Am linken Ufer der Notte viel. Hagmann.
- †*Erigeron Karwinskyanus* (vgl. Ascherson BV. XII S. XXXIV.) Tegel: Schaifenberg auf Blumentöpfen seit 1901. Bolle!!
- Inula Germanica*. Oderberg: Am südlichen Ende des östlichen Abhanges am Paarsteiner See, Ende der 70er Jahre. Lange! (A. u. G. Fl. S. 707, nicht bei Brodowin, wie Grantzow Fl. Uekerm. S. 129 angiebt), jetzt seit circa 15 Jahren verschwunden. Auch bei Potsdam, am Glindower See, wo die Pflanze seit Schramm (1851) bis 1899 beobachtet wurde, ist sie durch Anlage eines Obstgartens auf dem bisher unkultivierten Gelände, wenn auch nicht ausgerottet, mindestens aufs Höchste gefährdet. Mithin ist ihr Vorkommen in der Provinz Brandenburg jetzt sehr zweifelhaft.
- Xanthium Italicum*. Bernburg: am Werder. Zschacke. (DBM. XIX S. 133) [Kreis Meseritz: Brätz. Miller. (BAP. VII S. 7.)]
- †*Ambrosia artemisiifolia*. Magdeburg: im Hafengelände ein Exemplar. 1897. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- †*A. trifida*. Bernburg: Saaleufer am Dröbel'schen Busch. Zschacke. (DBM. XIX S. 133.)
- †*Rudbeckia laciniata*. Dessau: Luisium. Hermann. (BV. XLIII S. 151.)
- Anthemis Ruthenica*. [Kreis Meseritz: Schutzbezirk Kutschkau, an der Chaussee Tirschtiegel—Nasslettel, bei Brätz. Miller. (BAP. VII S. 7.)]
- †*Anacyclus officinarum*. Magdeburg: zwischen dem Schlachthofe und dem Sudenburger Bahnhofe. 1898. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- Ueber die *Achilleen* der Berliner Adventiv-Flora vgl. R. Schulz, BV. XLIII S. 72—79.
- Achillea millefolium* var. *setacea*. Rüdersdorf. R. Schulz. (BV. XLIII S. 74)
- †*A. crithmifolia* mit den Varietäten *pseudo-nobilis* und *villosa*. Rüdersdorf. R. Schulz. (wie vor.)
- †*A. micrantha* ist nicht die Marschall Bieberstein'sche Art, sondern die typische *A. Gerberi*, wogegen die in den Verhandlungen des BV. XXXVIII S. 87 sowie in den Berichten der DBG. X S. (72) angeführte *A. Gerberi* die Varietät *subcristata* dieser Art darstellt.
- Chrysanthemum corymbosum*. Buckow: Am Gr. Tornow-See gegenüber Haus Tornow. 1894. Kunow! (A. u. G. Fl. S. 725.) Indigenat wohl sehr zweifelhaft.
- †*C. aureum* (Ascherson, BC. Beihefte XII S. 49, 1902 = *Cotula aurea*.) Magdeburg: am Hohendodelebener Wege. 1899. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)

- Senecio vulgaris* × *vernalis*. Dessau: zwischen Mosigkau und Chörau. Zschacke. (DBM. XIX S. 133.) Schwiebus: hinter Paradies an der Paklitz und auf den Brätzer Wiesen. Torka. (BAP. VIII S. 59.)
- †*Echinopus sphaerocephalus*. Berlin: Eisenbahneinschnitt beim Bahnhof Schöneberg viel. Graebner!!
- Carduus crispus* × *nutans*. Küstrin: Oderdamm bei Bleyen. 1899. Hirte.
- Cirsium arvense* var. *setosum*. †Bernburg: Kalksteinbruch und vor dem Nienburger Thore, jedenfalls eingeschleppt. Hermann. (BV. XLIII S. 151.)
- Scorzonera laciniata* (*Podospermum lacin.*) var. **muricata**. Magdeburg: westlich der Neuen Neustadt. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 146.)
- Hieracium pilosella* × *aurantiacum*. Schwiebus: bei Gräditz. Torka. (BAP. VIII S. 60 u. 67.) dürfte *H. pilosella* × *pratense* (= *H. flagellare* Willd.) sein.
- H. echinoides*. †Magdeburg: Kommandantenwerder. 1896. Am Glacis. 1897. Fitschen. (NVM. 1898—1900 S. 147.)
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August, Retzdorff W.

Artikel/Article: [Uebersicht neuer, bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen \(Farn- und Blütenpflanzen\) des Vereinsgebiets aus den Jahren 1900 und 1901. 157-175](#)