

Zur Flora von Labes in Pommern.

Von

E. Schalow.

Bei Durchsicht meines Herbars finde ich unter den im Juli 1905 und 1908 bei Labes in Hinterpommern gesammelten Pflanzen einige interessante Arten und Formen von z. T. unbekanntem Oertlichkeiten. Im folgenden sei es mir gestattet, die bemerkenswerten Beobachtungen aufzuführen:

Polypodium vulgare L. bei Labes mehrfach, z. B. Heide hinter dem Gestüt; Regaabhänge oberhalb der Stadt.

Potamogeton alpinus Balbis B) *obscurus* D. C. in der Rega oberhalb der Stadt.

P. praelongus Wulfen im See vor Unheim.

Triglochin maritima L. im Moor hinter dem Gestüt in Menge mit *T. palustris* L.

Scirpus Tabernaemontani Gmel. im Moor hinter dem Gestüt.

Anthericum ramosus L. vielfach, z. B. Weinberg; Hainholz; Heide hinter dem Landgestüt; an letztem Standort auch die Abänderung *l. fallax* Zabel mit einfachem Blütenstande.

Lilium Martagon L. sehr spärlich in Laubwaldjagen der Heide hinter dem Gestüt, links der Chaussee nach Wangerin mit *Hepatica hepatica* (L.) Karst.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. auf recht feuchten Moorwiesen hinter dem Gestüt mit der folgenden Art.

Epipactis palustris (L.) Crtz. mehrfach, z. B. hinter dem Windmühlenberge, an der Chaussee nach Schievelbein u. a.

Goodyera repens (L.) R. Br. in der Heide hinter dem Gestüt.

Die von mir gesammelten Exemplare sind im oberen Teile des Stengels und im Blütenstande nicht nur kurzhaarig, sondern auch drüsig.

Dianthus superbus L. auf sehr nassen Moorwiesen hinter dem Gestüt.

Aquilegia vulgaris L. in der Heide hinter dem Gestüt, wohl verwildert.

Actaea spicata L. an Abhängen der Rega oberhalb der Stadt.

Thalictrum flexuosum Bernh. auf einem trockenen Hügel zwischen Bonin und dem Gestüt.

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. mehrfach, z. B. Weinberg; gegen Bonin; beim Gestüt.

Ranunculus circinatus Sibth. in der Rega unterhalb der Stadt.

Nasturtium nasturtium aquaticum (L.) Karst. mehrfach, z. B. am Fuße des Windmühlenberges; unweit der Schievelbeiner Chaussee.

Sedum reflexum L. am Wege nach Bonin.

Saxifraga hirculus L. im Moor hinter dem Gestüt.

Rubus saxatilis L. in der Heide hinter dem Gestüt mit *Potentilla alba* L. und *Trifolium rubens* L.

Ornithopus perpusillus L. auf dem Weinberge mit *Vicia cassubica* L.

Lathyrus silvester L. am Wege nach Schönwalde; Chaussee nach Schievelbein.

L. pratensis L. f. *glaber* Abrom. Moorwiesen hinter dem Gestüt; die Pflanzen waren in allen Teilen völlig kahl.

L. montanus Bernh. in der Heide hinter dem Gestüt; hier auch Formen mit schwach behaartem Stengel; Blätter sind ganz wenig behaart.

Empetrum nigrum L. Moor hinter dem Gestüt.

Hypericum perforatum × *quadrangulum*. Diesen Bastard beobachtete ich in mehreren Exemplaren im Hainholz am Krügerberge. Ich gebe im folgenden die Merkmale an, die die Dentung richtig erscheinen lassen:

Stengel hohl, zweikantig; Blätter ziemlich breit oval; Kelchzipfel lanzettlich bis oval, meistens stumpf, doch mitunter auch schwach zugespitzt, zur Blütezeit in der Regel 1½ mal so lang wie der Fruchtknoten.

H. montanum L. im Hainholz.

Helianthemum helianthemum (L.) Karst. mehrfach, z. B. Weg nach Bonin, Chaussee nach Schievelbein.

Vaccinium oxycoccus L. im Moor zwischen Bonin und Landgestüt.

Monotropa Hypopitys L. mehrfach, z. B. Hainholz, Heide hinter dem Gestüt.

Trientalis Europaea L. im Hainholz; Heide hinter dem Gestüt.

Sweetia perennis L. recht spärlich an Torfgräben im Moor hinter dem Gestüt unweit der Chaussee nach Wangerin.

Symphytum officinale L. b. *Bohemicum* F. W. Schmidt am Rega-
ufer unterhalb der Stadt.

Stachys rectus L. auf dem Weinberge und in seiner Nähe.

Scutellaria galericulata L. B) *pubescens* Benth. unweit der
Schievelbeiner Chaussee.

Solanum dulcamara L. B) *Persicum* Willd. im Hainholz.

Verbascum thapsus L. gegen Unheim.

Scrophularia alata Gil. am Bache hinter dem Gestüt.

Veronica longifolia L. an der Rega ober- und unterhalb der
Stadt, auch in der Form C) *media* Schrad.

Pedicularis silvatica L. im Moor hinter dem Gestüt und gegen
Bonin.

Knautia arvensis (L.) Coulter f. *integrifolia* G. Mey. in der
Heide hinter dem Gestüt.

Phyteuma spicatum L. im Hainholz.

Cirsium acaule (L.) All. im hinteren Teile des Hainholz.

C. oleraceum × *palustre* unter den Eltern im Moor hinter dem
Gestüt; auch an der Schievelbeiner Chaussee.

Chondrilla juncea L. auf Hügeln längs der Bahn nach
Schievelbein.

Sonchus arvensis B) *uliginosus* M. B. auf Moorwiesen hinter dem
Gestüt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Schalow E.

Artikel/Article: [Zur Flora von Labes in Pommern. 86-88](#)