

Zum Vorkommen von *Carex cyperoides* L. in Hinterpommern.

Von
Fritz Römer.

Im Juli 1900 entdeckte Carl Kohlhoff am Tranksee bei Elfenbusch im Kreise Neustettin *Carex cyperoides*, ein Bericht hierüber erschien in diesen Verhandlungen (cfr. Jahrg. 43, 1901, S. 141. *Carex cyperoides* in Hinterpommern. Von Carl Fr. Kohlhoff-Bärwalde i. Pom.). Seit dieser Zeit wurde die Oertlichkeit jährlich besucht, doch die Pflanze war wie vom Erdboden verschwunden. Am 25. August 1910 unternahm ich die gewohnte Exkursion zum Tranksee und sah zu meiner Freude *Carex cyperoides* in großer Zahl wieder. Die Individuen waren aber sehr klein, meist nur 2—4 (selten bis 8) cm hoch, während wir damals stattliche Exemplare bis 24 cm Höhe (vom Grunde des Stengels bis zur Spitze des Kopfes gemessen) einsammeln konnten. In den verfloßenen zehn Jahren ist weder durch Menschenhand eine Veränderung des Bodens vorgenommen worden, noch hat sich derselbe spontan mit einer Grasnarbe bedeckt; die Wasserstandverhältnisse sind auch die gleichen geblieben. Die drei genannten Faktoren können also keinen Einfluß auf das rätselhafte Verhalten der Pflanze am Tranksee ausgeübt haben. Der im letzten Sommer in Gesellschaft von *Carex cyperoides* aufgenommene *Centunculus minimus* ist wohl früher von uns übersehen worden.

Polzin, den 3. März 1911.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Römer Fritz

Artikel/Article: [Zum Vorkommen von Carex cyperoides L. in
Hinterpommern. 25](#)