

Die Cicindelen der Umgegend Hamburgs.

Von Dir. H. Beuthin.

Nachtrag zu dem Artikel in Band IX.

I. *Cicindela silvatica* Linné.

5. Mittelbinde mit langem Randsaume: var. *fennica* Beuthin.
Hausbruch. Juli und August 1897 und 98. ♀ ♂.
6. Schultermond geschlossen, Mittelbinde mit Randsaum, der
Fleck zwischen der Mittelbinde und der Spitze der
Flügeldecke in eine lange Randlinie auslaufend die sich
ganz oder fast bis zur Nahtspitze erstreckt var.
hungarica Beuthin.
Hausbruch. Juli und August 1897 und 98. ♀ ♂.
7. Schultermond nicht unterbrochen, Mittelbinde unterbrochen.
var. *subinterrupta* Beuthin.
Hausbruch. 5. 8. 98. ♂.

II. *Cicindela campestris* Linné.

- 8b Vierter Fleck (oberer Spitzenfleck) fehlt var. *subapicalis*
Beuthin.
Hausbruch. 12. 6. 95. ♂.
- 8c Fünfter Fleck (unterer Spitzenfleck) fehlt. var. *exsüturnalis*
Beuthin.
Hausbruch. 7. 8. 98. ♀.

III. *Cicindela hybrida* Linné.

7. Mittelbinde schmal, sehr breit unterbrochen. var. *dila-*
cerata Beuthin.
Geesthächt. 10. 5. 96. ♂. Von Herrn H. Schulz
gefunden und mir freundlichst überlassen.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für
Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: [Die Cicindelen der Umgegend Hamburgs 76](#)