

Neue und seltene Käfer der Hamburger Gegend.

Mitgeteilt von **Th. Wimmel.**

Anmerkung: Arten, welche nach dem bisher Veröffentlichten als neu für die hiesige Fauna gelten können, sind durch gesperrten Druck gekennzeichnet.

Harpalus fuliginosus Dft. Steinbeker Moor. Juni 97. 2 Stück.
Amara brunnea. Gyllh Bergedorf, Februar 95 unter Moos in
Anzahl.

Abax parallelus Duft. Haacke 29. 5. 97.

Tachinus bipustulatus F. John's Park VI. 97 an der
Wurzel und im Mulm einer Erle.

Philonthus fuscus Grav. John's Park VI. 97 unter der Rinde
und am ausfliessenden Saft derselben Erle. 5 Stück.

Stenus guttula Müll. Bergedorf, II. 96. 2 Stück unter Blättern.

Euaesthetus laeviusculus Mann. Winterhuder Moor, II. 95.
unter Blättern 4 Stück.

Stilicus fragilis Grav. Geesthacht, V. 96.

Acidota cruentata Mann. Bergedorf, II. 96 unter Moos.

Homalium vile Fr. Poppenbüttel, 8. 9. 98 1 Stück angefliegen.

Megarthrus depressus Payk. } John's Park, VI. 96 in Pferde-
denticollis Beck. } mist in Anzahl gefunden.

Alexia pilifera Müll. Bergedorf, II. 96 unter Blättern
einige Exemplare.

Crypthophagus dorsalis Sahlbg. Haacke, V. 96.

„ (*Micrambe*) *villosus* Heer. Auf *Spartium* in
Anzahl. Haacke, V. 96. Kleinborstel, X. 96.

- Coninomus constrictus* Humm. Wohldorf, 31. 5. 96.
- Cervus bipustulatus* Payk. Reinbek, 31. 5. 96 auf feuchten
Wiesen an der Bille einige Stück.
- Soronia punctatissima* Ill. John's Park, am ausfliessenden
Saft von Erlen, in Gesellschaft von *S. grisea*. L.
- Plegaderus saucius* Fr. Reinbek, 26. 5. 97 unter Kiefernrinde.
- Ernobius longicornis* Strm. Bergedorf, 26. 5. 97.
- Mycetochares axillaris* Payk. Steinbeker Moor, VI. 97.
- Conopalpus testaceus* Ol. Hamm, VI. 97.
- Peritelus hirticornis* Hbst. ist in der Haacke, unweit der
„Majestät. Aussicht“, auf jungen Buchentrieben, im Mai
oft in Anzahl zu finden.
- Hypera arundinis* Payk. Steinbeker Moor, VI. 97 in Anzahl.
- Dicranthus elegans* F. Hammer Deich, 10. 6. 97.
- Cossonus parallelopedus* Hbst. Geesthacht, 10. 5. 96.
- Apion cyaneum* Deg. Bergedorf, 13. 7. 96 unter Blättern.
„ *Hookeri* Fal. Winterhuder Moor, 26. 9. 97.
„ *immune*. Haacke, im Mai auf *Spartium* in Gesellschaft
von *Ap. striatum*, aber viel seltener.
- Grammoptera variegata* Gern. Haacke unweit Hausbruch,
29. 5. 97 in einer Wagenspur.
- Molorchus minor* L. Am Bahnhof Hausbruch, 19. 5. 97 in
grosser Anzahl gefunden
- Saperda scalaris* L. John's Park, 14. 6. 97 an einer Erle.
- Donacia sparganii* var. *coelestis* Wse. 5 Exemplare dieser
schönen, veilchenblauen Varietät fanden sich am Hammer
Deich unter der dort zahlreich vorhandenen Grundform.
„ *typhae* Ahr. War am Hammer Deich, VI. 97, in
grosser Anzahl anzutreffen, teilweise unter Wasser.
„ *obscura* Gyllh. Steinbeker Moor, 6. 6. 97.
„ *Malinowskyi* Ahr. Vor Kleinborstel, 28. 4. 97,
am Wege kriechend gefunden.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Wimmel Th.

Artikel/Article: [Neue und seltene Käfer der Hamburger Gegend 77-78](#)