©© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neue Käfer der Niederelbfauna.

Von **Dr. Max Hagedorn.**

Seit dem Erscheinen des Koltze'schen Verzeichnisses 1901 habe ich die folgenden Käfer gesammelt, deren Vorkommen in der Niederelbfauna bisher nicht erwähnt war oder deren Heimatsrecht erst durch die Beobachtung ihrer Bruten festgestellt werden musste

1. Chrysobothrys affinis Fbr. Juli 1901, Göhrde, an der Eiche.
2. Dictyoptera affinis Payk. Juli 1900, Göhrde, an einem alten Zaun.
3. Rhynchites bacchus L. Pfingsten 1902, Göhrde (Riebrau), an Apfelbaum.
4. Leptura erythroptera Hagenbach. August 1901, Göhrde, an der Eiche.

   Die Belagexemplare der vorstehenden Arten befinden sich in der Sammlung des Herrn W. Koltze.
5. Hylesinus oleiperda Fbr. 2./11. 1902 am Elbstrand bei Rittscher in Eschenzweigen im Larvenstadium gefunden
6. Myelophilus minor Hart. In Kiefern, in der Göhrde häufig. Wurde am 27./9. 1903 in der Haake, am 28/10. 1903 im Borsteler Jäger (1 Stück in einem Bruch) festgestellt.
7. Xylechinus pilosus Ratz. In Fichten sehr verbreitet; Sachsenwald, Göhrde, Rosengarten, Wellingsbüttel, Bergedorf, Borsteler Jäger, Borsteler Wohld bei Hohenraden, Schenefeld bei Osdorf (C. H. Groth).
8. Phloeophthorus rhododactylus Mrshm. Von C. H. Groth auf dem Bokelsberg bei Dockenhuden entdeckt, dann von mir gefunden in der Göhrde, Haake, Rosengarten. In der Besenpfrieme (Sarothamnus scoparius).
9. Polygraphus poligraphus L. In Fichten. Hummelsbüttel, Hellgrundberg, Sachsenwald, Borsteler Wohld bei Hohenraden, in allen Entwickelungsstadien.
10. Crypturgus cinereus Herbst. In Fichten, überall häufig.

©© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

11. Cryphalus (Ernoporus) caucasicus Lindemann (*Schreineri* Eichh.) Im Sachsenwald auf einer Linde 1 Stück gefunden
12. Cryphalus (Glyptoderes) granulatus Ratz. 6./11. 1903 von C. H. Groth in Schenefeld in Zitterpappel entdeckt, am 8./11. 1903 von demEntdecker und mir Larven und tote Mutterkäfer festgestellt; er brütet also hier.
13. Pityophthorus glabratus Eichh. Juli 1901 klopfte ich in der Göhrde ein ♀ von einer Kiefer, 7./5. 1903 fand W. Koltze in Hausbruch zwei Exemplare.
14. Pityogenes quadridens Hart. Blankenese und Göhrde in Kiefern.
15. Pityogenes bistridentatus Eichh. Göhrde auf Kiefer 1 Stück.
16. Dryocoetes alni Georg. 30./8. 1903 Borsteler Wohld bei Hohenraden, 13./9 1903 Sachsenwald, 21./10. 1903 Elbstrand bei Rittscher, 1./11. 1903 an der Wedeler Au bei Rissen, in Alnus glutinosa überall zahlreich.
17. Xyloterus signatus Fbr. 26./4. 1903 Sachsenwald auf gefälltem Birkenholz schwärmend.

Die Belagexemplare der vorstehenden Scolytiden-Arten befinden sich in meiner Sammlung.

©© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Berichtigung zum Band XII,

Neue Käfer der Niederelbfauna, von Dr. Max Hagedorn.

Nr. 12, *Cryphalus granulatus Ratz*, ist zu streichen. Es handelt sich um eine neue Art: *Cryphalus Grothii Hagedorn*, cf. Münchener coleopterologische Zeitung II, pag. 228 bis 233.

Nr. 13, *Pityogenes bistridentatus Eichh.* ist falsch bestimmt. Es handelt sich um ein besonders kräftig entwickeltes Exemplar von *Pityogenes bidens var. calcaratus Dej.*

Hagedorn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Hagedorn Max

Artikel/Article: Neue Käfer der Niederelbfauna 101-102