

## Beitrag zur Käferfauna der Niederelbgegend.

Von Th. Wimmel.

In dem Verzeichnis der in der Umgegend von Hamburg gefundenen Käfer von Herrn Koltze habe ich einige der bei früherer Gelegenheit bekannt gegebenen besonderen Fundorte seltener Arten vermißt. Wenn es nun auch nicht gerade nötig ist, von allen Arten das Verbreitungsgebiet aufgeführt zu sehen, so halte ich dies bei wirklich seltenen Arten doch für wünschenswert, zumal wenn dadurch auf eine besondere Lebensweise der betr. Art hingewiesen werden könnte. So ließ z. B. das Vorkommen einiger *Philonthus fuscus* unter Erlenrinde ein im allgemeinen lichtscheues Dasein bei dieser Art vermuten, tatsächlich ist inzwischen der sonst recht seltene Käfer in größerer Anzahl wiederholt in Vogelnestern gefunden worden, bei Erfurt.

Da nun durch die Herausgabe des Verzeichnisses frühere Veröffentlichungen als hinfällig zu betrachten sind, habe ich aus diesen einige Angaben zusammengestellt, um solche hiermit nochmals in Erinnerung zu bringen; gleichzeitig sind auch einige für die hiesige Fauna neue Arten, sowie Bemerkungen zu den bereits bekannten beigefügt worden.

Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf Band und Seite der Verzeichnissefte, in denen s. Z. die Veröffentlichung stattgefunden hatte.

*Harpalus fuliginosus* Duftsch. Im Juni 1897 im Steinbeker Moor.\* 2 St. gef. (X. 77).

*Dytiscus latissimus* L. Borsteler Moor in Anzahl, Eppendorfer Moor beruht wohl auf irrtümlicher Angabe (VIII. 2).

*Ilyobates forticornis* Lac. Winterhude Mai 1891 2 Ex. (VIII 2).

- Chilopora rubicunda* Er. Oktober 1888 Winterhude unter Moos (VII. 6). Haake in Pilzen, Septbr. 1877 (VIII 2).
- Aleochara inconspicua* Aub. Winderhude Aug. 1891 2 Ex. (VIII. 2).
- Tachinus elongatus* Gyllh. in d. Haake und in Barmbek einzeln, im Mai 1903 am Kehrwieder 3 Stück, die Art kommt also sehr verbreitet vor (VIII. 2).
- Velleius dilatatus* F., das erste Stück ist in Wandsbek 1884 gefunden worden, und ich hatte es aus der Sammlung von H. Niemeyer übernommen (VI. 9).
- Philonthus fuscus* Gyllh. Juni 1897 in Johns Park unter der Rinde am ausfließenden Saft einer Erle. 5 Ex. (X. 77).
- Sunius pulchellus* Heer. Winterhude Oktbr. 1885 unter faulenden Pflanzenstoffen, alten Matten und dergl. in großer Anzahl (VIII. 3).
- Bledius longulus* Fr. Mai 1895 bei Bergedorf in Sandgruben (IX. 5).
- Acidota eruentata* Marsh. Uhlenhorst im Spätherbst 1894 und 1895 an Gartenmauern 6 Ex. Bergedorf unter Moos Febr. 1896 (X. 77).
- Nargus badius* St. (VIII. 4) Hohenfelde 1 St. (Reitter det.)
- Colon calcaratum* Fr. Bergedorf Juli 1901 1 St. nach Sonnenuntergang (Reitter det.)
- „ *appendiculatum* Sahlbg. ebenso 2 ♀ (Reitter det.)
- Liodes cinnamomea* Pz. Geesthacht Juli 1889.
- Cyrtusa pauxilla* Schmidt. Bergedorf Juli 1901 nach Sonnenuntergang (Reitter det.)
- Calyptromerus dubius* Marsh. Ochsenwärder im Keller eines Hauses in großer Anzahl (VIII. 8).
- Orthoperus pilosiusculus* Duv. Bergedorf Juli 1901 (Reitter det.)
- Lathridius alternans* Mannerh. ist zu streichen, war *L. Bergrothi* Reitt., s. Bem. hierüber VIII. 5.
- Cercus bipustulatus* Payk. kommt auch bei Reinbek auf feuchten Wiesen a. d. Bille vor (X. 78).
- Dermestes vulpinus* F. wird mit Knochen und Fellen sehr häufig eingeführt und ist in einigen Straßen, z. B. Kehrwieder, in der warmen Jahreszeit stets zu finden.
- Dermestes Frischi* Kugel. }  
 „ *undulatus* Brahm. } ebenso, aber viel seltener.

- Dermestes peruvianus* Lap. ebenso, aber viel seltener.
- Hister marginatus* Fr. Sachsenwald unter Steinen Juni 1886. (VII. 9).
- Plegaderus vulneratus* Panz. Haake in morschem Holz (VII. 9).  
Bahrenfeld u. Haake unter Rinde (VIII. 6).
- Plegaderus caesus* Ill. Johns Park Juni 1887 2 St.
- Aphodius plagiatus* L. Kuhwälder mehrfach unter Schilf April 1895 (IX. 6).
- Aphodius niger* Panz. Geesthacht unter Schilf April 1895 (IX. 6).
- Prionocyphon serricornis* Müll. Bergedorf 1 St. in der Dämmung fliegend gef., Juli 1905.
- Melyris oblonga* Fabr. im August 1903 Kehr wieder und Kl. Grasbrook je 1 St., zweifellos eingeführt.
- Trypopytys carpini* Herbst. habe ich öfter in der nächsten Umgebung gefunden.
- Xylothecca Meieri* Reitter ist eingeführt. Vor 25 Jahren fand ich den Käfer stets in Anzahl auf Speicherböden, sobald Sassaparillwurzel aus Westindien auf Lager gekommen war; Herr Reitter hatte mir einige Stücke als *Mesocoelopus spec?* Exot bestimmt. Aus gleicher Gegend stammt
- Lasioderma testaceum* Dufts., das im Frühjahr 1906 mit Jamaikapiment zu Tausenden eingeführt worden war; die Pimentkörner waren meistens ganz leer gefressen.
- Alphitobius mauritanicus* F. wiederholt am Kehr wieder gefunden, jedenfalls eingeführt.
- Serropalpus barbatus* Schall. am 8. August 1903 in einem Hause am kl. Grasbrook 1 Stück gef.
- Otiorrhynchus rugosostriatus* Goeze (*scabrosus* Marsh.) im Oktbr. 1894 beim Hafenthor an der dortigen hohen Mauer (früher Hornwerk) gef. (IX. 6).
- Polydrusus flavipes* Deg., richtige Stücke habe ich besonders in Hamm, Horn, Billwälder, aber immer nur einzeln, gefunden.
- Barypithes pellucidus* Boh. habe ich am Elbstrand, in Bergedorf, Hamm, Hohenfelde, Eilbeck, Winterhude etc. an Gartenmauern, und meistens in Anzahl, gefunden.
- Sitona saturalis* Steph. Die Grundform kommt nur im Süden vor, die bei uns gefundenen Stücke repräsentieren *var. elegans* Gyllh.

*Hypera murina* F. Uhlenhorst, Kuhwärder, aber selten. (Reitter revid.)

*Pissodes harcyniae* Hbst. Hamm 1 Stück (VII. 12).

*Magdalis phlegmatica* Herbst, Haake mehrfach im Mai und Juli gef. (VIII. 8 und IX. 7).

*Apion basicorne* Ill. im Okt. 1897 bei Kleinborstel.

*Grammoptera variegata* Germ. Haake unweit Hausbruch im Mai 1897 (X. 78).

*Pogonochaerus scutellaris* Muls = *multipunctatus* Georg.

„ *ovatus* Goeze = *ovalis* Gmel.

Es ist mir stets unverständlich gewesen, wie zwei ganz verschiedene Arten, die noch im Cat. coleopt. Eur. et Cauc. ed. III v. 1883 mit voller Berechtigung getrennt aufgeführt worden sind, in der nächsten Ausgabe haben zusammengezogen werden können und daher auch in unserm Verzeichnis vereinigt worden sind. Von *Pogonochaerus scutellaris* Muls. besitze ich 3 Stücke nur von Bergedorf und Reinbeck (VIII. 10), *P. ovatus* Goeze sowie *P. decoratus* Fairm. dagegen nur von anderen Lokalitäten, bes. Nadelholzungen.

*Donacia tomentosa* Ahr. Hammer Deich an Schilf am 24. Juni 1897 1 Ex.

*Coccinella (distincta) Fald.) var. magnifica* Redt. im Juni 1885 1 St. bei Bergedorf gef. (VII. 14).



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1905-1907

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Wimmel Th.

Artikel/Article: [Beitrag zur Käferfauna der Niederelbgegend 90-93](#)