

II. Nachtrag zu dem „Verzeichniss der bisher um Altona und Hamburg gefundenen Gross-Schmetterlinge (Macrolepidoptera) von H. Tessien“

zusammengestellt von J. D. E. Schmeltz.

Rhopalocera.

1. Papilionidae.

† *Papilio Sinon* Poda (*P. Podalirius* L.) ist soweit Herr G. und mir bekannt von keinem der jetzigen Sammler hier gefangen und finde ich in einem mir zur Verfügung stehenden Verzeichniss von Herrn Rothlieb gesammelter Arten, diese Art als am 19. Mai 1841 aus, bei Lüneburg am 12. August des vorhergehenden Jahres gesammelten Raupen erhalten aufgeführt. Dieselbe scheint irrthümlich von Tessin für das hiesige Faunengebiet angesprochen und dürfte wohl besser zu streichen sein.

2. Pieridae.

† *Aporia crataegi* L. In den letzten Jahren von Herr G. nur einzeln im Sachsenwald gefunden. Herr Höge theilt mir dagegen mit, dass er im Sachsenwald diese Art gerade in den letzten Jahren häufiger als früher gefunden und dass bei Neumünster in Holstein dieselbe jedes Jahr in Menge vorkomme.

† *Pieris napi* L.

v. gen. II *napaeae* Esp. Zweimal von mir in Niendorf gefunden, von W. im Sachsenwald.

† *Antiocharis Daplidice* L.

v. gen. I. *Bellidice* O. — G. Sachsenwald.

† *Leucophasia sinapis* L. Nur einzeln in manchen Jahren im Sachsenwald. — G.

† *Colias Edusa* F. Im Herbst 1865 ziemlich häufig bei Boberg. — G.

3. *Lycaenidae*.

- † *Polyommatus Hippothoë* L. (P. Chryseis Bkh.)
 ab. *Confluens* Gerh. Ein Exemplar Juli 1870
 im Sachsenwald. — G.
Lycaena Argiades Pall. (L. Amyntas F.) Ein ♀ am 18. Juli 1858
 im Winterhuder Moor. — Sl.
 (?) *Lycaena Cyllarus* Rott. Sachsenwald. — W.

6. *Apaturidae*.

- † *Apatura Iris* L. wurde im Sommer 1874 in Niendorf
 ziemlich viel beobachtet. — Sl.
 (?) *Apatura Ilia* Schiff soll in einem Exemplar ebenfalls in
 Niendorf, ungefähr im Jahre 1860—1861 gefangen sein. — W.

7. *Nymphalidae*.

- † *Limenitis populi* L. Im Sommer 1872 war die Raupe im
 Sachsenwald ziemlich häufig. — G.
 † *Vanessa Levana* L.
 ab. *Porima* O. — H.
 (?) *Van. Xanthomelas* Esp. Sachsenwald. — W.
 † *Argynnis Niobe* L.
 ab. *Eris* Meig., von mir im Juli 1857 in einem
 Exemplar in den Sandgruben bei Borstel gefangen.
 † *Argynnis Paphia* L.
 ab. ♀ *Valesina* Esp., ein Exemplar im Sachsenwald
 1871 gefangen. — H.

9. *Satyridae*.

- † *Satyrus Alecyone* Schiff. Vor einigen Jahren ziemlich häufig
 bei Friedrichsruh und in der Haake, besonders viel aber bei
 Geesthacht gefunden. — Dörries. G.
Pararge Aegeria L., (P. Meone Esp.)
 var. *Egerides* Stdgr. (P. *Aegeria* Espr.), 1873 zwischen
 Bergedorf und Reinbeck, — Dörries. — In Altona ein Exem-
 plar Sept. 1874. — Sp. — In der Haake von Herrn Höge
 beobachtet.

Epinephele Lycaon Rott., (P. *Eudora* Esp.) In den Sandbergen nahe Sande, bei Bergedorf in und bei einer jungen Fichtenpflanzung (1873). — Dörries. G.

10. Hesperidae.

† *Syrichthus malvae* L. (S. *Alveolus* Hb.)

ab. *Taras* Meig., mehrfach aus Niendorf und Eimsbüttel. — Koltze.

Heterocera.

A. Sphinges L. 1. Sphingidae.

† *Deilephila Gallii* Rott. (*D. galii* Schiff), 1870 fanden sich Raupen dieser Art in Mehrzahl bei Bahrenfeld. — G.

† *D. Euphorbiae* L., 1865 am 12. September zwei Exemplare um Blumen schwärmend im botan. Garten gefangen. — G. Bei Trittau die Raupen in Mehrzahl gefunden. — Höge.

D. nerii L. Im October und November 1859 Raupen auf *Nerium oleander* in Altona gefunden. — Sp.

† *Smerinthus ocellata* L.

hibr. *Hybridus* Westw., mehrfach gezüchtet. — Höge.

† *Macroglossa Stellatarum* L., 1865 und 1870 die Raupen in zahlloser Menge, sonst nur einzeln gefunden. — G.

2. Sesiidae.

† *Sesia tipuliformis* Cl. in einem Garten am Kraienkamp, innerhalb der Stadt, in Menge auftretend und sämmtliche Stachelbeersträucher dort verderbend. — S.

5. Zygaenidae.

† *Zygaena Trifolii* Esp.

ab. *Orobi* Hb. Ueberall. — G.

B. Bombyces. 1. Nycteolidae.

Sarothripa undulana Hb. Blankenese. — Sp.

v. (et ab.) *degenerana* Hb. August. Haake, R.: Juli auf Eichen. — S.

Earias clorana L. Mai, Lehmgrube; R.: August auf Wollweiden. — S. — G.

Hylophila prasinana L. Mai. Niendorf, Haake, Reinbeck, Borstel. R.: September auf Eichen und Buchen. — S. — G. — Blankenese. Sp.

Hyloph. bicolorana Fuessl. (*H. quercana* Schiff.) August. Haake. R.: Juni auf Eichen. — S. — G. — Blankenese. Sp.

2. Lithosidae.

Nola cucullatella L. Juli. Steinbeck, Bahrenfeld und in Gärten innerhalb der Stadt. — S. — G. — Sp. (Blankenese.) R.: Mai und Juni auf Schlehen, Weissdorn und Obstbäumen. — S.

Nola strigula Schiff. Blankenese. — Sp.

Calligenia miniata Forst. — G.

5. Cossidae.

Herr Höge fand im März 1859 in der Haake, in Eichenstämmen zwei *Cossus*raupen von ganz weisser Farbe, welche sich alsbald verpuppten und im Mai zwei, zwar der gewöhnlichen Art: „*C. ligniperda* F.“, sehr ähnliche, allein bedeutend kleinere und auch sonst noch Unterschiede von jener Art darbietende Schmetterlinge lieferten. Auch die Chrysalide oder Puppe unterscheidet sich von der, der gemeinen Art durch die Dornen, welche die *Cossus*puppen auf den Segmenten tragen und die ihnen wahrscheinlich zum Hervorschieben aus den Bohrlöchern zur Zeit des Ausflugs dienen, indem dieselben hier kleiner und weniger zahlreich als bei der Puppe von *C. ligniperda* F. sind.

Im Jahre 1860 von Herrn Höge in grösserer Anzahl gefundene, noch unausgewachsene Raupen derselben Art, starben und im darauf folgenden Jahr waren die betreffenden Eichbäume abgehauen und also die Gelegenheit zu ferneren Beobachtungen erloschen.

6. Cochliopodae.

Heterogenea asella Schiff. Juni. Haake. — S. — Sachsenwald. — Höge, Dörries.

7. Psychidae.

Psyche unicolor Hufn. (*P. graminella* Schiff.) Niendorf. — Sl. G.

Echinopteryx bombycella Schiff. Niendorf. — Sl.

8. Liparidae.

† *Dasychira pudibunda* L. trat 1869 in der Haake in einer solchen Menge auf, dass alle Laubholzbäume kahl gefressen wurden. — G.

† *Psilura monacha* L.

ab. *eremita* O. — G. — Blankenese. — Sp. — Ueberall. — Höge.

9. Bombycidae.

† *Lasiocampa quercifolia* L.

ab. *alnifolia* O. — G.

11. Saturnidae.

(?) *Saturnia Pyri* Schiff. Ein, wohl verflogenes oder aus einem Zuchtkasten entwichenes Exemplar 1874 an der Elbseite eines Hauses der Hafenstrasse (St. Pauli) gefunden.

13. Notodontidae.

Hybocampa Milhauseri F. 29. Juli 1855 in Friedrichsruhe, Dörries; später von mehreren anderen daselbst. Sl. — H. — Wellingsbüttel — Sl. — Blankenese. Juni. R.: auf Eichen im Juli. — Sp.

Notodonta tritophus F. bei Bergedorf gefangen und gezogen. Petersen. — Sterschanze. — Dörries.

Notod. torva Hb. — Haake. — S. — Blankenese. Juli 1856. R.: Juni auf Zitterpappeln. — Sp.

Pygaera pigra Hufn. (*P. reclusa* F.) — G.

14. Cymatophoridae.

† <i>Gonophora derasa</i> L.	} Die Raupen beider Arten traten im Herbst 1870 in Mehrzahl auf.
† <i>Thyatira batis</i> L.	

- Cymatophora fluctuosa* Hb. — G. — Mai. Haake. R.:
August auf Birken. — S. —
Asphalia diluta F. — G.

C. Noctuae.

- Arsilonche albovenosa* Götze (*A. venosa* Bkh.) R.: auf
Typha angustifolia 27. Juli 1859 bei Winterhude gefunden,
der Schmetterling entwickelte sich 4. Juni 1860. — Sl.
Agrotis strigula Thnb. (*A. porphyrea* S. V.) — G.
Agr. signum F. (*A. sigma* Hb.) Puppen und Raupen in
Niendorf gefunden. — Schmeltz. — Raupen in Friedrichs-
ruhe. 6. Mai 1855. — Sl. — G.
(?) *Agr. Pronuba* L.
ab. Hoegei H. S. Von Herrn Höge aus, auf einem Korn-
felde bei Neumünster gefundenen Raupen erzogen.
Agr. Comes Hb., bei Teufelsbrücke am Elbstrand. — Dörries.
— Blankenese. Juli. R.: Mai auf Eichen. — Sp. — G.
Agr. castanea Esp. var. *neglecta* Hb. — H.
xanthographa F. Blankenese. Juli. R.: auf Gräsern im Mai.
— Sp. — Zuerst 1856 mit Raupen von *A. umbrosa* auf
Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*) aus Niendorf, später
zahlreich und überall gefunden. — Sl. — G. H. S.
Agr. florida Schmidt. R.: im April 1870 in trockenem Laub
bei Niendorf (1 Exemplar.) — G. — 1874 ein Exemplar
von gleichem Fundort. — Dörries.
† *Agr. Lidia* Cr. Blankenese. ♂ Juni, ♀ Juli 1867 und 1868
häufig, sonst selten. — Sp.
Agr. obelisca Hb. Sachsenwald, sehr selten. — Dörries.
Agr. praecox L. Grindel, Sachsenwald, selten. — Dörries. —
Flottbeck, Dr. Holle. — Boberg, G. — H.
Neuronia cespitis F. Blankenese, Juli-August; R.: Mai bis
Juni auf feuchten Wiesen, Sp. — G.
Mamestra tineta Brahm. Haake, — Dörries.
† *persicariae* L.
ab. *accipitrina* in coll. — H. — Raupen dieser
aberr. nur in Flottbeck. — Höge.

Mam. aliena Hb. Blankenese, Juni. — Sp.

Polia Xanthomista Hb. var. (et ab.) *nigrocincta* Tr., ein Exemplar in Niendorf von mir gefunden.

Luperina matura Hufn. (*Cerigo texta* Esp.), Blankenese, August. Sp. — Dörries. — Neumühlen, Höge. — G.

Hadena porphyrea Esp. — G. — Sachsenwald, Bergedorf; — Höge.

gemina Hb. — G. — Ueberall. — Höge.

ab. *remissa* Tr. — G. Ueberall. — Höge.

pubulatricula Brahm. (*H. connexa* Bkh.) — G. — Sachsenwald. — Höge.

Hyppa rectilinea Esp. — G. — Sachsenwald. — Höge.

Naenia typica L. — G. — Sachsenwald. — Höge.

(??) *Jaspidea Celsia* L.; soll nach einer mir früher von W. gemachten Mittheilung hier einmal gefangen sein.

† *Hydroecia nictitans* Bkh.

ab. *fucosa* Frr., 5. August 1858, Niendorf; ein frisches Exemplar aus dürrer Laub geschüttelt. — Sl. — Sachsenwald. — Höge.

† *Gortyna arundinis* F. (*Non. typhae* Esp.)

ab. *fraterna* Tr. — Elbinseln. — Höge. — G.

† *Tapynostola fulva* Hab. } August. 1870. Puppen in
ab. *flusca* Tr. } *Typha latifolium*. — G.

† *Calamia lutosa* Hb.

(*Leuc. Bathyerga* Frr.) Diese Art, welche sonst nur bei Kiel sich finden soll, kommt auch auf den Elbinseln vor und verirrt sich wenn in deren Flugzeit, September und October, starke Südwinde herrschen auch wohl ans diesseitige Ufer. Am 19. October 1858 ein Exemplar an einem Baumstamm vor dem Millerthor. (St. Pauli.) — Sl. — In der Palmaille in Altona. — Sp. — Elbinsel Kiebitzberg. — Dörries. — Ein Exemplar in der Börse in Hamburg. — Höge.

Leucania impudens Hb. Borstel. — S.

turca L. Niendorf 1857, Sachsenwald. Sl. — G.

Caradrina alsines Brahm. Blankenese, Juli. — Sp. — S. G.

- Caradr. arcuosa* Hw. — Aeusserer Hammerbrook. — H.
- Dicycla Oo* L. Sachsenwald. Sl. — Dörries, Höge.
- Cosmia paleacea* Esp. (*C. fulvago* Hb.) Blankenese, Juli.
R.: Mai und Juni auf Wollweiden. — Sachsenwald. — Höge.
- Dyschorista suspecta* Hb. (*D. congener* Frr.) Sachsenwald,
18. Juli 1858. — Höge.
- Orthosia macilenta* Hb. — H.
- Orth. pistacina* F. Vorstadt St. Pauli. — Sl. — Bergedorf,
— Petersen.
- Orth. laevis* Hb. Blankenese, August. — Sp.
- † *Cucullia artemisiae* Hufn. (*C. abrotani* F.) In den Jahren
1865 und 1869 die Raupen von Boberg bis Bergedorf in
Menge gefunden. — Dörries, G.
- † *Cuc. argentea* Hufn. (*C. artemisiae* Schiff.) Die Raupen
dieser Art fanden sich an denselben Orten wie die der
vorigen im Jahre 1865 in Menge, indess meist von Ich-
neumoniden angestochen. — Dörries, G.
- Heliothis scutosus* Schiff. — Sachsenwald. — Dörries. — G.
- Erastria fasciana* L. (*E. pygarga* Hufn. *E. fuscula* Bkh.) —
Juni. Niendorf. — S. — Sachsenwald. — Sl. — Wands-
beck und Niendorf. — Dörries, Höge.
- Prothymia viridaria* Cl. (*P. laccata* Sc.) — Juni. Eppendorfer
Moor. — S.
- Pseudophia lunaris* Schiff. 2. Aug. 1860 zuerst gefunden im
Saupark bei Friedrichsruhe. — Sl. Dörries. — Selten.
- Catephia Alchymista* Schiff. An derselben Stelle wie vor-
stehende Art zuerst vom verstorbenen Herrn Schlosser ge-
funden. — Sl. Dörries. — Selten.
- ? *Catocala Pacta* L. Zuerst am 12. Juni 1859 bei Neu-
münster in Holstein von Herrn Höge gefunden, seitdem
jedes Jahr, in einigen häufiger, in anderen seltener oder
gar sehr selten. R.: auf Wollweiden. — Sl.
- Aventia flexula* Schiff. — H.
- Boletobia fuliginaria* L. — Blankenese — Sp. — H.

Zanclognatha grisealis Hb. — Blankenese. — Sp. — Juni.
Reinbeck, Borstel. — S.

? *Zanclogn. tarsicrinalis* Knoch. — W.

Madopa salicalis Schiff. — G.

Herminia tentacularia L. — G.

Herm. derivalis Hb. Juli. Haake. — S.

Pechipogon barbalis Cl. Jc. Blankenese. Sp. — Mai, Juni.
Niendorf, Reinbeck. R.: September auf Eichen, überwintert
unter Laub und spinnt sich im April ein. — S.

Bomolocha fontis Thnb. — G. — Juli. Haake. — S.

Hypena rostralis L. Blankenese. Sp. — G. W. — Juli.
Steinbeck. R.: auf Hopfen. — S.

Hyp. proboscidalis L. Blankenese. — Sp.

? *Hyp. obsitalis* Hb. — W.

? *Hypenodes costaestrigalis* Stph. — W.

Rivula sericealis Sc. — Blankenese. Sp. — August. Boberg.
S. — G.

D. Gometrae.

Geometra vernaria Hb. — G.

Phorodesma smaragdaria F. var. *prasinaria* Ev. — G.

Acidalia muricata Hfn. (*A. auroraria* Bkh.) — G. —
22. und 29. Juli 1855 je 1 Exemplar in Friedrichsruhe ge-
funden. — Sl.

Acid. inornata Hw. — 29. Juli 1855 Sachsenwald. — Sl. — G.
var. (et. ab.) *deversaria* H. S. Sachsenwald. —
Sl. S.

Acid. immorata L. Mai. Sachsenwald. S. — G.

Acid. immutata L. — G.

Acid. flaccidaria Z. — G.

Pellonia vibicaria Cl. Jc. Juli. Haake. — S.

Abraxas (Zerene Tr.) *marginata* L. — G.
ab. *pollutaria* Hb. — G.

Eugonia fuscantaria Hw. August. Horn, Sternschanze. R.:
Juli auf Eschen. — S.

- Selenia bilunaria* Esp. (*S. illunaria* Hb.) Blankenese. Sp.
— S. G.
- Macaria signaria* Hb. 1868 ein Exemplar am Gehölz bei
Borstel gefangen. G. — H.
- Biston hispidarius* F. Von Herrn Dörries gezogen. (?) Sachsen-
wald. — Sl.
- Pachykenema hippocastanaria* Hb. Im Juli 1868 6 Exemplare
am nördlichen Abhang des Kösterberges bei Blankenese
gefangen. G. — Sp.
- Gnophos obscuraria* Hb. — H.
- Lobophora halterata* Hufn. Mai. Reinbeck. S.
- Cidaria caesiata* Lang. — G.
- Cid. berberata* Schiff. Blankenese Sp.
- Eupithecia subfulvata* Hw. — G.
- Eup. nanata* Hb. Blankenese. Sp. — Mit *Ortholitha coarctata* F.
zusammen auf den Haiden bei Bahrenfeld fliegend. Sl.
- Eup. pygmaeata* Hb. Lockstedt. Sl.
- Eup. satyrata* Hb. Mitte August bei Hamburg Raupen von
Blüthentheilen und unreifen Samen von *Gentiana ciliata*
lebend. Dietze.
- Eup. minutata* Gn. Spätsommer bei Hamburg Raupen an
Eupatorium cannabinum Dietze.
- Eup. absinthiata* Cl. Jc. Zu gleicher Zeit und an derselben
Pflanze die Raupen gefunden. Dietze.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Schmeltz J.D.E.

Artikel/Article: [II. Nachtrag zu dem "Verzeichniss der bisher um Altona und Hamburg gefundenen Gross-Schmetterlinge \(Macrolepidoptera\) von H. Tessien" 139-148](#)