# Beiträge zur Fauna der Niederelbe.

## VIII.\*)

### Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Orthoptera

der Umgegend von Hamburg.

Von Dr. H. Beuthin.

Die Bestimmung der nachstehend verzeichneten Thiere, welche ich in den Jahren 1873 und 1874 gesammelt habe, war Herr Hofrath Brunner von Wattenwyl in Wien so freundlich zu übernehmen, wofür ich dem verehrten Herrn auch an dieser Stelle meinen Dank abstatte.

## Ordo: Orthoptera Erichson.

Subordo: Orthoptera genuina Oliv. Latr.\*\*)

Fam. Forficulina Burm.

Labia minor L. 1 Exemplar Friedrichsruh 15/6. 73. Forficula auricularia L. überall.

<sup>\*)</sup> I-VII siehe Band I dieser Verhandlungen.

<sup>\*\*)</sup> Subordo Pseudoneuroptera Er. vide Pag. 122 in Band I dieser Verhandlungen, 1875.

#### Sectio Cursoria Latr.

#### Fam. Blattina Burm.

Ectobia lapponica L. Haake, Friedrichsruhe. livida Fabr. 1 Exemplar, Winterhude. Phyllodromia germanica L. in Häusern. Periplaneta orientalis L. in Häusern, americana L. in Fabriken.

#### Sectio Saltatoria Latr.

### Fam. Gryllodea Burm.

Gryllotalpa vulgaris Ltr. Haake, Ahrensburg. Gryllus campestris L. Haake, Rothenhaus. domesticus L. in Häusern der Bäcker etc.

#### Fam. Locustina Burm.

Meconema varium F. 2 Exemplare Haake, 17. Sept. 1874.
Xiphidium dorsale Charp. Haake.
Locusta viridissima L. überall.
cantans Fuessly. Hamm.
Thamnotrizon cinereus Zett. Haake.
Decticus brachypterus L. Haake, Aug. 1874.
verrucivorus L. Haake, Rothenhaus. Winterhude, Rissen.

### Fam. Acridioidea Burm.

Stenobothrus dorsatus Zett. Haake, Rothenhaus.
pratorum Fieb. Haake.
lineatus Panz. Winterhude.
viridulus L. Rothenhaus.
haemorrhoidalis Charp. Haake.
variabilis Fieb. Haake.
Gomphocerus biguttatus Charp. Haake.
rufus L. Rothenhaus.
Stethophyma grossum L. Winterhude, Rothenhaus.

Pezotettix pedestris L. Borstel.
Pachytylus migratorius L. sehr einzeln.
stridulus L. Haake, selten.

Oedipoda coerulans L. Haake, 16. Aug. 1874, 6. Sept. 1874. ?var. cyanoptera Charp. Haake\*) tuberculata Fabr. Haake, Winterhude. coerulescens Fabr. Haake, Rothenhaus, Geesthacht. Tettix subulata L. Haake, Winterhude, Rothenhaus. bipunctata L. Haake, Reinbeck.

<sup>\*)</sup> Die im September 1874 gefangenen 6 Exemplare scheinen Herrn Hofrath Brunner von Wattenwyl sowohl von coerulans L. als auch von den in Spanien vorkommenden cyanoptera Chrp. verschieden, ich wäre geneigt die cyanoptera als Varietät zu coerulans zu zählen; leider war im September 1875 das Wetter so ungünstig, dass ich nicht ein Stück fing.

# **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Verhandlungen des Vereins für</u> <u>Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg</u>

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: Beiträge zur Fauna der Niederelbe. VIII. Zweiter

Beitrag zur Kenntniss der Orthoptera 219-221