

## Beiträge zur Flora der Niederelbe.

### II. Ueber die Pilzflora unseres Gebietes von Th. Overbeck.

Fortsetzung des Verzeichnisses der sicher nachgewiesenen Pilze  
der Umgebung Hamburgs und Harburgs.

(Schluss.)

*Boletus granulatus bovinus* L. Kuhpilz, essbar, Sand,  
Kiefernwälder, gemein. Haacke, Dockenhuden.

„ *aereus* Bull., essbar. Dockenhuden, selten.

„ *rufus* Schaeff. (wohl nur Abart von *B. scaber*),  
essbar. Hölzung nordöstlich Appelbüttel, häufig, Haacke,  
selten, Dockenhuden.

„ *strobilaceus* Scop. sehr selten. Ward in dem  
letzten Jahresbericht schon von mir mit ? ohne Namen  
versehen, aufgeführt, ward vom Oberlehrer Dr. Wagen-  
knecht, November 1879, in Jaenisch's Park bei kl. Flott-  
beck, von mir, November 1880, auf's Neue im Centrum  
der Haacke in einem Hohlwege ca. 500 Schritt nordöstlich  
vom sogenannten Kaiserstuhl in zwei Exemplaren ge-  
funden.

„ *spadiceus* Herbst. Haacke bei Hausbruch selten.

*Polyporus sulfureus* Fr. Herbst; am Fusse alter Baum-  
stämme; Haacke, Rosengarten.

„ *igniarius* Fr. Unechter Feuerschwamm. An alten  
Weidenstämmen, überall häufig.

„ *sanguinolentus* Fr. Herbst, Haacke bei Hausbruch  
auf Moos.

„ *melanopus* an altem faulen Holz, Haacke; selten.

*Irpex obliquus*, an Stämmen bei der majestätischen Aussicht;  
Timm jr.

*Hydnum laevigatum* Haacke, einzeln, in der Nähe der  
Waldschenke.

„ *zonatum* Batsch. Herbst; gemischter Wald in der  
Haide zwischen Falkenberg und Rosengarten, Kayser.

„ *coralloides* Scop. Herbst, an faulen Stämmen,  
Sachsenwald, selten, essbar, Timm jr.

*Radulum fagineum* Fr. An alten Buchenstämmen in Stücken bei Lührade.

„ *orbiculare* Fr. Ebendasselbst.

*Craterellus cornucopioides* Pers. Ausser an dem im vorigen Hefte angeführten Punkte nicht selten in dem Laubholze nördlich vom Fuchsberge bei Rönneburg.

*Telephora laciniata* Pers. häufig, Schwarzenberg, Haacke auf der Erde.

„ *caryophyllea* Pers. Ebendasselbst.

*Stereum purpureum* Pers. An Buchenstämmen im Stücken bei Lührade.

„ *hirsutum* Fr. Ebendasselbst.

*Clavaria argillacea* Pers. Höpen, Haacke, Wald bei Lüh-  
rade, Dockenhuden.

„ *fastigiata* L. Bremer Chaussee zwischen Tötensen und Lührade.

*Tremella mesenterica* Retz. Winter an alten Baum-  
stämmen in der Haacke.

*Exidia recisa* Fr. Im Herbst und Frühling vereinzelt an alten Weiden bei Lührade, Timm jr., Höpen, selten.

#### Uredineae (Rostpilze).

*Puccinea anemones* P. Frühling auf Blättern von *Anemone ranunculoides*, Langenbeck.

„ *adoxae* D. C. auf *Adoxa moschatellina*.

„ *aegopodii* Link, auf *Aegopodium*.

*Accidium rhamni* Pers. auf Blättern von *Rhamnus frangula*.

„ *leucospermum* D. C. auf Blättern von *Anemone nemorosa*.

*Peridermium pini* Wallr. Kiefernblasenrost. Auf Kiefern-  
zweigen, Schwarzenberg bei Harburg, Haacke.

---

## Etymologische Späne.

Nicht ohne Berechtigung hat man neuerdings die Linguistik unter die naturwissenschaftlichen Fächer eingereiht; daher erlaube ich mir hier einige etymologische Späne mit-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Overbeck Th.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der Niederelbe 114-115](#)