

Verzeichnis der bisher um Hamburg beobachteten Rhynchota.

Von Dr. H. Beuthin.

In den Jahren von 1872 bis 1880 habe ich ausser anderen Insecten auch die Rhynchoten hiesiger Gegend auf meinen Sammeltouren mitgenommen; ich lasse, da dieselben nunmehr in anderen Besitz übergegangen sind, nachstehend das Verzeichnis der bestimmten Arten folgen, der grösste Teil meiner hier gefundenen Arten musste aus Mangel an Zeit, Literatur und Vergleichsmaterial unbestimmt bleiben; hoffentlich findet sich bald eine jüngere Kraft, welche sich dieses hier noch brach liegenden Feldes annimmt.

I. Rhynchota heteroptera (Hemiptera).

Familie **Corisae**.

Corisa Geoffroyi Leach., mehrfach Steinwälder, Winterhude.
„ *striata* Fieb., Borstel einzeln.

Familie **Notonectae**.

Notonecta Fabricii Fieb., überall gemein.

Familie **Nepae**.

Nepa cinerea L., überall gemein.
Ranatra linearis L., im Borstler Moor.

Familie **Naucoridae**.

Naucoris cimicoides L., bei Winterhude häufig gef.

Familie **Linnobatidae**.

Linnobates stagnorum L., Bergedorf, Haake häufig.

Familie **Hydroessae.**

Velia currens F., bei Winterhude mehrfach gef.

Familie **Hydrometrae.**

Hydrometra ventralis Fieb., häufig bei Bergedorf.

„ *lacustris* L., Winterhude, Bergedorf.

Familie **Aradidae.**

Aradus depressus F., Bergedorf 16. 5. mehrfach.

„ *lugubris* Fall., bei Friedrichsruh.

Familie **Tingidae.**

Zosmenus Laportei Fieb., Haake selten.

Monanthia ampliata Fieb., Haake, Bergedorf mehrfach.

„ *cardui* L., Friedrichsruh einzeln.

Orthostira cervina Ger., Haake einzeln.

Familie **Acanthidae.**

Acanthia lectularia L., in Häusern hie und da.

Familie **Acanthocoridae.**

Acanthocoris limbatus Fieb., häufig Bergedorf, Haake.

Triphleps minutus L., häufig, Haake.

Familie **Saldae.**

Salda litoralis L., Haake einzeln.

„ *cineta* L., Haake mehrfach.

Familie **Beduvidae.**

Harpactor annulatus L., Wandsbeck, Friedrichsruh, Haake, einzeln.

Colliocoris pedestris Wlf, Haake 27. 9.

Familie **Nabidae.**

Nabis brevipennis Hhn, überall auf Achillea etc

„ *subapterus* Deg., Haake, mehrfach.

„ *flavomarginatus* Schlz, Flottbeck häufig.

Familie **Pyrrhocoridae.**

Pyrrhocoris apterus L., Elbstrand, Haake, Alsterufer, gemein.

Lygaeus equestris L., einzeln.

Nysius thymi Wlf, mehrfach Haake.

Drymus notatus, Fieb., einzeln.

Lamprodema maura F., Haake mehrfach.

Homalodema ferruginea L., Haake einzeln.

Scoloposthetus affinis Schill, Haake, Flottbeck.

- Rhyparochromus tristis Fieb., Bergedorf häufig.
 „ phoenicus Rossi, Bahrenfeld 5. 6. mehrfach.
 „ pini L., häufig.
 Emblethis platychilus Fieb., Haake häufig.

Familie **Berytidae.**

- Neides tipularius L., Winterhude 2. 8. mehrfach.

Familie **Coreidae.**

- Spathocera laticornis Schill., Haake einzeln.
 Arenocoris spinipes Fall., Haake.
 Alydus calcaratus L., Haake 12. 7., Winterhude 12. 9.
 Syromastes marginatus L., überall gemein.
 Verlusia rhombea L., Haake einmal gef.
 Enoplops Scapha Fr., Haake einzeln.
 Therapha hyoseyami L., Rothenhaus 23. und 27. 8.
 Rhopalus Abutilon Rossi, häufig.
 „ truncatus Rbr., Haake häufig.
 Corizus maculatus Fieb., Bergedorf, einzeln.
 „ parumpunctatus Schill., Haake.

Familie **Phytocoridae.**

- Notostira erratica L., Bahrenfeld 3. 7., Borstel 9. 7.
 Leptopterna dolabrata L., Bahrenfeld 3. 7.
 Homodemus ferrugatus F., Bahrenfeld 6. 7., Winterhude 28. 7.
 Calocoris bipunctatus F., Friedrichsruh einzeln.
 „ detritus Meyer-D., Haake mehrfach.
 Phytocoris divergens Mey., einzeln, Haake.
 Pycnopterna striata L., Elbufer mehrfach.
 Lopus gothicus L., Haake.
 Lygus pratensis F.,
 „ camprestris F.,
 „ rubricatus Fall.,
 Cyllocoris histrionicus L.,
 Globiceps flavomaculatus F.,
 Aetorhinus angulatus Fall., Elbufer einzeln.
 Orthocephalus saltator Hhn, Haake häufig.
 „ Panzeri Fieb., Geesthacht einzeln.
 Harpocera thoracica Fall., Haake 1 Exempl.

Familie **Macropeltidae.**

- Sastragula ferrugator* F., Haake 25. 9.
Acanthosoma haemorrhoidalis L., Haake 14. 6.
Elasmotethus dentatus Deg., Rothenhaus 24. 8.
 „ *griseus* L., Haake 12. 9.
Piezodorus Degeeri Fieb., Haake 27. 9.
Tropicoris rufipes L., Haake 30. 8. häufig.
Eusarcoris binotatus Hhn., Bergedorf mehrfach.
Holcostethus congener Fieb., Bahrenfeld einzeln.
Mormidea baccarum L. überall einzeln.
 „ *nigricornis* F., Winterhude, Borstel, Bahrenfeld 24. 8
 — 2. 9.
Cimex dissimilis F., Rothenhaus 23. 8.
Strachia ornata L., Ahrensburg, Haake einzeln.
 „ *oleracea* L., überall gemein.
Zicrona coerulea L., Geesthacht 3. 7. Borstel 20. 7.
Picromerus bidens L., Rothenhaus einzeln.
Aelia acuminata L., überall auf *Spartium* gemein.
Brachypelta aterrima Forst., Haake einzeln.
Cydnus nigrita F., Bergedorf, Haake mehrfach.
Corymelaena scarabaeoides L., Borster Jäger 5. 6. 1 Expl.
Schirus ovatus H. S., Haake, Rothenhaus, einzeln.
 „ *biguttatus* L., Alsterdorf 28. 6.
 „ *bicolor* L., Borstel 3. 5.

Familie **Tetyrae.**

- Eurygaster maurus* L., Winterhude 2. 9.

II. **Rhynchota homoptera (Cicadaria).**Familie **Membracida.**

- Centrotus ornatus* L., sehr gemein auf *Spartium*. Haake,
 Bahrenfeld.
Gargara Genistae F., häufig auf *Genista* und *Spartium*. Haake
 20. 7. Winterhude 6. 8. Borstel 7. 9.

Familie **Fulgorida.**

- Cixius nervosus* L., Haake gemein.
 „ *cunicularius* L., Haake.

Familie **Cercopida.**

Aphrophora alni Fall., Haake, Borstel, häufig.

Philaenus lineatus H., in Gärten auf *Weigelia* häufig.

„ *minor* Kb., Haake, Bahrenfeld.

„ *spumarius* L., mit den Varietäten *lateralis* L., *leucocephala* L., *pallida* Schk., und *populi* L., überall häufig.

Familie **Jassida.**

Tettigonia viridis L., Haake, Borstel u. s. w. gemein.

Euacanthus interruptus L., Haake einzeln.

„ *acuminatus* F., Haake.

Acocephalus rusticus F., Bergedorf, Reinbeck.

Thamnotettix cruentata Pz., Borstel einzeln.

Nachtrag zum Verzeichnis der Neuropteren

der Umgegend von Hamburg.

(Band I. dieser Verhandlungen).

Von *Myrmeleon formicarius* L. (*formicalynx* Burm.) fand ich am 14. Juni 1885 ein frisch ausgekrochenes Exemplar auf dem Wege zwischen Hausbruch und Jägerhof am Grase sitzend; ein anderes Exemplar erhielt ich im Juli 1882 von einer Schülerin, die dasselbe bei Rothenhaus fand. Im Ganzen scheint diese Art hier nur vereinzelt vorzukommen, während die gefleckte Art, *Myrmeleon europaeus* M'Lachlan, hier sehr gemein ist.

Dr. H. Beuthin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: [Verzeichnis der bisher um Hamburg beobachteten Rhynchota 87-91](#)