

Beitrag zur Fauna der Niederelbgegend.

Neue und seltene Käfer.

Mitgeteilt

von

Th. Wimmel und R. Niemeyer.

Während der letzten Jahre hatten wir Gelegenheit, eine Reihe für die hiesige Fauna teils neuer, teils seltener Arten und Varietäten zu finden. Von seltenen Arten sind in nachfolgender Liste solche verzeichnet, die entweder durch zahlreiches Auftreten oder neuen Fundort der Veröffentlichung wert sind.

Cicindela var. *Saxeseni* Endrulat.* 1 Stück am 13. Juni 1885 vom Eppendorfer Moor (N.).

Chrysocarabus auronitens F. Im Mai 1887 circa 40 St. in der Haacke an Baumwurzeln gefunden (W.).

Leïstus rufomarginatus, Duftschm. Im Hinschendorfer Holz nicht selten. In Ebstorf bei Uelzen sehr häufig gefunden (1885 und 1886) (N.).

Leïstus ferrugineus, L. In Bahrenfeld in Anzahl zu finden (N.).

Bembidion modestum F. Im Frühjahr 1887 und 1888 bei Geesthacht stellenweise häufig, später wieder sehr einzeln (W. u. N.).

Bembidion argenteolum Ahr. Im Frühjahr 1890 erbeuteten Herr Schulz und ich bei Geesthacht 300 St., darunter 50 St. var. *azureum* Gebl. (W.).

*) muss *Tartarica* Mannerheim heissen.

- Bembidion 5 striatum* Gyllh. im Herbst einzeln in der Stadt und nächsten Umgebung (W.).
- Trechus rubens* F. am 27. Juli 1890 a. Ochsenwärder von Wasserpflanzen geschöpft (W.).
- Ophonus brevicollis* Dej. in Gärten in Hamm, oft häufig gefunden (N.).
- Bradycellus placidus* Gyllh. Mit einem andern Sämmler zusammen im Herbst 1889 in Winterhude 1200 Stück gefunden (N.). Die Tiere sassen unter Baumrinden und waren lebhaft.
- Bradycellus Deutschi* Sahlb. 7 Exemplare aus Winterhude; 4 im Frühjahr unter Moos (N.), 3 im Herbst unter trockenem Laube (W.).
- Bradycellus distinctus* Dej. 6. April 1890 1 Stück dieser Seltenheit in Winterhude gefunden (W.).
- Celia ingenua* Duftsch. 100 Stück im Oktober 1888 in Winterhude (N.).
- Celia infima* Duftsch. In den letzten drei Jahren von verschiedenen Orten gegen 40 Stück erbeutet (W. u. N.).
- Celia cursitans* Zimm. in der Stadt 2 Stück (W.).
- Celia praeternissa* Sahlbg. im Sachsenwald und bei Geesthacht einzeln gefunden (W. u. N.).
- Celia sylvicola* Zimm. ist bei Ohlenburg unter trockenem Kuhmist nicht selten (N.).
- Acrodon brunneum* Gyllh. 15 Stück im Juni 1888 bei Reinbek. Die Tiere krochen bei heissem Wetter an Fichtenstämmen (N.).
- Pedius inaequalis* Marsh war 1888 am Elbstrand häufiger zu finden (N.).
- Europhilus Thoreyi* Dej. ist auf den Elbinseln häufiger zu finden. (Siehe Seidlitz, Fauna baltica, II. Aufl. Seite 29 (N.).
- Europh. Thoreyi* var. *puellus* Dej. in Winterhude und an der Bille nicht selten (W. u. N.).
- Olisthopus rotundatus* Payk. Winterhude unter Moos oft in grösserer Anzahl (W. u. N.).
- Cymindis vaporariorum* F. 1887 bis 1889 bei Ohlenburg 40 Stück, davon 9 selbst gefunden (N.).

- Masoreus Wetterhali* Gyllh. in denselben Jahren bei Ohlenburg 45 Stück, davon einige selbst (N.) Ein Stück in der Zimmerstrasse, Uhlenhorst (W.).
- Dromius linearis* Oliv, hinter Steinbek alljährlich unter trockenem Laub zu finden (N.).
- Dromius 4notatus* Pz. in Sievekings Park unter Rinden häufig (N.).
- Dromius nigriventris* Thoms. im November 1888 bei Ohlenburg 15 Stück, davon 5 selbst (N.). Sassen unter bröckeligen Steinen einer Mauer.
- Coelambus decoratus* Gyllh. 5 Stück in einem Graben am Mühlenkamp (W.).
- Silusa rubiginosa* Er. 20. April 1887 in Winterhude unter Baumrinde (N.).
- Aleochara tristis* Grav. (*nigripes* Müll.) bei Escheburg unter trockenem Kulmist in grösserer Anzahl; sonst verbreitet aber selten (W. u. N.).
- Aleochara verna* Say. in Hohenfelde 3 Exemplare gefunden (W.).
- Aleochara ruficornis* Grav. Diese Seltenheit fing ich am 8. Mai 1883 an der Alster (W.).
- Ilyobates nigricollis* Payk. in Billwärder im Juli 1887 1 Exemplar (W.), an der Bille unter Schilf (N.).
- Chilopora rubicunda* Fr. October 1888 in Winterhude unter Moos (W. u. N.).
- Homalota trinotata* Kr. in Häusern mehrfach gefunden (W.).
- Homalota zosteræ* Th. „ „ „ „ „
- Atemeles paradoxus* Grav. in Bahrenfeld (W. u. N.) und bei Havighorst (N.).
- Diglossa mersa* Haliday. 29. April 1885 in grösserer Anzahl am Elbstrand bei Neumühlen (W.).
- Gymnusa brevicollis* Payk. auf dem Boberger Moor unter Baumrinden nicht selten; 1889 23 Stück (N.).
- Dinopsis erosa* St. an der Bille unter Schilf, im Frühjahr nicht selten (W. u. N.).
- Tachyporus (Lamprinus) saginatus* Grav. am 18. April 1886 in Bahrenfeld unter Moos gefunden (W.) 1 Exemplar vom Hammerdeich (N.).

- Conurus littoreus* L. unter altem Zeuge in Winterhude in Menge gefunden (Herbst 1888; N. u. W.).
- Bolitobius inclinans* Grav. 1886 2 Stücke in Ebstorf bei Uelzen unter Laub; 1889 in der Haacke 1 Stück unter faulem Holz gefunden (N.).
- Quedius infuscatus* Er. 28. Oktober 1888 auf Mühlenkamp unter Moos 1 Exemplar (W.), April 1889 1 Stück in Harburg (N.).
- Quedius umbrinus* Er. September 1886 Bahrenfeld 1 Stück (W.); 9. Juni 1887 Johns Park 1, am 26. Mai 1887 Harvestehude 2 Stücke (N.).
- Quedius tristis* Grav. 28. Juni 1885 Friedrichsruh 1 Stück (N.), 1. Oktober 1887 Bergedorf 1 Stück (W.).
- Quedius picipes* Mannh. 2. Oktober 1885 Havighorst 1 Stück (N.).
- Quedius suturalis* Ksw. Oktbr. 1887 Hinschendorf 2 Stück (N.).
- Staphylinus latebricola* Grav. Die in Erichson, Redtenbacher und Seidlitz enthaltenen Beschreibungen dieser Art passen vollkommen auf die hier gefundenen Stücke (5); dagegen ist es uns nie gelungen, *St. chalcocephalus* hier zu finden, und scheint das Vorkommen letzterer Art auf Verwechslung mit *St. latebricola* zu beruhen (W. u. N.).
- Staphylinus stercorarius* Ol. Sachsenwald-Haacke mehrfach gefunden (W.).
- Staphylinus brunnipes* F. Sachsenwald und Bahrenfeld im Frühjahr unter Moos und Steinen (W.).
- Actobius cinerascens* Grav. an der Bille unter Schilf häufig (W. u. N.).
- Philonthus punctus* Grav. bei Geesthacht nicht selten (W. u. N.).
- Philonthus fuscus* Grav. 1 Stück von Johns Park 3. Mai 1887 (N.).
- Philonthus lucens* Er. Harburg, Bahrenfeld, Geesthacht im Frühjahr unter Laub einzeln (W. u. N.).
- Philonthus quisquiliarius* var. *rubidus* Er. Geesthacht Frühjahr 1890 in Mehrzahl (W.).
- Philonthus varius* var. *bimaculatus* Grav. je 1 Stück in Hamm und Hohenfelde (W.).

- Philonthus albipes* Grav. am 16. September 1885 im Wandsbeker Gehölz unter Moos gefunden (W.).
- Philonthus tenuis* F. bei Bergedorf 1 Exemplar gef. (W.).
- Xantholinus fulgidus* F. einzeln in Hamm, an der Bille und an der Elbe (W. u. N.).
- Achenium humile* Nicol. an der Bille unter Schilf einzeln (W. u. N.).
- Lathrobium rufipenne* Gyll. mit *Gymnusa* (s. o.) zusammen in Mehrzahl, ca. 30 Stück, gefunden (N.).
- Lathrobium filiforme* Grav. Frühjahr 1888 unter Schilf an der Bille in grosser Menge (N.).
- Lathrobium longulum* Grav. Frühjahr 1888 unter Schilf an der Bille in grosser Menge (N.).
- Stenus calcaratus* Scriba. An beiden Seiten des Elbstrandes nicht selten (N.).
- Stenus fossulatus* Er. in der Haacke mehrfach unter Laub gefunden (W.).
- Euaesthetus ruficapillus* Lacord. an der Bille unter Schilf in grosser Anzahl (W. u. N.).
- Oxyporus maxillosus* F. Haacke nicht selten (N.).
- Olophrum fuscum* Grav. April 1889 mehrere Stücke an der Bille unter Schilf (W. u. N.).
- Pselaphus Heisei* Herbst. April 1887 an der Bille unter Moos sehr häufig (N.).
- Euconus hirticollis* Ill. ebenda, noch häufiger (N.).
- Eumicrus tarsatus* Müll. Oktober 1886 in Winterhude 1 Stück (N.).
- Anisotoma glabra* Kug. am 22. Juni 1890 bei Reinbek auf einem Baumstumpf gefunden; bisher nur aus Harburg bekannt (W.).
- Agathidium nigrinum* St. var. *rubicundum* Reitt. Dies seltene Tier erbeutete ich am 22. Mai 1884 im Sachsenwald (W.).
- Clambus armadillo* Degeer — wie *Pselaphus* und *Euconus* (N.).
- Scaphidium maculatum* Ol. im Sachsenwald ziemlich selten; 1 Exemplar fand ich im Borstler Gehölz unter Pilzen (W.).

- Lathridius alternans* Mannh. in einem Hause der Güntherstrasse in so grosser Anzahl, dass diese Käfer zu einer förmlichen Plage geworden; sonst selten (W.).
- Coninomus nodifer* Westw. Uhlenhorst in einem Hause ca. 10 Stück (W.).
- Soronia punctatissima* Ill. 3 Exemplare dieser sonst nur aus Harburg bekannten Art fand ich in Eilbek (Hasselbrook) unter Rinde in Gesellschaft mit *S. grisea* (W.).
- Platysoma angustatum* Hoffm. Sachsenwald 1 Exemplar unter Rinde (W.).
- Hister succicola* Th. Juni 1886 Sachsenwald 1 Exemplar unter Steinen (W.).
- Hister marginatus* Er. Juni 1886 Sachsenwald 1 Exemplar unter Steinen (W.).
- Plegaderus caesus* Ill. 19. Juni 1887 Johns Park 2 Exemplare (W. u. N.).
- Plegaderus vulneratus* Panz. in der Haacke in morschem Holz (W.).
- Onthophilus striatus* F. 2 Stück bei Havighorst (N.), 1 Stück bei Reinbek (W.).
- Abraeus globulus* Creutz. am 28. August 1887 bei Escheburg in trockenem Kuhmist 3 Stück (N.).
- Aphodius lugens* Creutz. 1 Stück bei Friedrichsruh in Kuhmist (W.).
- Aphodius pictus* St. Herbst 1888 etwas häufiger, sonst selten (W.).
- Aphodius obliteratus* Panz nur im Spätherbst; alljährlich in Harvestehude und Winterhude in grosser Anzahl an Gartenmauern (W. u. N.). Einmal 1 Exemplar in Hamm (W.).
- Geotrupes hypocrita* Serv. Ich sah einige Stücke aus Harburg (W.).
- Trox scaber* L. Juli 1889 Winterhude 1 Exemplar (W.).
- Hoplia philanthus* Füssl. 28. Juni 1885 Sachsenwald 1 Stück geklopft (W.).
- Megapenthes tibialis* Lac. in einigen Drogengeschäften alljährlich in mehreren Exemplaren gefangen (W.).

- Agriotes sobrinus* Ksw. 1887 und 1888 Johns Park sehr häufig (N.).
- Ludius ferrugineus* L. Ich sah bei Herrn Otto Meyer zwei Stücke aus Billwärder (N.).
- Diacanthus nigricornis* Panz. am 3. Juni 1887 in der Stadt gefunden (W.).
- Eucnemis capucina* Ahr. 15. Juni 1887 Johns Park 1 Exemplar (N.).
- Scirtes orbicularis* Panz. am 19. Juli 1885 in grösserer Anzahl am Mühlenkamp von Wasserpflanzen geschöpft (W.).
- Prionocyphon serricornis* Müll. 21. Juli 1885 Ebstorf 1 Stück (N.), 2 Exemplare 7. Oktober Holstein (W.).
- Podabrus alpinus* Payk. Juni 1888 bei Reinbek auf Fichten recht häufig (N.).
- Silis ruficollis* F. alljährlich am Eppendorfer Mühlenteich, aber nur sehr vereinzelt (W.).
- Rhagonycha testacea* v. *limbata* Th., verbreitet, stellenweise häufiger als die Stammform (W.).
- Haplocnemus virens* Suffr. 6. April 1884 1 Stück an einem Hause an der Alster (W.).
- Tillus elongatus* L. 30. Juli 1888 in der Stadt 1 Exemplar (W.).
- Bruchus raptor* St. in Häusern, bes. Drogengeschäften oft in grossen Mengen; nach Br. für die häufigste Art, früher mit *Br. bidens* verwechselt (W.).
- Anobium fagicola* Muls. 19. Juni 1888 Haacke 1 Exemplar geklopft (W.).
- Xestobium plumbeum* Ill. am 18. Mai 1890 bei Reinbek auf gefälltem Holz gefunden (W.).
- Trypopytus carpini* Hbst. im August 1890 in Hohenfelde 1 Exemplar ans Licht geflogen; ein zweites Exemplar fing ich bereits früher in der Stadt (W.).
- Rhizopertha bifoveolata* Woll. mit *Rh. pusilla* zusammen mit Reissäcken eingeführt (W.).
- Scaphidema metallica* F. an verschiedenen Orten einzeln, am Lehmweg und Jacobikirchhof (Kirchenallée) unter Baumrinde in Mengen gefunden (W. u. N.).

- Tribolium confusum* Duv. mit Orangenschalen eingeführt (W.).
- Allecula morio* Fab. in Drogengeschäften mehrfach gefunden (W.).
- Hallomenus binotatus* an morschem Holz in Johns Park 12 Stück, Juni 1887 (N.).
- Melandrya caraboides* L. 1887 Johns Park 50 Stück (N.); Sachsenwald bisweilen ebenfalls nicht selten (W.).
- Conopalpus testaceus* Ol. 3. Juli 1881 im Borstler Gehölz 1 Exemplar geklopft (W.).
- Euglenes nigrinus* Germ. 15. Juli 1885 in meinem Hause in Hohenfelde 1 Exemplar ans Licht geflogen (W.).
- Euglenes boleti* Marsh. Winterhude in Baummulm 1 Exemplar (W.).
- Mordella fasciata* Fab. v. *Mulsantii* im Juli 1890 auf Ochsenwälder 1 Exemplar gefunden (W.).
- Mordellistena abdominalis* F. in Bahrenfeld und Bergedorf auf Weissdorn (W.).
- Mordellistena lateralis* Ol. in Winterhude (W.).
- Anaspis Geoffroyi* Müll. im Juli 1887 in Johns Park von Blüten geschöpft (W.).
- Pytho depressus* L. 20. März 1887 in Bahrenfeld gegen 20 Stück erbeutet, darunter die var. *castaneus* (W. u. N.).
- Lissodema 4pustulatum* Marsh. in Eppendorf und Billwälder je 1 Exemplar (W.).
- Cerocoma Schäfferi* L. Mai 1885 Ebstorf 1 Exemplar (N.).
- Otiorrhynchus scabrosus* Marsh. alljährlich in Hohenfelde mehrere Exemplare (W.).
- Strophosomus fulvicornis* Walt. Im Frühjahr 1888 auf der Landstrasse von Bergedorf nach Geesthacht und in Harburg einige Stücke (W.).
- Sitona suturalis* Steph. Frühjahr 1888 an der Bille unter Schilf in grosser Anzahl (W.).
- Sitona cambricus* St. im August 1882 und April 1885 je 1 Exemplar in Winterhude gefunden (W.).
- Hypera fasciculata* Hbst. 4 Exemplare in Hohenfelde, 2 bei Bergedorf (W.).

- Hypera arundinis* Payk. Im Juli 1890 klopfte ich diese Art in grösserer Anzahl in Ochsenwärdern von *Aegopodium* (W.).
- Lixus cylindricus* einige Stücke vom Boberger Moor (N.).
- Lixus paraplecticus* L. Billwärdern nicht selten (N.).
Ochsenwärdern auf *Aegopodium* häufig (W.).
- Pissodes harcyniae* Hbst. 1 Stück aus Hamm (W.).
- Pissodes piniphilus* Hbst. 2 Stücke aus Hohenfelde (W.).
- Grypidius brunneostris* F. an der Bille und Elbe nicht selten (W. u. N.).
- Dorytomus filirostris* Gyllh. im Spätherbst auf Mühlenkamp und Winterhude stellenweise in grösserer Anzahl (W. u. N.).
- Dorytomus affinis* Payk. Sievekings Park unter Rinde häufig (N.).
- Magdalis aterrima* F. 6. Juni 1885 Hohenfelde 1 Exemplar (W.).
- Balaninus Herbsti* Germ. Borstel und Winterhude auf Ulmen (W.).
- Anthonomus sorbi* Germ. auf blühendem Weissdorn, stellenweise ziemlich häufig (W.).
- Tychius quinquepunctatus* L. Winterhude (W.).
- Sibinia primita* Hbst. in Hohenfelde und Hamm mehrfach gefunden (W.).
- Orchestes rufitarsis* Germ. Geesthacht und Sachsenwald (W.).
- Tapinotus sellatus* F. Wandsbek, Eppendorfer Mühlen-
teich (W.).
- Coryssomerus capucinus* Beck. bei Geesthacht (W.),
1 Exemplar bei Bergedorf (N.).
- Ceuthorrhynchus litura* F. Winterhude auf Nesseln (W.).
„ *viduatus* Gyllh. Mühlenkamp und Hamm
im Frühjahr mehrfach an Mauern kriechend gefunden (W.).
- Dryophthorus lymexylon* F. 29. April 1885 2 Exemplare
am Elbstrand bei Neumühlen (W.).
- Cossonus linearis* F. an einem Hause der Esplanade
alljährlich in Menge (W.).
- Cossonus parallelipedus* Hbst. Alsterdamm ebenso (W.).

- Cossonus cylindricus* Sahlbg. 1 Exemplar von Herrn Otto Meyer bei Escheburg in einer alten Weide gefunden (W.).
- Phloeophagus spadix* Hbst. in Drogengeschäften mehrfach gefunden (W.).
- Rhynchites megacephalus* Germ. Bergedorf und Friedrichsruh auf Wollweiden manchmal in grosser Anzahl (W.).
- Rhynchites pubescens* F. Sachsenwald, Haacke einzeln (W.).
- Rhynchites olivaceus* Gyllh. Sachsenwald einzeln (W.).
- Rhynchites sericeus* Hbst. 3. Juni 1886 1 Exemplar bei Reinbek geklopft (W.).
- Hylesinus crenatus* F. im Wandsbeker Gehölz gefunden (W.).
- Ergates faber* L. 1885 und 1886, als ich in Ebstorf bei Uelzen sammelte, zusammen 5 Stück gefangen (N.).
- Leptura 6 guttata* Sch. 2 Exemplare dieser seltenen Art fing ich am 22. Juni 1890 auf einer Waldwiese bei Reinbek auf *Cardamine pratensis* (W.).
- Obrium brunneum* F. bei Reinbek auf Kiefern (N. u. W.).
- Crioccephalus epibata* Sch. In der Stadt und Umgegend einzeln, doch nicht selten; scheint irrtümlich früher für *C. rusticus* gehalten zu sein; der letztere ist mir nicht aus hiesiger Gegend bekannt (W.).
- Pogonochaerus bidentatus* Thoms. 1 Exemplar bei Bergedorf auf blühendem Weissdorn (W.).
- Pogonochaerus fasciculatus* Deg. kommt in der nächsten Umgebung der Stadt vor (W.).
- Pogonochaerus ovatus* Goeze kommt ebenfalls in der nächsten Umgebung vor, ist aber seltener (W.).
- Saperda scalaris* L. 1 Exemplar Neuburg (W.).
- Oberca oculata* L. im Sachsenwald und bei Geesthacht auf Weidengebüsch, manchmal nicht gerade selten (W.).
- Donacia crassipes* F. Johns Park im Juni und Juli nicht selten; bei Sonnenschein auf den Blättern der Teichrosen, lebhaft fliegend (N. u. W.).
- Donacia sparganii* Ahr. Alster auf Wasserpflanzen, zuweilen häufig (W. u. N.).

- Lema cyanella* L. (*puncticollis* Curt) kommt auf feuchten Waldwiesen im Sachsenwald vor, manchmal in Anzahl; am 16. August 1890 erbeutete ich 1 Exemplar in Winterhude (W.).
- Gynandrophthalma aurita* L. 1 Exemplar bei Bergedorf geschöpft (W.).
- Cryptocephalus coryli* L. 1 Exemplar bei Friedrichsruh geklopft (W.).
- Cryptocephalus punctiger* Payk. 1 Exemplar bei Bergedorf geklopft (W.).
- Chrysomela oricalcia* Müll. Hohenfelde auf Nessel in einem Jahre häufig, dann nicht wieder (W.).
- Chrysomela hyperici* var. *4 gemina* Suffr. Uhlenhorst. Bergedorf auf *Hypericum* und in der Stadt ca. 12 Stück (W.).
- Lina collaris* L. Winterhuder Moor nicht selten, auch Boberg (N. u. W.).
- Phyllobrotica 4 maculata* L. auf dem Mühlenkamp in einem Sommer in grösserer Anzahl, sonst einzeln (W. u. N.).
- Psylliodes anglica* F., im Spätherbst an der Alster mit *Ps. chrysoceph.* zusammen, an Häusern, aber nur sehr einzeln (W.).
- Hippodamia 7 maculata*. Winterhude sehr selten (W.).
- Coccinella* var. *magnifica* Redt. Juni 1885 1 Exemplar bei Bergedorf geklopft (W.).
- Harmonia 4 punctata* Pont. bei Bergedorf 1 Exemplar von Kiefern geklopft (W.).
- Hyperaspis campestris* Hbst., im Sachsenwald mehrfach auf blühendem Weissdorn gefunden (W.).
- Novius cruentatus* Muls., 4. Sept. 1882 1 Exemplar in Hamm an einer Gartenmauer (W.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Wimmel Th., Niemeyer R.

Artikel/Article: [Beitrag zur Fauna der Niederelbgegend. Neue und seltene Käfer. 4-14](#)