

## Über mit Drogen eingeführte Käfer.

Von Th. Wimmel.

Folgende, der europäischen Fauna angehörige Käfer fand ich im Laufe einiger Jahre in verschiedenen Drogengeschäften vor. Dieselben waren meistens mit Waren eingeschleppt und hatten sich teilweise vollständig eingebürgert.

*Mycetaea hirta* Marsh, selten.

*Cryptophagus acutangulus*, *subfumatus* etc. h.

*Lathridius*, *Corticaria*, diverse Arten s. h.

*Carpophilus hemipterus* L. in Südfrüchten h.

*Tenebrioides mauritanicus* L. h.

*Ostoma Jvani* Allit. in Orangenschalen s.

*Pediacus depressus* Hbst. selten.

*Laemophloeus ferrugineus* St. selten.

*Silvanus surinamensis* L. in trockenen Orangenschalen.

*Dermestes vulpinus* F. }

*Frischi* Kugel. }

*undulatus* Br. }

*lardarius* L. }

*atomarius* Fr. }

in den Fell-Umhüllungen (Sero-  
nen) der *Sassaparil*-Wurzel.

*Attagenus piceus* Ol. }

*pellio* L. }

*Anthrenus museorum* L. }

*verbasci* L. }

sehr häufig.

*Megapenthes tibialis* Lac. ziemlich selten.

- Tillus elongatus L. sehr selten.  
Opilo mollis L. domesticus St. selten.  
Cleroides formicarius L.  
Corynetes coeruleus Deg.  
Necrobia ruficollis F., violacea L., rufipes Deg.  
Niptus hololeucus Fald. zieml. häufig.  
Bruchus variegatus Rossi, brunneus Duft. für L. raptor St.  
in leeren Seronen.  
Anobium pertinax L., domesticum Foure. paniceum L.  
Xestobium rufovillosum Deg. }  
Ernobius mollis L. häufig. } in altem Holz.  
Trypopytis carpini s. selten. }  
Lyctus unipunctatus Hbst. s. }  
Bostrychus capucinus L. s. }  
Rhizopertha pusilla F. } mit Reissäcken eingeführt.  
                  bifoveolata W<sup>o</sup>ell. }  
Blaps mucronata Latr. stellenweise häufig.  
Tribolium ferrugineum, confusum Duv. (mit getrockneten  
Orangenschalen).  
Tenebrio molitor L. obscurus F. letztere Art häufiger wie  
erstere.  
Allecula morio in altem Holz eingnistet.  
Calandra granaria L. oryzae L. mit Reissäcken einge-  
führt.  
Phloeophagus spadix Hbst selten.  
Mylabris. Diverse Arten, darunter auch M. mimosae früher  
irrtümlich für Bruchus acaciae gehalten aus den Schoten  
der Röhrenkassie (Cassia fistula), welche aber kein Hei-  
matrecht beanspruchen können, weil nach kurzer Zeit zu  
Grunde gehend.  
Gracilia minuta F. in Tonnenreifen, sehr häufig.  
Criocephalus epibata Sch.  
Callidium variabile L. in allen Varietäten, stellenweise  
häufig.  
                  „ violaceum L.  
Hylotrupes bajulus L.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Wimmel Th.

Artikel/Article: [Über mit Drogen eingeführte Käfer. 15-16](#)