

Coleophora Badiipennella Dup. Juni, Juli Ulmenalleen
der Vororte.

Tischeria Marginea Hw. Mai, Reinbek; Raupe im October
in Brombeerblättern.

„ *Angusticollella* Z. Mai, Reinbek, Niendorf;
Raupe im October in Rosenblättern.

Pterophorina.

Amblyptilia Acanthodactyla Hb. Juni, Höpen.

Oxyptilus Didactylus L. Ende Juni. Höpen.

Zu meiner Angabe über die *Myeloides Epelydella*- und *Suavella*-
Raupen (im VI. Bande dieser Verhandlungen, Seite 42 u. 43.)
füge ich folgende

Ergänzung und Berichtigung

an.

Im heissen Mai und Juni 1889 fand die Entwicklung
einige Wochen früher statt, doch gelten für normale Jahre
die angegebenen Zeiten. Betreffs der Aehnlichkeit der Raupen
sind folgende Unterschiede nachzutragen: *Epelydella* Kopf klein
und braun, Nackenschild schwarz; *Suavella* Kopf und Nacken-
schild schwarz, grösser als bei *Epelydella*. Der Körper von
Epelydella gleichmässig, bei *Suavella* verengt sich derselbe
allmählig und ist dunkler schwarzbraun als bei *Epelydella*.
Bei *Epelydella* sind die Bauchfüsse heller als der Körper,
bei *Suavella* haben sie die Farbe des Körpers. Beide Arten
sind wenig und kurz behaart.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Ergänzung und Berichtigung 32](#)