Beiträge

zur Fauna und Flora der Niederelb-Gegend.

Neue und seltene Käfer der Hamburger Gegend.

Mitgeteilt von Dr. R. Timm und Th. Wimmel.

- Cicindela sylvatica* L. Je ein Stück in Hohenfelde und Harvestehude, sonst nur von Harburg bekannt. *W.*
- Chaetocarabus intricatus* L., der wohl meist am linken Elbufer gesammelt wird, kommt auch diesseits vor. Ich besitze ein Stück, das mein Vater von Reinbek mitbrachte. *T.*
- Bembidium octomaculatum* Goeze (Sturmi Pz.). Geesthacht, 30.5 89, wenige Stücke. *T.*
- *humerale* Sturm. Schulau, 25.5 77. 1 Ex. *T.*
- Trechus rubens* F. Unterhalb Blankenese, 10.4 76. *T.*
- Panagaeus bipustulatus* F. (4 *pustulatus* Sturm). Vor Jahren am Wege nach Schulau (nicht Strand) ein Stück. *T.*
- Harpalus aeneus* var. *semipunctatus* Dej. Winterhude Mai 90, 1 Stück. *W.*
- *serripes* Quens. Winsberg (hinter der Altonaer Exercierweide), 30.5 78, 1 Stück. *T.*
- Bradycellus Deutschi* Sahlb. Schulau, 24.5 77, 1 Stück. *T.*; Neubertstr. (Hohenfelde), Mai 93, 1 Stück. *W.*
- Stenolophus Skrimshiranus* Steph. Kuhwälder VII 87 in Menge (Dömling).
- Stenolophus* (*Anthracus*) *Wimmeli* Reitter, n. sp. Winterhude IV 90, 1 Stück. *W.*
- Amara tricuspidata* Dej. Winsberg VI 81. *T.*
- *montivaga* Sturm. Winsberg IV 81. *T.*

Pterostichus angustatus Duft. Unter Fangkloben (zum Fange der Hylobien vom Förster ausgelegten, halbberindeten Holzkloben, Rinde nach unten) in der Nähe des Mühlen- dammes bei Ahrensburg, 6.6 76, 12 Stück. *T.*

Platynus longiventris Mhm. Ende der siebziger Jahre bei Tesperhude (Warburg), Geesthacht, 30.5 89. *T.*

Agonum ericeti Panz. Elbstrand vor Teufelsbrücke IV 85, 1 Stück. *T.*

Hygrobia Latr. (*Pelobius* Schk.) *tarda* Hbst. (Hermannii auct.) einmal in den achtziger Jahren in der Alster. (v. Döhren)

Agabus affinis Payk. Uhlenhorst, 1 Stück *W.*

— *biocellatus* Müll. (*didymus* Ol.). Vor Jahren in dem quelligen Seitengraben (jetzt verschwunden) der Isebekstr. (Ottensen). *T.*; XI 85 in der Kollau (v. Döhren u. Dömling)

Dytiscus latissimus L. wurde vor einigen Jahren von Herrn von Döhren und Beamten des naturh. Museums in etwa 20 Ex. im Borsteler Moor gefischt; später sahen wir beide daselbst ein Pärchen dieser Tiere.

Helophorus pumilio Er. Winterhude, 2 Stück. *W.*

— *nanus* St. bei Neumühlen, 1 Stück. *W.*

Aleochara inconspicua Aub. Winterhude VIII 91, 2 St. *W.*

Atemeles paradoxus Grav. Friedrichsruh 29.3 77, 1 Stück, Elbstrand vor Teufelsbrücke 14.4 78. *T.*

Myrmedonia humeralis Grav. Elbstr. wie vor. 17.7 77. *T.*

— *collaris* Payk. Hinter Steinbek; ferner Friedrichsruh 29.3 77, Osdorf (hinter Kl. Flottbek), Rosengarten (Harburg) 29.3 78. In Moos 22.3 78. *T.*

Ilyobates nigricollis Payk. Elbstr. vor Teufelsbr. I 76 1 Ex. *T.*

— *forticornis* Lac. Winterhude V 1891, 2 Stück. *W.*

Chilopora rubicunda Er. Haacke 29.9 77, in Pilzen. *T.*

Oxypoda flava Kr. In Winterhude im Spätsommer mehrfach. *W.*

Pronomaea rostrata Er. Haacke, 29.9 77, 1 Stück. *T.*

Habrocerus capillaricornis Grav. Haacke, 22.5 87, 1 Ex. *T.*

Tachinus elongatus Gyllh. Ebenda 5.5 78, 1 Stück. *T.*

Barmbek V 93, 1 Stück. *W.*

Megacronus cingulatus Mannh. Klövensteen (bei Pinneberg), 4.3 78, unter Moos, 1 Stück. *T.*

- Emus hirtus* L. Schulhof des Johanneums, 3.9 77 (Schüler des Johanneums), auch sonst in der Stadt beobachtet.
- Staphylinus chalconecephalus* F. (nicht *latebricola*). Falkenberg (Hausbruch), 22.5 87 unter Laub, 1 Stück. *T.*
- *brunnipes* F. Niendorfer Holz, 4.7 75, an einem gefällten Stamme mehrere Ex., Winsberg, 6.9 80, in einer Sandgrube. *T.*
- Philonthus intermedius* Lac. Haacke, in der Nähe der Waldschenke, in Moos; Bahrenfelder Tannen 29.5 77, 28.9 80 *T.*
- *lucens* Fr. scheint nicht auf den Wald beschränkt zu sein. Mehrere Stücke wurden in Barmbek, Uhlenhorst, Winterhude und auf Steinwälder gefunden. *W.*
- *rubripennis* Kiesw. Elbstrand vor Schulau, 24.5 77. *T.*
- *pullus* Nordm. Friedrichsruh, 29.3 77. *T.*
- *albipes* Grav. Barmbek und Uhlenhorst. *W.*; Elbstrand vor Teufelsbrücke, 12.6 78; Kl.-Borstel, 14.6 78. *T.*
- *tennis* F. Bei Bergedorf und Geesthacht mehrere Stück. *W.*
- Actobius procerulus* Grav. Elbstr. vor Teufelsbrücke, 12.8 76. *T.*
- Xantholinus fulgidus* T. Elbstr. vor Teufelsbrücke, 6.6 75. *T.*
- *lentus* Er. Bahrenfeld, Frühjahr 93, ein Stück unter Moos. *W.*
- Medon* (*Lithocharis*) *melanocephalus* F. Elbstrand vor Teufelsbrücke, 1.4 77. *T.*
- Scopaeus laevigatus* Gyllh. Ebenda, 1.9 78. *T.*
- Sunius immaculatus* St. Ein Stück bei Hamburg. *W.*
- *pulchellus* Heer. Winterhude X 85, unter faulenden Pflanzenstoffen, alten Matten u. dergl. i. grösserer Zahl. *W.*
- Dianous coerulescens* Gyllh. Auf Moos (*Eurhynchium rusciforme*) an der eingefassten Quelle im Quellenthal (Flottbek) 3.7 77, 31.3 79, je ein Stück. *T.*
- Stenus guttula* Müll. Dicht vor Schulau auf Mergel, 92 wenige Ex. *T.*
- Oxyporus maxillosus* F. Im kleinen Ochsenbek (Friedrichsruh) in Buchenpilzen (*Pholiota adiposa*) 29.9 74, 3 Ex. *T.*
- Trogophloeus arcuatus* Steph. Elbstrand vor Teufelsbrücke, 11.8 und 24.6 75, 24.4 und 24.8 75. *T.*
- Deleaster dichrous* Grav. 18.7 78.

- Homalium iopterum* St. Ochsenwälder, mehrere Ex. *W.*
- Phloeocharis subtilissima* Mannh. war eine Zeit lang mit ziemlicher Sicherheit unter der Rinde zweier abgestorbener Kiefern am Fusse des jähren Abhanges der Bahrenfelder Tannen zu finden, z. B. 1.7 77, 5.5 78. *T.*
- Euplectus intermedius* Woll. Escheburg V 87, 1 Stück, unter Baumrinde. *W.*
- Choleva intermedia* Kr. Bergedorf, Hamm. je ein Stück. *W.*
- (*Nargus*) *velox* Sp. Hohenfelde, 1 Stück. *W.*
- — *badia* St. Ebenda, *W.*
- Ptomaphagus nitidicollis* Kr. Bahrenfeld IV 86, mehrere Ex., unter Moos. *W.*
- *longulus* Kelln. Bei Hamburg, 1 Stück. *W.*
- *alpinus* Gyllh. Schröders Park (Hohlweg hinter Övelgönne), 19.3 76, in Moos. *T.*
- *sericeus* var. *sericatus* Chaud. Winterhude VIII 91, mehrere Ex. *W.*
- *anisotomoides* Spence. Borsteler Moor 21.6 85, 1 St. *T.*
- Colon fuscicorne* Kr. Ebenso.
- *dentipes* Sahlb. Falkenberg (Hausbruch) 21.5 85. *T.*
- Necrophorus sepultor* Charp. Einmal am Borgweg (Winterhuder Plateau). *T.*
- Liodes* (*Anisotoma*) *oblonga* Er. Geesthacht IX 89, 1 St. *W.*
- — *brunnea* St. Ebenda VIII 90, 1 St. *W.*
- Anisotoma* (*Liodes*) *glabra* Kug. Bahrenfelder Tannen 30.5 87. *T.*
- Calyptomerus dubius* Marsh. Ochsenwälder, im Keller eines Hauses in grosser Zahl. *W.*
- Scaphidium quadrimaculatum* Ol. Hausbruch, 1.6 87, 1 Stück in *Polyporus versicolor*. *T.*
- Cryptophagus populi* Payk. (*grandis* Kr.). Ochsenwälder, 25.8 91, 1 Stück. Ist über ganz Europa verbreitet, aber überall sehr selten. *W.*
- *hirtulus* Kr. Reinbek, 2 Stück in Pilzen. *W.*
- Atomaria ruficornis* Marsh. Winterhude, 1 Stück. *W.*
- Lathridius Bergrothi* Reitt. Im Keller eines Hauses in Ochsenwälder sowie in Hohenfelde (Neubertstr.) seit einigen

Jahren in grösserer Anzahl ges. Der im vorigen Hefte dieser Verhandlungen L. alternans genannte Käfer ist nicht dieser, sondern L. Bergrothi, das über ihn Gesagte also auf letzteren zu beziehen. Die 3 ersten Stücke L. Bergrothi fand ich vor Jahren in einem Hause der Catharinenstrasse, also dürfte der Käfer, der früher nur von St. Petersburg bekannt war, vor 3 Jahren auch in Dresden aufgespürt wurde, schon seit längerer Zeit in Hamburg und zwar ziemlich verbreitet vorkommen. *W.*

Coninomus nodifer Westw. ebenfalls ziemlich verbreitet in und um Hamburg in Häusern und unter faulenden Pflanzenstoffen. *W.*

Corticaria impressa Ol. Hammerdeich, im Frühjahr unter Schilf. *W.*

— *serrata* Payk. Mehrfach in Häusern auf Hohenfelde. *W.*

Cercus bipustulatus Payk., bisher nur aus dem nördlichen und südlichen, nicht aus dem mittleren Europa bekannt, fand ich Anfang V 91 in Ochsenwärder in 70 ausgefärbten Ex. Mitte VI 91 war der Käfer daselbst auf *Spiraea Ulmaria* massenhaft anzutreffen, jedoch nur in hellen, unausgefärbten Stücken. Von einer grösseren Anzahl mitgenommener Käfer verfärbten sich die meisten im Laufe von 6—8 Wochen. Die dann noch hell gebliebenen Stücke stellen die

— var. *ochraceus* Murr. dar. Im Freien fand sich der Käfer bereits Mitte Juli nicht mehr, obgleich die Futterpflanze noch in voller Blüte stand. *W.*

Meligethes memnonius Er. Neumühlen VI 86. *W.*

Cryptarcha strigata F. Friedrichsruh 2. 10. 81, unter Moos 1 Stück. *T.*

Pediacus depressus Hbst. Vor Jahren bei Wittenbergen (zwischen Blankenese und Schulau) in einem alten (jetzt abgebrochenen) Helgen 3 Stück. *T.*

Cathartus advena Waltl. Mehrfach mit Orangenschalen eingeführt. *W.*

Monotoma sub-quadri-foveolata Wterh. Einmal in der Stadt gefangen. *W.*

Dermestes lanarius Illig. Tesperhude (Geesthacht) 22. 5. 75.

Paromalus parallelipedus Hbst. Eine Zeitlang ziemlich regelmässig unter Rinde in den Bahrenfelder Tannen (zusammen mit *Pytho depressus*) zum Beispiel 20. 5. und 1. 7. 77. *T.*

Hetaerius ferrugineus Ol. (*sesqui cornis* Preysl.) Klövensteen 4. 3. 78 1 Ex. unter einem Stein. *T.* Haacke vor Hausbruch 22. 5. 87 ziemlich viele Exemplare unter Ameisen (Itzerodt).

Dendrophilus pygmaeus L. Hamm, 1 Stück. *W.*

Saprinus viresceus Payk. Winterhude V 90 2 Stück. *W.*

Plegaderus vulneratus Panz. Wie *Paromalus*: 10. 5., 1. 7. und 15. 7. 77, ausserdem: Haacke 17. 5. 87. *T.*

Onthophilus striatus Fort. Vor Jahren bei der Buschkoppel (vor Geesthacht) 1 Stück. *T.*

Trox scaber L. Früher an der Elb-Chaussée an Gartenmauern, Flottbek. Park 28. 3. 76, Harburg (Buxtehude. Chaussée) 1. 6. 87 unter Kastanienrinde. *T.* Hohenfelde VIII 93 1 Stück. *W.*

Hoplia philanthus Füssl. Helkendieck bei Grande 17. 7. 87 1 Stück geklopft. *T.*

Serica holosericea Scop. Hinter Steinbek 1. 4. 76 unter Steinen 3 Stück. *T.*

Eucnemis capucina Ahr. Vor Jahren bei Friedrichsruh (Warburg) 1 Stück Hamm, 1 Stück. *W.*

Agrilus coeruleus Rossi. Reinbek 19. 6. 86 1 Stück. *T.*

Cardiophorus gramineus Scop. Geesthacht 10. 5. 91 1 St. geschöpft. *W.*

Corymbites bipustulatus var. *rubidus* Wimmel. Käfer ganz rotgelb, Kopf, Unterseite und Fühler etwas dunkler. Diese interessante, bisher noch nicht beschriebene Varietät fand sich am Elbestrand vor Teufelsbrücke 9. 4. unter Baumrinde. *W.*

Scirtes orbicularis Panz. kommt auch in Ochsenwärder vor. *W.*

Phosphaenus hemipterus Geoffr. Reinbek 3. 7. 91 auf einer Waldwiese 1 Stück. *W.*

- Cantharis paludosa* Fall. Auf Waldwiesen bei Reinbek im Mai, stellenweise häufig. Diese Art ist bisher wahrscheinlich mit *Rhagonycha elongata* Fall verwechselt, die ich hier nie gefunden habe. *W.*
- Drilus concolor* Ahr. Elbstrand vor Teufelsbrücke. 29. 6. 84 1 Stück gekätschert. *T.*
- Cis villosulus* Marsh. (setiger Mell.) Sachsenwald. *W.*
— *striatulus* Mell. Ebenso.
- Platydema dytiscoides* Rossi (*violaceum* F.) Kl. Ochsenbek (Friedrichsruh) 29. 3. 77 1 Stück in Baummulm. *T.*
- Alphitobius mauritanicus* F. (*piceus* Ol.) Elbstrand unterhalb Övelgönne 27. 2. 76 unter dem Angeschwemmten 1 Stück. Wohl sicher eingeschleppt. *T.*
- Pseudocistela* (*Cistela*) *Luperus* Hbst. (*fulvipes* F.) Am Schlump an einer Gartenmauer 4. 7. 75 1 Stück. *T.*
- Tetratoma fungorum* F. Friedrichsruh 2. 10. 81 in hoch sitzender *Pholiota adiposa*, ziemlich zahlreich (Koltze).
- Anthicus antherinus* L. Elbstrand vor Teufelsbrücke 29. 6. 84 1 Stück geklopft. *T.*
— *sellatus* Panz. Ebenda. 28. 7. 75 1 Stück unter dem Angeschwemmten. *T.*
- Mordellistena episternalis* Muls. Sachsenwald 10. 6. 86 1 Stück, war bisher nur aus dem südlichen Europa, bis Oesterreich und Thüringen bekannt. *W.*
- Anaspis Geoffroyi* Müll. (*humeralis* F.). Vor Jahren an der Elb-Chaussée. *T.*
- Anaspis Geoffroyi* var. *quadrinaculata* Costa. Vor Poppenbüttel 14. 6. 76 1 Stück an der Alster geklopft. *T.*
- Nacerdes melanura* L., in den 70er Jahren besonders am Elbstrand von Altona an abwärts häufig, scheint selten geworden zu sein. *T.*
- Ischnomera coerulea* L. Vor Jahren in Eimsbüttel ein Stück gekätschert. Falkenberg (Hausbruch) 15. 5. 78 1 St. *T.*
- Pytho depressus* L. Schon vor Jahren in den Bahrenfelder Tannen beobachtet (vergl. *Paromalus*) wurde im Frühjahr 93 daselbst in grösserer Anzahl gefunden. *W.*

- Otiorrhynchus scabrosus Marsh. Hohenfelde (Neubertstrasse)
Spätsommer 93 unter abgefallenem Laube 23 Stück. *W.*
- Phyllobius mixtus Hochh. Reinbek 23. 5. 86 1 Stück,
bisher nur aus dem Kaukasus und den Schweizer Alpen
bekannt. *W.*
- sinuatus F. Nahe der Elbe auf den Besenhorster Wiesen
(vor Geesthacht) 18. 7. 87 mehrere Stücke von Büschen
geklopft. Das Tier gehört eigentlich dem Süden an. *T.*
- Sitona languidus Gyllh. Winterhude und Ochsenwärder. *W.*
- lateralis Gyllh. Ochsenwärder und Reinbek VI und
VII mehrfach. Die eigentliche Heimat dieser und der
vorigen Art ist das südliche Europa bis Schlesien. *W.*
- puncticollis Steph. Barmbek VIII 93 2 Stück. *W.*
- Trachodes hispidus L. Haacke (in der Nähe des Reiherberges)
7. 6. 85. auf einem Buchenstumpfe 1 Stück. *T.*
- Pissodes piniphilus Hbst. Vor Jahren beim „Borsteler Jäger“,
Westseite des Gehölzes, an gefälltten Kiefern. 3 St. *T.*
- Dorytomus macropus Redt. Vor Jahren am Rande der Eppen-
dorfer Gemeinweide 1 Stück unter Rinde. *T.*
- tremulae Payk. Bergedorf. *W.*
- Schönherri. Winterhude. *W.*
- salicinus Gyllh. Alsterdorf. *W.*
- punctator Hbst. Uhlenhorst. *W.* Diese 4 Arten
je in mehreren Stücken.
- dorsalis L. Borsteler Moor 22. 5. 77, 9. 6. 78. *T.*
- Dicranthus elegans F. Kuhwärder 26. 4. 86 in einer sandigen
Vertiefung am Wege nach Neuhof 1 Stück. *T.*
- Magdalis phlegmatica Hbst. Haake (Nähe des Reiherberges)
22. 7. 77 1 Stück. *T.*
- linearis Gyllh. Geesthacht 15. 5. 87. *T.*
- frontalis Gyllh. Bahrenfeld, Borstel, Reinbek,
im Juni auf Kiefern. *W.*
- Balaninus villosus F. 10. 6. 91 an der Elb-Chaussée 1 St. *W.*
- Anthonomus cinctus Redt. Vor Jahren am Mittelweg in Pösel-
dorf mehrere Stücke (Warburg).
- Acalyptus carpini Hbst. Geesthacht 15. 5. 87. *T.*
- alpinus Villa (rufipennis Gyllh.) Lauenburg 20. 5. 75,
Geesthacht 4. 8. 77 und 15. 5. 87. *T.*

- Miarus plantarum* Grm. Sachsenwald. W.
- Orchestes rufus* Ol. Blankenese, Elbstrand vor Teufelsbrücke
IV 76 je 1 Stück. T. Neumühlen 10. 5. 91 1 Stück. W.
- *alni* L. Vor Jahren eben vor Steinbek an der
Chaussée von Büschen geklopft; Blankenese 4. 6. 76 von
Büschen geklopft. T.
- *rufitarsis* Germ. Blankenese 4. 6. 76. T. Kommt
auch bei Barmbek vor. W.
- Rhytidosomus globulus* Hbst. Westseite des Borsteler Ge-
hölzes 25. 5. 75 3 Stück geklopft. T
- *dentipes* Reitt. Reinbek 3. 7. 91. W. Bisher
war nur das eine vom Autor in Kärnthen entdeckte
Exemplar bekannt.
- Phytobius velaris* Gyllh. Geesthacht, 30.5 86. 1 St. T.
- Ceutorrhynchidius pyrhorhynchus* Marsh. In Winterhude
auf *Sisymbrium officinale* im Spätsommer häufig. W.
- *constrictus* Marsh. Eppendorf Mühlenteich, VI. 86. 1 St. W.
- *raphani* F. In Ochsenwärder mehrfach. W.
- *abbreviatulus* F. Ochsenwärder. W.
- *scapularis* Gyllh. Reinbek, V. 1885. W.
- Coryssomerus capucinus* Beck Bahrenfelder Tannen 20.5 77. T.
- Baris chlorizans* Germ. Vor Jahren in einer der (jetzt ver-
schwundenen) Lehmgruben beim Hellbrook (hinter Barm-
bek) 1 St. (Warburg.)
- *Lepidii* Germ. Geesthacht. T.
- Cossonus linearis* F. (nicht *parallelopipedus* Hbst. = *ferrugi-
neus* Clairv., vgl. Schilsky, Käfer Deutschlands, p. 117).
An der Mauer am Eingang zu Schröder's Park (Elb-
chaussée). 24.6 75. 1 St. T.
- Apion basicorne* Ill. Bei Hamburg. W.
- *simile* Kirby. Sachsenwald. W.
- *affine* Kirby. Winterhude, XI. 87. 2 St. unter Moos. W.
- Rhynchites megacephalus* Germ. Vor etwa 20 Jahren bei
Meckelfeld (Harburg) geklopft, Blankenese VII. 85. T.
Sommer 92 im Eppendorfer Moor in grosser Zahl von
Weiden geklopft. W.
- Mylabris (Bruchus) atomaria* L. Bei Barmbek und Berge-
dorf von blühendem Weissdorn geklopft. W.

Callidium variabile L. Auf Weissbuchenholz, das in einem Fabrikgebäude der Uhlenhorst lagerte, alljährlich in grosser Anzahl, und zwar mit folgenden Varietäten:

- var. *fennicum* L., sehr häufig,
- „ *testaceum* L., häufig,
- „ *praeustum* F., nur 1 Stück,
- „ *Sellae* Kr., sehr selten,
- „ *similare* Küst., häufig,
- „ *anale* Redt., ziemlich selten (bisher nur aus Oesterreich bekannt).

Die Varietäten waren durch alle möglichen Formen mit einander und mit der Hauptart verbunden. W.

Pogonochaerus scutellaris Muls. (*multipunctatus* G.) Berge-dorf, V. 87, V, VII. 90 je ein Stück geklopft. W.

Cryptocephalus punctiger Payk. Bei Reinbek alljährlich von Weiden geklopft. W.

— *coerulescens* Sahlb. Bei Reinbek mehrfach. W.

— *10-maculatus* var. *bothnicus* L. Reinbek, 3.7 92.

— *ochroleucus* Fairm. Besenhorster Wiesen, 18.7 87 mit *Phyllobius sinuatus*. T. Nördlichster Fundort bisher Nassau.

Phytodecta (*Gonioctena*) *pallida* L. Am Ende des Pracherstieges, nahe der Försterei Hausbruch, mehrere Jahre lang regelmässig ziemlich häufig auf Vogelbeerbüschen (*Sorbus aucuparia*), mehr oder weniger stark gefleckt, sowie auch ungefleckt, z. B. 22.7 77. T.

Prasocuris junci Brahm (*beccabungae* Ill.). Jungfernborn (nahe der Waldschenke, vor Hausbruch) 15.5 78 2 St. gekätschert. T.

Luperus saxonicus Gmel. In Ochsenwälder auf Weiden im Sommer in grösserer Anzahl gefunden; bisher wahrscheinlich für *L. xanthopoda* Schr. (*rufipes* Duft.) gehalten, den ich nur aus dem Süden kenne. W.

Galeruca (*Adimonia*) *interrupta* Ol. Boberg, 4.10 77 mehrere Exemplare. T.

— *laticollis* Sahlb. Auf einer Waldwiese bei Reinbek VII. 91 2 Stück. W.

Psylliodes cuprea Koch. Im Spätsommer in Winterhude auf *Sisymbrium officinale* alljährlich in Mehrzahl. *W.*

— *cupreata* Duft. Hamm und Winterhude, Herbst. *W.*

— *chalconera* Ill. Winterhude 1 St. *W.*

Haltica Lythri Aub. V. 91 1 St. in Hamm. Der Käfer soll bei Geesthacht vorkommen, wo ich ihn jedoch nie gefunden habe, so dass ich glaube, es liegt eine Verwechslung mit der folgenden Art vor. *W.*

— *tamaricis* Schrnk. (*hippohaës* Auct.). Bei Geesthacht auf Weiden sehr häufig. *W.*; z. B. 20.7 75, 8.8 86. *T.*

— *palustris* Weise. Ochsenwälder, Sachsenwald, Winterhude; im Sommer mehrfach gefunden. *W.*

Aphthona pygmaea Kutsch. Winterhude, Sachsenwald. *W.*

Longitarsus quadriguttatus Pont. Hohenfelde und Winterhude einzeln. *W.*

— *suturellus* Duft. Am Hammer Deich im Frühjahr unter Schilf. *W.*

Apteropeda orbiculata Marsh. (*ciliata* Ol.) Vor etwa 20 Jahren in dem (jetzt unzugänglichen) Hinschenfelder Holz auf *Mercurialis perennis*. *T.*

Hippodamia septemmaculata Deg. Eppendorfer Moor IX. 85. *T.*
(vgl. den Bericht von 1891, p. 14.)

Adalia bipunctata L. var. *concolor* Wimmel. (Der schwarze Fleck auf jeder Flügeldecke völlig verschwunden, letztere einfarbig gelbrot.) 2 Stück dieser noch nicht beschriebenen Varietät in Hohenfelde. *W.*

Coccinella quinquepunctata L. var. *similatrix* Weise. (Flügeldecken mit 7 Punkten.) Hohenfelde 1 St. *W.*

Angegebene Beobachter:

† v. Döhren, weiland Rentner in Hamburg.

Dömling, }
Itzerodt, } Beamte des naturhist. Museums.

Koltze, Kaufmann, seit langen Jahren bekannter
Hamburger Entomolog.

Warburg, Dr. phil., Privatdozent in Berlin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Timm Rudolf, Wimmel Th.

Artikel/Article: [Beiträge zur Fauna und Flora der Niederelb-Gegend: Neue und seltene Käfer der Hamburger Gegend 1-11](#)