Neue und seltene Käfer der Hamburger Gegend.

I.

Mitgeteilt von **Th. Wimmel.**

Anmerkung: Arten, welche nach dem bisher Veröffentlichten als neu für die hiesige Fauna gelten können, sind durch gesperrten Druck gekennzeichnet.

Cicindela campestris var. coerulescens Schilsky. Diese seltene Varietät wurde von Herrn H. Schulz bei Niendorf gef.

Bembidion 8 maculatum Goeze. Nach ungewöhnlich hohem Wasserstand im Frühjahr 1895 fand sich 1 Exemplar auf Kuhwärder unter angeschwemmtem Schilf. Vermuthlich ist das Stück von Geesthacht — woselbst der Käfer in hiesiger Gegend bisher allein beobachtet wurde — mit Schilf herabgetrieben. Das Vorkommen der weiter unten erwähnten Phil. tenuis, var. rubidus und Otiorrh. laevigatus an demselben Orte lässt sich wohl auf die gleiche Ursache zurückführen.

Tachys bisulcatus Nicol. den 21. 4. 95 1 Stück bei Geesthacht unter Schilf gefunden.

Amara curta Dej. Haacke 1 Stück 20. 5. 95.

„ convexior Steph. Bahrenfeld, Haacke, Geesthacht mit A. communis zusammen und wohl häufig mit dieser verwechselt. Herr H. Gebien fand diese Art in Mehrzahl im August 95 in Gross-Hansdorf.

„ famelia Zimm. Uhlenhorst, Hohenfelde, Harburg in den letzten Jahren 5 Stück gefunden.

Harpalus autumnalis Dft. Geesthacht IV. 95.
Panagaeus bipustulatus F. Kuhwärder, Geesthacht IV. 95 mehrfach unter Schilf gefunden.
Brachynus crepitans L. IV. 94 auf Kuhwärder von Herrn H. Schulz 1 Stück.
Hydrobius fuscipes var Rottenbergi Gerh. Kuhwärder, Hohenfelde und Bramfelder See einzeln gefunden.
Georyssus crenulatus Rossi. Kuhwärder, Geesthacht IV. 95.
Trichophya pilicornis Gyllh. ist auf Kuhwärder unter Schilf im Frühjahr einzeln anzutreffen.
Quedius scitus Grav. Billwärder 5. 6. 95.
„ tristis Grav. Uhlenhorst X. 95 2 Stück.
„ picipes Mannerh. Bergedorf 25. 9. 95 1 Stück.
Philonthus quisquiliarius var. rubidus Er. Kuhwärder unter Schilf 1 Stück IV. 95.
Philonthus tenuis F. Desgleichen 4 Stücke.
Deleaster dichrous Grav. Desgleichen 1 Stück.
Lathrobium pallidum Nordm. Hohenfelde 25. 5. 93, Kuhwärder 15. 4. 95 je 1 Stück.
Medon castaneus Grav. Bergedorf unter Steinen 25. 9. 95.
Bledius longulus Er. Bergedorf i. Sandgr. 1 St. 13. 5. 95.
„ erraticus Er. Geesthacht 21. 4. 95.
Anthophagus caraboides L. Eppendorfer Mühlenteich 1. 6. 95.
Acidota crenata F. ist im Frühjahr und Spätherbst in der nächsten Umgebung, an Häusern und Gartenmauern kriechend, anzutreffen.
„ cruentata Mannh. im Spätherbst 1894 und 95 auf der Uhlenhorst an Gartenmauern 6 Exemplare gefunden.
Cryptophagus (Micrambe) abietis Payk. Friedrichsruh unter Kiefernrinde 1 Stück 31. 5. 95.
Lathridius rugicollis Ol. am 7. 6. 95 1 Stück i. d. Haacke am Gasthaus „Zur majestätischen Aussicht“ kriechend gefunden.
„ Bergrothi Reitter hat sich jetzt auch in einem Hause Harvestehude (Hansastrasse) zahlreich angefunden.
Hadrotoma nigripes F. Bergedorf von Weissdorn 1 Stück geklopft 12. 6. 95.
Systenocerus caraboides v. ♀ rufipes Haacke 20. 5. 95.

Oniticellus fulvus Goeze. 1 Stück dieser für hiesige Fauna seltenen Art erbeutete Herr H. Schulz IV. 93 auf Kuhwärder.

Aphodius niger Panz. Geesthacht unter Schilf 2 Stück 21. 4. 95.
„ plagiatus L. Kuhwärder desgl. 3 Stück IV. 95.

Trox scaber L. im Frühjahr 1895 je 1 Stück in Hohenfelde und Kuhwärder.

Hoplia philanthus Füssl. Bergedorf 2 Stücke 27. 6. 95.

Cardiophorus gramineus Scop. von Herrn H. Schulz 3 Stück bei Geesthacht gefunden V. 94.

Cardiophorus asellus Er. V. 95 in Harburg 5 Stück, in Friedrichsruh 1 Stück gefunden.

Rhagonycha elongata Fall. Haacke 1 Stück von Kiefern geklopft. 8. 6. 95.

Lymexylon navale L. 1 Stück von Herrn Itzerodt in Friedrichsruh an einer Buche gefunden.

Ernobius nigrinus Strm. Friedrichsruh, Haacke VI. 95.

Orchesia luteipalpis Muls. 1 Stück dieser seltenen Art am Eppendorfer Mühlenteich gekätschert. 25. 6. 95.

Hypulus bifasciatus F. Geesthacht 1 Stück 21. 4. 95.

Anthicus sellatus Panz. Desgl.

Otiorrhynchus scabrosus Marsh. beim Hafenthor an der dortigen hohen Mauer (früher Hornwerk) 8. 10. 94. 1 Stück erbeutet. An derselben Stelle findet sich auch noch Zabrus tenebrioides (gibbus).

Otiorrhynchus laevigatus F. war im Frühjahr 95 auf Kuhwärder unter Schilf in Anzahl anzutreffen, bisher nur von Geesthacht bekannt.

Phyllobius viridicollis F. von Herrn Niemeyer auf dem Vaaler Moor (bei Wilster) auf Spartium scoparium in Anzahl gefunden. 14. 5. 94.

Barynotus moerens F. einige Stücke von Herrn H. Schulz und mir im Frühjahr 95 auf Kuhwärder unter Schilf gefunden, in Gesellschaft des häufigen B. murinus.

Tanymecus palliatus F. Dieser im allgemeinen ziemlich seltene Käfer war im Mai 95 bei Bergedorf und Harburg in Sandgruben häufig anzutreffen.

Sitona puncticollis Steph. Bergedorf in Sandgruben 2 Stück. 25. 9. 95.

Hypera fasciculata Hbst. } desgl. einige Stück V. 95.
trilineata Marsh. }

Lixus myagri Ol. einige Ex. IV. 95 bei Geesthacht von Herrn H. Schulz und mir gef., 1868 im April 8 Exemplare von Herrn H. Beuthin. *)

Hylobius fatuus Rossi } V. 95 Haacke mehrfach gef.
pinastri Gyllh. }

Pissodes piniphilus Hbst. Haacke auf Kiefernholz, 2 Stück 20. 5. 95, Borgfelde 6. 8. 94, Billwärder 5. 6. 95, je 1 Stück.

Dicranthus elegans F. Kuhwärder unter Schilf 15. 4. 95.

Magdalis phlegmatica Hbst. Haacke auf Kiefernholz, 2 Stück 20. 5. 95.

Magdalis carbonaria L. Friedrichsruh auf Kiefernholz 31. 5. 95.

Rhinoncus albicinctus Gyllh. Geesthacht unter Schilf 21. 4. 95.

Ceuthorrhynchus viduatus Gyllh. Bergedorf 13. 5. 95.
napi Gyllh. 1 Stück bei Bergedorf gekätschert 25. 5. 95.

Apion confluens Kirb. Bergedorf 7. 5. 95.
dissimile Germ. VIII. 94 bei Ahrensburg auf einer Wiese in Anzahl gekätschert.

Dendroctonus micans Kug. am 28. 5. 95 in der Haacke unweit Hausbruch in Wagenspuren 1 Stück; bisher — soweit bekannt — nur einmal im Sachsenwald (Nissen) gef.

Stenocorus sycophanta Schr. VI. 95 auf Eichenstümpfen in der Haacke in Anzahl gef., darunter ein abnormes Stück mit doppeltem rechten Hinterbein; das überzählige, sonst ganz ausgebildete 7. Bein entstand durch Theilung des Schenkels dicht hinter der Wurzel.

Stenoccrus bifasciatus var. unifasciatus Muls. Bei Rothenhaus von Herrn H. Schulz 1. Stück.

Oxymirus cursor L. Am 20. 5. 95 in der Haacke auf gefällten Fichtenstämmen 3 Stück 1 ♂ 2 ♀.

---

*) vide Berliner entomol. Z. 1872, pg. 162.

Tetropium luridum L. war V. 95 in der Haacke unter entrindeten Fichtenstämmen stellenweise häufig anzutreffen.

Saperda scalaris L. Ich erhielt von Herrn Niemeyer ein bei Bergedorf 12. 6. 95 gefangenes Ex. dieser seltenen Art.

Cryptocephalus coryli L. bei Bergedorf geklopft 27. 6. 95.
sexpunctatus L. Bei Reinbek von Weiden geklopft 12. 6. 95.

Cryptocephalus coerulescens Sahlbg. bei Reinbek gekätschert 27. 6. 95.

Colaphus sophiae Schall. war VI. 95 bei Harburg in Sandgruben häufig anzutreffen.

Chrysomela gemellata Duft. Bei Bergedorf in Sandgruben 2 Stück VI. 95.

Phaedon pyritosus Ross. Kuhwärder 1 Stück 15. 4. 95.

Cassida liriophora Kirby. Geesthacht unter Schilf 21. 4. 95.
fastuosa Schall. desgl. von Herrn Schulz.

Hippodamia 7 maculata Deg. Diese seltene Art fand Herr H. Schulz X. 95 zahlreich und in allen Varietäten hinter Ohlsdorf auf Genista.

Coccinella quinquepunctata var. similatrix Weise. Haacke 1 Stück 20. 5. 95.

II.

Mitgeteilt von **H. Gebien.**

Cicindela maritima Dej. 39 Exempl. am 5. Juni 95 im Boberger Sand gegriffen. Sonst wurde dieses Tier bei Geesthacht gefunden.

Cicindela campestris L. var. rubens Friv. Von Herrn Feldtmann bei Bergedorf 1895 gefangen.

Carabus clathratus L. 1 Ex. vom Ahrensburger Moor. Juni 94.
„ convexus F. In Gross-Hansdorf nicht selten.

Calosoma inquisitor var. coeruleum West. Gr.-Hansdorf, Juni 95.

Miscodera arctica Payk. 1 Exemplar dieser, unserer Fauna sonst fremden Art, fand ich im September 93 unter dem Angeschwemmten in Allermöhe. Wahrscheinlich wurde das Tier vom Riesengebirge her heruntergeführt.

Trechus rubens F. Hammerbrook Juni 93. Gross-Hansdorf Juli 94.

Bolitobius analis F. Gross-Hansdorf häufig, Billwärder a. B.

Ocypus picipennis F. } Gross-Hansdorf gemein.
„ olens Müll. }

Necrophorus ruspator Er. } Gross-Hansdorf häufig.
„ fossor Er. }

Peltis Yvani Allib. Juni 92. Am Bullerdeich im Mühlenfegsel einige Exemplare.

Odontaeus mobilicornis F. Von Herrn Gundlach in Wellingsbüttel gefunden.

Serica holosericea Scop. Steinbeck unter einem Stein 1 Exempl. September 94.

Corymbites cinctus Payk. Allermöhe Juni 94.

Balaninus cerasorum Herbst. Grossensee Juli 93 2 Exempl.
„ rubidus Gyll. Johns Park Mai 94 1 Exempl.

Stenostola nigripes F. Delingsdorf bei Bargteheide von Herrn Peemöller auf Salix in grosser Menge (92).

Oberea linearis L. Ebendaselbst von demselben Herrn.

Colaphus Sophiae Schall. Im Winterhuder Sand August 94 in grosser Menge.

Chrysomela limbata F. Boberg 28. August 94.

Adimonia laticollis Sahlb. Gross-Hansdorf Juli 93 17 Exempl., Juli 94 1 Exempl., Juli 95 über 100 Tiere. Dieses Tier wurde zuerst von Herrn Wimmel in 1 Exempl. im Sachsenwald gefunden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Wimmel Th.

Artikel/Article: Neue und seltene Käfer der Hamburger Gegend 4-9