

Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz.

Von

C. Roettgen, Amtsrichter in Stromberg.

Im Nachfolgenden habe ich als eine Art Nachtrag zum Förster'schen Verzeichniss der Käfer der Rheinprovinz eine Reihe von Beobachtungen zusammengestellt, welche theils von dem weitbekannten, jetzt ältesten rheinischen Koleopterologen, Herrn Justizrath Fuss, theils von meinen Freunden Dr. Verhoeff und Dr. Dormeyer oder von mir selbst gemacht worden sind.

Aufgenommen wurden einerseits alle in dieser Weise mir bekannt gewordenen Arten, deren Vorkommen in der Rheinprovinz weder aus dem Förster'schen Verzeichniss noch aus den ergänzenden Angaben der Bach'schen Käferfauna mit Sicherheit hervorgeht. Diese etwa 180 Arten, welche gegenüber den gedachten beiden Werken als neu fürs Rheinland zu betrachten sind, wurden mit × oder mit * bezeichnet; mit ersterem Zeichen, wenn ihr Vorkommen im Rheinland in andern Werken, Westhoff, von Heyden und Schilsky angegeben ist, wobei ich allerdings für die stets richtige Auslegung des verwickelten, oft ein wahres Kreuz für den Leser bildenden Bezeichnungssystems von Schilsky nicht eintreten kann. Das Zeichen * wurde bei den etwa 75 Arten angewendet, welche ich als unbedingt neu für's Rheinland ansehen musste. Bei den bisher gedachten Arten ist, um die Beurtheilung des Fundes zu erleichtern, meist angegeben, in welcher der beiden Nachbarfaunen (der westfälischen oder Nassau-Frankfurter) das Vorkommen nachgewiesen ist, bei ihrem Fehlen

dort ihre Verbreitung insbesondere im westlichen Deutschland auf Grund von Schilsky.

Aufgenommen wurde anderseits eine Anzahl schon aus Förster und Bach für's Rheinland bekannter, seltenerer Arten, für welche Beobachtungen über die Lebensweise oder neue Fundorte (diese mit „auch“ angeführt) vorliegen. Ich mochte auf die Angabe solcher schon bekannten Arten nicht verzichten, da einmal deren Neuauffindung eine gewisse Prüfung der älteren Vorkommensangaben ermöglicht, und weiter dieselben meistens aus dem noch wenig bekannten mittleren Theile der Rheinprovinz herrühren.

Abkürzungen.

Ahrw. = Ahrweiler und weitere Umgebung.

Dorm. = von Dr. Dormeyer angegeben.

Fs. = von Justizrath Fuss angegeben (dessen Funde sind gemacht für Düsseldorf 1848—50, Ahrweiler 1850—66, Cleve 66—80).

Nass. = in v. Heyden: Nassau-Frankfurter Fauna angeführt.

Verf. = von mir selbst gefunden.

Verh. = von Dr. Verhoeff angegeben.

Westf. = in Westhoff: Fauna von Westfalen angeführt.

- Bembidium prasinum* Dft. — auch Beuel, Siegburg, Aggerthal bei Donrath, Walporzheim a. d. Ahr, selten (Dorm. Verf.).
- ×— *pygmaeum* F. var. *bilunulatum* Bielz. (Schilsky für Rheinland) 1 St. im Geniste, Cleve (Fs.).
- *gilvipes* Stm., *Sturmi* Pz., und *pusillum* Gyll. — auch Ahrw. (Fs.).
- *quadripustulatum* Serv. — auch Siegmündung 2 St. (Verf.).
- *— *monticola* Stm. (Westf.) — Rhöndorfer Thal 1 St. (Dorm.).
- *lunatum* Dft. — auch Rheinufer bei Beuel (Dorm. Verf.), Ahrw. (Fs.).
- *— *harpaloides* Serv. (*rufescens* Guer.) (Westf. u. Nass.) — Ahrw. 2 St. (Fs.).
- *quinquestriatum* Gyll. — auch Ahrw., Cleve, gesellig unter Laubbaumrinde im Winter (Fs.).

- **Tachys Focki* Humm. (Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
 — *parvulus* Dej. — auch Bonn, Tönnisstein (Dorm. Verf.)
 — *quadrirignatus* Dft. — auch Aggerthal bei Donrath,
 Ahrthal bei Bodendorf nicht selten (Dorm. Verf.).
- × — *nanus* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Crefeld (Fs.).
Trechus longicornis Stm. — auch Unterahrthal nicht be-
 sonders selten (Fs.).
- Ophonus obscurus* F. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
- **Harpalus politus* Dej. (nicht in Westf. u. Nassau, Schilsky
 für Bayern, Thüringen u. a.) — 1 St. Traben am Mosel-
 ufer (Verh.).
- * — *quadripunctatus* Dej. (Westf.? Nass.) — Annaberg bei
 Bonn 1 St. (Verh.).
 — *autumnalis* Dft. — auch Oberkassel bei Bonn (Verh.).
- × *Amara strenua* Zimm. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
- * — *silvicola* Zimm. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
- * — *sabulosa* Serv. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für
 Bayern, Thüringen, Württemberg) — Ahrw. 2 St. (Fs.).
 — *equestris* Dft. — auch Oberkassel und Paulshof bei Bonn
 (Verh.).
- Poecilus dimidiatus* Ol. — auch Bonn (Fs.).
- Pterostichus aterrimus* Hbst. — auch Laacher See 1 St. (Fs.).
 — *angustatus* Dft. — auch Laacher See (Oberst Schulze
 in Detmold).
- Anchomenus livens* Gyll. — auch Cleve (Fs.).
 — *Thoreyi* Dej. var. *puellus* Dej. — auch Tönnisstein
 1 St. (Verf.).
- Cymindis axillaris* F. — auch Ahrw. (Fs.), Oberkassel (Verh.).
- Dromius testaceus* Er. — auch Ahrw. (Fs.), Bonn, Beuel
 (Dorm. Verf.) unter Kiefernrinde im Winter nicht selten.
 — *nigriventris* Thoms. und *sigma* Rossi — auch Ahrw. (Fs.).
 — *fenestratus* F. — auch Bonn 1 St. (Dorm.).
- **Metabletus pallipes* Dej. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky
 für Württemberg, Thüringen, Böhmen u. a.) — Ahrw.
 sehr selten (Fs.).
- Lionychus quadrillum* Dft. — auch Unterahrthal, Agger-
 thal (Dorm. Verf.).

- × *Brychius elevatus* Pz. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf (Fs.).
Hydroporus 12 — *pustulatus* F. — auch Agger bei Donrath 1 St. (Verf.), scheint westlich nicht den Rhein zu überschreiten, alle Fundorte liegen rechtsrheinisch.
-
- Hydrophilus piceus* L. — auch Poppelsdorf bei Bonn auf der Strasse kriechend 1 St. (Verh.), im Poppelsdorfer Weiher 1 St. (Verf.).
- × *Helophorus rugosus* Ol. (Nass.) — Cleve 1 St. (Fs.).
-
- × *Parnus luridus* Er. (Westf.) und
 × — *nitidulus* Heer (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
Potaminus substriatus Müll. und *Latelmis opaca* Müll. — auch Ahrw. (Fs.).
-
- Heterocerus obsoletus* Curt. — auch Laacher See (Fs.).
-
- * *Bolitochara bella* Märk. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 × *Silusa rubiginosa* Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 * *Stichoglossa semirufa* Er. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky für Elsass u. Rheinbayern u. a.) — Cleve unter Moos 2 St. (Fs.).
Aleochara ruficornis Grav. — auch Ahrw. selten (Fs.).
 × — *lygaea* Krtz. (Schilsky für West-Deutshl.) — Ahrw. häufig (Fs.).
 × — *cuniculorum* Krtz. (Schilsky für West-Deutshl.) — Neuenahr 1 St. (Fs.).
 — *inconspicua* Aubé — auch Ahrw. u. Düsseldorf mehrfach (Fs.).
Myrmedonia Haworthi Steph. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
 × — *plicata* Er. (Westhoff für Elberfeld) in der Fs.'schen Sammlung von v. Hagens als bei Elberfeld gefunden.
Ilyobates nigricollis Payk., *propinquus* Aubé und *forticornis* Lac., sämmtlich auch Ahrw. (Fs.), *nigricollis* auch Cochem (Verf.).
Callicerus rigidicornis Er., auch Ahrw. sehr selten (Fs.), Cochem 1 St. (Verf.).
 × *Homalota (Aloconota) aegyptiaca* Mot. (*Eichhoffi*. Scrib.), (Westhoff für Elberfeld) — Ahrw. selten (Fs.).

- * *Homalota (Al.) currax* Krtz. (Schilsky für Bayern, Westf. u. a.) — Ahrw. 3 St. (Fs.).
- (*Hydrosmeeta*) *subtilissima* Krtz. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
- (*Plataraea*) *hepatica* Er. — auch Ahrw., Cleve (Fs.).
- ×— (*Atheta*) *Pertyi* Heer (*aeneicollis* Sharp.) (Nass.) — Ahrw. nicht selten (Fs.).
- ×— (—) *nitens* Fuss. (Schilsky nur für Rheinland) — Ahrw. 3 St. (Fs.).
- ×— (—) *testaceipes* Heer (Westhoff für Elberfeld, Nass.) — Ahrw. (Fs.).
- *— (—) *dilaticornis* Krtz. (Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
- *— (—) *boletophila* Thoms. (Schilsky für Thüringen) — Ahrw. 2 St. (Fs.).
- *— (*Bessobia*) *monticola* Thoms. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky für Hessen, Thüringen u. a.) — Cleve an Aas mehrfach (Fs.).
- ×— (*Microdota*) *indubia* Sharp. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky für Rheinland u. Thüringen) — Cleve an Aas sehr selten (Fs.).
- ×*Phloeodroma concolor* Krtz. (Schilsky für Elberfeld, Bayern, Hessen) — in der Fs.'schen Sammlung als von v. Hagens bei Elberfeld gefunden.
- Encephalus complicans* Westw. — auch Ahrw. (Fs.).
- Agaricochara laevicollis* Krtz. — auch Ahrw. (Fs.).
- ×*Gymnusa variegata* Kiesw. (Westf.) — Ahrw. unter modernden Blättern 1 St. (Fs.).
- Tachinus rufipennis* Gyll. und *elongatus* Gyll. — auch Ahrw. (Fs.).
- *subterraneus* L. — auch Cochem (Verf.).
- *— *Lamprinus erythropterus* Pz. (Westf.) — Cleve 1 St. (Fs.).
- Bryoporus cernuus* Grav. und *rufus* Er. — auch Ahrw. (Fs.).
- Euryporus picipes* Pk. — auch Ahrw. (Fs.).
- Heterothops quadripunctulus* Gyll. — auch Ahrw. (Fs.).
- ×*Quedius longicornis* Krtz. (Westhoff für Elberfeld, Nass.) — Cleve 1 St. (Fs.).
- *— *brevicornis* Thoms. (Nass.) — Cleve (Fs.).
- *— *ochripennis* Ménétr. (Dr. Epp. bestimmt) (Nass.) — Bonn 1 St. (Verf.).

- × *Quedius tristis* Grav. (Westf. u. Nass.) — Coblenz, Cleve (Fs.).
- × — *picipes* Mannh. (Dr. Epp. bestimmt.) Schilsky: ganz Deutschland) — Cochem und Bonn (Verf.).
— *nigriceps* Krtz. — auch Ahrw. (Fs.).
- × — *riparius* Kelln. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Rheinland, Thüringen) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
— *maurorufus* Grav. — auch Laacher See (Verf.).
- Ocypus pedator* Grav. — auch Ahrw. sehr selten (Fs.).
— *brunnipes* F. — auch Conder-Wald bei Cochem überwinternd (Verf.).
- * — *compressus* Marsh. (für Westf. von Verh. in dessen Fauna von Soest) — Cleve u. Bonn sehr selten (Fs.).
- × *Philonthus rivularis* Kiesw. (*signaticornis* Rey.) (Westhoff für Elberfeld, Nass.) Ahrw. nicht selten (Fs.).
- × *Philonthus addendus* Sharp. (Schilsky für Rheinland, Bayern u. a.) — Cleve an Aas selten (Fs.).
— *immundus* Gyll. — auch Bonn (Verf.).
- * — *Bodemeyeri* Epp. (Reitt. u. Dr. Epp. bestimmt) (nicht in Westf. u. Nass.), auf einer fast überflutheten Kiesbank der Ahr bei Walporzheim unter Steinen Juni 1894 etwa 12 St. (Dorm. u. Verf.). 1 St. vor Aufstellung der Art bei Ahrw. unter *atratus*, *var. coerulescens* Lac. untergebracht. (Fs.). Der Autor theilte mir freundlichst mit, dass die ursprünglich aus Mehadia in Süd-Ungarn beschriebene Art in Deutschland, so im Harz, weiter verbreitet sei; in der Fs.'schen Sammlung zwei von Bruck'sche Stücke aus den Pyrenäen (die ebenfalls zu *coerulescens* gestellt worden, was wohl noch öfter der Fall gewesen sein wird).
- Othius fulvipennis* F. — auch und zwar auffallend häufig auf dem Petersberg im Siebengebirge (Verh.).
- * — *laeviusculus* Steph. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Elsass u. a.) — Bonn bei *Formica rufa* (Verh.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
- * *Baptolinus longiceps* Fauv. (nicht in Westf. u. Nass.), Schilsky für Ost- und Südostdeutschland) — Ahrw. 1 St. (Fs.).

- × *Xantholinus ochraceus* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.), Bonn, Cochem (Verf.).
 — *distans* Rey. — auch Ahrw. (Fs.).
 *— *relucens* Grav. (Schilsky für Norddeutschland u. a.) — Bonn bei *Formica rufa* und unter Weidenrinde (Verh.).
 × *Lathrobium picipes* Er. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
 — *angusticolle* Lac. — auch Ahrw. (Fs.).
Lithocharis castanea Grav. — auch Cleve (Fs.).
 ×— *diluta* Er. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für West- u. Ostdeutschland) — Cleve 1 St. (Fs.).
Stenus silvester Er. — auch Ahrw., Düsseldorf (Fs.).
 — *pubescens* Steph. (*subimpressus* Er.) — auch Ahrw., Cleve (Fs.).
 — *Leprieuri* Cuss. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
 *— *bifoveolatus* Gyll. (Westf.) — Ahrw. häufig (Fs.).
 * *Bledius femoralis* Gyll. (Westf.) — Cleve sehr selten (Fs.).
 — *pallipes* Grav. — auch Elberfeld (Fs.).
 × *Platysthetus capito* Heer (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 * *Oxytelus laqueatus* Marsh. (*luteipennis* Er.) (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
 × *Thinodromus dilatatus* Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrthal, Aggerthal (Verf.).
 × *Trogophloeus distinctus* Fairm. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Rheinland) — Ahrw. selten (Fs.).
 ×— *punctatellus* Er. (Nass.) — bei *Tetramor. caespitum* Ahrw. häufig (Fs.).
 × *Thinobius longipennis* Heer (Schilsky für ganz Deutschland) — Ahrw. (Fs.).
 × *Ancyrophorus longipennis* Fairm. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Rheinland, Bayern, Thüringen u. a.) — Ahrw. einmal häufig (Fs.).
Acrognathus mandibularis Gyll. — auch Bonn am Rheinufer 1 St. (Verf.).
 × *Geodromicus plagiatus* F. var. *nigritus* Müll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 * *Lathrimaemum unicolor* Marsh. (Westf. u. Nass.) — Cleve (Fs.).
 × *Lesteva pubescens* Mannh. (Westf.) — in der Fs.'schen Sammlung aus Elberfeld als dort gefunden (Fs.).
 — *punctata* Er. — auch Ahrw. (Fs.).

- ×*Orochares angustata* Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw., Cleverberg bei Cleve im Spätherbst häufig (Fs.), Conderberg bei Cochem, November 1890 im Sonnenschein fliegend nicht selten (Verf.).
- Philorinum sordidum* Er., auch Ahrw. auf *Spart. scopar.* (Fs.).
- Coryphium angusticolle* Steph. — auch Düsseldorf 1 St. (Fs.).
- ×*Omalium gracilicorne* Fairm. var. *hiemale* Fuss. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Rheinland, Allergebiet) — Cleve 2 St. (Fs.).
- ×*Anthobium abdominale* Grav. (Westf. u. Nass.), sowie
- ×— *signatum* Märk. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
- *atrum* Heer — auch Ahrw. (Fs.).
- **Megarthus nitidulus* Krtz. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
- *sinuaticollis* Lac. und *depressus* Pk. — auch Ahrw. (Fs.).
-
- ×*Neuraphes rubicundus* Schaum. (Westhoff für Elberfeld; Nass.) in der Fs.'schen Sammlung aus Elberfeld als dort gefunden.
-
- ×*Leptinus testaceus* Müll. (Westf.) — Ahrw. selten (Fs.).
- **Choleva spadicea* Stm. (Westf. und Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
- **Colon latum* Krtz. (Nass.) — Ahrw. sehr selten (Fs.).
- Silpha carinata* Ill. — auch Kottenforst bei Bonn und Cochem beidemale in Eichwald (Verf.).
- *tristis* Ill. — auch Rheinufer oberhalb Beuel 1 St. (Verf.).
- **Agyrtes bicolor* Casteln. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf sehr selten (Fs.).
- **Hydnobius punctatissimus* Steph. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
- Liodes nigrita* Schmidt. — auch Ahrw. selten (Fs.).
- Agathidium mandibulare* Stm. und *badium* Er. — auch Ahrw. (Fs.).
- ×— *marginatum* Stm. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf und Ahrw. sehr selten Fs.
-
- ×*Stilbus oblongus* Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
-

- × *Triplax melanocephala* Latr. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky für Oesterreich, Bayern, Rheinland). — Ahrw. in faulenden Schwämmen häufig (Fs.).
— *aenea* Pk. — auch Ahrw. selten (Fs.).
-
- Alexia pilifera* Müll. u. *pilosa* Pz. — auch Ahrw. nicht bes. selten (Fs.).
- × — *globosa* Stm. (Schilsky für ganz Deutschland). Ahrw. (Fs.)
- Endomychus coccineus* L. — auch Bonn, Kottenforst (Fs. Verh.).
-
- × *Cryptophagus setulosus* Stm. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. mehrfach (Fs.)
— *melanocephalus* Hbst. — auch Ahrw. nicht selten (Fs.).
-
- Dasycerus sulcatus* Brogn. — auch Ahrw. (Fs.).
-
- Mycetophagus decempunctatus* F. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
- × — *quadriguttatus* Müll. (Nass.) Ahrw. sehr selten (Fs.).
— *fulvicollis* F. — auch Ahrw. selten (Fs.).
- Thyphaea fumata* L. — auch Ahrw. (Fs.).
-
- Eपुरaea limbata* F. — auch Ahrw. (Fr.) Bonn (Verf.).
- × — *longula* Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
— *terminalis* Mannerh. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
- Soronia punctatissima* Ill. — auch Düsseldorf (Fs.) Cochem (Verf.).
— *grisea* L. auch Bonn einmal häufig an und zwischen *Teras terminalis*-Gallen (Verh.).
- Meligethes gagatinus* Er. — auch Ahrw. häufig auf *Mentha* (Fs.).
- * — *bidentatus* Bris. (*Gresseri* Bach) (Nass.) — Ahrw. auf Eichen (Fs.).
- × *Cychramus fungicola* Heer. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. häufig (Fs.).
- * *Rhizophagus perforatus* Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. selten (Fs.).
-

×*Nemosoma elongatum* L. (Nass.) — Bonn in Apfelbaum-
mulm mehrfach (Verf.).

Thymalus limbatus F. — auch Cochem im Ernster Wald
unter Eichenrinde ziemlich häufig (Verf.).

**Colobicus emarginatus* Latr. (Westf. u. Nass.) — Cochem
unter Apfelbaumrinde 1 St. (Verf.).

**Teredus nitidus* F. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf (Fs.)
Cochem im Ernster Wald unter Eichenrinde ziemlich
häufig (Verf.).

×*Cerylon deplanatum* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. nicht
bes. selten (Fs.).

Laemophloeus ater Ol. — auch Kottenforst bei Bonn 1 St.
(Verf.).

Brontes planatus L. — auch Düsseldorf (Fs.).

×*Psammoecus bipunctatus* F. (Nass.) — Laacher See sehr
selten (Fs.).

×*Hadrotoma marginata* Pk. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).

×— *fasciata* Fairm. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky
für Rheinpreussen) Düsseldorf 1 St. (Fs.).

×*Trogoderma nigrum* Hbst. (Westf.?, Nass.) — Ahrw. selten
(Fs.) Bonn 1 St. (Verf.).

Trinodes hirtus F. — auch Ahrw., einmal sehr häufig (Fs.).

Nosodendron fasciculare Ol. — auch Düsseldorf 1 St. (Fs.).

×*Byrrhus luniger* Germ. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf
1 St. (Fs.).

**Hister helluo Truqui* (Westf. u. Nass.) — Ahrw. an mor-
schem, angeschwemmtem Holze, mehrfach (Fs.).

*— *succicola* Thoms. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.)

×— *distinctus* Er. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky
für Rheinland, Thüringen u. a.) Ahrw. in faulenden als
Dünger verwendeten Kuhhaaren in einem Weinberg ein-
mal sehr zahlreich (Fs.).

*— *stigmatosus* Marsh. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky
als aus Deutschland bekannt, jedoch ohne genaue
Vaterlands-Angabe) — Ahrw. (Fs.).

- **Hister funestus* Er. (Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 — *marginatus* Er. — auch Ahrw. (Fs.).
 **Saprinus rugifer* Pk. (Westf.) — Ahrw. 3 St. (Fs.).
 — *conjungens* Pk. — Bonn 1 St. (Verf.).
Paromalus parallelepipedus Hbst. — auch Ahrw. (Fs.).
 ×*Abraeus globulus* Creutz. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 — *globosus* Hoffm. — auch Ahrw. (Fs.).
 ×*Acritus rhenanus* Fuss. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky
 Rheinland.) unter morschen, feuchtliegenden Brettern
 bei Ahrw. (Fs.).
-

Sisypus Schaefferi L. — ein vielleicht verflogenes Stück,
 Herbst 1878 bei Gerolstein (Verf.), bisher im Rheinland
 nicht nördlich des Hunsrück gefunden.

Onthophagus Hübneri Ill. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
 — *lemur* F. — auch Umgebung des Laacher See in
 Schweinemist, nicht sehr selten (Fs.).

*— *semicornis* Pz. (Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).

×*Aphodius melanostictus* Schmidt (Westf. u. Nass.) — Ahrw.
 ziemlich selten (Fs.).

— *tristis* Pz. und *obliteratus* Pz. — auch Ahrw. (Fs.).

Ammoecius brevis Er. — auch Ahrw. selten (Fs.).

Aegialia rufa F. — auch Düsseldorf nach einer Rhein-
 überschwemmung mehrere Jahre häufig, dann fast ver-
 schwunden (Fs.).

**Rhizotrogus assimilis* Hbst. (nicht in Westf. u. Nass.,
 Schilsky für Cassel, Thüringen u. a.) — 1 St. in
 einer Lösswand an der Ippendorfer Chaussee bei Bonn
 todt gefunden (Verf.) (Reitt. vid.).

×*Anisoplia agricola* F. (Westf. u. Nass.) — Laacher See
 nicht besonders selten, Cleve 1 St. (Fs.).

×*Agrilus sexguttatus* Hbst. (Nass.) — Rheinufer bei Beuel
 1 St. (Fs.).

— *sinuatus* Ol. — auch Ahrw. u. Cleve, je 1 St. (Fs.).

— *pratensis* Ratzbg. — auch Ahrw. u. Melbthal bei Bonn
 (Fs.).

×— *laticornis* Ill. — (Westf. u. Nass.) — Ahrw. auf Eichen
 nicht selten (Fs.).

×*Trachys troglodytes* Gyll. (Westf.?, Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).

Throscus carinifrons Bonv. — auch Cleve, häufig (Fs.).

×*Elater elongatulus* F. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).

*— *nigerrimus* Lac. (Nass.) — Cleve 1 St. (Fs.).

×*Megapenthes tibialis* Lac. (Westf. u. Nass.) — Bonn 1 St. (Verf.).

**Cardiophorus ruficollis* L. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. mehrfach (Fs.).

— *rufipes* Fourc. und *nigerrimus* Er. — auch Ahrw. (Fs.).

**Melanotus crassicollis* Er. (Westf.) — Ahrw. selten (Fs.).

×— *rufipes* Hbst. (Schilsky für ganz Deutschland. Bonn in Weidenstöcken überwintend (Verh.).

**Athous rhombeus* Ol. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Bayern, Hessen, Thüringen) — Cleve am Rheinufer 1 St. (Fs.).

Corymbites affinis Pk. und *Diacanthus impressus* F. — auch Ahrw. (Fs.), letzterer auch Plittersdorf und Venusberg bei Bonn (Verh.).

Diac. cruciatus L. — auch Cleve, einmal sehr häufig (Fs.).

Ludius ferrugineus L. — auch Bonn in Weiden an der Coblenzer Chaussee nicht selten (Stud. Frings aus Bonn).

Prionocyphon serricornis Müll. — auch Düsseldorf (Fs.).

Scirtes orbicularis Pz. — auch Cleve, einmal häufig (Fs.).

Dictyoptera sanguinea L. — auch Siebengebirge 1 St. (Verf.).

Podabrus alpinus Pk. — auch Ahrw. (Fs.), Cochem und Kottenforst bei Bonn (Verf.).

**Telephorus abdominalis* F. var. *cyanipennis* Bach (Westf. u. Nass.) — Cochem 1 St. (Verf.).

— *Erichsoni* Bach — auch Düsseldorf (Fs.).

*— *albomarginatus* Märk. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).

×*Silis ruficollis* F. (Westf.) — Laacher See sehr selten (Fs.).

**Drilus concolor* Ahr. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf 1 St.

Malachius scutellaris Er. — auch Ahrw. sehr selten (Fs.).

Dasytes subaeneus Schh. — auch Ahrw. ziemlich häufig (Fs.) und Rodderberg (Verh.).

**Haplocnemus ahenus* Kiesw. (Nass.) — Ahrw. (Fs.).

×*Phloeophilus Edwardsi* Steph. (Westf.) — Cleve nicht selten (Fs.).

Denops albofasciatus Charp. — auch Ahrw. April 1882 in einem Weinberg 1 St. (Fs.) und in einem Weinberg diesseits Kessenich bei Bonn Frühjahr 1881 4 St. (Verf.), seitdem nicht mehr. Die Thiere liefen an alten mit Insektenbohrlöchern durchsetzten Weinbergspfählen eilig umher, jedes Loch untersuchend; gleichzeitig fand sich dort an den Pfählen umherlaufend und theilweise noch in Bohrlöchern steckend die unten erwähnte *Xylopertha sinuata* F., aus dem Gebiete meines Wissens nur noch von Ahrw. bekannt. Letzteres Thier dürfte, wenn nicht schon ursprünglich einheimisch, jedenfalls nach seinem dauernden Vorkommen bei Ahrw. dort eingebürgert sein. Für *Den. albofasc.* möchte ich bei seinem äusserst sporadischen Vorkommen (ausser den angeführten nur noch 2 St. bei Neuwied und Mainz — s. Bach II, S. 88) jedesmalige Einschleppung vermuthen, seine Lebensweise und Auffindung nur in Weinbaugegenden steht dem wenigstens nicht entgegen.

Trichodes alvearius F. auch aus *Anthophora*-Bauten bei Rhöndorf erzogen (Verh.).

**Laricobius Erichsoni* Rosh. (Westf. u. Nass.) — Crefeld (Fs.)

×*Corynetes ruficollis* F. (Westf. u. Nass.) — Rheinufer oberhalb Beuel an getrocknetem Aas 4 St. (Verf.).

×*Gibbium scotias* F. (Nass.) — 1 St. im Freien bei Bonn (Verf.).

Niptus hololeucus Fald. — auch Bonn 1 St. (Verh.).

Ptinus sexpunctatus Pz. — auch Ahrw. (Fs.), Bonn (Verh.).

— *rufipes* F. — auch Ahrw. häufig (Ps.), Cochem selten (Verf.).

×— *subpilosus* Stm. (Westf. u. Nass.) — Cochem 2 St. (Verf.).

×— *brunneus* Dft. — auch Bonn 1 St. (Verh.).

×*Ptinus bicinctus* Stm. (Westf. u. Nass.) — Cochem 2 St. (Verf.).

„Gedachter“ *sexpunct.* zahlreich erzogen aus den Futter-, Kokon- und Leichenresten verlassener Immenbauten, daher an Lösswänden oft zu finden (Verh.).

Xestobium plumbeum Ill. — einmal in Gärten im Süden von Bonn auf Gesträuchen und Zäunen nicht besonders selten (Verf.).

**Hedobia regalis* Dfl. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.) Cochem 1 St. (Verf.).

×*Xyletinus ater* Pz. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).

— *pectinatus* F. auch Ahrw. (Fr.) Bonn 1 St. (Verf.).

Dorcatoma dresdensis Hbst. — auch Ahrw. nicht selten (Fs.).

×*Lyctus bicolor* Comolli (Westf.?, Nass.) — Ahrw. (Fs.) Bonn 1 St. (Verf.).

**Xylopertha sinuata* F. (Nass.) — Ahrw. nicht selten an altem Holze (Fs.) Bonn an Weinbergspfählen mit Den. albobasc. zusammen einmal mehrfach, seitdem nicht mehr (Verf.).

Asida grisea F. — auch Brohlthal (Fs.) geht im Moselthal weit aufwärts, so Eifelhöhen bei Cochem und auf der Marienburg bei Bullay je 1 St. (Verf.).

Hypophloeus bicolor F. — auch Bonn in Apfelbaummulm mehrfach (Verf.).

[**Blaps reflexicollis* Fisch. — ein jedenfalls irgendwie eingeschlepptes Stück dieser österreich-ungarischen Art im Freien bei Cleve (Fs.).]

**Prionychus laevis* Küst. (nicht Nass., Schilsky für Tirol, für Rheinland?) — Ahrw. an morschem Holze 1 St. (Fs.).

×*Mycetochares axillaris* Pk. (Nass.) — Düsseldorf mehrfach (Fs.), Linz a. Rhein 1 St. (Verf.) und

*Die *variet. maurina* Muls. (Westf. u. Nass.) — Cleve (Fs.).

×*Omophlus amerinae* Curt. (Westf. — Fricken — u. Nass.) Burgbrohl 1 St. (Es.).

- Abdera affinis* Pk. u. *flexuosa* Pk. — auch Düsseldorf (Fs.).
- **Phloeotrya Vaudoueri* Muls. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf, Crefeld, sehr selten (Fs.).
- Hypulus quercinus* Quens. — auch Düsseldorf (Fs.).
- ×*Melandrya flavicornis* Dft. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
- ×*Conopalpus testaceus* Ol. (Westf. u. Nass.) Ahrw. mehrfach (Fs.).
- Nothus bipunctatus* F. (*praeustus* Ol.) — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
-
- Oedemera subulata* Ol. — auch Ahrw. (Fs.) Cochem (Verf.).
- **Oncômera femorata* F. (Nass.) — Cochem 1 Weibchen (Verf.).
- Chrysanthia viridissima* L. — auch Bonn, erzogen aus Larven, die im Mulm von *fagus silvatica* lebten (Verh.).
-
- ×*Lissodema denticolle* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Cleve mehrfach (Fs.).
-
- **Otiorhynchus scabripennis* Schönh. (Nass.) — Coblenz und Siebengebirge mehrfach (Fs.).
- *— *multipunctatus* F. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky nur für Kärnthen, Steiermark u. a. für Süd-Deutschland?) — 1 St. (von Reitt. bestimmt) Linz a. Rhein (Verf.).
- ×*Caenopsis Waltoni* Boh. (Westf.) — Cleve (Fs.).
- **Barypeithes tenex* Boh. (Nass.) — Cleve (Fs.).
- ×*Strophosomus curvipes* Thoms. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Rheinland u. a.) — in Sandgruben bei Cleve, seinerzeit äusserst häufig (Fs.).
- ×*Sitones Waterhousi* Walt. (Nass.) — Ahrw. mehrfach (Fs.) Bonn in der Plittersdorfer Au 2 St. (Verf.).
- **Hypera tessellata* Hbst. (Nass.) — Cleve (Fs.).
- *— *pastinacae* Rossi (Nass.) — Coblenz 2 St. (Fs.).
— *plantaginis* Deg. — auch Bonn (Verf.)
- Procas armillatus* F. — auch Ahrw., Cleve, Goch, sehr selten (Fs.).
- Lixus iridis* Ol. — auch Ahrw. (Fs.).

- Lixus Ascanii* L. — auch *Traben* a. d. Mosel (Verh.).
 *— *angustatus* F. (*algius* L.) (Nass.) — Laacher See (Fs.).
 ×*Pissodes piceae* Ill. (Schilsky: ganz Deutschland) einmal
 sehr häufig bei Thronecken a. d. Mosel (Fs.).
 ×*Trachodes hispidus* L. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. Cleve
 sehr selten (Fs.).
 ×*Eriirhinus scirpi* F. (Westf. u. Nass.) — Laacher See (Fs.),
 Bonn (Verf.).
 *— *scirrhosus* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 — *variegatus* Gyll. — auch Düsseldorf (Fs.).
 ×— *validirostris* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.),
 Bonn, Siegmündung (Verf.).
 ×— *filirostris* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
Smicronyx politus Boh. — auch Ahrw. (Fs.).
 ×*Bagous frit* Hbst. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
 *— *nigritarsis* Thoms. (Westf.? Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 ×*Magdalinus nitidus* Gyll. (Schilsky: ganz Deutschland)
 — Bonn 1 St. (Fs.).
 *— *nitidipennis* Boh. (Nass.) — Ahrw. (Fs.).
Balaninus cerasorum Hbst. — auch Venusberg b. Bonn
 auf Birken äusserst häufig (Verh.).
 ×*Sibinia pellucens* Scop. (*cana* Hbst.) (Westf. u. Nass.) —
 Ahrw. selten (Fs.).
Mecinus janthinus Germ. — auch Bonn am Rheinufer
 2 St. (Verf.).
 ×*Gymnetron collinum* Gyll. (Nass.) —
 ×sowie — *tetrum* F. (Westf. u. Nass.) —
 ×und — *noctis* Hbst. (Westf. u. Nass.) — sämtlich Ahrw.
 nicht selten (Fs.).
 **Ramphus aeneus* Boh. (Nass.?) Schilsky für Rheinbayern,
 Thüringen — Ahrw. mehrfach auf Apfelbäumen (Fs.).
Coeliodes rubicundus Pk., *geranii* Pk., *trifasciatus* Bach.
 (*subrufus* Hbst.) und *ruber* Marsh. sämtlich auch
 Ahrw. (Fs.).
 ×*Phytobius leucogaster* Marsh. (Westf.) — Cleve (Fs.).
 ×— *canaliculatus* Fahr. (nicht in Westf. u. Nass. Schilsky
 für ganz Deutschland) — Ahrw. (Fs.).
 **Phytobius Waltoni* Boh. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
 ×— *quadrinodosus* Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).

×*Ceuthorhynchus querceti* Gyll. (*alboscuteellatus* Gyll.) (Westf.)
— Düsseldorf (Fs.).

*— *arator* Gyll. (Westf.?, Nass.) — Ahrw., Cleve (Fs.).

*— *pilosellus* Gyll. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky
nur für Oesterreich) — Cleve 1 St. (Fs.).

*— *angulosus* Boh. (Westf. u. Nass.) — Crefeld 1 St. (Fs.).

*— *picitarsis* Gyll. (*tarsalis* Boh.) (Nass.) — Ahrw. selten
(Fs.).

×*Baridius coeruleus* Scop. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).

Sphenophorus mutilatus Laich. — auch Küdinghoven bei
Bonn und Bonn (Verh., Verf.).

Dryophthorus lymexylon F. — auch Cochem, Ernster Wald
(Verf.).

×*Apion opeticum* Bach. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).

×— *dissimile* Germ. (Nass.) — Laacher See 1 St. (Fs.).

Tropideres sepicola Hbst. — auch Cleve (Fs.).

Choragus Sheppardi Kirb. — auch Düsseldorf (Fs.).

Grammoptera analis Pz. (*variegata* Germ.) (Westf. — Fricken-
Nass.), auch Cochem 1 St. (Verf.).

Anoplodera rufipes Schall. — auch Ahrw. (Fs.), Cochem
1 St. (Verf.).

Callimus angulatus Schrank. — auch Ahrw. (Fs.).

Obrium cantharinum L. — auch Remagen 1 St. (Verf.).

×*Callidium aeneum* Deg. (Nass.), ein jedenfalls wohl einge-
geschlepptes Stück an der Holzschneidemühle oberhalb
Bonn (Verh.).

Clytus arvicola Ol. — auch Ahrw. sehr selten (Fs.).

Purpuricenus Koehleri L. — auch Venusberg bei Bonn,
Drachenfels, beidemale auf *Spart. scoparium* (Verh.).

Agapanthia suturalis F. — auch Bertricher Thal bei Alf
a. d. Mosel und Bodendorf a. d. Ahr je 1 St. (Verf.).

— *cyanea* Hbst. — auch Venusberg bei Bonn 1 St. (Verh.).
1 Pärchen (Verf.).

Clythra humeralis Schneid. — auch Ahrw. mehrfach (Fs.).

- ×*Cryptocephalus signatus* Laich. (*interruptus* Suffr.) (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für ganz Deutschland ausser dem Norden) — Laacher See mehrach (Fs.). M.-Gladbach 1 St. (Verf.).
- **Cryptocephalus distinguendus* Schneid. (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Bayern, Thüringen, Braunschweig u. a.) — Bonn 1 St. (Fs.).
 — *10-punctatus* L. — auch Goch, nur auf Torfboden (Fs.).
 — *populi* Suffr. — auch Siegmündung (Verf.).
- ×*Lamprosoma concolor* Stm. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. nicht selten (Fs.), Bonn (Verf.).
Chrysomela hyperici Forst. var. *quadrigemina* Suffr. — auch Lengsdorf bei Bonn unter Steinen im ersten Frühjahr (Verh.).
- **Haltica (Batophila) aerata* (Marsh.) (nicht in Westf. u. Nass., Schilsky für Tirol und Elsass) — Ahrw. auf Brombeeren häufig (Fs.).
Cassida ornata Creutz. var. *lucida* Suffr. — auch Bonn 2 St. (Verf.).
 — *austriaca* F. — auch Stromberg (Verf.).
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [51](#)

Autor(en)/Author(s): Roettgen C.

Artikel/Article: [Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz 178-195](#)

