

Vogel-Fauna des Wupperthals.

Nach Beobachtungen von Dr. Hopff.

I. *Raptatores*. Raubvögel.

Species.

| | |
|--|----|
| Fam. <i>Strigidae</i> . Eulen. | |
| Strix aluco, flammea, otus, brachyotus, noctua, Tengmalmi | 6 |
| Fam. <i>Accipitrinae</i> . Hachte. | |
| Falco rufus, pygargus, buteo, lagopus, apivorus, milvus, palumbarius, nisus, tinnunculus, subbuteo, peregrinus | 11 |
| Aquila albicella, haliaëtos | 2 |

II. *Syndactyli*. Heftzeher.

| | |
|------------------------------------|---|
| Fam. <i>Halcyones</i> . Eisevögel. | |
| Alcedo ispida | 1 |

III. *Zygodactyli*. Paarzeher.

| | |
|---|---|
| Fam. <i>Picidae</i> . Spechte. | |
| Yinx torquilla | 1 |
| Picus viridis, maior, leuconotos, medius, minor | 5 |
| Fam. <i>Cuculidae</i> . Kuckucke. | |
| Cuculus canorus | 1 |

IV. *Oscines*. Singvögel.

| | |
|--|---|
| Fam. <i>Corvinae</i> . Raben. | |
| Corvus Corax, Corone, Cornix, frugilegus, monedula, Pica, glandarius, Caryocatactes | 8 |
| Sturnus vulgaris | 1 |
| Fam. <i>Laniadae</i> . Würger. | |
| Lanius excubitor, collurio, minor, ruficeps | 4 |
| Fam. <i>Muscicapidae</i> . Fliegenschnäpper. | |
| Muscicapa grisola | 1 |
| Fam. <i>Ampelidae</i> . Schmuckvögel. | |
| Bombycilla garrula | 1 |

Fam. *Turdidae*. Drosseln.

| | |
|--|---|
| <i>Turdus viscivorus, pilaris, musicus, merula, torquatus, iliacus</i> | 6 |
| <i>Oriolus Galbula</i> | 1 |
| <i>Cinclus aquaticus</i> | 1 |

Fam. *Sylviadae*. Sanger.

| | |
|--|----|
| <i>Saxicola rubetra, oenanthe</i> | 2 |
| <i>Sylvia tithys, phoenicurus, luscinia, rubecula, sibilatrix, arundinacea, hypolais, trochilus, hortensis, curruca, cinerea, atricapilla, suecica, rufa</i> | 14 |
| <i>Troglodytes vulgaris</i> | 1 |
| <i>Anthus campestris, pratensis, aquaticus</i> | 3 |
| <i>Motacilla alba, sulphurea, flava</i> | 3 |

Fam. *Paridae*. Meisen.

| | |
|--|---|
| <i>Regulus flavicapillus, ignicapillus</i> | 2 |
| <i>Parus cristatus, palustris, ater, maior, caeruleus cyanus, caudatus</i> | 7 |

Fam. *Fringillidae*. Finken.

| | |
|---|----|
| <i>Alauda arvensis, cristata, arborea</i> | 3 |
| <i>Emberiza miliaria, citrinella, hortulana</i> | 3 |
| <i>Fringilla domestica, montana, petronia, caelebs, montifrigilla, coccothraustes, chloris, carduelis, cannabina, linaria, spinus, citrinella</i> | 12 |
| <i>Pyrhula vulgaris</i> | 1 |
| <i>Loxia curvirostra</i> | 1 |

V. *Tenuirostres*. Dunnschnabler.

Fam. *Certhiidae*. Baumlufer.

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Sitta europaea</i> | 1 |
| <i>Certhia familiaris</i> | 1 |

Fam. *Epopidae*. Wiedehopfe.

| | |
|--------------------|---|
| <i>Upupa epops</i> | 1 |
|--------------------|---|

VI. *Fissirostres*. Schwalbenvogel.

Fam. *Hirundinidae*. Tagsschwalben.

| | |
|---|---|
| <i>Hirundo riparia, urbana, rustica</i> | 3 |
| <i>Cypselus apus</i> | 1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fam. Caprimulgidae. Nachtschwalben. | |
| Caprimulgus europaeus | 1 |

VII. *Columbae*. Tauben.

| | |
|--|---|
| Fam. Columbae. Tauben. | |
| Columba palumbus, oenas, turtur, domestica | 4 |

VIII. *Gallinae*. Hühner.

| | |
|--|---|
| Fam. Tetraonidae. Feldhühner. | |
| Tetrao urogallus, tetrrix, bonasia | 3 |
| Perdix cinerea, coturnix | 2 |
| Fam. Phasianidae. Hühner. | |
| Pavo cristatus | 1 |
| Gallus domesticus | 1 |
| Meleagris gallopavo | 1 |

IX. *Cursores*. Laufvögel.

X. *Grallatores*. Sumpfvögel.

| | |
|---|---|
| Fam. Gallinulae. Sumpfhühner. | |
| Crex pratensis | 1 |
| Rallus aquaticus | 1 |
| Ortegometra Parzana, pusilla | 2 |
| Gallinula chloropus | 1 |
| Fulica atra | 1 |
| Fam. Gruidae. Kraniche. | |
| Grus cinerea | 1 |
| Fam. Charadriidae. Regenpfeifer. | |
| Charadrius auratus | 1 |
| Vanellus cristatus | 1 |
| Haematopus ostralegus | 1 |
| Fam. Scolopacidae. Schnepfenvögel. | |
| Scolopax gallinula, gallinago, maior, rusticola | 4 |
| Numenius arquatus | 1 |
| Fam. Ardeadeae. Reihervögel. | |
| Ardea cinerea, stellaris | 2 |
| Ciconia alba | 1 |

XI. Natatores. Schwimmvögel.

Fam. *Anatidae*. Enten.

| | |
|--|----|
| <i>Cygnus musicus</i> | 1 |
| <i>Anser segetum, cinereus, domesticus</i> | 3 |
| <i>Anas Boschas, domestica, crecca, querquedula, clypeata, acuta, Penelope, Tadorna, fusca, clangula, fuligula, marila</i> | 12 |
| <i>Mergus merganser, serrator, albellus</i> | 3 |

Fam. *Pelecanidae*. Pelekane.

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Phalacrocorax Carbo</i> | 1 |
|----------------------------|---|

Fam. *Colymbidae*. Taucher.

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Podiceps minor, cornutus</i> | 2 |
|---------------------------------|---|

Fam. *Porcellariae*. Sturmvögel.

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Thalassidroma pelagica</i> | 1 |
|-------------------------------|---|

Fam. *Laridae*. Seeschwalben.

| | |
|------------------------|---|
| <i>Larus argenteus</i> | 1 |
| <i>Sterna hiruudo</i> | 1 |

Species 165

Bemerkungen.

Die Classe der Vögel ist demnach im Wupperthale durch die daselbst vorkommenden Vögel in 10 Ordnungen, 30 Familien, 61 Gattungen und 165 Species repräsentirt, so dass man, die Zahl der Ordnungen als Einheit genommen und die Bruchtheile nicht mitgerechnet, für diese verschiedenen Abtheilungen des Systems die Verhältnisszahlen 1 : 3 : 6 : 16 erhält.

Wenn man mit ziemlicher Sicherheit die approximative Gesamtzahl aller auf der Erde lebenden Vögelspecies auf 6500 anschlagen darf, so würde die Fauna des $1\frac{3}{4}$ □ Meilen grossen Wupperthals fast den 40sten Theil der Gesamtzahl für sich in Anspruch nehmen. Bedeutender wird sich natürlich das Verhältniss stellen, wenn wir die hiesigen Vögel mit der Gesamtzahl der Vögel von ganz Deutschland vergleichen. Naumann hat in seinem 12bändigen berühm-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande](#)

Jahr/Year: 1848

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Hopff Georg Bernard

Artikel/Article: [Vogel-Fauna des Wupperthals. 231-234](#)