

Dritter Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz.

Von

C. Roettgen,

Amtsgerichtsrat in Koblenz.

Mehrjähriges Sammeln in der Umgebung von Koblenz, fremde Sammlungen und einige mir in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellte Sammlungsverzeichnisse rheinischer Käfer, besonders ein umfassendes von Herrn Prof. Dr. L. v. Heyden ergaben eine ziemliche Anzahl von Arten, die aus dem Gebiet, teilweise sogar aus Westdeutschland noch unbekannt waren.

Die wichtigsten dieser sowie einige neuere Beobachtungen bekannter seltener Arten habe ich im folgenden zusammengestellt unter Bezugnahme auf ihr anderweites Vorkommen besonders in Westfalen (Verzeichnis von Westhoff) und Nassau-Frankfurt (Verzeichnis von v. Heyden).

Einen Teil der Funde verdanken wir den Herren Konr. Bocklet, Koblenz-Lützel; Karl Frings, Bonn; Oberleutnant a. D. Mühlenfeld, Horchheim; Paul Preiß, früher Koblenz, jetzt Ludwigshafen-Rhein; Geyr v. Schweppenburg, Müddersheim bei Zülpich; Dr. phil. le Roi, Bonn; Dr. Urban, Gewerbeinspektor, früher Duisburg, jetzt Magdeburg.

- Bembidium Redtenbacheri* K. Dan. — Am Wiedufer bei Nothausen von mir gefunden (K. Dan. det.), neu für Westdeutschland (Münch. Kol. Z. 1902. S. 24).
- Bemb. Stephensi* Crotch. — Ein Stück bei Trier von Mühlenfeld gefunden und mir überlassen (K. Dan. det.), anscheinend neu für Westdeutschland.
- Masoreus Wetterhalli* Gyll. — An der Nahe bei Langenlonsheim vor einigen Jahren von mir gefunden, neuerdings ebendort oder im Soonwald [Neupfalz] von Geyr von Schweppenburg. Schon aus Westfalen und Nassau bekannt.
- Agabus biguttatus v. nitidus* F. — Bei Elberfeld von Cornelius gefunden (Verz. S. 13) neuerdings von Bocklet im Mühlenbachtal b. Ehrenbreitstein (Gerh. vid. -♂-). Aus Westfalen und Nassau bekannt.
- Ag. congener v. ♀ Venturii* Bertol. — Mit der Stammform auf dem Hohen Venn von le Roi einige Stück gefunden und mir überlassen (Gerh. determ.). Die Stammform aus Westfalen bekannt.
- Ilybius Kiesenwetteri* Wehnke. — Von Krefeld in der Sammlung vom Bruck mit „Wehnke gesehen“. Aus Norddeutschland bekannt.
- Xylodromus affinis* Gerh. — Ein Stück von mir bei Güls am Moselufer gefunden (Bernh. vid.); neu für Westdeutschland.
- Ancyrophorus aureus* Fauv. — Ein Stück von mir nahe Nettehammer am Bachufer gesiebt (Bernh. vid.); neu für Westdeutschland.
- Quedius rufipes* Grav. — Von Nassau (Buddeberg) bekannt, wurde von mir auf der Schmittenhöhe gegenüber Koblenz gefunden (Bernh. vid.), ein Stück von Aachen sah ich aus der Samml. Urban.
- Mycetoporus forticornis* Fauv. — Von Mühlenfeld auf der Schmittenhöhe in Mehrzahl gesiebt (Bernh. det.) — anscheinend neu für Westdeutschland.

- Gnypeta ripicola* Kiesw. — Von Elberfeld durch Cornelius bekannt, von Mühlenfeld und mir an den Tümpeln auf Oberwerth bei Koblenz zahlreich gesiebt.
- Brachyusa concolor* Er. — Von Urban bei Duisburg, von mir auf Oberwerth bei Koblenz gefunden; neu für Westdeutschland.
- Atheta Gyllenhali* Thoms. — Von Kraatz bei Bonn gefunden; ebendort von Frings, und mir überlassen (Bernh. vid.).
- Ath. complana* Mannh. — Am Nettebach und Wiedbach je ein Stück von mir gefunden (Bernh. determ.); anscheinend neu für Westdeutschland.
- Ocalea concolor* Kiesw. — Am Guldenbach bei Stromberg, am Nettebach und Eltzbach von mir aus Genist gesiebt (Bernh. vid.); neu für Westdeutschland.
- Oxypoda Doderoi* Bernh. — Ein Stück von mir im Soonwald bei Stromberg gefunden (Bernh. determ. it.) anscheinend neu für Deutschland.
- Oxyp. nigrocincta* Rey. — Ein Stück von Düsseldorf aus der Fußschen Sammlung von Bernh. bestimmt; anscheinend neu für Deutschland.
- Aleochara erythroptera* Grav. — Ein Stück ♂ sah ich aus der Sammlung Urban von Duisburg; aus Nassau bekannt.
- Euplectus piceus* Motsch. — Von Kreuznach zahlreich in der Sammlung vom Bruck als *sulcatulus* Sauley mit „Sauley gesehen“. — Aus dem Taunus bekannt.
- Brachygluta Helfer* Schmidt. — Von Kreuznach in der Sammlung vom Bruck mit „Sauley gesehen“ — Salzbodenbewohner, Nauheim u. a.
- Nemadus colonoides* Thoms. — Ein Stück von mir im Nettetal gefunden (Heyd. vid.); aus Nassau bekannt.
- Triarthron Märkeli* Schmidt. — Vor 1850 in einem noch in seiner Sammlung befindlichen Stücke von vom Bruck bei Krefeld gefunden, neuerdings von Urban bei Duisburg (ein Stück); von Frankfurt bekannt.

- Cryptopleurum crenatum* Pz. — Ein Stück von Preiß bei Koblenz gefunden (Heyd. vid.); eins von Urban bei Duisburg; aus Nassau bekannt.
- Hydraena longior* Rey. — Ein Stück (als *angustata* Steph.) in der Fußschen Sammlung von Düsseldorf (Heyd. vid.); aus Westfalen in der Sammlung von Heyden.
- Limnebius crinifer* Rey. — Von Cleve in der Fußschen Sammlung (Gerh. det.); aus Holland bekannt (Cat. Col. 1906).
- Psilothrix cyaneus* Ol. — Aus Westfalen und Nassau bekannt, in der Rheinprovinz, Koblenzer Stadtwald, in einem Stück von Bocklet gefunden.
- Cryptophagus punctipennis* Bris. — Im Nettetal und auf Oberwerth bei Koblenz von mir gefunden (Reitt. determ. it.); noch nicht in Westfalen und Nassau.
- Atomaria bella* Reitt. — Auf Oberwerth in einem Stück von Mühlenfeld gefunden und mir überlassen (Reitt. vid. it.); neu für Westdeutschland.
- Triplax lepida* Fald. — Ein Stück auf Oberwerth von mir gefunden (Heyd. vid.); anscheinend neu für Westdeutschland.
- Cis setiger* Mell. — Bei Bonn von mir gefunden (Schilsky det.); aus Nassau bekannt.
- Clitosthetus arcuatus* Rossi. — Auf der Schmittenhöhe gegenüber Koblenz von mir gefunden (Weise vid.); aus Nassau bekannt.
- Stenelmis consobrina* Duf. — Bei Lützel-Koblenz von Bocklet, im Nettebach von mir gefunden; von Nassau (Buddeberg) bekannt.
- Corymbites virens* Schrk. — Ein Stück von Mühlenfeld bei Trier gefunden. Von Hockai (belgische Seite des Hohen Venn) in zwei Stück bekannt (Frédéricq).
- Ischnodes sanguinicollis* Pz. — Von Bonn (Bertkau) in der Sammlung von Heyden, bei Koblenz von Bocklet gefunden und mir überlassen; aus Westfalen und Nassau bekannt.

- Anthaxia Godeti* Lap. — An der Unterahr in einem Stück von v. Heyden gefunden; aus Nassau bekannt.
- Ptosima undecimmaculata* Hbst. — Alljährlich einzeln auf der Blumslay bei Winnigen von Bocklet gefunden; aus Nassau bekannt.
- Pytho depressus* L. — Nach Westhoff S. 308 seit 1881 in Westfalen gefunden und wahrscheinlich aus dem Norden eingeschleppt und eingebürgert, findet sich in der Rheinprovinz nunmehr ebenfalls, so bei Dinslaken (v. Heyden), Duisburg (Bocklet).
- Anthicus bifasciatus* Rossi. — Von Bocklet nach Moselhochwasser in einem Stück bei Koblenz gefunden; Mombacher Sand bei Mainz.
- Anaspis Regimbarti* Schilsky. — Von mir bei Koblenz in einigen Stücken gefunden (Schilsky det.) sonst in der Normandie.
- Asida sabulosa* Goeze. — Die Einwanderung durch das Moseltal scheint jetzt nachweisbar. Die Art findet sich insbesondere in der Umgebung des Laacher Sees, bei Koblenz und Boppard; dann fand sie Bertkau bei Cochem, ich bei Cochem und auf der Marienburg bei Bullay, Mühlenfeld bei Trier, während sie am Rhein oberhalb Boppard noch nicht nachgewiesen ist, in Westfalen und Nassau fehlt.
- Helops laevioctostriatus* Goeze. — Alle *Helops* aus der Rheinprovinz, die ich erreichen konnte (von Viersen, Gladbach, Krefeld, Bonn, Koblenz, das eine noch in der Sammlung Cornelius als *quisquilius* F. befindliche Stück von Elberfeld) gehören dieser Art an (Heyd. vid. omn.).
- Gaurotes virginea* L. — In Sammlung Bocklet von Jünckerath; aus Westfalen bekannt.
- Leptidea brevipennis* Muls. — Ein gewiß eingeschlepptes Stück fand ich in der Stadt Koblenz (Heyd. vid.); in Holland vereinzelt, in Belgien stellenweise sehr häufig (Everts, Deutsche E. Z. 1907 S. 374).

- Clytus arvicola* Ol. — Ein Stück von der Ahr in der Sammlung Fuß, eins von Bonn in der Sammlung Bertkau (Heyd. vid.); aus Nassau ein Stück bekannt.
- Pogonochaerus decoratus* Fairm. — Ein Stück von Bonn in der Sammlung Bertkau (Heyd. vid.). — Frankfurt.
- Cryptocephalus primarius* Harold. — Alljährlich einzeln auf der Blumslay bei Winnigen von Bocklet gefunden (Heyd. vid.); neu für Westdeutschland.
- Gastroidea viridula* Deg. — Unterhalb Rhens am Rheinufer und an der Biewermündung bei Trier von mir gefunden. Aus Westfalen bekannt.
- Chrysomela analis* L. — Von Boppard in der Sammlung vom Bruck, bei Koblenz von Bocklet gefunden; aus Westfalen und Nassau bekannt.
- Chrys. rufoaenea* Suffr. — Bisher aus Westdeutschland nur in einem Stück von Nassau (Buddeberg) bekannt, von Bocklet in einem Stück aus Moselgenist gesiebt (Reitt. vid.) — sonst Frankreich.
- Aphthona laevigata* F. — Bei Walporzheim von mir zwei Stück gesiebt (J. Dan. vid.); neu für Westdeutschland.
- Cneorrhinus exaratus* Marsh. — Stücke von Rheydt (Beckers), in der Sammlung Geilenkeuser (Heyd. vid.); sonst Frankreich.
- Larinus turbinatus* Gyll. — Aus Nassau bekannt, von mir an der Unternahe und bei Stromberg gefunden (Reitt. vid.).
- Ceutorrhynchus carinatus* Gyll. —
 „ *moguntiacus* Schlze. — Beide von Mainz bekannt, fand ich ersteren bei Stromberg, letzteren bei Koblenz (Oberst Schultze det.).
- Hylesinus oleiperda* F. — Bei Saarlouis (Degenhardt) gefunden (v. Heyden), fand ich in einem Stück am Laacher See (Heyd. vid.); aus Nassau bekannt.

- Trox Perrisi* Fairm. — Ein Stück dieser aus Westfalen und Nassau noch unbekannten Art fand v. Heyden an der Unterahr. Aschaffenburg (Flach, Deutsche E. Z. 1879, Haroldi n. sp.).
- Aphodius brevis* Er. — Aus Westfalen bekannt, in der Sammlung Fuß von Walporzheim, Mühlenfeld fand die Art bei Trier.
- Aph. lugens* Creutz. — Ich fand ein Stück bei Strotzbüsch in der Eifel (Schilsky vid.); aus Westfalen bekannt.
- Hoplia praticola* Dft. — Bei Trier zahlreich von Mühlenfeld gefunden (Heyd. vid.); aus Westfalen und Nassau bekannt.
- Trichius sexualis* Bed. — Bei Koblenz in drei Stück (♀) von Bocklet gefunden, die v. Heyden und Schilsky vorgelegen haben; noch nicht in Westfalen und Nassau.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [64](#)

Autor(en)/Author(s): Roettgen C.

Artikel/Article: [Dritter Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz 219-225](#)

