

Die Käfer der Rheinprovinz.

Von

C. Roettgen.

Vorbemerkung.

I. Der Beginn der planmäßigen Durchforschung der Käferfauna der Rheinprovinz fällt in das fünfte Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts. Schon 1841 hatte Bach damit angefangen und, wie er in dieser Zeitschrift 1851 mitteilt, ein Verzeichnis der bei Boppard aufgefundenen Käfer für seine Schüler herausgegeben. Es ist ganz verschollen. Dann ging Förster in Aachen, gestützt auf die Mitarbeit von Mink und vom Bruck in Krefeld, Braselmann und Hildebrand in Düsseldorf, Cornelius in Elberfeld, Bach in Boppard sowie Kaltenbach und Heinemann in Aachen, Pliester in Homberg und Stollwerck in Ürdingen, an die Zusammenstellung der im ganzen Gebiet gesammelten Erfahrungen, die 1849 als „Übersicht der Käferfauna der Rheinprovinz“ erschien. Sie weist 2747 Arten auf. Bald, von 1851 bis 1860, mit letztem Nachtrag 1866, folgte die beschreibende „Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preußischen Rheinlande“ von Bach. An faunistischen Einzelheiten für die Rheinprovinz viel reichhaltiger und vor allem zuverlässiger als das Förstersche Verzeichnis ermöglichte sie einen durch zahlreiche Nachträge und Verbesserungen freilich beeinträchtigten Überblick über die Käfer des Gebiets. Zu den alten Gewährsmännern sind hinzugereten außer Kraatz für die Ahr und Bonn, Eigenbrodt und Wirtgen in

Koblenz, v. Hagens in Düsseldorf, Fuß in Ahrweiler und Tischbein in Birkenfeld.

Inzwischen war in der Stettiner Entomologischen Zeitung 1852 und 1853 erschienen die „Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera“ von Zebe. Ihre Angaben beruhen für die Rheinprovinz auf Förster und Bach sowie unbekannten Quellen. Bach hat sie nur berichtigend berücksichtigt.

Damit schließen zunächst die die ganze Provinz umfassenden Darstellungen.

Ein unvollendet gebliebenes „Verzeichnis der Käfer der Umgegend von Trier“ veröffentlichte 1855 Schnur in den Schriften der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier. Von 1857 bis 1868 werden in der Berliner Entomologischen Zeitschrift zahlreiche Entdeckungen von v. Hagens, Eichhoff, Kraatz und besonders in fast jährlichen Sammelberichten von Fuß niedergelegt. Viel Neues über die Staphyliniden des Gebiets, hauptsächlich auf Fuß und vom Brück beruhend, enthält die 1867 begonnene Faune Gallo-rhénane von Fauvel. Auf geraume Zeit bis zum „Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft“ von Cornelius, 1884, werden dann nur vereinzelte Beobachtungen meist in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift bekanntgegeben, umfangreichere von de Rossi in Neviges in dieser Zeitschrift 1882.

Erst 1888 gab wieder eine Übersicht für das ganze Gebiet Schilsky im Verzeichnis der Käfer Deutschlands, wertvoll durch Berücksichtigung des seit Förster entdeckten, doch infolge der notwendigen Aufnahme jeder, auch veralteten Angabe nicht überall ausreichend.

Seitdem erschienen von de Rossi 1894 und 1898 Mitteilungen über Funde bei Neviges, von Geilenkeuser in Elberfeld 1896 ein umfangreicher Nachtrag zum Verzeichnis von Cornelius und 1908 die Käferfauna der Hildener Heide, vom Verfasser 1894, 1907 und für das weniger bekannte untere Nahetal 1899 faunistische Beiträge.

Von den die Nachbargebiete behandelnden Werken enthalten die Coleoptera Neerlandica von Everts, 1899 bis 1903, viele zum Teil auf eigenen Quellen beruhende Angaben für die Provinz, und für das Hohe Venn ist bemerkenswert die Zusammenstellung der in seinem belgischen Teil gemachten Funde von Fredericq, 1904.

Daneben hatte im stillen die Arbeit an der Käferfauna des Gebiets ihren Fortgang genommen.

Vor allen lagen ihr ob von Heyden 1881 bis 1901, besonders an der unteren Ahr, Bocklet etwa seit 1880 in der Gegend von Koblenz, Gabriel 1891 bis 1895 besonders bei Saarlouis, Mühlendorf 1894 bei Trier, seit 1900 bei Koblenz, Urban 1903 bis 1905 in Duisburg, Andreae seit 1907 im Brohltal und Ulbricht seit 1908 in Krefeld, Heymes bei Eupen. Die gesamte Fauna und Flora der Eifelmaare wurde 1910 von mehreren Fachmännern und im Anschluß daran die Käferfauna der Schneifel von Reichensperger und le Roi untersucht.

Das neueste Werk, „Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreichs“ von Schilsky, 1909, enthält für die Rheinprovinz, neben dem aus den älteren Quellen Entnommenen, vom Verfasser herrührend, das Ergebnis seiner damals noch nicht abgeschlossenen Vorarbeiten für das vorliegende Verzeichnis.

* * *

Wie dieser kurze Überblick wohl erkennen läßt, steht dem Umfange nach die den heimatlichen Käfern zugewandte Tätigkeit kaum hinter der in den Nachbargebieten, wie sie in den Faunen von Westfalen und Nassau-Frankfurt dargestellt ist, zurück; schon früh beginnend, das Förstersche Verzeichnis ist eins der ältesten der von Schilsky angeführten, ist sie bis in die neueste Zeit fortgesetzt worden. Er zeigt aber auch, daß die tatsächliche Kenntnis der Käferfauna nicht der dort durch einheitliche Verzeichnisse ermöglichten entsprechen kann. Abgesehen von vielem in den neueren und auch älteren Sammlungen

unverwertet Ruhenden, bietet das Schrifttum nur einen unübersichtlichen, teilweise recht alten und keiner Nachprüfung unterzogenen Stoff dar. Ein neues Verzeichnis durfte daher als lohnende Aufgabe erscheinen.

II. Die Grenzen des Gebietes, das dem Verzeichnis zugrunde zu legen war, mußte der politische Umfang der Rheinprovinz abgeben, doch unter Ausschluß des getrennten, faunistisch zu Nassau gehörenden Kreises Wetzlar und Einbeziehung des oldenburgischen Einschlusses Birkenfeld. Eine Abrundung war weiter geboten in der Berücksichtigung der nachbarlichen Grenzstriche, wenn, wie besonders in der Tiefebene, auf dem Hohen Venn und bei Eupen, jede natürliche Grenze fehlt. Weitergehende Übergriffe in den alten Quellen sind für das Zebesche Verzeichnis sicher, für Förster nach seiner Vorbemerkung nicht anzunehmen, Bach hat in einigen Fällen rechtsrheinische, nassauische Funde schlechtin für das linksrheinische Boppard angegeben.

Dieses Gebiet fällt fast ganz — ausgenommen ist das Nahetal — in die einen Teil der Nordregion seiner gallisch-rheinischen Fauna bildende „rheinische Subregion“ Fauvels, zu der noch Belgien, Holland, Teile von Westfalen, von Nassau und Rheinbayern, Lothringen und Teile von Nordfrankreich gezogen werden, und als deren östliche Grenzen insbesondere Vogesen, Hunsrück und Taunus bezeichnet sind. Ob die Umgrenzung der Fauvelschen Fauna richtig ist, mag hier dahingestellt bleiben; anscheinend hat ihr ein weitgehendes Abrundungsbedürfnis zugrunde gelegen. Die genannten Gebirge bilden zwar eine natürliche Grenze, und tatsächlich weist auch das durch den Hunsrück abgeschnittene untere Nahetal, dem Mainzer Becken und damit den südwestdeutschen Faunen anhörend, einige Vorkommnisse auf, die ihm in der Rheinprovinz eine Sonderstellung geben¹⁾.

1) Es sind *Betarmon ferrugineus*, Arten von *Hymenalia*, *Anoncodes*, *Omophlus*, *Haltica tamaricis*, *Larinus turbinatus*

Doch ist die Käferfauna der Rheinprovinz im übrigen, von Westfalen und Nassau, wie das systematische Verzeichnis der Käfer Deutschlands von Schilsky zeigt, keineswegs von der Mitteldeutschlands so verschieden, daß ihre Zuweisung zu einer sonst fremden Fauna begründet wäre. Und schließlich, auch der Hunsrück und die Eifel bilden natürliche Grenzen nach Westen, nur unterbrochen durch die Einwanderungsstraße der Mosel, wie Hunsrück und Taunus durch die des Rheins.

III. Die Käferfauna, neben der von Aachen und Saarlouis am besten bekannt für die östlichen, dem Rhein näher liegenden Landstriche, weniger für die Eifel, am wenigsten vom Hunsrück und der mittleren Sieg, zeigt bei Abweichungen, die oft wohl nur auf Unzulänglichkeit der Beobachtungen beruhen, viel Übereinstimmung mit den in der Regel zum Vergleich angezogenen Faunen von Holland, Westfalen und auch Nassau-Frankfurt. Außerdem weist sie entsprechend den großen Einwanderungsstraßen Rhein und Mosel Vorkommnisse des weiteren Westens, Ostens und Südens auf.

Erst in der Neuzeit ist sie bereichert worden durch die nachweisbare Einwanderung von *Pytho depressus* und *Geotrupes niger* von Norden her und durch Einschleppung des bei Stromberg eingebürgerten, dem weiteren Osten angehörigen *Acupalpus interstitialis*, des *Lathridius Bergrothi* und wohl auch *Lathridius nodifer*, den Bach noch nicht anführt. Auf jedesmaliger Einschleppung dürfte beruhen das Vorkommen von *Lyctus brunneus* *Gnathocerus cornutus*, *Araeocerus fasciculatus*, *Acanthoscelides irssectus*, *Calandra oryzae*, *Coccotrypes dactyliperda*.

Eine kleine Gesellschaft von Salzbodenbewohnern findet sich allein an den Salinen von Kreuznach: *Dyschirius*

und *Ceutorrhynchus carinatus*, die sonst in der Provinz nicht, oder nur in einzelnen, mutmaßlich verschlagenen Stücken beobachtet sind.

chalceus, *Bembidion aspericolle*, *Acupalpus elegans*, *Trogophloeus halophilus*, *Bledius spectabilis*, *Brachygluta Helferi*; die Salzbodenstelle oberhalb Merzig an der Saar bedarf jedoch noch der Untersuchung.

Als sicher einheimisch dürfen schon etwa 3550 Arten betrachtet werden, zu denen noch manche Fremdlinge treten. Nassau-Frankfurt weist nach dem Verzeichnis von von Heyden 3548 Arten, Holland über 3300 auf; Westhoff gibt 1881 für Westfalen einschließlich Elberfeld 3221 Arten an, welche Zahl sich nach Reeker, Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins 1887, schon auf 3345 erhöht hatte.

Die faunistische Unterteilung des Gebiets ist im großen gegeben durch den Gegensatz der nieder-rheinischen Tiefebene zum Mittelgebirge, dem rheinischen Schiefergebirge mit Eifel, Hunsrück und dem rechtsrheinischen Berggelände; daneben steht ziemlich selbständige das schon angeführte, dem Mainzer Becken angehörende untere Nahtal.

Die für dieses bezeichnenden Vorkommnisse sind angegeben; für die Tiefebene kommen als solche in Betracht: *Dyschirius arenosus*, *Agabus neglectus*, *Ilybius aenescens*, *Medon dilutus*, *Atheta arenicola*, *Limnebius crinifer*, *Ebaeus lobatus*, *Cerapheles terminatus*, *Caenopsis Waltoni*, *Polydrosus impressifrons*, *Strophosomus curvipes*, *Sitona gemellatus*, *Cneorrhinus exaratus*.

Während die Tiefebene eine weitere Teilung wohl kaum zuläßt, fehlen für das Mittelgebirge mit seiner viel größeren Mannigfaltigkeit der Bodenbeschaffenheit im allgemeinen dazu noch die Unterlagen, doch lassen sich wenigstens einzelne gut gekennzeichnete Bezirke ausscheiden.

So vor allem das subalpine Gebiet des Hohen Venn mit *Agonum ericeti*, *Cymindis vaporariorum*, *Agabus congener* v. *Venturii*, *Acrulia inflata*, *Corymbites Heyeri*, *Oedemera tristis*, *Cryptocephalus frenatus*. Zwar liegen deren bekannte Fundstellen mit Ausnahme

der des *Agabus* alle auf der belgischen Seite seiner von der Grenze geteilten höchsten Erhebung, der Baraque Michel und Botrange von 675 und 692 m, doch ist die Beschaffenheit der Landschaft so gleichartig, daß es für die rheinländische Seite wohl nur noch der Auffindung bedarf; *Acrulia inflata* und *Corymbites Heyeri* sind schon im Grenzgebiet des Hohen Venn bei Eupen nachgewiesen. Weitere, gleich zu bewertende Vorkommnisse von Eupen sind: *Phyllodrepa vilis*, *Omalium septentrionis*, *Lesteva monticola*, *Athous Zebei*, *Dryocoetes alni*.

Vermutlich bildet auch der Hunsrück um den 816 m hohen Erbeskopf eine ähnliche subalpine Insel. Die Ortsnamen Morscheid, Bruchhausen weisen auf alte Moorgebiete hin, wie sie das Hohe Venn in großem Umfang besitzt; *Oedemera tristis*, von Hockay am Hohen Venn bekannt, ist auch dort, in Birkenfeld, gefunden worden, und schon der bedeutend niedrigere Soonwald hat die bisher nur aus dem Norden bekannte *Atheta rivulorum*, *Liosoma oblongulum*, *Notaris v. montanus*.

Die Fauna von Elberfeld, von Westhoff zum westfälischen Gebirgsland gezogen, aber auch viele Verwandtschaft mit der holländischen zeigend, besitzt ausschließlich: *Hydroporus septentrionis* und *Sanmarki*, *Gyrinus Suffrani*, *Quedius auricomus*, *Pidonia lurida*, *Otiorrhynchus gemmatus*, dem Norden oder höheren Mittelgebirge angehörige Arten.

Auch das untere Ahrtal kann als gut gekennzeichneter Bezirk gelten. Außer dem jetzt auch anderweit aus der Provinz bekannten *Stenus glacialis* sind dort allein gefunden an zum Teil sonst südlichen und östlichen Arten: *Trogophloeus Mannerheimi*, *Pseudobium labile*, *Philonthus coerulescens*, *Borboropora Kraatzi*, *Acritus homoeopathicus*, *Anthaxia Godeti*, *Gynandrophthalma flavicollis*, *Aphthona laevigata*, *Otiorrhynchus rugosostriatus*, *Nanophyes flavidus*, *Trox Perrisi*.

Als Einwanderungsstraße aus dem Westen und weiter dem Süden stellt sich das Moseltal dar. Ihm

gehören teilweise ausschließlich von Arten dieser Herkunft an: *Leistus montanus*, *Chlaenius velutinus*, *Ptosima undecimmaculata*, *Cteniopus sulphureus*, *Asida sabulosa*, diese letztere am Rhein im Bereich der Moselmündung weiter verbreitet, *Clytus glabromaculatus*, *Cryptocephalus primarius*, *Otiorrhynchus Marquardti*.

Das Rheintal von der Nahe bis zur Mosel und weiter abwärts bis zu seiner Verbreiterung bei Bonn ist die Einwanderungsstraße nach dem Norden. Ihm gehören an: *Nebria picicornis*, *Denops albofasciata*, *Purpuricenus Kaeheri*, *Callimus angulatus*, *Coptocephala rubicunda*, *Cassida canaliculata*, *Otiorrhynchus armadillo*, *Chlorophanus dorsiger* und *Trichius sexualis*; nur zwischen Boppard und Koblenz der auch bei Duisburg gefundene *Rhizotrogus marginipes*. Seine Verbreiterung bei Boppard weist eine Anzahl Arten auf, die sich im Gebiet von Nassau-Frankfurt, weiter aber noch nicht in der Provinz finden, so *Scydmaenus Hellwigi*, *Pycnomerus terebrans*, *Adelocera quercea*, *Dicerca alni*, *Eurythyrea scutellaris*, *Cryptocephalus querceti*, *Bradybatus Creutzeri*, *Eremotes reflexus*.

Die Eifel, der Hunsrück und der rechtsrheinische Abfall des westfälischen Gebirgslandes zum Rheintal werden jedenfalls auch noch faunistische Besonderheiten aufweisen, wie die begonnene Untersuchung der Schneifel schon in *Agabus melanarius* und *Crenitis punctatostriata* ergeben hat.

IV. Der Durchforschung des Gebiets lagen ob neben Kraatz, dessen Staphyliniden in der Naturgeschichte der Insekten Deutschlands dafür zeugen, und von Heyden, der von 1881 bis 1901 als Oberleiter der Reblausbekämpfungsarbeiten in der Provinz, besonders an der unteren Ahr tätig war, die nachfolgend Verzeichneten:
Andrae, Hans, Chemiker, zu Burgbrohl, sammelt seit 1907.

Bach, Michael, Dr. phil. h. c., geb. 19. 3. 1808, gest. als Seminardirektor zu Boppard 17. 4. 1876. Sein Hauptwerk die „Käferfauna für Nord- und Mittel-

deutschland mit besonderer Rücksicht auf die preußischen Rheinlande“.

Beckers, Gustav, geb. 1847 zu Müllfort bei Odenkirchen, gest. 8. Juli 1895 als Seminarlehrer zu Rheydt.

Bertkau, Philipp, Dr., Professor an der Universität Bonn, Zoologe, gest. 1895. — Nachruf Verhandl. Nat. Ver. Rheinl. u. Westf. 1896 S. 9. —

Bocklet, Konrad, Präparator, Koblenz-Lützel, sammelt seit etwa 1880 in der weiteren Umgebung von Koblenz.

Bocklet, Bernhard, Sohn des vorigen.

Braselmann, J. E., Schullehrer in Düsseldorf, Gewährsmann bei Förster, gest. 1872.

Brink, Robert, Inhaber einer Anstalt für zoologische Lehrmittel und Präparator, Krefeld.

vom Bruck, Emil, Kommerzienrat, Krefeld, gest. 1884, Gewährsmann im Försterschen Verzeichnis. — Nachruf D. E. Z. 1884. —

Cornelius, Carl, Realschuloberlehrer, gest. 1885 zu Elberfeld, wo er seit 1833 sammelte. Von seinen zahlreichen Schriften kommt hier in Betracht das Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und Umgebung, das Ergebnis einer fünfzigjährigen Tätigkeit.

Crumbach, Privatlehrer zu Düsseldorf, Botaniker und Staphyliniden-Sammler nach Mitteilung von Fuß, um 1850 gest., Gewährsmann bei Bach.

Degenhardt, Oberförster in Saarlouis zur Zeit Bachs.

Dormeyer, Carl, Dr. phil., Chemiker, Stettin, sammelte von 1890 bis 1896 im Gebiet, besonders bei Bonn.

Drescher, Rudolf, Bauinspektor in Czarnikau, sammelte um 1884 in Elberfeld; viele seiner Funde im Geilenkeuser'schen Nachtrag zum Verzeichnis von Cornelius.

Eichhoff, Wilh. Joseph, Oberförster, zuerst in Hilchenbach in Westfalen, dann in Saarbrücken, um 1866 bei Jülich; geb. 1823 in Prüm, gest. 1893 in Straßburg. Monograph der Bostrychiden (Ipiden).

Eigenbrodt, Lehrer in Ehrenbreitstein, gest. um 1869,
Gewährsmann bei Bach.

Fischer, Otto F., Krefeld.

Förster, Arnold, Prof. Dr., geb. 1810, gest. 1884 als
Lehrer an der Gewerbeschule zu Aachen. Verfasser
der 1849 erschienenen Käferfauna der Rheinprovinz.
— Nachruf D. E. Z. 1884. —

Frings, Carl Ferdinand, Bonn, Lepidopterologe. Eine
größere Anzahl bemerkenswerter Käferfunde sind
ihm zu verdanken.

Fuß, Hermann, geb. 15. Mai 1824 in Geldern, sammelte
nach 1845 in Düsseldorf, von 1850 bis 1866 in Ahr-
weiler, bis 1889 in Kleve. Justizrat, seit 1890 in Bonn.

v. Hagens, Josef, Dr. jur., geb. 1826, gest. als Land-
gerichtsrat a. D. 1899 in Düsseldorf. Sammelte in
Düsseldorf, Elberfeld und Kleve anfangs Coleopteren,
wendete sich später den Hymenopteren, besonders
den Ameisen zu.

Heinemann, Apotheker aus Duisburg, zur Zeit Försters
in Aachen, Gewährsmann im Försterschen Verzeich-
nis, gest. in Aachen 1896.

Henseler, Carl, Lehrer in Düsseldorf, sammelt dort.

Heymes, Pierre, Sekretär, Zolver in Luxemburg, sam-
melt seit Jahren in der Provinz, besonders bei Eupen.
Spezialist für eine Reihe von Familien und einzelne
Gattungen (Entomol. Blätter 1911 Nr. 2/3).

Hildebrand, Theodor, geb. 1804 zu Stettin, Professor
an der Malerakademie zu Düsseldorf, dort gest. 1874,
Gewährsmann im Verzeichnis von Förster.

Gabriel, Generalmajor z. D., Neiße. Als Regiments-
kommandeur in Saarlouis 1891—1895.

Geilenkeuser, Wilh., Rektor a. D., Elberfeld, vordem
in Borbeck. Verfasser des Nachtrags zum Verzeich-
nis der Käfer von Elberfeld.

Geyr v. Schweppeburg, Hans, Frh., Forstreferendar,
Haus Müddersheim bei Düren, sammelte 1905 im
Soonwald, Oberförsterei Neupfalz.

Kaltenbach, J. G., Lehrer an der höheren Bürgerschule in Aachen, gest. 1876. Verfasser der Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten. Gewährsmann bei Förster und Bach.

Meigen, Joh. Wilh., gest. 1845 als Sekretär der Handelskammer in Stolberg bei Aachen. Der erste Dipterologe seiner Zeit. Einige seiner Käferfunde im Försterschen Verzeichnis.

Mink, Wilh., Oberlehrer am Realgymnasium zu Krefeld, dort geb. 1807, gest. 1883. Gewährsmann bei Förster.

Mühlenfeld, Carl, preuß. Oberleutnant a. D., Horchheim. Sammelte 1894 bei Trier, 1895 bei Elberfeld, dann in Nassau, seit 1900 bei Koblenz.

Müller, Robert, Dr. med., Arzt, geb. zu Greisau, sammelt seit 1907 in Elberfeld.

Ostheide, Heinr., Leeds. Sammelte 1884 bei Elberfeld. Viele seiner Funde im Geilenkeuserschen Nachtrag zum Verzeichnis von Cornelius.

Pliester, H., Lehrer in Homberg, gest. nach 1870. Gewährsmann bei Förster.

Preiss, Paul, Büreauchef der Pfälzer Eisenbahnen in Ludwigshafen a. Rhein. Sammelte vor 1890 bei Koblenz.

Radermacher, Peter, Lehrer in Duisdorf, sammelt dort, früher bei Löhndorf und Stommeln.

Rantzau, Graf v., gest., Gewährsmann bei Förster.

Reichensperger, August, Dr. phil., Zoologe, Privatdozent an der Universität Bonn.

Roettgen, Carl, Amtsgerichtsrat, Koblenz, der Verfasser. Sammelte bei Bonn, Kochem, von 1895 bis 1903 in Stromberg (Hunsrück), seitdem in Koblenz.
le Roi, Otto, Dr. phil., Zoologe, Bonn. Sammelte besonders im Hohen Venn und in der Eifel.

de Rossi, Gustav, geb. 1841 zu Düsseldorf, gest. 1899 als Postvorsteher in Neviges, wo er seit etwa 1871 sammelte. Seine zahlreichen Funde sind veröffentlicht teils in dieser Zeitschrift, teils in den Jahresberichten

des Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst.

Schauß, Rudolf, Dr. phil., Gymnasialoberlehrer, Godesberg.

Schneider, Wilh., Lehrer in Hamborn.

Schnur, J., Oberlehrer an der höheren Bürgerschule in Trier, gest. 1860. Verfasser eines Verzeichnisses der Trierer Käfer.

Schultze, August, gest. als preuß. Oberst a. D. 1907 in München. Nachruf Münch. Kol. Zeitschrift III. Ceutorrhynchinen-Spezialist. Sammelte in Düsseldorf, Köln und Koblenz.

Stachelhausen, Gustav, Dr. med., Arzt in Barmen, dort geb. 1810, gest. 1. Dezember 1870. Viele seiner Funde bei Cornelius und Geilenkeuser.

Steinicke, Heinrich, Maler in Düsseldorf, gest. um 1905.

Stollwerck, F., Lehrer in Ürdingen, Verfasser eines 1863 erschienenen, noch heute nicht veralteten Verzeichnisses der Lepidopteren der preußischen Rheinlande, Gewährsmann bei Förster.

Tischbein, Oberförster in Herrstein in Birkenfeld zur Zeit Bachs. Eine Anzahl seiner Funde von Bach angegeben, sonst Hymenopterologe. Gest. 1883 als Oberforstmeister in Eutin.

Ulbricht, Albert, Druckereibesitzer, Krefeld. Sammelt dort seit 1908.

Urban, C., Dr., Gewerbeinspektor in Schönebeck. Sammelt in Duisburg 1903—1905.

Verhoeff, Carl, Dr. phil., Zoologe, Kannstatt. Sammelt in Bonn bis 1900.

Voigt, Dr., Professor an der Universität Bonn, Zoologe.

Wirtgen, Philipp, Dr. phil. h. c., geb. 1806, gest. 1871, Lehrer in Wittingen und Koblenz, Botaniker. Lebensbild im 23. Jahrgang der Lehrerzeitung für Westfalen, die Rheinprovinz usw. Nr. 44, 45.

V. Die Unterlagen des Verzeichnisses gab ab zunächst das Schrifttum seit dem Försterschen Verzeichnis.

Alle Artangaben wurden aufgenommen, von mehreren gleichen in der Regel die nicht immer älteste des Gewährsmanns; allgemein gehaltene Angaben, wie „ganz Deutschland“ und ähnliche, die die Verallgemeinerung erkennen lassen, blieben unberücksichtigt. Stillschweigende Bichtigungen durch Übergehen wurden nicht vorgenommen, auch dann nicht, wenn eine solche oder ausdrückliche, wie besonders gegenüber Förster und Zebe durch Bach und Cornelius schon vorlag; sie verboten sich, weil manche alten Irrtümer auch in neueren Werken, so der Fauna Germanica, wiederkehren.

Folgende Hauptwerke sind benutzt:

1. Die Übersicht der Käferfauna der Rheinprovinz von Förster und sein Nachtrag dazu. — Verhandl. Nat. Ver. Rheinl. u. Westf. 1849. —

Die veraltete Nomenklatur läßt oft, — zumal die umgearbeiteten Sammlungen, auch die Förstersche, keine Stütze mehr abgeben, — keine sichere Deutung zu; manche Angaben sind auch von vornherein als unrichtig erkennbar; so viele sind aber teils durch den Befund noch erhaltener Sammlungen, teils durch neuere Funde bestätigt, daß die Übersicht im allgemeinen als zuverlässig betrachtet werden darf.

Entnommen wurden ihr alle Artangaben, von den Fundorten meist nur die Hauptorte Aachen, Krefeld, Düsseldorf, Boppard; für Elberfeld liegt das Verzeichnis von Cornelius vor, und die weiteren Fundorte bei Förster befinden sich überwiegend in der Nähe jener Hauptorte, sind daher ohne besondere Bedeutung. Die Fundangaben für Homberg sind schon von Bach als unzuverlässig erkannt und regelmäßig übergangen worden.

Vielfach gibt Förster keine Fundorte an, im allgemeinen bei überall häufigen Arten, mitunter scheint jedoch dabei eine unrichtige Verallgemeinerung vorgenommen; dem ist Rechnung getragen durch Anwendung der Bezeichnung „Rheinprovinz“.

2. Die Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland

mit besonderer Rücksicht auf die preußischen Rheinländer von Bach und sein Nachtrag zu der Försterschen Übersicht, die Entomologischen Kleinigkeiten, in Verhandl. Nat. Ver. Rheinl. u. Westf. 1851.

Im Nachtrag fehlen meistens die Autornamen, wodurch die Deutung mitunter unmöglich wird; oft sind die Angaben auch nicht in der Käferfauna wiederholt, und auf sie allein die Annahme des Vorkommens einer Art nicht zu gründen.

Die Käferfauna enthält vor allem viele neuen Funde besonders von Boppard (Bach), Krefeld (in der Regel vom Brück) und Düsseldorf, öfter, wenn von Förster nur die Rheinprovinz schlechthin angegeben, die Einzelfundorte. Ihre allgemein gehaltenen Angaben „überall“, „über ganz Deutschland“ sind nicht berücksichtigt. Keinen Wert hat auch das *, das die Art als einheimisch bezeichnen soll; es ist, wie Bd. 1 S. 414 zugegeben wird, unzuverlässig und fehlt von Bd. 2 S. 149 an ganz.

Wichtig sind weiter die drei ersten Bände für die Deutung der Nomenklatur Försters, in der die Bedeutung eines Namens mitunter von der heutigen ganz abweicht.

Geringer ist das Ergebnis für die Beurteilung der Försterschen Angaben selbst; dessen Fundorte sind bald sämtlich, bald teilweise wiederholt, mitunter wird auch die Art nicht mehr für das Gebiet angeführt, ohne daß, abgesehen von dem hervortretenden Mißtrauen gegen den Fundort Homberg, ein Grund für die Abweichungen immer erkennbar ist. Ihre Bewertung bleibt deshalb oft unsicher, wenn nicht etwa der einzige Förstersche Fundort Boppard fehlt.

3. Das Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft von Cornelius, in den Jahresberichten des Naturwissenschaftlichen Vereins in Elberfeld 1884. Es weist rund 2300 Arten nach. Die älteren Angaben von v. Hagens und Cornelius selbst in den Käfern Westfalens von Westhoff sind damit überholt und konnten regelmäßig unberücksichtigt bleiben.

4. Der Nachtrag zu dem Verzeichnis von Cornelius von Wilhelm Geilenkeuser, 1896 in derselben Zeitschrift erschienen. Die umfangreiche Zusammenstellung umfasst ausser den zum Teil schon anderwärts veröffentlichten Funden von de Rossi die v. Hagenschen aus dem Rheinteil des Kreises Solingen und zahlreiche des Verfassers und anderer Elberfelder Sammler.

5. Das Verzeichnis der Käfer der Umgegend von Trier von Schnur, 1855 in den Jahresberichten der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier erschienen.

Die unvollendet gebliebene, die Familien bis zu den Scarabaeiden einschließlich umfassende Zusammenstellung enthält manche sehr zweifelhaften Angaben, beispielsweise: *Drypta emarginata*, *Polystichus connexus*, *Chlaeniuss festivus*, die die Verlässlichkeit der übrigen beeinträchtigen. Ihr sind entnommen die sonst aus der Provinz nicht angegebenen Arten, weiter nur die wichtigeren.

6. Die Faune Gallo-rhénane von Fauvel und Nachfolgern. Im dritten, unvollendet gebliebenen Band, den Staphyliniden, von Fauvel, ist die Rheinprovinz eingehend berücksichtigt nach den Angaben in den Werken von Förster, Bach, den Angaben von vom Bruck, Fuß und Mink und mitunter dem Befund der Sammlungen von vom Bruck, Förster und Mink. Band II, die Cicindeliden und einen kleinen Teil der Carabiden behandelnd, ergibt für die Rheinprovinz sehr wenig, Band IV nichts.

7. Die Coleoptera Neerlandica von Everts mit sechs, größtenteils faunistischen Nachträgen in der Tijdschrift voor Entomologie.

Die Rheinprovinz wird eingehend berücksichtigt; neben dem aus Förster, Bach, Cornelius, Geilenkeuser entnommenen finden sich viele neuen Angaben aus nicht mehr zu ermittelnden Quellen und eine Anzahl eigener Beobachtungen. Manche Funde aus Nassau-Frankfurt sind für die Rheinprovinz angeführt.

An der Hand eines Berichts von Everts in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift 1892 S. 205 läßt sich erweisen, daß die neuen Angaben für Krefeld wohl sämtlich irgendwie auf vom Bruck zurückgeführt werden dürfen, unmittelbar vielleicht auf Snellen van Vollenhoven, mit dem vom Bruck lange in Verbindung stand. Für die Nachprüfung ist das von Wichtigkeit, da die vom Brucksche Sammlung unversehrt erhalten ist.

Von Abhandlungen kleineren Umfangs sind benutzt:

1. Die von Fuß, v. Hagens, Eichhoff in der Berliner Entomologischen Zeitschrift 1857 bis 1868 herührenden Berichte.

2. Von de Rossi mehrere Berichte über Käfer aus der Umgebung von Neviges, in dieser Zeitschrift 1882 mit Neubeschreibungen und in den Jahresberichten des Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst 1894 und 1898.

3. Ein Sammelbericht von Beckers in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift 1892 S. 206.

4. Eine Art von Nachlese zu den rheinischen Käfern von Everts in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift 1892 S. 205. — Die Angaben für Krefeld, ohne Quelle, müssen auf vom Bruck zurückgehen, denn von den angegebenen *Gyrophaena laevipennis*, *Stenus exiguus*, *Anthobium Marshami*, *Sphaerius acaroides*, *Rhizophagus Brucki*, *Ernobioides longicornis*, *Otiorrhynchus nigrita* F., *Liopus punctulatus* finden sich so bestimmte Stücke von Krefeld allein in der vom Bruckschen Sammlung.

5. Eine Abhandlung von Fredericq über die Glazialfauna und -flora des Plateau de la Baraque Michel im Bulletin der Académie royale de Belgique von 1904, S. 1263, die Zusammenstellung der im belgischen Teil des Hohen Venn gemachten Funde. Aus ihr sind alle Angaben entnommen, die Arten jedoch, für welche keine Fundorte aus der Rheinprovinz selbst vorliegen, als fraglich angeführt.

6. Die Käferfauna der Hildener Heide von Wilh. Geilenkeuser, in dieser Zeitschrift 1907, Sitzb., Abt. E.

7. Die drei faunistischen Beiträge des Verfassers in dieser Zeitschrift 1894, 1899 und 1907. Sie sind dem Inhalt nach ganz aufgenommen, mit Quellenangabe nur, wenn Berichtigung nötig geworden.

Einzelne Angaben sind entnommen der Berliner Entomologischen Zeitschrift seit 1869, der Deutschen Entomologischen Zeitschrift seit 1875, der Stettiner Entomologischen Zeitung, besonders den älteren Jahrgängen, der Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, der Fauna Austriaca von Redtenbacher, den Verzeichnissen der Käfer Westfalens von Westhoff und Nassau-Frankfurts von von Heyden, der Abhandlung von Leydig „Über Verbreitung der Tiere im Rhöngebirge und Maintal im Hinblick auf Eifel und Rheintal“, in dieser Zeitschrift 1881 S. 43, und den Käfern Mitteleuropas von Ganglbauer, wenig auch, es fehlen meist Fundorte, aus „Deutsche Phytophagen aus der Klasse der Insekten“ von Kaltenbach, in Bd. 13 bis 26 dieser Zeitschrift.

Schließlich ergab noch die Zebesche Synopsis manches, was quellenmäßig nicht belegbar, jeder Nachprüfung entzogen, doch nicht übergangen werden konnte; anscheinend waren öfter holländische Vorkommnisse auf die Rheinprovinz übertragen worden. Von den neuen Angaben der beiden Verzeichnisse von Schilsky sind in der Regel nur die für die Rheinprovinz insbesondere geltenden, nicht die schon verallgemeinerten für ganz Westdeutschland berücksichtigt. Das wenige, was die Reittersche Fauna Germanica über die Rheinprovinz bringt, beruht ersichtlich meistens auf dem erörterten Schrifttum; insoweit erschien eine besondere Erwähnung unnötig. Die „Fauna der näheren Umgebung von Bingen“, in den Programmen der Realschule zu Bingen dargestellt 1866 bis 1873 von Reallehrer Mühr, 1880 und 1881 von Professor Dr. Glaser, bot in den beiden letztgedachten über die Käfer der angrenzenden Teile der Rheinprovinz nichts Neues.

An handschriftlichen Mitteilungen erhielt der Verfasser die den ganzen Sammlungsbestand umfassenden Verzeichnisse von Bocklet, Gabriel, von Heyden, Urban, und die auf wichtigere Funde oder Gruppen beschränkten von Andreae, Brink, Geilenkeuser, Heymes, Mühlenfeld, Preiß, Schneider, Ulbricht, von K. Daniel der Ceutorrhynchen und Baris der Sammlung A. Schultze, von Neumann der Staphyliniden der Sammlung Scriba. Ihnen sei hier für ihre große Mühewaltung bestens gedankt.

Die Sammlungen, deren Einsichtnahme in gleich dankenswerter Weise dem Verfasser ermöglicht wurde, konnten in großem Umfange benutzt werden.

Von den älteren, für die im Schrifttum enthaltenen Angaben wichtigen, kann als verloren bezeichnet werden die von Bach. Sie befand sich, wie von Heyden feststellte, schon 1875 im schlechtesten Zustande, 1879 war sie in Nr. 1 der Entomologischen Nachrichten zum Kauf ausgetragen, ihr schließliches Schicksal war nicht zu ermitteln.

Die von Eigenbrodt wurde nach seinem Tode vereinzelt; geringe, mehrfach umgearbeitete und neu bezettelte Reste besitzen noch einzelne Koblenzer Sammler, Sicherheit bei ihrer Verwertung würde gänzlich fehlen.

Der Verbleib der Sammlungen von Pliester, Stollwerck, Wirtgen und aus neuerer Zeit Beckers ist unbekannt. Daß die ersten noch irgendwo erhalten sein sollten, dürfte bei der Länge der Zeit und dem Fehlen jeder Nachricht ausgeschlossen sein. Wohin die von Eichhoff und Tischbein gelangt sind, bleibt noch festzustellen; die Tischbeinsche ist nicht im oldenburgischen Landesmuseum.

Die von de Rossi ist auch als verloren zu bezeichnen; nach seinem Tode wurde sie, wie Geilenkeuser in Erfahrung brachte, vereinzelt.

Von den erhalten gebliebenen Sammlungen aus

älterer Zeit befindet sich die Hildebrandsche im Missionshaus zu Steyl. Sie hatte bei ihrem späteren Besitzer Giesbers in Düsseldorf sehr gelitten, das Fehlen der Belegstücke für sämtliche auffälligen Angaben Hildebrands im Försterschen Verzeichnis muß deshalb nicht notwendig auf spätere Umarbeitung zurückgeführt werden.

In der Braselmannschen Sammlung, im städtischen Museum zu Krefeld, fehlen nach Mitteilung von Ulbricht die Fundorte.

Die Minksche Sammlung ist jetzt im Besitz der Stadt Annaberg im Erzgebirge. Bei der von ihrem Vorbesitzer schon vorgenommenen Neubezettelung sind nach Mitteilung des Musealverwalters, Stadtrats Lange, nicht stets die Fundorte wieder vermerkt worden; trotzdem bot sich für eine Reihe wichtiger Minkscher Angaben genügender Aufschluß.

Die Förstersche, von dem verstorbenen Gutsbesitzer Friedrich von Halfern zu Aachen erworben, hatte nach dessen Mitteilung an den Verfasser, sehr gelitten gehabt, war teilweise zerstört und ist nach Möglichkeit wiederhergestellt worden. Fundorte fehlen in ihr überwiegend; mitunter geben die meist eingeklebten Namenszettel einige Anhalt; da dem Augenschein nach viele Stücke fremder Herkunft vorhanden sind, kann sie nur ausnahmsweise bei der Nachprüfung der alten Angaben benutzt werden.

Die Sammlung von v. Hagens befindet sich im Dominikanerkloster „Trans Cedron“ zu Venlo; über ihren Befund wurde in wichtigeren Fällen, darunter solchen, in denen Angaben der Coleoptera Neerlandica für Düsseldorf auf v. Hagens zurückgehen konnten, Auskunft eingeholt.

Die von Cornelius, im Besitz des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Elberfeld, hat teilweise sehr gelitten gehabt, viele Belegstücke für Angaben seines Verzeichnisses sind verloren. In der Regel kann deshalb der heutige Bestand nicht zu Folgerungen bezüglich solcher

Angaben benutzt werden; öfters bieten Ersatz Tauschstücke in den Sammlungen von vom Bruck, Fuß und Scriba.

Die vom Brucksche Sammlung, der Universität Bonn zugefallen, groß nicht nur für die damalige Zeit, ist ganz unversehrt erhalten, alles ausnahmslos mit Fundort versehen, meist an der Nadel, bei älteren Funden oft auf dem Namenszettel, wobei das + nach dem Ergebnis eines Vergleichs mit den alten vom Bruckschen Angaben Krefeld bezeichnet. Sie enthält Tauschstücke von Bach, Cornelius, Förster und besonders Fuß und Bestimmungen von Allard, Capiomont, v. Kiesenwetter, Matthews, Reitter, v. Seidlitz, Tournier, Wehnke und Wencker. Ihr konnten eine ziemliche Anzahl unveröffentlichter Funde entnommen werden. Sie bei der Beurteilung der alten Angaben zugrunde zu legen, erschien ganz unbedenklich.

Die Fußsche Sammlung, im Besitz des Verfassers, ist ebenso ganz unversehrt erhalten. Fundortbezeichnungen sind im allgemeinen spärlich, überwiegend bei selteneren rheinischen Vorkommnissen und Tauschstücken fremder Herkunft; auch für die von Fuß im Schrifttum und I. Beitrag des Verfassers angegebenen Funde fehlen oft bezettelte Stücke, dafür finden sich solche Tauschstücke mehrfach in den Sammlungen von vom Bruck und Scriba. Die Sammlung enthielt noch manches Unveröffentlichte und darf der Beurteilung der alten Angaben zugrunde gelegt werden.

Von neueren Sammlungen konnten benutzt werden neben der des Verfassers die von Bocklet, Geyr v. Schweppenburg und Radermacher, die sämtlich einer vollständigen Neubestimmung unterzogen wurden, die von Bertkau im Naturhistorischen Verein zu Bonn, Brink, Fischer, Geilenkeuser, Mühlenfeld, Ulbricht, Urban und von Gabriel. Letztere war in großem Umfange von Gerhardt nachgeprüft. Die Ausbeute der Maar- und Schneifel-Untersuchung erhielt der Verfasser ganz.

Eine Sammlung Guntermann und die von Hein-

rich Steinicke, beide im Löbbecke-Museum zu Düsseldorf, blieben unberücksichtigt.

Zum Verzeichnis.

Der Inhalt des Verzeichnisses beschränkt sich nach dem verfolgten Zweck, der Feststellung der Art und ihrer Verbreitung im Gebiet, auf die dafür notwendigen Unterlagen. Daher hatten Angaben über Lebensweise, Zeit und Art der Auffindung ganz zurückzutreten, sofern sie nicht, wie mitunter bei Holzbewohnern, stets bei den Hochwasserrelikten der großen Flüsse Rhein und Mosel und des Grenzflusses Nahe für die Beurteilung der Einschleppungsmöglichkeit von Belang waren. In den Quellen ist dieser Möglichkeit auch öfter Rechnung getragen; die von Eichhoff in der Berliner Entomologischen Zeitschrift 1866 von Jülich angegebenen Staphyliniden sind Hochwasserrelikte der Roer, doch gehört die Roer mit allen Nebenflüssen ganz dem Gebiet an.

Fundstellen, ohnehin meist unbekannt, für alte Angaben infolge eingetretener Änderungen der Geländebeschaffenheit wohl häufig auch nicht mehr zutreffend, wurden nur bei vereinzelten, auffälligen Vorkommnissen zur Erleichterung der Wiederauffindung angegeben.

Für den Nachweis des Vorkommens kam, wenn Belegstücke erreichbar waren, in erster Linie ältere oder neuere fachmännische Bestimmung in Betracht. Sie liegt in großem Umfang, bei vereinzelt geblieben, erreichbaren Funden aus neuerer Zeit fast ausnahmslos, vor, und es sei hier den Herren Bernhauer, Karl und Josef Daniel, von Heyden, Hubenthal, Gerhardt, Reitter, Schilsky, v. Seidlitz und Weise für ihre stete Hilfsbereitschaft, die allein die Durchführung der gestellten Aufgabe möglich machte, der gebührende Dank abgestattet.

Von solcher Bestimmung durfte im allgemeinen ab-

gesehen werden, wenn häufigere Arten mehrfach angegeben waren, und ihr Vorkommen in allen oder mehreren der zum Vergleich angezogenen Nachbargebiete Holland, Westfalen, Nassau-Frankfurt feststand¹⁾.

Fehlen, wie überwiegend bei alten alleinstehenden Angaben, Belegstücke, so ist das Vorkommen in den Vergleichsgebieten als Maßstab angenommen worden; eine alte Angabe, in keiner Weise gestützt durch weitere Funde, auch nicht aus der Nachbarschaft, darf, auch ohne daß noch Bestimmungsschwierigkeiten in Betracht zu ziehen wären, als unrichtig angesehen werden.

Fehlt bei alleinstehenden, als entlehnt erkennbaren Angaben des Schrifttums auch Quelle oder Gewährsmann, so war die Angabe nur zu vermerken.

Bei der als nachgewiesen betrachteten Art sind die Einzelfundorte vielfach ohne weitere Nachprüfung verzeichnet. Aus der älteren Zeit mag der eine oder andere unrichtig sein, doch wäre Sicherheit darüber meist unerreichbar gewesen, schien auch von geringer Bedeutung; oft muß eine Angabe auch richtig sein.

Daß nicht selten für häufige, im mittleren Europa allgemein verbreitete Arten nur spärliche Fundorte verzeichnet sind, findet seine Erklärung darin, daß solchen Arten weniger Beachtung geschenkt worden ist sowohl beim Sammeln, als auch vom Verfasser bei der Zusammenstellung.

Den Varietäten und Aberrationen konnte die wünschenswerte Berücksichtigung noch nicht überall zuteil werden.

Abkürzungen.

Schrifttum (vergl. oben V).

B. = Bach, Käferfauna, oft mit Band und Seitenzahl, mit „Ent. Kl.“ verbunden = Bach in den entomologischen Kleinigkeiten in dieser Zeitschrift 1851.

1) Hierbei konnte das Verzeichnis von Silbermann und Wencker für Elsaß und die Vogesen, ohnehin von 1866, nicht

- C. = Verzeichnis von Cornelius, mitunter mit Seitenzahl.
 F. = Verzeichnis von Förster mit dem als Anhang dazu erschienenen Nachtrag.
 H. = Holland nach den Coleoptera Neerlandica, deren Nachträgen und den Bemerkungen von Everts zum Catalogus Coleopterorum in der deutschen entomologischen Zeitschrift 1910.
 N. = Verzeichnis der Käfer von Nassau-Frankfurt von Heyden, mitunter mit Seitenzahl, weiterhin das Gebiet von Nassau-Frankfurt.
 W. = Verzeichnis der Käfer Westfalens von Westhoff, mitunter mit Seitenzahl, und sein Nachtrag dazu von 1885, sowie der Beitrag von Reeker, Westf. Provinzial-Verein 1887 S. 65, weiterhin das Gebiet von Westfalen.
 Ann Belg. = Annales de la Société Entomologique de Belgique, mit Band und Seitenzahl.
 Beitr. I., II., III. = Die faunistischen Beiträge des Verfassers in dieser Zeitschrift 1894, 1899, 1907.
 Belg. = Belgien nach den Coleoptera Neerlandica.
 Berl. E. Z. = Berliner Entomologische Zeitschrift bis 1875, mit Erscheinungsjahr.
 Cat. Col. = Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae, Ed. II., 1906.
 Dom. Hag. = Auskunft des Priors des Dominikanerklosters zu Venlo über den Befund der dem Kloster zugefallenen v. Hagenschen Sammlung.
 Faune G.-Rh. II. = Band II der Faune Gallo-rhénane.
 Fauv. = Fauvel in Band III der Faune Gallo-rhénane, meist mit Seitenzahl oder Zahl des Nachtrags.
 Fred. = Fredericq in der Faune de la Baraque Michel.
 Ganglb. Käf. M. = Käfer Mitteleuropas von Ganglbauer.
 Ins. D. = Insekten Deutschlands von Erichson und Nachfolgern, mit Band und Seitenzahl.
 Kaltenb. = Kaltenbach, „Deutsche Phytophagen . . .“, in dieser Zeitschrift, mit Erscheinungsjahr und Seitenzahl.
 Leyd. = Prof. Dr. Leydig, „Über Verbreitung der Thiere im Rhöngebirge“, in dieser Zeitschrift 1881, mit Erscheinungsjahr.
 de R. = de Rossi im Jahresbericht des Westfälischen Provinzialvereins von 1898.

in Betracht kommen, dagegen wurden wichtigere Vorkommnisse aus Belgien nach den Coleoptera Neerlandica angeführt.

Schilsky I., II. = Die Verzeichnisse der deutschen Käfer von Schilsky 1888 (I.) und 1909 (II.).

Schnur = Verzeichnis von Schnur.

Stett. E. Z. = Stettiner entomologische Zeitung, mit Erscheinungsjahr und Seitenzahl.

Verh. Nat. Ver. = Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens, mit Erscheinungsjahr.

Westf. Pr. = Jahresberichte des Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst, mit Erscheinungsjahr.

Zebe = Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera von Zebe.

Gewährsmänner (vergl. oben IV).

Andr. = Andreae.

Bernh. = Dr. Bernhauer.

Bockl. = Bocklet, Konr.

Braselm. = Braselmann.

Bruck = vom Bruck.

Corn. = Cornelius.

K. Dan. } = Dr. Karl und Dr.

J. Dan. } Josef Daniel.

Dorm. = Dormeyer.

Eichh. = Eichhoff.

Epp. = Dr. Eppelsheim.

Ev. = Dr. Everts.

Gabr. = Gabriel.

Geilenk. = Geilenkeuser.

Gerh. = Oberlehrer a. D. Jul.

Gerhardt.

v. Geyr = Geyr v. Schweppenburg.

Hens. = Henseler.

Heyd. = Prof. Dr. L. von Heyden.

Heym. = Heymes.

Hildebr. = Hildebrand.

Hubenth. = Pfarrer W. Hubenthal.

Lange = C. F., Stadtrat und Verwalter der städtischen Sammlungen in Annaberg im

Leyd. = Leydig. [Erzgebirge.
Miss. Steyl = Auskunft des Br. Berchmans über den Befund der im Missionshaus zu Steyl befindlichen Hildebrandschen Sammlung.

Mühlf. = Mühlenfeld.

Neum. = Kurt Neumann, Hom-R. = Roettgen. [burg.

de R. = de Rossi.

Raderm. = Radermacher.

Reichensp. = Reichensperger.

Reitt. = Edm. Reitter.

Schmitz = H., Pater in Maastricht.

Schneid. = Schneider.

Ulbr. = Ulbricht.

Urb. = Urban.

Fundorte.

Aach. = Aachen.

Aggertal = unteres Aggertal bis Donrath.

Ahrw. = Ahrweiler.

Arenberg — bei Ehrenbreitstein.

Blumsay — Felsenhang und Höhe bei Winningen.

Bopp. = Boppard. [Gleestal.	Saarbr. = Saarbrücken.
Brohltal — nahe Burgbrohl u.	Saarl. = Saarlouis.
Duisb. = Duisburg.	Schalkm. = Schalkenmehren.
Duisdorf — bei Bonn.	Schmittenhöhe — Bergrücken
Düssdf. = Düsseldorf.	bei Pfaffendorf gegenüber Koblenz.
Elbf. = Elberfeld.	Siebengbg. = Siebengebirge.
Elsenborn — im Hohen Venn.	Siegmdg. = Siegtal von der
Eltztal — von der Mündung	Mündung bis etwa zur Men-
bis Schloß Eltz.	dener Fähre.
Eupen — die Funde von Hey-	Soon = Soonwald, der Strom-
mes entfallen teilweise auf das	berg näher gelegene Teil.
belgische Gebiet unweit der	St. = Stromberg (Hunsrück).
Grenze; bei der Grenznähe	Stommeln — bei Köln.
durften sie für die Rhein-	U. Ahr — von der Mündung
provinz eingestellt werden.	bis Ahrweiler.
Hamm. W. = Hammersteiner	U. Nahe — linkes Naheufer,
Werth, Insel bei Andernach.	von Langenlonsheim aufw. bis
Hild. H. = Hildener Heide im	zur Guldenbachmündung.
Elberfelder Gebiet.	U. Solg. = Rheingegend im
Kob. = Koblenz und bei ganz	unteren Kreise Solingen.
verbreiteten Vorkommnissen	Vallendar — nahe Koblenz, be-
auch weitere Umgebung.	sonders das Hinterland nach
Kondertal — an der Mosel	Höhr zu.
oberhalb Koblenz.	H.Venn — von Fredericq schon
Kottenforst — bei Bonn.	verallgemeinert. Seine An-
Kref. = Krefeld.	gaben wurden als für den
Laach. See = Laacher See.	deutschen Teil noch fraglich
Löhndorf — bei Sinzig.	eingestellt, wenn die Art nicht
Nettetal — von der Mündung	anderweit in der Provinz
bis Nettehammer. [Gebiet.	nachgewiesen war. Bei allen
Nev. = Neviges im Elberfelder	übrigen wurde die Grenze
Niederwerth — Rheininsel un-	beachtet, insbesondere bei den
terhalb Koblenz.	aus dem Hertogenwald von
Oberkassel — b. Bonn.	Brink und Heymes.
Oberwerth — Halbinsel bei Kob-	Wiedtal — oberhalb Neuwied
lenz, nur der südliche Teil.	bis Niederbieber.
Rhp. = Rheinprovinz.	

Verzeichnung.

Anordnung und Nomenklatur des Verzeichnisses ist die des Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae, Ed. II., von 1906; spätere Abände-

rungen, besonders solche, die im Verzeichnis von Schilsky Aufnahme gefunden haben, und namentlich die dort einheitlich durchgeföhrte Unterscheidung von Varietät und Aberration sind beachtet, die Oberteilungen des Systems und die Untergattungen, als für den verfolgten Zweck nicht nötig, übergangen.

Die als nachgewiesenermaßen einheimisch betrachteten Arten sind mit in der Gattung durchlaufenden Zahlen angeführt; Angaben des Schrifttums, bei denen die Bestimmung als unrichtig gelten muß, mag auch die Art vorkommen können, und sichere Angaben, die unzweifelhaft nicht einheimische Arten betreffen, in []; aus irgendeinem Grunde zweifelhaft gebliebene Angaben, wozu auch die im Schrifttum schon entlehnten, für die keine Quelle zu ermitteln war, gerechnet werden mußten, sofern sie nicht schon erkennbar unrichtig waren, mit — statt der Reihenzahl¹⁾.

Zum Artnamen gestellte Fundorte gelten wie im Catalogus Coleopterum der Stammform, doch werden die älteren Angaben wohl überwiegend und auch manche neueren auf die Art zu beziehen sein.

Die bessere, geographische Anordnung der einzelnen Fundorte einer Art konnte, um zahlreiche Wiederholungen über Quellen und Bestimmung zu vermeiden, nur beschränkt durchgeführt werden.

Angaben, bei denen eine Quelle oder ein Gewährsmann nicht benannt ist, wie vielfach solche über den Befund von Sammlungen, Synonymik, Bestimmung, gehen auf den Verfasser zurück.

Koblenz, im Juni 1911.

C. Roettgen.

1) Das Ergebnis kann daher vielfach nur als ein vorläufiges gelten. Auf eine Reihe teilweise recht ansehnlicher Arten, deren Vorkommen möglich ist, mag hier die Aufmerksamkeit hingelenkt werden: *Cychrus caraboides* subsp. *caraboides* L., *Carabus glabratus*, *Tachyta nana*, *Harpalus servus*, *Amara fusca*, *Pterostichus inaequalis* und *melas*, *Agonum piceum*, *Semiadalia undecimnotata*, *Toxotus quercus*, *Leptura*

Cicindelidae.

Cicindela (L.) Dej.

1. **silvatica** L. — Rhp. (F.) — Aach., Düssdf., Trier (B.) — Hild. H. (C.) — Marxloh (Schneid.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Troisdorfer Heide [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —
2. **silvicola** Latr. — Hild. H. (Drescher u. Ostheide - G.) — Düssdf. (1 - de R., Westf. Pr. 98) — Winningen (Bockl.) — Soon (1 - v. Geyr) — Belegst. aus den drei Verbreitungsgebieten in Samml. R. - Heyd. vid. — Nicht *H. W. N.* - Luxemburg, Elsaß, Vogesen [Faune G-Rh. II. S. 8] —
3. **hybrida** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
- a. **monasteriensis** Westh. — Kob. (Bockl. - riparia Steph.) - Belegst. Reitt. vid. — *H. W.* —
- a. **virescens** Letzn. — Rheydt, Düssdf. (Beckers, D. E. Z. 92) —
4. **campestris** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —
- a. **affinis** Fisch. — Elbf. (C.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — *W. N.* und bei Montabaur [Giebeler, Verh. Nat. Ver. 09. E.] —
- a. **con juncta** D'Torre — Elbf. (C.) — Rheydt, Düssdf. (Beckers, D. E. Z. 92) — *H. W.* und bei Montabaur [Giebeler, l. c.] —
- a. **impunctata** Westh. — Elbf. (C.) — *W.* —
- v. **connata** Heer — Elbf. (2 - C.) — Rheydt, Düssdf. (Beckers, l. c.) — *H. W.* und bei Montabaur [Giebeler, l. c.] —
5. **germanica** L. — Gangelter Heide b. Aach., Kref., Düssdf., Linz (F.) — Trier, Saarbr. (B.) — Siegmdg., einmal massenhaft (Frings) — *H. W. N.* —
- v. **Jordani** Beuth. — Siegmdg., unter der Stammform 1 von Frings gfd., in Samml. Fuß. — *N.* —

Carabidae.

Carabinae.

Cychrus F.

1. **caraboides** L. — die Art: Aach. (F.) — H. Venn (Fred.) — Düssdf., Bopp., Saarbr. (B.) —
- subsp. rostratus** L. — Nev. (de R., Verh. Nat. Ver. 82, u. G. - elongatus Hoppe!) - i. e. elongatus Westh. — Köln (Hens. sanguinolenta, Agapanthia Dahli, Galerucella luteola, Sitona lineellus, Dorytomus hirtipennis, Polyphylla fullo, Hoplia graminicola, Oryctes nasicornis.

- elongatus) — Stücke von Elbf. u. Nev. [Samml. Corn. u. Geilenk., darunter einer der elong. von de Rossi], von Kob. [Samml. Bockl.], der Siegmdg., Güls, St. [Samml. R.] K. Dan. vid. — Auch aus der Schneifel [Reichenesp.] in Samml. R. — *H.* [bekannt nur Form rostr. - Ev. briefl.], Westf. [*W. 4*], *N.* [nur rostr. - Heyd. briefl.] — subsp. *caraboides* L. nicht nachweisbar und wohl fehlend, wie anscheinend auch in *H. W. N.* —

2. attenuatus F. — Aach. (*F.*) — Bopp., Saarbr. (*B.*) — Duisb. (Heym.) — Elbf. (1 - *C.*) — Bertrich (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — Petersberg, Ölberg i. Siebengbg. (Dorm.) — Rengsdorf [1 - Frings] in Samml. R. — *W. N.* —

Calosoma Web.

1. inquisitor L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. coeruleum Letzn. — Elbf. (*G.*) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Eupen, Duisb. (Heym.) — Kottenforst (Frings) — *W.* —

2. sycophanta L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Mörs (Schneid.) — Bonn (Frings) — Brohltal (Andr.) — Kondertal, Kob. (Bockl.) — Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Carabus Latr.

1. coriaceus L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. sublineatus Géh. — Elbf. (1 - jetzt in Samml. Schilsky - *G.*) —

2. irregularis F. — Mit „Lobberich, VIII. 1877“ bezettelt von Westhoff ein Stück im westfäl. Prov.-Museum für Naturkunde zu Münster (Direktor Dr. Reeker) - Westhoff hat nach *W. 6* im August 1877 am Niederrhein gesammelt. — Im belgischen Teil des H. Venn vor langen Jahren 1 gfdn. von Miedel, Lüttich [Ann. Belg. 20 S. 9 u. 17] - auch in Westf. [*W. 5* u. Entom. Bl. 1910 Nr. 4]. —

3. violaceus L.

v. purpurascens F. — Bopp. (*B. I. 27.* - purp. Dej.) — Elbf. (*C.*) — Düssdf. (Hens.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Soon (v. Geyr) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. Suffriani Westh. [im Cat. Col. nicht angeführt, nach *W. 6* zwischen purp. u. cren. stehend] — Kaldenkirchen (*W. 6*) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — *W.* —

v. crenatus Stm. — Aach. (*B. - cren.* Zieggl.) — Rheydt, Wesel (Beckers, l. c.) — Stücke von Rheydt [Samml. Geilenk.] Heyd. vid. — *N.* —

a. asperulus Krtz. — Düssdf. (1 - *W. 6*) — Düssdf., Mülheim a. Ruhr, Wesel (Beckers, l. c.) — Brohltal - Samml. Andr. — Bonn (1 - R.) — *W.* —

v. exasperatus Dft. — *F.* für Bopp. [Bach] — in *B. I.* 26 exasp. Stm. nicht für Rhp. — Fred. für H. Venn mit? — Schaum, Ins. D. I. 155, für Rhp. — *H. N.* u. bei Montabaur [Giebeler, Verh. Nat. Ver. 1909 E. 72] - wohl in Rhp. noch nachzuweisen. —

v. violaceus L. [Stammform] — Am Rhein verbr. (*B. I.* 26) — Bopp. (*B. I.* 25 - Form β Suffr.) -- Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

4. intricatus L. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp., Kirchen, Saarbr. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Siebengbg., Laach. See, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

5. catenulatus Scop. — Rhp. (*F.* - cat. Pz.) — Elbf. (*C.*) — Gerolstein (Verhoeff) — Eifel u. Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

6. variolosus F. — Aach. (Meigen - *F.* - nodulosus *F.*) — Nach Schaum, Ins. D. I. 124, noch in verschiedenen Strichen des Gebiets, insbesondere der Koblenzer Gegend. — Kob. wohl nach Fischer v. Waldheim [Corn. in Verh. Nat. Ver. 64, Corresp. S. 58] - dessen Samml. im Dresdener Museum gibt keinen Aufschluß - sonst von Kob. nicht bekannt. — Faune G.-Rh. II. S. 51 hat für Kob. „Dejean“ und als weiteren Fundort noch Trier. — *W.*, Elsaß. —

7. auronitens F. — Aach. (*F.*) — Bopp., Kirchen, Saarbr. (*B.*) — Jünkerath (Bockl.) — Eifel (Gabr.) — Soon (R.) — *H. W. N.* —

8. convexus F. — Aach. (*F.*) — Bopp., Saarbr. (*B.*) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Eifel (Gabr.) — Ehrang [le Roi], Gerolstein, U. Nahe, Soon (R.) — *H. W. N.* —

9. nitens L. — Aach., Kref., Ruhrort (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Hild. H. (1 - *C. u. G.*) — H. Venn (Fred.) — *H. W.* —

10. auratus L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., Winningen (auch laticollaris n. v., Gubener E. Z. 1904 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. quadricostatus Bockl. — Kob. (daher beschrieben — Bockl. l. c.) — Auch bei Montabaur [Giebeler, Verh. Nat. Ver. 09. E. 72] —

a. confluentinus Bockl. — Kob. (daher beschrieben - Bockl.l.c.) —

11. granulatus L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Laach. See, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. rubripes Géh. — Elbf. (*C.* - rubr. *F.* - u. *G.* - rubr. Krtz.) — *H. W. N.* —

12. cancellatus Ill. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. femoralis Géh. — Wesel (Beckers, D. E. Z. 92 - rufofemoratus Letzn.) — *H.* —

v. carinatus Charp. — Nev. (1 - de Rossi - G.) — Eifel (Gabr.) — W. 303 [Kraatz determ.] —

13. **Ullrichi** Germ. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) - daher in Samml. Bruck — Beuel, am stumpfen Turm (1 - Dorm.) — Siegmdg. (2 - R.) — H. W. N. —

14. **arvensis** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kottenforst (Frings) — Trier (Mühlf.) — H. W. N. —

a. **Seileri** Heer — Fred. für H. Venn. —

v. silvaticus Dej. — Eupen (Heym.) — Jünkerath, Kob. (Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — H. —

[**catenatus** Pz. — F. für Aach. [Fürst. u. Kaltenb.] - in B. nicht für Rhp. - nicht H. W. N. - Südosteuropa. -]

15. **monilis** F. — Die Art: Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F.) —

v. consitus Pz. — Bopp. (1 - B.) — Elbf. (G.) — Wesel, Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Kref. - Samml. Bruck — Düssdf. (Hens.) — Rheydt, U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (1 - Andr.) — Kob. (Bockl.) — H. W. N. —

[**v. Schartowi** Heer. — Schaum, Ins. D. I. 140, für das mittlere Rheingebiet - nicht auf Rhp. auszudehnen - auch nicht N. —]

v. affinis Pz. [Stammform] — Rheydt (Beckers, l. c.) — Muffendorf b. Godesberg, Beckingen a. Saar (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Soon (v. Geyr) — Siegmdg., St. (K. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

a. **regularis** Wissm. — Fred. für H. Venn. —

16. **nemoralis** Müll. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

[**hortensis** L. — Schnur für Trier - nicht in B., noch H. N. - wie viele Angaben von Schnur äusserst zweifelhaft. —]

[**glabratu**s Pk. — Zebe für ganz Deutschland - Schnur für Trier - nicht in Eifel u. Siebengbg. (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) und, wie schon B. I. 25 betont wird, in Rhp. fehlend. — An den Grenzen, Roermond, Venlo [Col. Neerl.], bei Montabaur [Giebeler, Verh. Nat. Ver. 09. E. 72], in W. u. N. —]

Nebriinae.

Leistus Fröl.

1. **ferrugineus** L. — Aach., Kref., Düssdf. Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Borbeck (G.) -- Siebengbg. (Verhoeff) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

2. **rufescens** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — H. Venn, Schneifel [le Roi] in Samml. R. — H. W. N. —

3. **spinibarbis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.)

Ent. Kl.) — Elbf. (C.) — Borbeck (G.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Oberkassel, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **montanus** Steph. — Blumsay b. Winningen [1 - am 25.4.09 - Bernh. Bockl.] in Samml. R. - K. Dan. vid. — Nicht *H. W. N.* - Elsass [Schilsky II.] —

[**piceus** Fröl. — *C.* für Elbf. [nicht häufig - Corn.] - die fünf Belegst. der Samml. Corn. sind kleine, dunkle ferrugineus - Heyd. vid. — Auf einen Irrtum lässt wohl auch die Angabe „nicht häufig“ schliessen, da die Art nicht in *H. W.*, in Belg. [Ev., D. E. Z. 07] u. *N.* nur je 1 gfdn. —]

Nebria Latr.

[**livida** L. — *B.* I. 22 für Bingen [unter Ufergenist - Klingelhöffer] - Fundstelle das Naheufer [Scriba, Verzeichnis im Bericht Oberhess. Gesellschaft. 63 S. 6 - anscheinend mit Bedenken] - dem Verfasser daher nicht bekannt. — *H. W.*, 1 in *N.* —]

1. **picicornis** F. — Düssdf., Kettwig, Bonn, Laach. See (F.) - Laach. See, Ahrtal in Samml. Bruck. — Remagen am Rheinufer (Heyd.) — Bopp. (B.) — Elbf. (1 - C.) — Rheinufer oberhalb Beuel b. Bonn bis zum stumpfen Turm, früher nicht selten (R.) — *H. W. N.* —

2. **brevicollis** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Eifel (Gabr.) Dinslaken, Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Notiophilinae.

Notiophilus Dum.

1. **pusillus** Waterh. — Kreuzn. (1 - K. Dan. vid. - R.) — *N.* [1] —

2. **aquaticus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **palustris** Dft. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. **substriatus** Waterh. — Düssdf., Elbf. (v. Hagens u. Corn. - B. I. 416. punctulatus Wesm.! - u. C. - substr. Waterh.) — Kref. - 1 - Samml. Ulbr. — *H. W. N.* —

5. **rufipes** Curt. — Düssdf., Elbf. (v. Hagens u. Corn. - B. I. 417 u. C.) - daher u. Kleve in Samml. Fuss - nicht Ahrtal [Fuss] wie B. l. c. angibt. — Hamm. W. (1 - Andr.) — H. Venn (Fred.) — *H. W.* —

6. **biguttatus** F. — Rhp. (F. - semipunctatus F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Omophroninae.

Omophron Latr.

1. **limbatum** F. — Kref., Düssdf. (F.) — Tönnisstein, Kob., Winningen, Saarbr. (B.) — Trier (Schnur) — Oberhalb der Ruine

Tönnisstein, U. Nahe (R.) — Bei Kob. u. Winningen jetzt infolge der Uferbauten verschwunden (Bockl.) — *H. W. N.* —

Elaphrinae.

Blethisa Bon.

1. **multipunctata** L. — Aach., Rheydt (F.) — Kob. (B.) — da nicht wieder aufgefunden (Bockl.) — Elbf. (2 - C.) — Bruckhausen (Schneid.) — Trier (Schnur) — *H. W. N.* —

Elaphrus F.

1. **uliginosus** F. — Aach. (F.) — Bopp., Saarbr. (B.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

2. **cupreus** Dft. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Siegmdg. (R.) — *H. W. N.* —

3. **riparius** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Siegmdg., Tönnisstein, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

— **Ullrichi** Redtb. — In *H.* u. *W.* verbr. — Angeblich einmal bei Düssdf. gfd. [Geilenk. briefl.] — Nach Faune G.-Rh. II. S. 83 bei Kob. am Moselufer - daher nicht wieder bekannt geworden. —

4. **aureus** Müll. — Kref., Düssdf. (F.) — U. Solg. (G.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — Schnur für Trier. — *H. W.* —

Lorocerinae.

Lorocera Lahr.

1. **pilicornis** F. — Rhp (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Scaritinae.

Clivina Lahr.

1. **foscor** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **collaris** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Dyschirius Bon.

1. **arenosus** Steph. — Düssdf., Lippetal (F. - thoracicus F.) — Kref. (B.) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W.* —

[**obscurus** Gyll. — Zebe für Rhp. — Küstenbewohner - *H.*, in den Dünen. —]

2. **chalceus** Er. — Kreuzn. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *F.* für Homberg [Pliester] - unzweifelhaft unrichtig, da Salzbodenbewohner. — *H.* —

3. **politus** Dej. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — U. Solg. (G.) — Kob. (Preiß) — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. - Hubenth. vid. — H. W. N. —

4. **nitidus** Dej. — Düssdf., Lippetal (F.) — U. Solg. (G.) — Kob. (Preiß) — Aggertal, Tönnisstein, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

[**pusillus** Dej. — F. für Düssdf. - trifft pus. Er. = angustatus Ahr. [B. I. 41] - pus. Dej. auch Osteuropäer. —]

5. **angustatus** Ahr. — Düssdf. (B. I. 41) — Elbf. (C.) — Kreuzn. - Samml. Bruck. — H. W. N. —

6. **aeneus** Dej. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

7. **intermedius** Putz. — Burgbrohl (1 - Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — N. u. bei Metz [Schilsky II.] —

8. **globosus** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Broscinae.

Broscus Pz.

1. **cephalotes** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Eifel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

Bembidiinae.

Asaphidion Gozis = **Tachypus** Lap.

1. **pallipes** Dft. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — H. W. N.

2. **flavipes** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) H. W. N. —

Bembidion Latr.¹⁾

1. **striatum** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F.) — Bopp. (B.) — Hild. H., U. Solg. (G.) — Brohltal (Andr.) — Siegmdg. (R.) — H. W. N. —

[**foraminosum** Stm. — G. für Kref., Hild. H. [Geilenk.] - Angabe von Geilenk. brieflich zurückgezogen. —]

2. **velox** L. = **impressum** Pz. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F.) - nicht auch Elbf., wie F. angibt, nicht in C. — Siegmdg. (R.) — H. W. N. —

3. **argenteolum** Ahr. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — U. Solg. (G.) — H. W. N. —

1) Periphus piceus Ahr., in F. für Elbf. [Corn.], u. Leja lucida Stm., in F. für Aach., Kref., Elbf., blieben ungedeutet.

a. azureum Gebl. — Kref. - Samml. Bruck. — Düssdf. - Samml. Fuß. — *N.* —

4. litorale Ol. = **paludosum** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Borbeck (Geilenk.) — Bonn, Aggertal, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

5. pygmaeum F. — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Nev. (1 - de Rossi - *C.*) — *F.* für Kref. [Mink - pygm. Stm.] - von *B. I.* 92 nicht aufgenommen, doch wohl richtig. — *H.*: Amsterdam. —

v. bilunulatum Bielz — Kleve (1 - Fuß, Berl. E. Z. 67.) —

6. lampros Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

v. properans Steph. — Rhp. (*F.* - *velox* Er.) — Kref. - Samml. Bruck. — Siegmdg. (1 - *R.*) — *W. N.* —

— **nigricorne** Gyll. — Fred. für H. Venn - Fundgebiet die Campine limbourgeoise [Ann. Belg. 18. S. 107], recht weit vom H. Venn. —

7. punctulatum Drap. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - *aerosum* Er.) — Elbf. (*C.*) — U. Solg. (*G.*) — Siegmdg., Wiedtal, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

8. ruficolle Gyll. — Lippeufer (Mink - *F.*) - 9 mit „Lippe“ bezettelt in Samml. Mink (Lange) - einige daher auch in Samml. Bruck. — *B. I.* 82. 414 für Kref. trifft offenbar den Herkunfts-ort der Angabe, Wohnort von Mink, keinen weiteren Fund, das Lippetal wird nicht angegeben. — *F.* für Elbf. [*Corn.*] - durch Verz. *C.* berichtigt. — Nicht *H. W. N.* - im Norden u. Osten [Ganglb. Käf. M.] —

[**bipunctatum** L. — *F.* für Elbf. [*Corn.*] - so auch *B.* - doch nicht mehr im Verz. *C.* —]

9. dentellum Thunb. — Rhp. (*F.* - *undulatum* Stm.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

10. varium Ol. — Rhp. (*F.* - *ustulatum* *F.*) - überall nicht selten (*B.* - *ust.* *L.*) - doch nur Kref. in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

11. adustum Schaum. — Rhp. (*F.* - *fumigatum* Creutz.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kref. - Samml. Bruck. — Bonn, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

12. obliquum Stm. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck. — Elbf. (*C.*) — Soon [1 - v. Geyr] in Samml. R. — *H. W.* —

13. prasinum Dft. — Ruhrtal, Düssdf. (*F.* - *pras.* Megl.) — Bopp. (*B.*) — Nev., Elbf. (*C.*) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 63) — Aggertal (Dorm.) — Kob. (Bockl.) — Beuel, Siegburg, U. Ahr, Kochem (*R.*) — *H. W. N.* —

14. **fasciolatum** Dft. — Montjoie, Düssdf., Altenahr (*F. - fasc.* Megl.) u. Elbf. (*C.*) - treffen vielleicht die **v. ascendens** mit. — die Stammform: Kref. (Geilenk.) — Siegmdg. (K. Dan. - vid. - R.) — *N.* —

v. ascendens K. Dan. — Bürresheim (Dorm.) — Aggertal, U. Ahr, U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

[**coeruleum** Serv. — *B.* I. 89 für den ausgeschiedenen Bezirk Wetzlar [Eichhoff] - ob richtig? - Dan., Münch. Kol. Z. 02, kennt nur ein sicheres Stück aus Deutschland. —]

15. **atrocoeruleum** Steph. — Rhp. (*B. I. 462*) — Siegburg, Bürresheim (Dorm.) — Bonn, U. Ahr (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

16. **tibiale** Dft. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Rhöndorfer Tal (Dorm.) — Bonn, Wiedtal, Vallendar, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

17. **Redtenbacheri** K. Dan. — Wiedtal b. Nodhausen (2 - K. Dan. vid. - R.) — neu für Westdeutschland - sonst im Süden u. Osten [Münch. K. Z. I. 25] —

18. **testaceum** Dft. — Aach., Bonn (*F. - obsoletum* Dej.) — Elbf. (*C.*) — Kref. (Fischer) — Hamm. W. (Andr.) — Siegmdg. (R.) — *H. W. N.* —

19. **Andreae** F. — die Stammform: *F. - cruciatum* Dej. - für Aach. [Fürst.] u. Düssdf. [Hildebr.] - gehört dem Süden von Europa an [Heyd. in *N. 30* u. Ganglb. Käf. M.] - aus Rhp. in keiner Samml. —

[**v. distinguendum** Duv. — In Samml. Bruck zwei Stück mit „Rheinufer“, in der Präparation ganz abweichend, so daß die naheliegende Deutung auf „Rheinufer b. Kref.“ bis zur Wiederauffindung unzulässig erscheint. — Nicht *H. W. N.* — Straßburg u. südlicher [Faune G. Rh. II. 216] —]

v. femoratum Stm. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - fem.* Dej.) - Kref. in Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Ahr, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

20. **ustulatum** L. — Rhp. (*F. - Andreae* F.!) - in *B.* = Andr. Er. — Elbf. (*C. - litorale* Ol.) - hierhin nach der Stellung im Verzeichnis, nicht zu *paludosum* Pz. — Kref. (Ulbr.) — Saarl. (Gabr.) — Soon (v. Geyr) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

21. **rupestre** L. — Kref. (Mink - *F. - bruxellense* Wesm.) — Elbf. (Corn. - *C.*) - daher 1 in Samml. Corn. — Brohltal (1 - Andr.) - K. Dan. vid. — Soon [1 - v. Geyr] in Samml. R. - K. Dan. vid. — *H. W.* —

[**saxatile** Gyll. — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. *C.* —]

22. **lunatum** Dft. — Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) — Rheinufer unterhalb Beuel (Dorm.) - ebendorf (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

23. **modestum** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (1 · C.) — Kob. (Bockl.) — Siegmdg., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

24. **decorum** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - dec. Zenk.) — Bopp. (B.) — Nev. (G.) — Ahrtal, Elztal, St. (R.) — *H. W. N.* —

25. **nitidulum** Marsh. — Elbf. (C.) — Ehrenbreitstein (N. 30) — Von Kref. [Samml. Bruck], Elbf. [Samml. Corn.] H. Venn [R.] K. Dan. vid. — *H. W. N.* —¹⁾

26. **Stephensi** Crotch. — Von Elbf. [Samml. Corn. unter nitidulum], Bonn [Frings u. R.], Brohltal [Andr.], Laach. See [R.], Winningen [Bockl.], Trier [Mühlf.] K. Dan. vid. — Alles gehört der v. Marthae Reitt. an. — *H.* —¹⁾

27. **monticola** Stm. — Elbf. (1 · Corn. - C.) - Belegst. K. Dan. vid. — de R., Westf. Pr. 98, für Nev. mit? — Angabe in Beitr. I. für Rhöndorf [Dorm.] wird zurückgezogen. — *H. W.* —

[**ruficorne** Stm. — B. I. 386 für Kref. - auf Grund des brunnpipes Megl. von Kref. in F. - nicht in Samml. Bruck, noch sonst aus Rhp. bekannt. — Fred. für H. Venn - nach einem Funde bei Hockay [Ann. Belg. 11. S. 95] - trifft nach Col. Neerl. atroviolaceum. — *W.* 40 mit Bedenken - für Witten auch unrichtig [Fügner briefl.]. — Alpine Art. —¹⁾]

— **Millerianum** Heyd. — Ahrthal - Schaum, Ins. D. I. 691, beschreibt nach u. a. von der Ahr ihm vorliegenden Stücken eine kleinere Form des ruficorne, die = Mill. Heyd. [Ganglb. Käf. M.]. In Samml. Schaum auch 1 Mill. mit „Ahr“ bezettelt [Hubenth. briefl.], doch auffälligerweise daher nicht wieder bekannt geworden, insbesondere nicht durch Fuß, ebensowenig anderweit aus Rhp. oder *W. N.* — Ob Fundort „Ahr“ richtig? — *H.* —

— **atroviolaceum** Duf. = stomooides Dej. — Hockay [cf. ruficorne] - daher im rheinl. Teil des H. Venn wohl noch aufzufinden. — Über ganz Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

28. **elongatum** Dej. — Aach. (Fürst. - F.) - daher in Samml. Bruck. — Elbf. (Corn. - G.) - daher noch in Samml. Corn. — Jülich (Eichb., Berl. E. Z. 66) — *H.* u. belg. Limburg. —

[**inustum** Duv. - von Kraatz [D. E. Z. 88 - Eichhoffi] beschrieben nach vermeintlich aus Saarl., tatsächlich [l. c. 89] aus Mülhausen i. Elsass stammenden Stücken. —]

1) B. rufipes Ill., in F. für Aach., Kref., Düssdf., Homberg, Elbf., synonymisch auf ruficorne Stm. zu deuten, ist in B. I. 84 nach der Beschreibung erkennbar = nitidulum, ruficorne wird auch erst im Anhang I. 386 angeführt. — Die Angaben in F. werden Stephensi mittreffen; ihrer Deutung auf atroviolaceum, wohin Col. Neerl. sie stellen, steht B. entgegen; ohnehin handelt es sich in F. um eine häufige Art, was für atroviol. [Ganglb. Käf. M.] nicht zutrifft.

29. **aspericollis** Germ. — Theodorshalle b. Kreuzn., an den Gradierhäusern, noch nicht bei Karlshalle und Münster a. Stein (R.) — N. —

30. **minimum** F. — Düssdf. (*F. - pusillum* Gyll.) - in *B.* nicht für Rhp., doch wohl richtig. — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Ahrw. (Fuß) — H. W. N. —

31. **Genei** Küst. = *quadriguttatum* auct. — Rhp. (*F. - quadrig.* F.!) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Tönnisstein, St. (R.) — W. N. —

32. **quadriguttatum** F. = *quadripustulatum* Serv. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (1 - de R.) — Siegmdg. (2 - R.) — H. W. —

33. **quadrimaculatum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Kreuzn. St. (R.) — H. W. N. —

— **humerale** Stm. — Fred. für H. Venn — wohl auch im rheinl. Teil zu finden. — H. —

34. **tenellum** Er. — Rhp. (*F.*) — Aach., Bopp. (*B.*) — Hild. H. (*G.*) — Kref. - Samml. Bruck — Tönnisstein (R.) — H. W. —

a. triste Schils. — Brohltal (Andr.) — Tönnisstein (R.) —

35. **gilvipes** Stm. — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) - nicht Ahr, wie Beitr. I. — Duisb. (Urb.) — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. - Hubenth. vid. — H. W. N. —

36. **Doris** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - Dor.* Ill.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — H. W. N. —

37. **articulatum** Gyll. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Ahrw., Kob. (R.) — H. W. N. —

38. **octomaculatum** Goeze — Kref., Düssdf. (*F. - Sturm* Pz.) — Rheindorf b. Düssdf. (*G.*) — Ahrtal (Fuß u. Geilenk.) — Kob. (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

39. **assimile** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (1 - R.) — H. W. N. —

40. **obtusum** Serv. — Aach., Kref. (*F. - obt.* Dej.) — Elbf. (*C.*) — Eifel, Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

41. **guttula** F. — Rhp. (*F.*) — Aach., Kref., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 63 - *guttula* Redtb.!) - trifft gutt. F. - gutt. Redtb. = *lunulatum* Fourc. in Samml. Fuß auch fehlend. — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

42. **Mannerheimi** Sahlb. — Elbf. (*C.*) — Ahrw., Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 62 u. 67) — H. Venn (Fred.) — Wiedtal, Kob., St. (K. Dan. vid. - R.) — H. N. —

43. **biguttatum** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß,

Berl. E. Z. 63) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

44. **lunulatum** Fourc. — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Brohltal (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — U. Nahe (1 - K. Dan. vid. - R.) — [gutt. Redtb. - Fuß, Berl. E. Z. 63 - cf. gutt. F.] — *H. N.* —

Ocys Steph.

1. **harpalooides** Serv. — Elbf. (C.) — Nev. (G. - rufescens Guér.) — Ahrw. (2 - Fuß) — Aach. (Urb.) — Elztal, Oberwerth. St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **quinquestriatus** Gyll. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw., Kleve (Fuß) — Neuenahr (Heyd.) — Pyrmont (Andr.) — Weinfeld. Maar [le Roi], Bonn, Tönnisstein, Kreuzn. St. (R.) — *H. W. N.* —

Tachys Steph.

1. **bistriatus** Dft. — Bonn (1 - Geilenk.) - Belegst. Hubenth. vid. — Siegmdg. [1 - Reichensp.] in Samml. R. - Hubenth. vid. — Oberwerth, in Mehrzahl (Mühlf.) - daher in Samml. R. — Angaben in F. für Aach., Kref., Düssdf. treffen wohl den früher und wohl auch in W. 37 noch nicht getrennten micros Fisch. mit - dieser allein von Kref. in Samml. Bruck — C. für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. verloren. — *H. N.* —

2. **micros** Fisch. = gregarius Chaud. — Kref. in Samml. Bruck als bistr. Dft. — Ahrw., Brohltal (Hubenth. vid. - R.) — *H.* - U. Nahe, hess. Ufer [R.] —

3. **parvulus** Dej. — Ahrtal (F. - pulicarius Dej.) - daher in Samml. Fuß — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Tönnisstein (Dorm. u. R.) — *H. W. N.* —

4. **quadrisignatus** Dft. — Aach., Kettwig, Ahrtal (F. - quadris. Creutz.) — Roertal (B.) — Ahrw., Aggertal (Dorm. u. R.) — *H. W. N.* —

[**sexstriatus** Dft. — B. I. 93 für Bonn [v. Rantzau - angustatus Dej.] — Nicht *H. W. N.* - Ganglb. Käf. M.: südl. Mitteleuropa. — Wohl unrichtig, zumal nicht wieder aufgefunden, wenn nicht etwa Hochwasserrelikt. —]

5. **bisulcatus** Nic. — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 63 - Focki Humm.) — Kreuzn., an der Saline (1 - Heyd.) — *H. N.* —

Tachyta Kirb.

— **nana** Gyll. — Mit „Kref.“ bezettelt in Samml. Fuß - in der vom Bruck'schen Samml., von dem die Stücke unzweifelhaft herrühren, nicht daher - auch nicht in der Mink'schen (Lange) - bedarf trotz Vorkommens in *H. W. N.* noch des Nachweises. —

Trechinae.

Trechi.

Perileptus Schaum.

1. **areolatus** Creutz. — Aach., Montjoie, Kettwig (F.) — Nev. (C.) — Sinzig (Dorm.) — Aggertal, Ahrtal, Eckfelder Maar, Kob., Kreuzn., St. (R.) — *H. W. N.* —

Thalassophilus Wollast.

1. **longicornis** Stm. — Kref., Kettwig (F. - litoralis Ziegl.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — U. Ahr (Fuß) — Sinzig (Dorm.) — U. Ahr, Nettetal, Sayntal (R.) — *W. N.* —

Trechus Clairv.

1. **micros** Hbst. — Düssdf. (Braselm. - F.) - daher in Samml. Fuß — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kob., in Mehrzahl, wahrscheinlich aus Hochwassergenist von Rhein oder Mosel (Mühlf.) — Eupen (Heym.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

2. **discus** F. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. in Samml. Corn. — Hild. H. (Geilenk.) — Hamm. W. (1 - Andr.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

3. **quadrinstriatus** Schrk. — Rhp. (F. - minutus F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. obtusus Er. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Siebengbg. (R.) — *H. W. N.* —

4. **rubens** F. — *B.* Ent. Kl. für Bopp. [paludosus] - in der Fauna I. 79 nicht für Rhp. — Elbf. (C.) — Nev. (de R., Verh. Nat. Ver. 82) — H. Venn (Fred.) - Elsenborn (R.) — Eupen (Heym.) — *H. W. N.* —

[**splendens** Gemm. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. der Samml. Corn. ist obtusus - K. Dan. vid. — Ganglb. Käf. M.: Sudeten, Ostalpen. —]

Epaphius Sam.

1. **secalis** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Eupen (Brink) — H. Venn [le Roi], Nettetal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Patrobi.

Patrobus Steph.

1. **excavatus** Pk. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Panagaeinae.

Panagaeus Latr.

1. **crux major** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. trimaculatus Dej. — Bopp. (1 - B. I. 32) — Düssdf. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — *W. N.* —

a. Schaumi Ganglb. — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 62 - die von Schaum, Ins. D. I. 320, beschriebene Varietät.) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

2. bipustulatus F. = quadripustulatus Stm. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) - daher in Samml. Bruck — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

Chlaeniinae.

Chlaenius Bon.

1. velutinus Dft. — Moselufer von Kob. bis Winningen (Bach und Wirtgen - *F.*) - unterhalb Winningen infolge der Uferbauten jetzt nur noch bei Lützel-Koblenz — Winningen rechtes Moselufer, Kond gegenüber Kochem (R.) — Trier (Schnur) — Anscheinend auf die Mosel beschränkt. — Südl. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

[**festivus** F. — Schnur für Trier - Verwechslung mit dem ähnlichen *velutinus*, der dort nach Schnur und unzweifelhaft vorkommt - südliche Art. —]

2. vestitus Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. variegatus Fourc. = agrorum Ol. — Kreuzn., Trier (*F.*) — Mosel oberhalb Kob., Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — Winningen, Kond b. Kochem mit *velutinus* zusammen, was schon *B.* angibt (R.) — *F.* für Altenahr [vom Bruck] trifft nitidulus, der daher in Samml. Bruck. — Belg. u. *N.* —

4. nitidulus Schrk. — Rhp. (*F.* - Schranki Dft.) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Altenahr - Samml. Bruck — Brohltal (Andr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. nigricornis F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Kref. - Samml. Bruck — Stommeln (Raderm.) — Hatzenport (R.) — *H. W. N.* —

v. melanocornis Dej. — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl) — *H. W. N.* —

6. tristis Schall. — Bonn (Fürst. - *F.* - holosericeus F.) — Laach. See (*B.*) — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Schnur für Trier. — *H. W. N.* —

[**sulcicollis** Pk. — Zebe für Rhp. - nicht nachweisbar. — Je 1 in *H. u. W.* —]

Callistus Bon.

1. lunatus F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Neuenahr (Heyd.) — Linz (Dorm.)

— Godesberg, Gerolstein (Geilenk.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., Kochem (R.) — *H. W. N.* —

Oodinae.

Oodes Bon.

1. **helopiooides** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw., Oberwerth, St. (R.) — *H. W. N.* —

Licininae.

Badister (Clairv.) Dej.

1. **unipustulatus** Bon. — Aach. (Först. - *F.* - unipunctatus Bon.) - nicht in Rhp. wieder aufgefunden - doch *H. W. N.* —

2. **bipustulatus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Kochem, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

3. **sodalis** Dft. — Kref. (*F.* - humeralis Bon.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

4. **peltatus** Pz. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — *H. W. N.* —

Licinus Latr.

— **cassideus** F. — *F.* für Kreuzn. [Mink] - als Fundort kann der zur weiteren Umgebung von Kreuzn. gehörende Gaualgesheimer Kopf in Hessen, woher die Art bekannt [*N. 46*], in Betracht kommen. — Schnur für Trier. — *N.* —

Harpalinae.

Harpalini.

Ophonus Steph.

1. **obscurus** F. — Ahrtal (1 - Fuß) — Belg. u. *H. W. N.* —

2. **sabulicola** Pz. — Aach. (Först. - *F.*) — Bopp. (2 - Samml. Bruck) — Belg. u. *W. N.* —

3. **rupicola** Stm. — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) - in der Fauna bei subcordatus Dej. zwar nicht wiederholt, doch daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Kob. (1 - Bockl.) — Linz (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **punctatulus** Dft. — Aach., Düssdf., Bonn (*F.*) — Nev. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — M.-Gladbach, Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

5. **puncticollis** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - punct. Pz.) — Elbf. (*C.*) — Eifel (Gabr.) — Prüm [le Roi] in Samml. R. — Brohltal (Andr.) — St. (1 - K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

6. **brevicollis** Serv. = rufibarbis (F.) Bed. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — U. Solg. (*G.*) — St. (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. parallelus Dej. — Saarl. (Gabr.) — *H.*, auch Elsaß [Schilsky II.] —

7. **azureus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

8. **signaticornis** Dft. — Aach. (*F.*) — Nev. (de R.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Elsenborn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

9. **maculicornis** Dft. — Aach., Bonn (*F.*) — Bopp. (*B.*) - Elbf., Nev. (*C. u. G.*) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Kob., Horchheim (je 1 - *R.*) — *H. N.* —

v. complanatus Dej. — Nev. (1 - de R., Westf. Pr. 98) — *H. W.* —

10. **griseus** Pz. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Düssdf. (Geilenk.) — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

11. **pubescens** Müll. — Rhp. (*F.* - *ruficornis* *F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

12. **calceatus** Dft. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *calc.* Creutz.) - Saarbr. (*B.*) - nicht Bopp., wie *F.* angibt — Stommeln (Raderm.) — Brohltal (Andr.) — Beuel (*R.*) — *H. W. N.* —

[**hospes** Stm. — Schilsky II. für Elbf. - nicht in *C.* - beruht nach Mitteilg. von Schilsky auf Irrtum. —]

Harpalus Latr.¹⁾

1. **aeneus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

v. limbopunctatus Fuß — Brohltal (1 - Andr.) — Prüm [Reichensp.], St. (je 1 - *R.*) - Hubenth. vid. —

2. **distinguendus** Dft — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Düssdf. (Geilenk.) — Stommeln (Raderm.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Beilstein [le Roi], Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **smaragdinus** Dft. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - *discoideus* *F.*) — Nev. (1 - Heyd. vid. - de R., Westf. Pr. 98.) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

4. **dimidiatus** Rossi — Rhp. (*F.* - *semiviolaceus* Brogn.) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Linz, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

5. **rufus** Brügg. — *F.* für Homberg [Pliester - *ferrugineus* *F.*] - von *B.* nicht aufgenommen. — Elbf. (je 1 - *C. u. G.*) — *H. W. N.* —

6. **atratus** Latr. — Aach., Kref. (*F.* - *hottentotta* Dft.) — Brohltal (Andr.) — Horchheim (Mühlf.) — Beilstein [le Roi], Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

1) *H. auratus* Stm, in *F.* für Düssdf. [Hildebr.], blieb ungedeutet.

7. **tenebrosus** Dej. — Brohltal (1 - Andr.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. - K. Dan. vid. omn. — Belg., N. —

— **fuliginosus** Dft. — Fred. für H. Venn - Finder Miedel, Lüttich [Ann. Belg. 11 S. 95] — Venlo, Roermond [Col. Neerl.] — danach wohl in den angrenzenden Gebietsteilen noch aufzufinden. —

8. **latus** L. — Rhp. (F. - fulvipes F.) — Düssdf. (F. - limbatus Dft.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Preiß) — Bonn, Prüm [Reichenesp.], Manderscheid (R.) — H. W. N. —

9. **luteicornis** Dft. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, St. (je 1 - R.) — H. W. N. —

10. **quadripunctatus** Dej. — Annaberg b. Bonn (1 - Verhoeff - Beitr. I) — Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. K. Dan. vid. — H. N. —

11. **rubripes** Dft. — Rhp. (F. - rubr. Creutz.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Ahrw., St.-Goar, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

12. **honestus** Dft. — Aach., Kref. (F. - hon. And.) — Elbf. (C.) — Horchheim (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Brohltal (R.) — H. W. N. —

13. **rufitarsis** Dft. — Aach., Kref. (F. - ignavus Dft.) - Tauschstücke von Kref. (Geilenk.) — Kleve - Samml. Fuß — Duisb. (Urb.) — Soon (v. Geyr) — St. (R.) — H. W. N. —

— **fuscipalpis** Stm. — F. für Kref. [vom Bruck] - das Stück in Samml. Bruck ist anxius nach der an der Nadel befindlichen Bestimmung von v. Heyden aus 1891 — B. I. 50 für Saarbr. — Belg. u. 1 in N. —

14. **Frölicheri** Stm. — F. für Mayen [vom Bruck] u. B., jedenfalls nach vom Bruck, noch für Kref., - in Samml. Bruck nur ein Stück von Mayen, das einer andern Art angehört - Reitt. vid — Kottenforst [1 - Frings] in Samml. R. - K. Dan. vid. — H.W. —

15. **autumnalis** Dft. — Aach., Kref. (F. - impiger Megl.) - Kref. in Samml. Brink — Oberkassel b. Bonn (Verhoeff) — Stommeln [Raderm.] in Samml. R. — H. W. N. —

[**hirtipes** Pz. — F. für Düssdf. [Hildebr.] - von B. nicht aufgenommen - aus Rhp. nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl) — N. - nicht H. W. —]

[**politus** Dej. — R. Beitr. I für Traben [1 - Verhoeff] - Belegst. verloren. — Nicht H. W. N. - Thüringen, Bayern [Ganglb. Käf. M.] —]

— **servus** Dft. — F. für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Homberg [Pliester] - in Samml. Mink nicht aus Rhp. (Lange) auch nicht in Samml. Bruck. — Doch H. W. N. —

16. **tardus** Pz. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrtal, U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

17. **modestus** Dej. — Aach., Kref., Düssdf., (F. - *flavitarsis* Stm.) — Bopp., Saarbr. (B. - *flavit.* Dej.) — Elbf. (C.) — Linz, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

18. **anxius** Dft. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Hild. H. (1 - G.) — Wesel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

19. **serripes** Quens. — Aach. (F. - *serr.* Dft. — Mayen, Bopp. (B.) — Brohltal (Andr.) — Winningen (Bockl.) — Ahrw., U. Nahe, St. (R.) — *H. N.* —

20. **picipennis** Dft. — Kref., Düssdf. (F. - *picip.* Megl.) — Elbf. (G.) — Altenahr - Samml. Bruck. — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.*

Acupalpini.

Trichotichnus Moraw.

1. **laevicollis** Dft. — Aach. (F. - auch *satyrus* Knoch.) — Saarbr. (B.) — Elbf. (C.) — Hohe Acht (Heyd.) — Brohltal, Laach. See (Andr.) — Siebengbg. (R.) — *H. W. N.* —

a. **nitens** Heer — Nev. (de Rossi - Heyd. vid. - G.) — Eupen (Heym.) — Gerolstein [le Roi], Sayntal (je 1 - R.) — *H. N.* —

Stenolophus Dej.¹⁾

1. **teutonus** Schrk. — Rhp. (F. - *vaporariorum* F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **Skrimshiranus** Steph. — Stammform noch nicht aus Rhp. bekannt, obschon *H. W. N.* —

a. **affinis** Bach — Kref., ziemlich häufig (B. I. 380 - nach Funden von vom Bruck u. Mink beschrieben) — B. Ent. Kl. für Bopp. - in der Fauna nicht angeführt. — *H. W. N.* —

3. **mixtus** Hbst. — Aach. (F. - *vespertinus* Ill.) — Eupen (Heym.) — Elbf. (1 - C.) — Duisb. (Urb.) — Kref. - Samml. Bruck — Stommeln (Raderm.) — *H. W. N.* —

Acupalpus Dej.

1. **elegans** Dej. — Kreuzn. - Samml. Bruck - dort, an den alten, mittleren Gradierhäusern von Theodorshalle nicht besonders selten (R.) — *H. W. N.* —

a. **ephippium** Dej. — ebendort sehr selten (R.) —

2. **flavicollis** Stm. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Stommeln (Raderm.) — Ahrw. (1 - R.) — *H. W. N.* —

1) Sten. halophilus Germ., in F. für Elbf., und *flavus* Stm., in F. für Bopp. u. Kref., blieben ungedeutet. Ersterer vielleicht = *Polygon chalceus* Marsh. [Ins. D. I. 374] und dann für Elbf. unrichtig, Salzbodenbewohner.

[**brunnipes** Stm. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. — Da *H. W. N.*, wohl noch aufzufinden. —]

3. interstitialis Reitt. — St. (K. Dan. vid. - R.) — Ost-europäer. — Zuerst 1898 oder 99, dann jedes Frühjahr einzeln im Genist im sogen. Gefach des Mühlenbachs unterhalb der III. Mühle im Guldenbachtal bei St., einige Stück auch in Seitentälern b. St. u. nach starkem Hochwasser im Guldenbach-genist bei der Station Kloningersmühle. Vermutlich, entgegen der Meinung in Beitr. II., eingeschleppt - mit Getreide? - und einheimisch geworden. —

4. meridianus L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. dorsalis F. — Rhp. (*F.*) — Aach., Düssdf., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

6. luteatus Dft. — Rhp. (*B.* - luridus Dej.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (1 - Urb.) — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

7. exiguis Dej. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Anthracus Motsch.

1. consputus Dft. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Tetraplatypus Tschitsch.

1. similis Dej. — Aach., Kref. (*F.*) — Düssdf. (*B.*) — U. Ahr (Heyd.) — H. Venn (Fred.) — Elsenborn, Bonn, Kob., Rhens (R.) — *H. W. N.* —

Bradyceillus Er.

1. verbasci Dft. — Kref. (Schaum, Ins. D. I. 627) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (1 - *C.*) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

2. harpalinus Serv. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - harp. Dej.) — Elbf. (*C.*) — Borbeck (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Schneifel [le Roi], Vallendar, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. collaris Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Trichocellus Ganglb.

— **cognatus** Gyll. — Fred. für H. Venn - dort gemein [Ann. Belg. 11 S. 95] — bei Roermond [Col. Neerl.] — Im Grenzgebiet sicher noch aufzufinden. —

1. placidus Gyll. — *F.* für Homberg [Pliester] - von *B.* nicht

aufgenommen. — Laach. See, mehrfach (K. Dan. vid. - R.) — H. u. 1 in N. —

Anisodactylini.

Diachromus Er.

1. **germanus** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Borbeck, Wermelskirchen, U. Solg. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Kottenforst (1 - R.) — H. W. N. —

Anisodactylus Dej.

1. **binotatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

v. **spurcaticornis** Dej. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Kochem, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

2. **nemorivagus** Dft. — Düssdf. (F) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Kob. (1 - Bockl.) — Siegmdg. [1 - Frings] in Samml. R. — H. W. N. —

3. **signatus** Pz. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Düssdf. (B.) — Elbf. (1 - C.) — H. W. N. —

Zabrinae.

Zabrus Clairv.

1. **tenebrioides** Goeze = gibbus F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Essen (W. 29) — M.-Gladbach, Bonn (je 1 - R.) — H. W. N. —

Amarinae.

Amara Bon.

1. **fulvipes** Serv. — Saarl., häufig an Ähren von Anthoxanthum odoratum (Gabr.) — Kordel nahe Trier [le Roi], Kob., im Genist nach Moselhochwasser (je 1 - K. Dan. vid. - R.) — H. N. —

— **concinna** Zimm. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - in Samml. Corn. [jetzt] andere Art. — Nicht H. W. N. —

2. **strenua** Zimm. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Stommeln (Raderm.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kreuzn. (Heyd. vid. - R.) — H. W. —

3. **tricuspidata** Dej. — Aach., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — H. W. N. —

4. **plebeja** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Kob. (R.) — H. W. N. —

5. **similata** Gyll. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

6. **ovata** F. — Rhp. (*F.* - obsoleta Dej.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
7. **montivaga** Stm. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
8. **nitida** Stm. — Aach., Kref. (*F.*) — Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) - daher, aus Samml. Corn., Heyd. vid. — Kob. (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
9. **communis** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - comm. Dej.) — Elbf. (*C.*) — Stommeln (Raderm.) — Brohltal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
10. **convexior** Steph. — Elbf. (*C.* - continua Thoms.) — Nev. (1 - de Rossi - *G.*) — H. Venn (Fred.) — Stommeln (Raderm.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Elsenborn, Alken [le Roi], Kochem, St. (R.) — *H. N.* —
11. **lunicollis** Schiödte — Rhp. (*F.* - vulgaris L.) — Elbf. (*C.*) — Aach. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Elsenborn, Ahrw., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —
12. **curta** Dej. — Kref. Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisdorf (Heyd. vid. - Raderm.) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. K. Dan. vid. — Kob. (1 - Bockl.) — b. Montreal [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —
13. **aenea** Deg. — Rhp. (*F.* - trivialis Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Laach. See, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
14. **spreta** Dej. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Bonn, U. Nahe (je 1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
15. **famelica** Zimm. — Elbf. (1 - Geilenk. - *C.*) - ♀, noch in Samml. Corn. — H. Venn (Fred.) - Finder Miedel, Lüttich [Ann. Belg. 11 S. 95] — Brüggen b. Kempen (Heym.) — *H.* —
16. **eurynota** Pz. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
17. **familiaris** Dft. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - fam. Creutz. u. levis Stm.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Ahrw., St. (R.) — *H. W. N.* —
18. **anthobia** Villa — Duisdorf (Heyd. vid. - Raderm.) — Brohltal (1 - Andr.) - K. Dan. vid. — *N.* —
19. **lucida** Dft. — Aach. (*F.* - gemina Zimm.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —
20. **tibialis** Pk. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — *H. W.* —
21. **ingenua** Dft. — Kref. (Mink - *F.*) — Hild. H. (1 - *G.*) — bei Saarl. (Heyd.) — *W. N.* —

[**fusca** Dej. — Kraatz, Berl. E. Z. 64 S. 131, für Ahrw. [Fuß] nach ihm vorliegenden Fuß'schen Stücken, darunter einzelnen mit den spitzen Hinterecken des Halsschildes der cursitans, die ♂♂ der fusca, bisher als cursitans betrachtet worden. — Die Art fehlt aber in Samml. Fuß, und die 8 cursitans darin sind richtig [K. Dan. vid.]. — Da in *H. W. N.*, wohl noch aufzufinden. —]

22. **cursitans** Zimm. — Ahrw. (Frühjahr 1863 zahlreich - Fuß, Berl. E. Z. 63) - Belegst. K. Dan. vid. — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (2 - Andr.) — Hubenth. vid. — Kottenforst [1 - Frings] in Samml. R. - K. Dan. vid. — *H. N.* —

23. **municipalis** Dft. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (*C.*) - daher 1 ♂ noch in Samml. Corn. — Belg. —

[**Quenseli** Schönh. — Fred. - auch monticola Zimm. - für H. Venn - Angabe für Fundort Hockay [Ann. Belg. 35 S. 426] trifft praetermissa [Everts vid. - Col. Neerl.] — für den rheinl. Teil des H. Venn noch nachzuweisen. —]

24. **silvicola** Zimm. — H. Venn (Fred.) — Ahrtal (Fuß) - Belegst. Hubenth. vid. — Belg., *H. W.* —

25. **bifrons** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Tönnisstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

26. **infima** Dft. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (v. Hagens - *C.*) - daher, aus Samml. Corn., Heyd. vid. — *H. N.* —

— **praetermissa** Sahlb. — *F.* für Kref. [Mink - rufocincta Mannh!] - die rufoc. Sahlb. in *B. I.* 68 mit Fundort Kref. ist rufoc. Dej. = praetermissa Sahlb. - fehlt in Samml. Mink (Lange) — Fred. für H. Venn. — *H.* —

27. **brunnea** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Remscheid (1 - Corn. - *G.*) - daher, aus Samml. Corn., Heyd. vid. — Kleve (Col. Neerl.) — *H. W.* —

28. **sabulosa** Serv. — Ahrw. - Samml. Fuß — U. Ahr u. bei Saarl. (Heyd.) — Südmittleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

29. **apricaria** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

30. **fulva** Deg. — Rhp. (*F.*) — Elbf., Nev. (*C. u. G.*) — Saarl. (Gabr.) — Tönnisstein [le Roi], Bonn, Ahrtal (R.) — *H. W. N.* —

31. **consularis** Dft. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Andernach, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

32. **aulica** Pz. — Rhp. (*F. - spinipes L.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**torrida** Ill. — Schilsky II. für Elbf. mit ? - nicht in Verz.
C. - Nordeuropa - auch irrtümlich angegeben [Schilsky briefl.] —]

33. **equestris** Dft. — Kref. (F. - patricia Dft.) — Elbf. (C.) —
daher, aus Samml. Corn., Heyd. vid. — Hild. H. (Geilenk.) —
Oberkassel b. Bonn (Verhoeff - Beitr. I.) — Saarl. (Gabr.) —
Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Pterostichinae.

Stomini.

Stomis Clairv.

1. **pumicatus** Pz. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.)
— Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Pterostichini.

Abax Bon.

1. **ater** Villa — Rhp. (F. - striola F.) — Elbf. (C.) — Saarl.
u. Eifel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Siebengbg., St. (R.)
— *H. W. N.* —

2. **parallelus** Dft. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. u. Eifel
(Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **ovalis** Dft. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) —
Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**carinatus** Dft. — Everts, D. E. Z. 92, für Düssdf. - trifft nach
Col. Neerl. ovalis. — Doch car. nahe der Gebietsgrenze, bei
Roermond [Col. Neerl.], daher wohl noch aufzufinden. —]

Molops Bon.

1. **elatus** F. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.)
— Siebengbg., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **piceus** Pz. = *terricola* F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal
(Andr.) — Eifel (Gabr.) — Eupen (Brink) — Siebengbg.,
Soon (R.) — *H. W. N.* —

Pterostichus Bon. = *Feronia* Latr.

1. **macer** Marsh. — Bopp. (B. I. 58 - *picimanus* Creutz.) —
H. W. N. —

2. **punctulatus** Schall. — Kref., Düssdf. (F.) - Düssdf. in
Samml. Fuß — Bopp., Kreuzn. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.)
— U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. **dimidiatus** Ol. — Kref. (F.) — Düssdf., Bopp. (B.) — Nev.,
Hild. H. (G.) — Bonn - Samml. Fuß — Brohltal (Andr.) — Kob.
(Bockl.) — Trier (Mühlf.) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **lepidus** Leske — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - lep. F.)
— Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **niger** Letzn. — Elsenborn, Siegmdg. (R.) — *H.* —

[**gressorius** Dej. — Schilsky II. für Westdeutschl. — Cat. Col. nur Westalpen. —]

5. **cupreus** L. — Rhp. (F.) - trifft coerulescens mit. — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — M.-Gladbach, Bonn, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

a. **affinis** Stm. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — *H. W.* —

6. **coerulescens** L. — In *F.* u. *B.* noch nicht von cupreus getrennt. — Nev., U. Solg. (G.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. - Samml. Fuß. — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — M.-Gladbach, Elsenborn, Bonn (R.) — *H. W. N.* —

— **inaequalis** Marsh. — *B.* I. 56 für Kref. [negligens Dej.] - Angabe jedenfalls auf vom Bruck zurückzuführen, in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - in Samml. Mink ohne Fundort (Lange) - von Kref. nicht wieder angegeben - doch *H. W. N.* —

7. **ernalis** Pz. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Elztal, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

8. **aterrimus** Hbst. — Dinslaken, Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Laach. See - Samml. Fuß — *H. W. N.* —

9. **oblongopunctatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl., Eifel (Gabr.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **angustatus** Dft. — Düssdf. (Braselm. - F.) — Duisb. (1 - Urb.) — H. Venn (Fred.) — Laach. See (Oberst Schultze) — *H. W. N.* —

11. **niger** Schall. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Eifel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — H. Venn [le Roi], Schneifel [Reichensp.], Siegmdg., Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

12. **vulgaris** L. — Rhp. (F. - leucophthalmus F.) — Elbf. (C.) — Eifel (Gabr.) — M.-Gladbach, Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **nigrita** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

14. **anthracinus** Ill. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Kochem (R.) — *H. W. N.* —

15. **gracilis** Dej. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (1 - R.) — *H. W. N.* —

16. **minor** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Düssdf. (B. I. 57.) — Eifel (Gabr.) — Laach. See (Andr.) — Bonn, Tönnisstein (R.) — *H. W. N.* —

17. **interstinctus** Stm. — Kref. (B. - eruditus Dej.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

18. **strenuus** Pz. — Aach., Kref., Bopp. (F. - pygmaeus Stm.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — M.-Gladbach, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

19. **diligens** Stm. — Aach., Kref., Bopp. (F. - strenuus Kugel.)

— Elbf. (C.) — Gerolstein (Geilenk.) — Kob. (Mühlf.) — H. Venn [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

— **aethiops** Pz. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - daher nicht wieder angegeben - in Samml. Hildebr. ohne Fundort (Miss. Steyl). — Fred. für H. Venn - daher, Provinz Luik, Everts vid. [Col. Neerl.] — Im rheinl. Teil des H. Venn wohl noch aufzufinden. — *W. N.* —

20. **madidus** F. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Remagen, Niederrzissen i. Brohltal (Heyd.) — Gerolstein (Geilenk.) — H. Venn, Schneifel u. Prüm [le Roi], Bonn (R.) *H. W.* —

v. concinnus Stm. — Bopp. (B. I. 58) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Eifel (Gabr.) — Prüm, Schalkm. u. Laach. See [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**cylindricus** Hbst. — *F.* für Aach. [Kaltenbach] - von B. I. 383 aufgenommen - doch unrichtig, Osteuropäer. —]

— **melas** Creutz. — B. I. 57 für Bopp. - wohl nur rechtsrheinisch, wenigstens von Bopp. nicht wieder bekannt geworden. — *N.* in den Gebirgsteilen. —

[**foveolatus** Dft. — *F.* für Düssdf. [Braselm. - latibula Stm.] - von B. I. 59 nicht aufgenommen - Karpathen. —]

21. **metallicus** F. — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Bruck — Siebengbg. u. Eifel (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — Trier (Schnur) — *H. W. N.* —

22. **cristatus** Duf. — Düssdf., Siebengbg. (*F.* - parumpunctatus F.) — Bopp., Birkenfeld (B.) — Stommeln (Raderm.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Saarl., Eifel (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Hagenbachi** Stm. — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht in Verz. C. - Westalpen, Jura [Ganglb. Käf. M.] —]

Sphodrus Clairv.

1. **leucophthalmus** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Kob., Jünkerath (Bockl.) — Kochem (R.) — *H. W. N.* —

Laemostenus Bon.

1. **terricola** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf., Remscheid (C. - inaequalis Pz.) — Borbeck (Geilenk.) — Ehrenbreitstein (Mühlf.) — Oberwerth, im Freien (Bockl. u. R.) — Kob., in Kellern (Bockl.) — *H. W. N.* —

Calathus Bon.

1. **fuscipes** Goeze — Rhp. (*F.* - cisteloides Ill.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **erratus** Sahlb. — Rhp. (*F.* - fulvipes F.) — Elb. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **ambiguus** Pk. — Rhp. (*F.* - fuscus F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —

4. **mollis** Marsh. — Kref. (B. I. 385 - ochropterus Dft.) — daher [1 - Ulbr.] in Samml. R. - Hubenth. vid. — *H. W.* —

5. **melanocephalus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Eifel (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

— **micropterus** Dft. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] - von B. I. 72 nicht aufgenommen - in Samml. Hildebr. nicht aus Rhp. (Miss. Steyl). — Da *H. W. N.* wohl auch in Rhp. —

6. **piceus** Marsh. — Grafenberg b. Düssdf. (Maler Frische Fuß, Berl. E. Z. 67.) — *H. W.* —

[**Dolichus** Bon.

halensis Schall.

a. **flavicornis** F. — Oberwerth, nach Rheinhochwasser (1 - Bockl.) - Heyd. vid. - nicht einheimisch. — *H. W.* u. Elsaß [Heyd. briefl.] —]

Synuchus Gyll. = *Taphria* Latr.

1. **nivalis** Pz. — Kref., Düssdf. (*F.* - *vivalis* Ill.) — Elbf. (C.) — Brohltal (1 - Andr.) — Eifel (Gabr.) — *H. W. N.* —

Olisthopus Dej.

1. **rotundatus** Pk. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Prüm [Reichenosp.], Gerolstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

Agonum Bon.

1. **ruficorne** Goeze — Rhp. (*F.* - *albipes* F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **obscurum** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *oblongum* F.) — Elbf., Nev. (C. u. G.) — Siegmdg., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **assimile** Pk. — Rhp. (*F.* - *angusticolle* F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Nettetal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**longiventris** Mannh. — Schilsky II. für Rhp. — *N.*, u. a. bei Rüdesheim - noch nicht Rhp. —]

4. **livens** Gyll. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Düssdf. (B) — Eupen (Heym.) — Kleve (Fuß) — Oberwerth, überwinternd, häufig (Mühlf. u. R.) — Siegmdg. [2 - Frings] in Samml. R. — *H. N.* —

5. **quadripunctatum** Dej. — Aach. (Fürst. - *F.*) — Elbf. (Corn. C.) - daher in Samml. Bruck — *W. N.* —

6. **impressum** Pz. — Elbf. (v. Hagens - C.) - daher in Samml. Corn. — *H. N.* —

7. **sexpunctatum** L. -- Rhp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **ericeti** Pz. — Fred. für H. Venn - u. a. bei Hockay [Ann. Belg. 22 S. 44] - belgische Stücke Everts vid. [Col. Neerl.] —

Im rheinl. Teil des H. Venn wohl noch aufzufinden. — Norddeutschl. u. a. [Schilsky II.] —

8. **viridicupreum** Goeze — Aach., Rheydt (*F.* - modestum Stm.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kob. (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

9. **marginatum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **Mülleri** Hbst. — Rhp. (*F.* - parumpunctatum *F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **gracilipes** Dft. — Fred. für H. Venn - Finder Putzeys [Ann. Belg. 22 S. 46] — *H. N.* — In Rhp. jedenfalls noch aufzufinden. —

11. **lugens** Dft. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Nev. (1 - Heyd. vid. - de R., Westf. Pr. 98) — Belg., *W. N.* —

12. **dolens** Sahlb. — Nev. (1 - de R., Westf. Pr. 98) — Ahrw. u. Kleve (je 2 - Fuß, Berl. E. Z. 67) - Samml. Fuß ergibt darüber nichts - doch *H. W.* —

13. **versutum** Gyll. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —

14. **viduum** Pz. — Stammform: Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

v. moestum Dft. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Laach. See (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

15. **scitulum** Dej. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kleve (2 - Fuß, Berl. E. Z. 67) — *H.* —

16. **micans** Nic. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Laach. See (Andr.) — Siegmdg., Ahrw., Aldegund [le Roi] Nettetal, Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

17. **fuliginosum** Pz. — Aach., Kref. (*F.* - ful. Knoch) - Kref. - Samml. Fischer — Elbf. (*C.*) — H. Venn u. Viersen [le Roi], Siegmdg. [Frings], Laach. See, Nettetal (R.) — *H. W.* —

— **piceum** L. = picipes F. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Düssdf. - in Samml. Mink ohne Fundort (Lange) - Samml. Bruck Kref. auf dem Namenszettel, die Stücke nicht aus Rhp. - auch später nicht von Kref. oder Düssdf. angegeben. — Doch *H. W. N.* —

18. **gracile** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — *H. W. N.* —

19. **Thoreyi** Dej.

v. puellum Dej. — Stollberg b. Aach., Kref. (*F.* - pelidnum Hbst.) - in *B.* pelidn. Pk. — Nev. (de Rossi - *G.*) — Laach. See (Andr. u. R.) — Tönnisstein (R.) — *H. W.* —

20. **dorsale** Pont. — Rhp. (*F.* - prasinum *F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Masoreinae.

Masoreus Dej.

1. **Wetterhalli** Gyll. — Soon [v. Geyr.], U. Nahe (je 1 - R.)
— *H. W. N.* —

Lebiinae.

Lebia Latr.

1. **cyanoccephala** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **chlorocephala** Hoffm. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

3. **crux minor** L. — Aach., Düssdf., Trier (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Ahrw., Bertrich [Frings], St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **marginata** Geoffr. — Aach., Bonn (F. - haemorrhoidalis F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (1 - C.) — Trier (Mühlf. u. Geilenk.) — Bonn, Aggertal, Ahrw. (R.) — Belg., *W. N.* —

[**humeralis** Dej. — Düssdf. - 1 - im Rheingenist, vermutlich von weither angeschwemmt (Geilenk. - G.) - unzweifelhaft Fremdling - nicht *H. W. N.* - Cat. Col. Österreich, Ungarn u. a. —]

Lionychus Wissm.

1. **quadrillum** Dft. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Ahrtal - Samml. Fuß — Trier (Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Aggertal, Bertrich, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

- a. **bipunctatus** Heer — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — *H. W. N.* —

Metabletus Schmidt-Göbel.

- **obscuroguttatus** Dft. — *F.* für Aach. [Fürst.] — *G.* für Nev. [1 - de Rossi] — Nicht Belg. noch *W. N.*, in *H.* nach Col. Neerl. vielleicht eingeschleppt. — Zweifelhaft. —

1. **pallipes** Dej. — Ahrw. (Fuß) - Belegst. aus Samml. Fuß K. Dan. vid. — *H.* —

2. **truncatellus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp., Kreuzn. (F.) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **foveatus** Geoffr. — Aach., Kref., Bopp. (F. - foveola Gyll.) — Hild. H. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Microlestes Schmidt-Göbel = Blechrus Motsch.

1. **minutulus** Goeze — Bopp. (F. - glabratius Dft.) — Hild. H. (C.) — Nev. (1 - de Rossi - Heyd. vid. - G.) — Brohltal, Kob., Winningen (R.) — *H. W. N.* —

2. **maurus** Stm. — Bopp. (*B. - maurus* Megl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

Dromius Bon.

1 **linearis** Ol. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **agilis** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **angustus** Brull. — Aach., Kref., (*F. - testaceus* Er.) - Kref. - Samml. Ulbr. — U. Solg. (*G.*) — Oberkassel (Dorm.) — Ahrw. (Fuß) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

[**meridionalis** Dej. — *B. I.* 427 berichtet die Anführung von *testaceus* Er. [*I. 36 mit Fundort Kref.*] dahin, es sei merid. Dej. zu setzen - anscheinend nur nomenklatorische Unrichtigkeit, denn die Beschreibung *I. 36* lässt den test. Er. erkennen - merid. auch nicht von Kref. in Samml. Bruck, noch in Belg., noch in *H. W. N.* —]

4. **marginellus** F. — Aach. (Först. u. Kaltenb. - *F.*) — *F.* für Elbf. [Corn.] durch Verz. *C.* berichtet. — Bonn, Oberkassel (Dorm.) - von Bonn [Dorm.] in Samml. R. — *W. N.* —

5. **fenestratus** F. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (1 - Dorm.) — Kob. (Bockl.) — Schmittenhöhe (R.) — *H. W. N.* —

6. **quadrimaculatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Oberkassel (Dorm.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

7. **quadrinotatus** Pz. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Oberkassel (Dorm.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

8. **nigriventris** Thoms. — Bopp. (*B. - fasciatus* F.!) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß) — Brohltal (Andr.) — Siebengbg., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **sigma** Rossi -- Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß) — Siegmdg., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

10. **melanocephalus** Dej. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Demetrias Bon.

1. **imperialis** Germ. — Bopp. (*B.*) — Kref. (Ulbr.) — Viersen [le Roi], Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

2. **monostigma** Sam. — Bopp. (*B. - uhipunctatus* Germ.) — Niederwerth, Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

3. **atricapillus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Cymindis Latr.

1. **humeralis** Geoffr. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Landskron i. Ahrtal (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Winningen (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **axillaris** F. — Stollberg b. Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Venusberg b. Bonn, Rochusberg (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — Oberkassel b. Bonn, in den Steinbrüchen (Verhoeff) — Ahrw. (Fuß) — Brohltal (1 - Andr.) — Soon (v. Geyr) — U. Nahe, Kreuzn. (R.) — Belg., W. N. —

— **macularis** Dej. — H., u. a. bei Roermond, Venlo (Col. Neerl.) - daher in den angrenzenden Teilen des Gebiets sicher zu finden. —

— **vaporariorum** L. — Fred. für H. Venn, n. sltn. - Finder Miedel, Lüttich (Ann. Belg. 11 S. 95) - daher Everts vid. (Col. Neerl.). — Im rheinl. Teil des H. Venn. wohl auch zu finden. —

Polystichus Bon.

— **connexus** Geoffr. — Schnur für Trier [fasciatus F.] — Bei der Zweifelhaftigkeit vieler Angaben von Schnur Wiederauffindung nötig. — Elsaß [Schilsky II.], N. —

Odacanthinae.

Odacantha Pk.

1. **melanura** L. — Aach., Dinslaken (F.) — Hild. H (C.) — Kref. (Ulbr.) — Oberwerth (4 - Mühlf.) — Viersen u. Steuden, Kreis Geldern [le Roi] in Samml. R. — H. W. N. —

[Dryptinae.

Drypta Latr.

dentata Rossi — Schnur für Trier [emarginata Ol.] - nicht H. W. N. - südliche Art. —]

Brachyninae.

Brachynus Web., Chaud.

1. **crepitans** L. — Eifel, Andernach (F.) — Bopp. (B.) — Gerolstein (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Linz (R.) — H. W. N. —

2. **explodens** Dft. — Aach., Andernach, Kreuzn. (F.) — Bopp. (B.) — Gerolstein (Geilenk.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Linz, Kochem, St. (R.) — H. W. N. —

v. **strepens** Fisch. — Brohltal (2 - Andr.) - Hubenth. vid. — W. —

Haliplidae.

Brychius Thoms.

1. **elevatus** Pz. — Elbf., Nev. (C.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Nettetal (1 - R.) — H. W. N. —

Haliplus Latr.

1. **obliquus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Laach. See (F.) — Elbf., Nev. (C. u. G. - amoenus Ol.) — Ahrw., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

2. **confinis** Steph. — Kref. (F. - lineatus Aub.) - daher in Samml. Bruck — Rheydt. (Geilenk.) — Duisb. (Urb.) — H. W. N. —

[**mucronatus** Steph. — Zebe - badius Aub. - für Rhp. — Belg., H. - noch nicht Rhp. —]

3. **variegatus** Stm. — Kref. (F. - var. Dej.) - daher in Samml. Bruck — Hild. H. (1 - Geilenk. - G.) — Elbf. (Mühlf.) - daher in Samml. R. — H. W. N. —

4. **fulvus** F. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — H. Venn [le Roi], Bonn, Siegmdg., St. (R.) — H. W. N. —

5. **flavicollis** Stm. — Rhp. (F. - impressus F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — H. Venn u. Holzmaar [le Roi], Rheinböllen (R.) — H. W. N. —

6. **laminatus** Schall. — Aach. (F. - cinereus Aub.) — Nev., Hild. H. (G.) — Holzmaar [le Roi], Rheinböllen (R.) — H. W. N. —

7. **ruficollis** Deg. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob., U. Nahe, St. (Stammform - Gerh. vid. - R.) — H. W. N. —

a. **Heydeni** Wehnke — Elbf. (C.) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Kref. Heym.) — W. N. —

8. **fulvicollis** Er. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) - Elbf. (Mühlf.) - daher u. Kref. [Brink] in Samml. R. — H. W. —

9. **fluviatilis** Aub. — Kref., Bonn (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (R.) — H. W. N. —

10. **immaculatus** Gerh. — Elbf. (Corn. - C.) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — H. Venn, Schalkm., Weinfelder, Gemündener, Meerfeld. Maar [le Roi], U. Nahe (Gerh. vid. - R.) — H. W. N. —

11. **lineatocollis** Marsh. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Nettetal, St. (R.) — H. W. N. —

Cnemidotus Ill.

1. **impressus** Pz. = caesus Dft. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg., Hild. H., Hochfeld (G.) — Trier (Schnur) — Kref. [Brink] in Samml. R. — H. W. N. —

Hygrobiidae.

Hygrobia Latr.

1. **tarda** Hbst. — Kref., Düssdf. (F. - Hermanni F.) - Kref. in Samml. Bruck - Düssdf. (Hens.) — Kob. (B.) — Essen, Hochfeld (Geilenk.) — Trier (Schnur) — H. W. N. —

Dytiscidae.

Hydroporinae.

Hiphydrus Ill.

1. **ovatus** L. — Rhp. (*F.* - ferrugineus L. — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **variegatus** Steph. — Brohltal (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — [Aubei Ganglb. — *F.* für Bopp. [Bach - variegatus Ill.] - von B. I. 464 nicht aufgenommen - Südeuropäer. —]

Hygrotus Steph.

1. **inaequalis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Schalkeumehrener Maar [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **versicolor** Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - reticulatus F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Gemündener Maar [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **decoratus** Gyll. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*G.*) — *H. W.* —

Coelambus Thoms.

1. **impressopunctatus** Schal. — Rhp. (*F.* - picipes F.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Rheinböllen (R.) — *H. W. N.* —

v. ♀ **lineellus** Gyll. — Elbf. (1 - *G.*) — *W. N.* —

2. **parallelogrammus** Ahr. — Ahrtal - Samml. Fuß — Kob. (1 - Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — *H.* —

3. **confluens** F. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — *H. W. N.* —

— **bicarinatus** Clairv. — *G.* für Elbf. [1 aus Samml. Stachelhausen] mit „Vorkommen wohl?“ — *H.* - deshalb möglich. —

Bidessus Sharp.

1. **unistriatus** Ill. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.* - parvulus Pz.) — *H. W. N.* —

2. **delicatulus** Schaum — Altenahr (Mink, Stett. E. Z. 53 - B. I. 389: an der Ahr) - Ahrtal in Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — Elbf. (1 - Corn. - *C.* - als minutissimus Germ.) - Belegst. aus Samml. Corn. Heyd. vid. - Elbf. (1 - aus Samml. Stachelhausen mit Wehnke vid. - *G.*) — Kettwig a. d. Ruhr (Mink, Stett. E. Z. 59) — Angabe von minutissimus Germ. für Ahrtal u. Ruhrtal in Ins. D. I. II. 41 gilt den deutschen Stücken [= *delicatulus*] des damaligen minutissimus. — Nicht *H. W. N.* — Deutschl. u. im Osten [Ganglb. Käf. M.] —

3. **geminus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.* - minutissimus Scop.) — Duisb. (Urb.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Hydroporus Clairv.

1. **latus** Steph. — Aach. (*F.* - *ovatus* Stm.) — Eupen (Heym.) — Elbf. (C.) — Nettetal, St. (R.) — *H. W. N.* —
2. **platynotus** Germ. — Bopp. (*B. I.* 114) — Elbf. (C.) — Kochem (R.) — *W.*, Hertogenwald [Heym.] —
3. **duodecimpustulatus** F. — Düssdf. (Crumbach, Berl. E. Z. 57, u. *B. I.* 465) — Nev., Elbf. (C.) — im Gleestal b. Burgbrohl einmal in Menge (Andr.) — Aggertal b. Donrath (1 - R.) — *H.* —
4. **elegans** Stm. — Elbf. (1 - C. - *brevis* Stm.) — Kob. (2 - Bockl.) — Pulvermaar [1 - le Roi] in Samml. R. — *W. N.* — [**assimilis** Pk. — Col. Neerl. für Elbf. — Nicht in Verz. C. noch anderweit für Elbf. angegeben - nicht *H. W. N.*] —
5. **septentrionalis** Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. noch in Samml. Corn. — *W.* —
6. **Sanmarki** Sahlb. — Elbf. (Drescher u. Ostheide - Reitt. vid. - G.) - Belegst. in Samml. Geilenk. — *H. W.* —
7. **pictus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Weinfelder u. Gemündener Maar [le Roi], Siegmdg., St. (R.) — *H. W. N.* —
8. **granularis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (C.) — Kref. [Brink], Hangelar b. Bonn [Schauß], St. (R.) — *H. W. N.* — — **bilineatus** Stm., — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Düssdf. [Braselm] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - doch wohl noch aufzufinden, da *H. W. N.* —
9. **flavipes** Ol. — Kref. [Mink, Stett. E. Z. 53] - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. Gerh. vid. — *H. W.* — — **oblongus** Steph. — In Samml. Bruck mit „Kref.“ auf dem Namenszettel, nicht an den Stücken selbst. — Da nicht in *H. W. N.*, bis zur Wiederauffindung wohl als fraglich zu führen. —
10. **lineatus** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Kref. [Brink], U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —
11. **halensis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — *H. W. N.* —
12. **dorsalis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Düssdf. [Hens.] in Samml. R. — Elbf. (1 - G.) — Kob. (Bockl.) — *H. W.* —
13. **erythrocephalus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (C.) — Schalkm., Mürmeswiesen [le Roi], H. Venn, Bonn, U. Nahe (Gerh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
- [v. ♀ **deplanatus** Gyll. — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. C. —]

14. **rufifrons** Dft. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (1 - Preiß) — *H. W. N.* —

15. **scalesianus** Steph. — Kref. (vom Bruck - *F.* - *pygmaeus* Stm.) - daher in Samml. Bruck. — Angabe in *F.* für Aach. [Först.] vielleicht unrichtig, da in Samml. Först. fehlend. — *W.* 48 für Elbf. [Corn.] unrichtig gegenüber dem Verz. *C.* — *H.* —

16. **angustatus** Stm. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (1 - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Gerh. vid. — Kob. (1 ♂ - Preiß) — Laach. See [Voigt] in Samml. R. - Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

17. **neglectus** Schaum — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

18. **palustris** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Laach. See [Reichensp.], H. Venn, Kob., U. Nahe (Gerh. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

19. **striola** Gyll. — Elbf. (1 - Corn - *C.* - *vittula* Er.) - Belegst. aus Samml. Corn. Gerh. vid. — Kref. [Brink], Laach. See [Voigt] in Samml. R. — *H. W.* —

20. **tristis** Pk. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — H. Venn, häufig (Gerh. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

[**notatus** Stm. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - nicht in Samml. Bruck. — Deutschl., Schweden [Ganglb. Käf. M.] —]

21. **umbrosus** Gyll. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Duisb. (Heym.) — Elbf. (Corn. - *C.*). — Schalkm., Mürmeswiesen i. Eifel [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

22. **piceus** Steph. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck - Schaum sah Stücke daher [Ins. D. I. II 60] — Kref. [Brink], Bonn (*R.*) — *H.* —

23. **elongatus** Stm. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W.* —

— **melanocephalus** Gyll. — *C.* für Elbf. [Corn. - mel. Marsh.] - in Samml. Corn. [jetzt] andere Art - Gerh. vid. — Ganglb. Käf. M.: Nordeuropa, Riesengbg. u. a. —

24. **obscurus** Stm. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (*C.*) — Schneifel [le Roi], Sayntal (Gerh. vid. - *R.*) — *H. W.* —

25. **marginatus** Dft. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Ahrtal, Nettetal (Gerh. vid. - *R.*) — Belg., *W. N.* —

26. **planus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Siegmdg., U. Nahe (Gerh. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

27. **pubescens** Gyll. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Wehnke vid. — Brohltal (Andr.) — H. Venn, Schneifel [le Roi] in Samml. R. - Gerh. vid. — *H. W. N.* —

— **fuscipennis** Schaum — *F.* für Aach., Kref., [piceus Stm.]
 - in Samml. Bruck nicht daher, die Stücke von Kref. von
 Wehnke als pubescens bestimmt. — *C.* für Elbf. [Corn.] - in
 Samml. Corn. [jetzt] andere Art - Gerh. vid. — *N.* —

28. **discretus** Fairm. — Elbf. (*C.*) - Belegst. in Samml. Corn.
 — Sayntal, Brohltal, Soon (R.) — Gerh. vid. omn. — *H. W. N.* —
 29. **nigrita** F. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Duisb. (Heym.)
 — Elbf. (*C.*) — Schneifel [le Roi], Kob., Soon (Gerh. vid. - R.)
 — *H. W. N.* —

30. **memnonius** Nic. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. - Samml.
 Bruck - Belegst. Reitt. vid. - Kref. (Mink, Stett. E. Z. 53) —
 Duisb. (Heym.) — Elbf. (3 - *C.*) — Duisdorf - Samml. Raderm.
 — *H. W. N.* —

v. ♀ **castaneus** Aub. — Duisb. (Heym.) — Schneifel u. Laach.
 See [le Roi] in Samml. R. - Hubenth. vid. —

31. **melanarius** Stm. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.* - mel. Latr.)
 — Ahrtal - Samml. Fuß — H. Venn, Schmittenhöhe (Gerh. vid.
 - R.) — *H. W.* —

32. **ferrugineus** Steph. — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Duisb. (Urb.) -
 Belegst. Reitt. vid. — H. Venn - Samml. Brink - Hubenth. vid.
 — Ahrtal - Samml. Fuß — Schneifel [le Roi] in Samml. R. —
 — *W. N.* —

Noterinae.

Noterus Clairv.

1. **crassicornis** Müll. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. -
 Samml. Bruck — Ulmener Maar, Meerfeld, Schalkm. Maar u.
 Wanzenboden [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **clavicornis** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - semipunc-
 tatus *F.*) — Elbf. (*C.*) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Laccophilinae.

Laccophilus Leach.

— **variegatus** Germ. — Roermond [Col. Neerl.] - daher im
 Grenzgebiet wohl noch zu finden. —

1. **obscurus** Pz. — Rhp. (*F.* - minutus *F.!*) — Elbf. (*C.*) —
 Prüm [le Roi], U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **virescens** Brahm — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - hyalinus
 Deg.) — Elbf. (*C.*) — Holzmaar [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Colymbetinae.

Agabus Leach.

1. **didymus** Ol. — Bopp., Saarbr. (*B.*) — Elbf., Nev. (*C.*) —
 Kref. - Samml. Bruck — Düssdf. (Hens.) — Kob. [1 - Bockl.],
 Wahner Heide [le Roi] in Samml. R. — *H. W.* —

2. **guttatus** Pk. — Aach., Kref. (F.) — Düssdf. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — H. Venn u. Schneifel [le Roi], Tönnisstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **biguttatus** Ol.

a. **nitidus** F. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. (Brink) — Brohltal (Andr.) — Mühlental b. Ehrenbreitstein (Bockl.) - daher 1 ♂ in Samml. R. - Gerh. vid. — *W. N.* —

4. **melanarius** Aub. — Schneifel [6 - le Roi] in Samml. R. - Hubenth. vid. — *W. [1 Fundort.]* —

5. **bipustulatus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — H. Venn u. Schneifel [le Roi], Nettetal, U. Nahe (R.) — *W. N.* —

6. **striolatus** Gyll. — Kref. (B., u. Schaum Ins. D. I. II. 100) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (Reitt. vid. - G.) — *H.* —

7. **neglectus** Er. — Kref. (vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Fundort Elbf. in B. I. 103 gegenüber Verz. C. unrichtig. — Nicht *H. N.* - *W.?* - Ganglb. Käf. M.: Norddeutschland u. a. —

— **subtilis** Er. — *F.* für Siebengbg. [v. Rantzau] — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - in Samml. Corn. [jetzt] andere Art - Gerh. vid. — *W.* —

8. **chalconatus** Pz. — Rhp. (F. - chalc. Ill.) — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Schneifel [le Roi], Strotzbüscher i. Eifel (R.) — *H. W. N.* —

9. **paludosus** F. — Aach., Kref. (F.) — Birkenfeld (B.) — Elbf. (C.) — Tönnisstein (1 - Andr.) — Kob. (1 - Preiß) — Meerfeld. Maar [le Roi], Nettetal (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

10. **uliginosus** L. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck -- Elbf. (Corn. - C.) — H. Venn (Heym.) — *H. W. N.* —

11. **congener** Pk. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Duisb. (Urb.) — H. Venn (Fred.) — H. Venn u. Schneifel [le Roi] in Samml. R. — *W.* —

v. ♀ **Venturii** Bertol. — H. Venn [le Roi] in Samml. R. - Gerh. vid. — Cat. Col. nur Italien - Schilsky II. Tirol mit? —

12. **affinis** Pk. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Bopp. (B.) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — *H.* —

13. **nebulosus** Forst. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - bipunctatus F.) — Elbf. (C.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

14. **Sturmi** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Brink — Bonn - Samml. Bertkau — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — H. Venn [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

15. **undulatus** Schrk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - abbreviatus *F.*) - Tauschst. von Kref. (Geilenk.) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

16. **labiatus** Brahm — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - femoralis *Pk.*) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schnur) — *H. W. N.* —

Platambus Thoms.

1. **maculatus** L. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) - daher in Samml. Bruck — Bonn, Nettetal, St. (R.) — *H. W. N.* —

Copelatus Er.

1. **ruficollis** Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - agilis *F.*) - Kref. in Samml. Brink — Elbf. (*C.*) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Ilybius Er.

1. **fenestratus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Schalkm. u. Weinfelder Maar [le Roi], Laach. See [Reichensp.], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **fuliginosus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — H. Venn, Aggertal, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **subaeneus** Er. — Elbf., Nev. (*G.*) - Belegst. in Samml. Geilenk. — *H. W. N.* —

4. **ater** Deg. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Brink — Kob. (Bockl.) — Schalkm. Maar [1 - le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

5. **obscurus** Marsh. — Kref., Düssdf. (*F.* - quadriguttatus Boisd.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl. u. Preiß) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

6. **guttiger** Gyll. — Rhp. (*F.*) — Kref., Bopp. (*B.*) - Kref. in Samml. Bruck mit Wehnke vid. — Kob. (1 - Preiß) — Fundort Elbf. in *B.* gegenüber Verz. *C.* unrichtig. — *H. W. N.* —

7. **Kiesenwetteri** Wehnke — Kref. - 2 - Samml. Bruck mit Wehnke vid. — Ganglb. Käf. M: Nord- u. Mitteleuropa. —

8. **aenescens** Thoms. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Westhoff in Westf. Pr. 85 bezweifelt die Richtigkeit - doch Belegst. aus Samml. Corn. Gerh. vid. — Kref. - Samml. Bruck mit Wehnke vid. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — H. Venn [le Roi] in Samml. R. - Gerh. vid. — *H.* —

[**angustior** Gyll. — *F.* für Aach. [Kaltenb.], Kref. [Mink u. vom Bruck], Düssdf. [Hildebr.] - in *B.* nicht für Rhp. - Samml. Bruck nur Lappland - Cat. Col. nur Lappland —]

Rhantus Lac.

1. **Grapei** Gyll. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Nev. (1 - de Rossi - *C.*) — Laach. See [Reichensp.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **punctatus** Geoffr. — Rhp. (*F.* - *pulverosus* Knoch) — Elbf. (*C.*) — Bonn - Samml. Bertkau — Brohltal (*Andr.*) — U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **notatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* - *roridus* Müll.) - daher [Mühlf.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

4. **suturellus** Harr. — Kref., Düssdf. (*F.* - *bistriatus* Bergstr.) — Elbf. (*C.* - *bistr.* Bergstr.) — Bonn - Samml. Bertkau — Bonn, H. Venn [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

5. **adspersus** F. [= *bistr.* Bergstr. in Ganglb. Käf. M.] — Rhp. (*F.* - *adsp.* F.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — M.-Gladbach (*R.*) — *H. W. N.* —

6. **consputus** Stm. — Linz - 2 - Samml. Fuß. — *W.* —

7. **exoletus** Forst. — Rhp. (*F.* - *collaris* Pk.) — Elbf. (*C.*) — Kref. Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — Rheinböllen (*R.*) — *H. W. N.* —

Colymbetes Clairv.

1. **fuscus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — Viersen [le Roi], Bonn, U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

[**Paykulli** Er. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - von *B.* nicht aufgenommen - aus Rhp. nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl) - nicht *H. W. N.* - im Norden. —]

[**striatus** L. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - aus Rhp. nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl). — *B.* I. 99 für Bopp. — Nicht *H. W. N.* - im Norden. —]

Dytiscinae.

Hydaticus Leach.

1. **seminiger** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *Hybneri* F.) — Elbf. (*C.*) — Viersen [le Roi], Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **stagnalis** F. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Schnur für Trier — *W. N.* —

3. **transversalis** Pont. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck u. Samml. Brink — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

Graphoderes Thoms.

1. **austriacus** Stm. — Bopp. (*B.* I. 97) — *W. N.* —

2. **bilineatus** Deg. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

3. **cinereus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — *H. W. N.* —

4. **zonatus** Hoppe — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

Acilius Leach.

1. **sulcatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

2. **canaliculatus** Nic. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - fasciatus Deg.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — H. Venn [le Roi] u. Breyeller See [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Dytiscus L.

1. **latissimus** L. — Kref., Düssdf., Bonn (F.) — Witterschlick b. Bonn (Voigt) — *H. W. N.* —

2. **marginalis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

v. ♀ **conformis** Kunze — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

3. **dimidiatus** Bergstr. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Nev. (1 - C.) — Marxloh (Schneid.) — Brohltal (Andr.) — *H. W. N.* —

4. **punctulatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hamborn (Schneid.) — Bonn (Frings) — Soon (v. Geyr) — Wahner Haide (R.) — *H. W. N.* —

5. **circumcinetus** Ahr. — Kref., Düssdf., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

6. **circumflexus** F. — Kref. (B.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Marxloh (Schneid.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

v. ♀ **perplexus** Lac. — Essen, mehrfach (Geilenk.) —

Cybister Curt.

1. **lateralimarginalis** Deg. = Roeseli Füßly — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Mülheim b. Köln (Frings) — U. Solg., Hochfeld (G.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Gyrinidae.

Gyrinus Geoffr.

1. **minutus** F. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Mühlental b. Ehrenbreitstein (Bockl.) — *H. W. N.* —

2. **bicolor** Pk. — Erkrath b. Elbf. (Mink - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

— **colymbus** Er. — F. für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Düssdf. [Hildebr.] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. — *H.* - daher vielleicht noch aufzufinden. —

3. **distinctus** Aub. — Brohltal (2 - Andr.) - unterm Mikroskop bestimmt. — Ganz Europa [Cat. Col.] —

4. natator L. = *mergus* Ahr. — Stammform: Rhp. (*F.* - *merg.* Ahr.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

v. natator Ahr. = *substriatus* Steph. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *natator* L.!) - Kref. in Samml. Bruck — Bonn, Tönnisstein (*R.*) — *H. W.* —

5. Suffriani Scrib. — Nev. (*C.* u. - mehrfach - de *R.*, Westf. Pr. 98) — *H.* —

6. marinus Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Schalkm. [le Roi] in Samml. R. — Schnur für Trier. — *H. W. N.* —

v. opacus Sahlb. — Elbf. (*Corn.* - *C.*) - daher in Samml. Corn. mit Wehnke vid. [Geilenk.] — *H. W.* —

Orectochilus Lac.

1. villosus Müll. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Siegmdg., Ahrw., Nettetal, St. (*R.*) — *H. W. N.* - ¹⁾

Staphylinidae.

Piestinae.

Siagonium Kirb.

1. quadricorne Kirb. — Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß) — Borbeck (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Siegmdg. [1 - Frings] in Samml. R — *H. W. N.* —

[**humerale** Germ. — *G.* für Elbf. [1 aus Samml. Stachelhausen - Geilenk.] mit „Fundort vielleicht unrichtig“. — Nicht *H. W. N.* - auch südlichere Art. —]

Oxytelinae.

Micropeplini.

Micropeplus Latr.

1. tesserula Curt. — Eupen (1 - Heym.) — Hertogenwald [Heym.] u. Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

2. staphylinoides Marsh. — Elbf. (1 - *Corn.* - *C.*) — Bonn (1 - Geilenk.) - Belegst. Hubenth. vid. — Angaben in *F.* für Aach. [Fürst.] u. Kref. [Mink], vor Aufstellung des longipennis Krtz., treffen vielleicht diesen - in Samml. Bruck keine der beiden Arten aus Rhp. — *H.* —

1) *Rhysodes sulcatus* F. in Zebe mit der mißzuverstehenden Angabe: Solinger Wald, *B. I.* 235: Sollinger Wald. Es ist der Solling gemeint.

3. **fulvus** Er. — Kref. (Mink - Kraatz, Ins. D. II. 1054) — Elbf. (1 - C.) — *H. W. N.* —

4. **longipennis** Krtz. — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 1054 - staph. Er. et Marsh.) — Bopp. (B. IV. 292 - staph. Marsh.!) — Sonst in Bayern, Thüringen [Schilsky II.] —

5. **porcatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Phloeocharini.

Phloeocharis Mannh.

1. **subtilissima** Mannh. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Proteinini.

Metopsia Wollast. = **Phloeobium** Er.

1. **clypeata** Müll. — Kref., Bopp. (B. IV. 288) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Soon, in Pilzen (R.) — *H. W. N.* —

Megarthrus Steph.

1. **depressus** Pk. — Kref. (B.) — Elbf. (C.) — Eupen (Heym.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Remscheid (R.) — *H. W. N.* —

2. **affinis** Mill. — Elbf. (C.) — Eupen (Heym.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Gabr. u. Mühlf.) — Belg., N. —

3. **sinuatocollis** Lac. — Aach., Kref. (F. - lineaticollis!) — Elbf. (C) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **denticollis** Beck — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

5. **nitidulus** Krtz. — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 58) — Brohltal (1 ♂ - Andr.) — Kob. (Gabr.) — Oberwerth (1 - R.) — N. —

6. **hemipterus** Ill. — Aach., Kref., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Proteinus Latr.

1. **ovalis** Steph. — Elbf. (Reitt. vid. - G.) — Unkelbach (Reichensp.) — Brohltal (♂ - Andr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. N.* —

2. **brachypterus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) — Brohltal (♂ - Andr.) — Remscheid, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **macropterus** Gyll. — Aach., Kref., Bonn (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Brohltal (♂ - Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Soon (R.) — *H. W. N.* —

4. **atomarius** Er. — Aach., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Brohltal (Andr.) — Soon (R.) — *H. W. N.* —

Omaliini.

Anthobium Steph.

1. **montivagum** Heer — Bonn (daher beschrieben - Kraatz, Ins. D. II. 1013 - sordidulum) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — H. Venn (Col. Neerl.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — N. —
2. **longipenne** Er. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv. 51) — Trier (Urb.) — Schneifel [Reichenosp.], Arenberg, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
3. **stramineum** Krtz. — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 1016) — Col. Neerl. noch für Elbf. — *W. N.* —
4. **ophthalmicum** Pk. — Aach. (F.) — Elbf. (G.) — Kref. - Samml. Bruck — Brodenbach, St.-Goar (R.) — *H. W. N.* —
5. **rectangulum** Fauv. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. (vom Bruck - Fauv. 52) - daher in Samml. Bruck mit Fauv. vid. — Eupen (Heym.) — *H. N.* —
6. **sorbi** Gyll. — Rhp. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Eupen (Heym.) — Laach. See, Sayntal, St. (R.) — *H. W. N.* —
7. **Marshami** Fauv. — Elbf. (C.) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv. 53) — Duisb. (Urb.) — Eupen (Heym.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *W. N.* —
8. **torquatum** Marsh. — Aach., Bopp. (F. - scutellare Boisd.) — Elbf. (C.) — Mülheim a. Ruhr (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Olbrück, Laach. See, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
9. **limbatum** Er. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — St. (Bernh. vid. - R.) — Belg., *W. N.* —
10. **signatum** Märk. — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß) — Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —
11. **abdominale** Grav. — Aach., Kref. (F. - semicoleopratum Pz.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
12. **primulae** Steph. — Aach. (F. - triviale Er.) — Elbf. (aus Samml. Stachelhausen - G.) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv. 40) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
13. **minutum** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
14. **atrum** Heer — Aach. (Fürst. - F. - nigrum Er.) — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Bernh. vid. — Arenberg (1 - R.) — Verviers [Col. Neerl.], *N.* —
15. **florale** Pz. — Aach., Kref. (F. - florale Pk.) — Elbf. (C.) — Kochem, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Acrulia Thoms.

1. **inflata** Gyll. — H. Venn (Fauv. 56 u. Fred.) - Eupen, unter Baumrinde (8 - Heym.) — Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

Acrolocha Thoms.

1. **striata** Grav. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Kob., St. (Bernh. vid. · R.) — *H. W. N.* —

2. **amabilis** Heer. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Vallendar, Soon, im Spätherbst in Pilzen (Bernh. vid. - R.) — Nicht *H. W. N.* - Oberlais [Scriba - Fauv. 60] - Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

Phyllodrepa Thoms.

1. **floralis** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.* - *rufipes* Fourc.) — Kleve, Düssdf. (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Siebengbg., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **salicis** Gyll. — *C.* für Elbf. [Corn.] - in Samml. Corn. nicht auffindbar. — *H.*, nicht *W. N.* —

2. **melanocephala** F. — Elbf. (1 - Corn. - *C.* - *brunnea* Pk.) — *W. N.* —

3. **ioptera** Steph. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - *lucida* Er.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Mühlf.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **elegans** Krtz. — Elbf. (*C.* u. - Epp. vid. - Geilenk.) — Ganglb. Käf. M.: Grafschaft Glatz. —

5. **linearis** Zett. — Aach. (Först - *F.*) - in Fauv. 67 aufgenommen. — Verviers [Col. Neerl.] u. *H.* —

6. **vilis** Er. — Eupen (2 - Heym.) — *W.* - Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

7. **gracilicornis** Fairm. — Kleve (nach 2 Stück daher beschrieben - Fuß, Berl. E. Z. 68 - *hiemalis*) — *H.* —

8. **pygmaea** Gyll. — Aach., Düssdf. (*F.* - *pygm.* Grav.) — hierhin Lathrimaeum fusculum Er. von Kref. [Mink] in *F.* - [Fauv. 95, vid.] — *H. N.* —

Omalium Grav.

1. **rivulare** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **septentrionis** Thoms. — Col. Neerl. für Elbf. - jedenfalls auf Grund der Angabe von Corn. in *W.* 98 - durch Verz. C. berichtigt. — Eupen, häufig im Fluge in Kiefernwald (Heym.) — Mitteldeutschland, Nordeuropa [Ganglb. Käf. M.] —

3. **oxyacanthae** Grav. — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

4. **exiguum** Gyll. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegt. aus Samml. Corn. Bernh. vid. — *H.* —

— **foraminosum** Mäkl. — *G.* für Nev. [1 de Rossi] - nicht *H. W. N.* - Thüringen [Ganglb. Käf. M.]. — Zweifelhaft. —

5. **caesum** Grav. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **excavatum** Steph. — Aach., Kref., Bonn (*F.* - *fossulatum*

Er.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Soon (1 - R.) — *H. W.* —

7. **validum** Krtz. — Vallendar, im Spätherbst (1 - Bernh. vid. - R.) — *W.* —

Phloeonomus Heer.

1. **monilicornis** Gyll. — Soon, an Baumsaft (1 - Bernh. vid. - R.) — Belg., *W.* —

2. **planus** Pk. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **pusillus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **minimus** Er. — Düssdf. (F.) — U. Solg. (G.) — Kref. (Mink - Fauv. 72) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — Kob., St. (R.) — *N.* —

Xylocromus Heer.

1. **affinis** Gerh. — Güls b. Kob. (1 - Bernh. vid. - R.) — Antwerpen [1 - Col. Neerl.], Rheinbayern u. a. [Schilsky II.] —

2. **concinnum** Marsh. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Siebengbg., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **depressus** Grav. — Aach., Kref. (F.) - Kref. (Epp. vid. - Geilenk.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **testaceus** Er. — Aach. (F. - test. Grav.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Laach. See, St. (je 1 - Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

Philorinum Krtz.

1. **sordidum** Steph. — Siebengbg. (Kraatz, Ins. D. II. 967) — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Gerolstein, Olbrück (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

a. **nigriventre** Rosh. — St. (1 - R) —

Orochares Krtz.

1. **angustata** Er. — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. u. Kleve, im Spätherbst (Fuß) — Konderberg b. Kochem, im November (R.) — Belg. [Col. Neerl.] —

Lathrimaeum Er.

1. **melanocephalum** Ill. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *W. N.* —

2. **atroc�헤aphalum** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **unicolor** Marsh. — Elbf. (C.) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv.) — Kleve (Fuß) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Soon (R.) — *H. W. N.* —

4. **fuscum** Er. — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - Geilenk.) — *F.* für Kref. - trifft nach Fauv. 95 *Homalium pygmaeum* [Phylodrepa]. — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

Olophrum Er.

1. **piceum** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — H. Venn [le Roi], Wiedtal, Kob., Elztal, Soon (R.) — *H. W. N.* —

— **fuscum** Grav. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] - in Samml. Hildebr. nicht aus Rhp. (Miss. Steyl) — *C.* für Elbf. [Corn.] - in Samml. Corn. [jetzt] andere Art. — Nicht *H. W. N.* - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

2. **assimile** Pk. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv.) - zahlreich in Samml. Fuß ohne Fundort — *W. N.* —

Arpedium Er.

1. **quadrum** Grav. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Oberwerth, zahlreich (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *W. N.* —

Acidota Mannh.

1. **crenata** F. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Kref. (Mink - Fauv.) - daher in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — H. Venn (Fred.) - daher [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **cruentata** Mannh. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. (Mink - Fauv.) — Düssdf. - Samml. Fuß - nicht Kleve, wie Fauv. in Nachtr. 2 — H. Venn (Fred.) — Saarl. (Gabr.) — Schmittenhöhe [1 - Mühlf.] in Samml. R. — *H. W.* —

Lesteva Latr.

1. **pubescens** Mannh. — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Fuß. — *H. W.* —

2. **longelytrata** Goeze — Aach., Kref., Düssdf. (F. - bicolor F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Remscheid, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **maura** Er. — Elbf. (1 - Reitt. vid. - G.) — Laach. See (1 - Bernh. vid. - R.) — *H.* —

3. **monticola** Ksw. — Eupen (Heym.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — In den höheren Gebirgen Deutschlands und den Alpen. —

— **sicula** Er. — *H* verbr., u. a. bei Roermond [Col. Neerl.] - daher wohl im Grenzgebiet noch aufzufinden. —

4. **punctata** Er. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw (Fuß) - daher in Samml. Bruck — Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Geodromicus Redtb.

1. **plagiatus** F.

a. **nigrita** Müll. — Elbf. (1 - Reitt. vid. - G.) — Eupen (Heym.) — Ahrw. (Fuß) — Brohltal (Andr.) — Saynthal, Ahrw., St. (Bernh.)

vid. - R.) — *H. W. N.* — Angabe von plagiatus F. in *F.* für das Brohltal [v. Rantzau] trifft jedenfalls die a. nigrita, die dort von Andr. gfd., zumal die Stammform auch nicht in *H. W. N.* —

Anthophagus Grav.

1. **bicornis** Block — Aach. (*F.* - armiger Grav.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Siegbg. (Kraatz, Ins. D. II. 917) — Prüm [Reichensp.], Kob., Kochem, St. (R.) — Belg., *W. N.* —

2. **abbreviatus** F. — Aach. (*F.* - caraboides L.!) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **caraboides** L. — Düssdf. (*F.* - testaceus Grav.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Vallendar (R.) — *H. W. N.* —

4. **praeustus** Müll. — Aach., (Först. - *F.*) - Aach. (Ulbr.) — Mander-scheid [le Roi], Wiedtal, Oberwerth, U. Nahe, St. (stets auf Ufer-gebüschen - R.) — *H. W. N.* —

Coryphium Steph.

1. **angusticolle** Steph. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - jetzt im Berliner Museum nach Kraatz, Ins. D. II. 971 — Bonn (1 - Kraatz, l. c.) — Düssdf. (1 - Fuß) — *H. N.* —

Oxytelini.

Syntomium Curt.

1. **aeneum** Müll. — Aach., Kref. (*F.*) - Aach. (Ulbr.) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Deleaster Er.

1. **dichrous** Grav. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Ahrw., Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **Leachi** Curt. — Bopp. (Kraatz, Ins. D. II. 903 - adustus Küst.) — Bayern, Thüringen u. a. [Schilsky II.] —

Coprophilus Latr.

1. **striatulus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Acrognathus Er.

1. **mandibularis** Gyll. — Bonn, am Rheinufer (1 - R.) — Kleve (Col. Neerl.) — *N.* —

Planeustomus Duv.

1. **palpalis** Er. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — H. Venn (Fred.) — Kref. - Samml. Bruck. — Nord- u. Mittel-europa [Ganglb. Käf. M.] —

Ancyrophorus Krtz.

1. **longipennis** Fairm. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Neuen-

ahr (Heyd.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Elztal, St. (R.) — Belg. [Col. Neerl.] —

2. **aureus** Fauv. — Nettetal, aus Bachgenist (1 - Bernh. vid. - R.) — Westl. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

— **omalinus** Er. — Col. Neerl. für Jülich u. Kref. - von Kref. nicht in Samml. Bruck - in Samml. Mink 2 Mink'scher Präparationsart, ob von Krefeld? (Lange). — Belg. u. Roermond [Col. Neerl.] - daher wohl noch nachzuweisen. —

Thinobius Ksw.

1. **longipennis** Heer — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65) - daher in Samml. Bruck mit Epp. vid. — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

Trogophloeus Mannh.

1. **dilatatus** Er. — Ahrw. (Fuß) — Siegmdg. [1 - Frings], Aggertal, Staudernheim a. Nahe (R.) — *W. N.* —

[**distinctus** Fairm. — Fuß, Berl. E. Z. 62, für Ahrw. - wie Fauv. 147 vermutete, Mannerheimi - Belegst. aus Samml. Fuß mit „Ahr“ bezettelt Bernh. vid. — Angabe in Schilsky II. 203 demnach wieder zu berichtigen. —]

2. **Mannerheimi** Kolen. — Ahrw. - 3 - in Samml. Fuß - Bernh. vid. — Frankreich u. im Süden [Ganglb. Käf. M.] —

3. **arcuatus** Steph. — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — a. d. Nette, Wied, Eltz, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **bilineatus** Steph. — Rhp. (*F.* - riparius Boisd.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **rivularis** Motsch. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - bilineatus Er.) — Elbf. (C.) — Wiedtal, U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **memnonius** Er. — Elbf. (Geilenk. - C.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

7. **fuliginosus** Grav. — Kref. (*F.*) — Elbf. (C.) — Nettetal, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **elongatus** Er. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (C.) — Kob., Saarl. (Gabr.) — Elztal, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **impressus** Lac. — Bopp. (*B.* - *inquilinus* Er.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal (2 - Andr.) — Kob. (1 - R.) — *H. W.* —

10. **corticinus** Grav. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **punctatellus** Er. — Ahrw., zahlreich (Fuß, Berl. E. Z. 60) - daher in Samml. Fuß u. Bruck. — Oberkassel - 1 - Samml. Reichenesp. — Belg., N. —

12. **foveolatus** Sahlb. — Kref. (vom Bruck - Fauv.) - Belegst. aus Samml. Bruck Hubenth. vid. — Kreuzn.-Theodorshalle, in

Rissen der von Salzwasser durchtränkten Balken der Gradierhäuser (Bernh. vid. - R.) — *H. W.* —

13. **halophilus** Ksw. — Kreuzn. (vom Bruck - Fauv. 159) - dort, Theodorshalle, wie foveolatus (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

14. **pusillus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) - Belegst. Hubenth. vid. — Kreuzn. - Samml. Bruck — Brodenbachthal (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

15. **gracilis** Mannh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Fauv. vid. — Kob., U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **subtilis** Er. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] - trifft nach Fauv. 161 tenellus Er. = gracilis - so Samml. Bruck. — *C.* für Elbf. [Corn.] - die beiden Stücke der Samml. Corn. sind [jetzt] gracilis. — Nicht *H. W. N.* - Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

16. **exiguus** Er. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Hubenth. vid. — Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — *N.* —

Haploderus Steph.

1. **caelatus** Grav. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **caesus** Er. — Kref., Düssdf. (*F.*) - von Kref. nicht in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — *W. N.* —

Oxytelus Grav.

1. **rugosus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **insecatus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **fulvipes** Er. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

4. **laqueatus** Marsh. — Elbf. (*C.* - luteipennis Er.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß) — *H. W.* —

5. **piceus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - pic. Grav.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob. (1 - Preiß) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —

6. **sculptus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **inustus** Grav. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

8. **sculpturatus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **nitidulus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*)

— Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**intricatus** Er. — Fauv. 172 für die Ahr [Fuß] - in Samml. Fuß nur 1 ohne Fundort, der bei auffälligen Funden fast nie fehlt. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten. —]

10. **complanatus** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **clypeonitens** Pand. — Brohltal (3 - Andr.) - Hubenth. vid. — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. - Bernh. vid. — *H. N.* —

12. **tetracarinatus** Block — Aach., Kref., Düssdf. (F. - depressus Grav.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **tetratoma** Czwal. — G. für Langerfeld b. Elbf. [Lehrer Käseberg] - Samml. des Finders zerstreut. — Nicht *H. W. N.* - sonst im Osten [Schilsky II.] —

Platystethus Mannh.

1. **arenarius** Geoffr. — Rhp. (F. - morsitans Pk.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **cornutus** Grav. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Cob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **alutaceus** Thoms. — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Nettetal (je 1 - R.) — *H. N.* —

3. **capito** Heer. — Elbf. (C.) — Kref. (Mink - Fauv.) — Ahrw. (Fuß) — Tönnisstein, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

— **nodifrons** Sahlb. — F. für Kref. [vom Bruck u. Mink] u. Elbf. [Corn.] - in Fauv. 183 nicht aufgenommen, „vielfach sei nitens als nodifrons angeführt“ - von Kref. nicht in Samml. Bruck, noch [Lange briefl.] in Samml. Mink. — C. für Elbf. [Corn.] - Belegst verloren. — Nicht *H. N.* - nach W. 95 in Westf. —

4. **nitens** Sahlb. — Elbf. (Corn. - G. - nitens Schrk.) — *H. W. N.* —

Bledius Mannh.

[**tricornis** Hbst. — F. für Kreuzn. [Heyd.] u. Fauv. 194 für Kreuzn. [vom Bruck] treffen den damals noch nicht aufgestellten spectabilis - so die tric. von Kreuzn. in Samml. Bruck - Bernh. vid. — Mehrmaliges Absuchen an den Gradierhäusern von Karls-halle u. Theodorshalle zwischen 1895 u. 1909 ergab nur spect. (R.) — *W. N.* —]

1. **spectabilis** Krtz. — Kreuzn. - Samml. Bruck — Karlshalle, Theodorshalle dort, unter den Gradierhäusern nicht bes. selten (Epp. vid. - R.) — *H.* —

2. **pallipes** Grav. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) - daher in Samml. Fuß. — *H. W.* —

3. **longulus** Er. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — *H. W.* —

4. **opacus** Block -- Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Solg. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

5. **atricapillus** Germ. — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - Geilenk., D. E. Z. 92) — H. N. —

v. **nanus** Er. — W. 94 für Elbf. [Corn.] - nicht mehr im Verz. C. — G. für U. Solg. [v. Hagens] - in Samml. Hagens 3 Stück mit „E.“ bezettelt, ob Elberfeld? (Dom. Hag.) — Nicht H. W. N. - sonst in Deutschl. verbr. [Schilsky II.] —

6. **fracticornis** Pk. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Gerolstein, U. Nahe (Bernh. vid. - R.) — H. W. N. —

7. **femoralis** Gyll. — Elbf. (C.) — Kref. (vom Bruck - Fauv.) — Kleve, nicht Ahrtal, wie in Fauv. (Fuß) — H. —

8. **crassicollis** Lac. — Kref., Düssdf., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

9. **cibricollis** Heer — Aach. (F. - rufipennis Er.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., nicht auch Siegmdg., wie Beitr. II. (R.) — H. W. N. —

10. **dissimilis** Er. — Ahrw. (Fuß - Fauv.) - Belegst. aus Samml. Fuß Bernh. vid. — H. W. N. —

11. **erraticus** Er. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck mit Fauv. vid. — H. —

12. **subterraneus** Er. — Kref., Düssdf., Bonn (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C. u. G.) — Tönnisstein (R.) — H. W. N. —

Oxyporinae.

Oxyporus F.

1. **rufus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

2. **maxillosus** F. — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb. (1 - Urb.) — W. N. —

Steninae.

Stenus Latr.

1. **biguttatus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

2. **bipunctatus** Er. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

3. **guttula** Müll. — Elbf. (C. u. G.) — Laach. See, Kob., U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

4. **stigmula** Er. — U. Solg. (Epp. vid. - G.) — Kleve (Fuß - Fauv. Nachtr. 1.) — Oberwerth (Bernh. vid. - R.) — H. N. —

5. **bimaculatus** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf.

(C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **Juno** Pk. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Oberwerth, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

7. **ater** Mannh. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Löhndorf (Hubenth. vid. - Raderm.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **longitarsis** Thoms. — Fauv. Nachtr. 1 für Ahrw. [Fuß] - in Samml. Fuß anscheinend nur Hessen. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

9. **clavicornis** Scop. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F. - speculator Boisd.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **Rogerii** Krtz. — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *N.* —

11. **providus** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

12. **silvester** Er. — Kref. (Mink - F.) — Düssdf., Ahrw. (Fuß - Belegst. aus Samml. Fuß Bernh. vid. — *H.* —

13. **excubitor** Er. — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - G.) — Duisb. [1 - Urb.] in Samml. R. - Bernh. vid. — Nicht *H. W. N.* - Mittel-europa [Ganglb. Käf. M.] —

14. **lustrator** Er. — Elbf. (1 - C.) — Kref. u. Ahrw. (vom Bruck u. Fuß - Fauv.) - Kref. in Samml. Bruck mit Scriba vid. — Saarl. (Gabr.) — Schmittenhöhe (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **proditor** Er. — C. für Elbf. [2 - Corn.] - Belegst. aus Samml. Corn. verloren - Vorkommen nach Fauv. 244 Anm. zweifelhaft. — Nicht *H. N.* - nach W. 91 in Westf. [1 - grandiceps Thoms.] —

15. **asphaltinus** Er. — Ahrw. (Kraatz, Ins. D. II. 749, u. Fuß, Berl. E. Z. 58) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H.* —

16. **fossulatus** Er. — Kref. (Mink - F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (1 - Andr.) — Bonn, Rhens (je 1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

17. **aterrimus** Er. — Bonn (v. Rantzau - F.) — Elbf. (2 - Corn. - C.) — Witterschlick b. Bonn, Linz u. Löwenburg i. Siebengbg. [Reichensp.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

18. **palposus** Zett — Düssdf. - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. - daher auch in Samml. Bruck. — *H.* —

19. **ruralis** Er. — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - G.) — *N.* —

20. **bupthalmus** Grav. — Aach.. Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

21. **incrassatus** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — *H. N.* —

22. **cananiculatus** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (1 - Andr.) — Kob., U. Nahe (je 1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
23. **morio** Grav. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — *H. W. N.* —
24. **melanarius** Steph. — Kref. (Mink - F. - cinerascens Er.) — Elbf. (1 - C.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Kob., Kreuzn.-Theodorshalle (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
25. **atratulus** Er. — Kref. (F.) - daher, aus Samml. Bruck, Bernh. vid. — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —
26. **melanopus** Marsh. — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 756) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - nitidus Lac.) — Elbf. (1 - C.) — *H. W. N.* —
27. **incanus** Er. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv. Nachtr. 1) — *H. W. N.* —
28. **pusillus** Steph. — Aach., Kref. (F. - pus. Er.) — Elbf. (C.) — Ahrw., Laach. See, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
29. **exiguus** Er. — Kref. (1 - vom Bruck - Fauv. vid. 251) - das Belegst. so bezettelt in Samml. Bruck. — Frankreich u. a. [Ganglb. Käf. M], Hamburg [Schilsky II.] —
30. **nanus** Steph. — Rhp. (F. - declaratus Er.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Duisb. [1 - Urb.] in Samml. R. - Bernh. vid. — *H. W. N.* —
31. **circularis** Grav. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
— **pumilio** Er. — C. für Elbf. [Corn.] - Belegst. aus Samml. Corn. verloren - die schon in *F.* enthaltene Angabe soll nach Fauv. 249 Anm. jedenfalls *pusillus* treffen. — Nicht *H. N.* - in *W. 91* —
32. **vafellus** Er. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
33. **fuscipes** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Bernh. vid. — Saarl. (Gabr.) — Nettetal (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
34. **Argus** Grav. — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - G.) — Kref. u. Ahrw. (vom Bruck u. Fuß - Fauv.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn [1 - Frings], Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
35. **humilis** Er. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - G.) — Siegmdg., Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —
36. **carbonarius** Gyll. — Kref. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. [1 - Mühlf.] in Samml. R. - Belegst. Hubenth. vid. — *H. N.* — Fauv. 251 hat die alten Angaben zu carb. Er. = *palposus* Zett. gestellt u. den carb. Gyll. nicht für die rheinische Sub-region aufgenommen. —

37. **opticus** Grav. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. (vom Bruck - Fauv.) — *H. W. N.* —
38. **crassus** Steph. — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - G.) — Kob. (Gabr.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. - Bernh. vid. — *H. W. N.* —
39. **nigritulus** Gyll. — Kref. (Mink - F. - campestris Er.) — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - Geilenk.) — Angaben des nigr. Gyll. in *F.* für Aach. [Först.] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] wohl zu nigr. Er. = *crassus* - doch dieser nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —
40. **brunnipes** Steph. — Kref. (*F.* - *unicolor* Er.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Duisdorf (Hubenth. vid. - Raderm.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
41. **latifrons** Er. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Bernh. vid. — Eupen (Heym.) — U. Solg. (Epp. vid. - G.) — Saarl. (Gabr.) — St. (2 - Bernh. vid. - R) — *H. W. N.* —
42. **fulvicornis** Steph. — Elbf. (C. - *paganus* Er.) — Kref. - Samml. Bruck - Bernh. vid. — Brohltal (1 - Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Eupen (Heym.) — *H. W. N.* —
43. **tarsalis** Ljungh — Rhp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Laach. See, Kob., Sayntal, Elztal (R.) — *H. W. N.* —
44. **similis** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *oculatus* Grav.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
45. **cicindeloides** Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- **fornicatus** Steph. — *F.* für Kref. [vom Bruck u. Mink - *contractus* Er.] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - desgl. nicht in Samml. Mink (Lange) — *C.* für Barmen [Stachelhausen] — *H.* - daher möglich. —
46. **pubescens** Steph. — Kref. (Mink - *F.* - *subimpressus* Er.) — Kleve, Ahrw. (Fuß) — Prüm u. Schalkm. [le Roi], Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
47. **binotatus** Ljungh — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
48. **pallitarsis** Steph. — Aach., Kref. (*F.* - *plantaris* Er.) — Elbf. (C.) — Kref. [Ulbr.], Kob., St. (je 1 - R.) — *H. W. N.* —
49. **Leprieuri** Cuss. — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 783) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) - Bernh. vid. — *H.* —
50. **picipes** Steph. — Aach. (*F.* - *rusticus* Er.) — Elbf. (C.) — St. (R.) — *H. W. N.* —
51. **bifoveolatus** Gyll. — Kref. (Mink - *F.* - *planus* Er.!) - Kref. [vom Bruck - Fauv.] — Elbf (C. u. - Epp. vid. - G.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß) — Saarl. (Gabr.) — Weinfeld. Maar [le Roi], Kob., Elztal (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
52. **picipennis** Er. — Ahrw. (Fuß - Fauv. Nachtr. 1) - Belegst. aus Samml. Fuß Bernh. vid. — Saarl. (Gabr.) — *W. N.* —

53. **nitidiusculus** Steph. — Elbf. (*C. u.* - Epp. vid. - Geilenk.) — Eupen (2 - Heym.) — Schneifel [1 - le Roi] in Samml. R. - Hubenth. vid. — *H. W. N.*, Hertogenwald [Heym.] —

54. **flavipes** Steph. — Aach., Kref., Bonn (*F.* - *filum* Er.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C. u.*, *G.*) — Löhndorf (Raderm.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

55. **glacialis** Heer — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) - Belegst. aus Samml. Fuß Bernh. vid. — Wolkenburg i. Siebengbg. [Verhoeff] u. Sayntal (je 1 - R.) - Hubenth. vid. — Nach Col. Neerl. angeblich in Belg., Provinz Luik = Venngebiet — Taunus? [N. 98.] —

56. **subaeneus** Er. — Elbf. (*C. u.* - Epp. vid. - *G.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Pfaffendorf b. Kob., in Weinbergen (Mühlf.) - daher in Samml. R. - Bernh. vid. — *H. N.* —

57. **fuscicornis** Er. — Ahrw. (Fuß - Kraatz, Ins. D. II. 792) — Vallendar, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

58. **geniculatus** Grav. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Löhndorf (Hubenth. vid. - Raderm.) — Oberwerth (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

59. **palustris** Er. — Kref. (Mink - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

60. **impressus** Germ. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Siebengbg., Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

61. **Erichsoni** Rye — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

62. **pallipes** Germ. — Aach., Bonn (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Oberwerth, Elztal, U. Nahe (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Dianous Sam.

1 **coerulescens** Gyll. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nettetal, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Euaesthetinae.

Euaesthetus Grav.

1. **bipunctatus** Ljungh — Aach., Kref. (*F.* - *scaber* Grav.) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Viersen [le Roi], Laach. See, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **ruficapillus** Lac. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

— **laeviusculus** Mannh. — *C.* für Elbf. [Corn.] - nicht [mehr] in Samml. Corn. — Westhoff hat im Nachtrag zur Westf. Käferfauna [XIV. Jahresber. Westf. Pr. für 1885 S. 49] die Art nicht angeführt, was schon de Rossi [ebendort 1898] bemerkt. - Ob versehentlich? — *H.* —

Paederinae.

Astenus Steph.¹⁾ = **Sunius** Er.

1. **filiformis** Latr. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., Kreuzn., St. (R.) — *H. W. N.* —
a. humeralis Gredl. — Blumsay [1 - Bockl.] in Samml. R. —
 2. **angustatus** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Paederus F.

1. **ruficollis** F. — *F.* für Aach., Düssdf., Bonn, Ahrtal, Bopp. - wohl den damals noch nicht aufgestellten gemellus mittreffend, schwerlich auch den in der Fauna Germanica als Art wieder aufgenommenen, sonst aus Rhp. nicht bekannten sanguinicollis Steph. — Kref. - Samml. Bruck — Kleve, Ahrw. (Fuß) — Siegmdg. [Frings], Sayntal, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
 2. **gemellus** Krtz. — Laach. See - Samml. Bruck — Ahrw., Laach. See (Fuß) — Kond b. Kochem (Bernh. vid. - R.) — *W.* —
 3. **riparius** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Laach. See (R.) — *H. W. N.* —
 4. **fuscipes** Curt. — Ruhrtal, Düssdf., Bopp. (*F.* - longipennis Er.) — Elbf. (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
 5. **limnophilus** Er. — Ruhrtal, Düssdf., Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Aggertal (R.) — *W. N.* —
 6. **litoralis** Grav. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* - gregarius Scop.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
 7. **brevipennis** Lac. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Stilicus Serv.

1. **angustatus** Geoffr. — Aach., Düssdf., Bonn (*F.* - fragilis Grav.) — Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Siegmdg., Ahrw., Wiedtal, U. Nahe, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —
 2. **subtilis** Er. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —
 3. **rufipes** Germ. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
 4. **similis** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Löhndorf (Raderm.) — Siegmdg., Ahrw. (R.) — *H. W. N.* —
 5. **geniculatus** Er. — Elbf. (*C. u. G.*) — Kref. (vom Bruck - Fauv.) - daher in Samml. Bruck - genic. Er. — *H. W. N.* —

1) Sunius exilis Schüpp., in *F.* für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet.

6. **orbiculatus** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - *affinis* Er.) - Kref. in Samml. Bruck - aff. Er. — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

7. **Erichsoni** Fauv. — Düssdf. (*F.* - *orbiculatus* Pk.!) — Bopp. (*B.* - *orb.* Pk.) - für *orb.* Er. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck - *orb.* Pk. — Brohltal (3 - Andr.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W.* —

Scopaeus Krtz.

1. **didymus** Er. — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — Südl. Mittel-europa [Ganglb. Käf. M.] —

2. **cognatus** Rey = **sulcicollis** Steph. in Cat. Col. 06 -- Elbf. (*C.* - *cogn.* Rey) — Oberwerth (1 - Mühlf.) — Brohltal (1 - Andr.) Hubenth. vid. — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

3. **minutus** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *min.* Er.) — Elbf. (*C.* - *sulcicollis* Steph.!) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

[**v. pusillus** Ksw. — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. *C.* —]

4. **minimus** Er. — Elbf. (1 - *C.*) — Ahrw. (Fuß · Fauv.) - daher in Samml. Bruck mit Fauv. vid. — *H. N.* —

5. **gracilis** Sperk. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) - daher in Samml. Bruck — St. (1 - Epp. vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **laevigatus** Gyll. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Kob., U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Lithocharis Lac.

1. **ochracea** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

Medon Steph.

1. **castaneus** Grav. — Düssdf. (*F.*) - daher u. Kleve in Samml. Fuß — Elbf. (v. Hagens - *C.*) — *H. W. N.* —

2. **dilutus** Er. — Kleve (1 - Fuß, Berl. E. Z. 67) — Roermond [Col. Neerl.] —

3. **piceus** Krtz. — Düssdf. (v. Hagens - *G.*) - nicht Elbf., wie Kraatz, Berl. E. Z. 63 u. B. IV. 298 angeben [*W.* 312] — *H. W. N.* —

4. **brunneus** Er. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Werden (Urb.) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **fusculus** Mannh. — Bonn (v. Rantzaу - *F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **ripicola** Krtz. — Ahrw., Barmen (Kraatz, Ins. D. II. 715) - Ahrw. (Fuß) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **bicolor** Ol. — Kreuzn. (1 - Hubenth. vid. - R.) — Aller, Harz u. a. [Schilsky II.] —

8. **melanocephalus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. in Samml. Bruck — Ahrw., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **obsoletus** Nordm. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

Domene Fauv.

1. **scabricollis** Er. — Elbf. (Stachelhausen u. Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv. Nachtr. 1) — *W. N.* —

Lathrobium Grav.

1. **multipunctum** Grav. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **angusticolle** Lac. — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Ahrw. (Fuß) — Ahrw., Kreuzn. - Theodorshalle (R.) — *W.* —

3. **picipes** Er. — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. 62) — Honnef [1 - Dorm.] in Samml. R. - Epp. vid. — *W.* —

[**punctatum** Zett. — *F.* für Aach., Kref., Elbf. - trifft punct. Er. = *fovulum* Steph. - so nach der Beschreibung und Stellung B. IV. 197 mit denselben Fundorten - punct. Zett. auch Ost-europäer. —]

4. **quadratum** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - quadr. Gyll. - Angabe wird terminatum mittreffen. — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — Siegmdg [1 - Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

5. **terminatum** Grav. — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., Alf., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **rufipenne** Gyll. — *F.* für Aach., Kref., Bopp. - Fauv. noch für Ahrw. [Fuß] — In B. IV. 196 nicht für Bopp. - in Samml. Bruck nicht von Kref. - in Samml. Fuß nur Stettin - Angabe für Ahrw. an Fauv. jedenfalls durch vom Bruck gelangt, in dessen Samml. Tauschstücke mit „Ahr“, die von Fuß, aber nicht von dessen Wohnort stammen. — Da Belg. u. H., vielleicht richtig für die Torfgebiete des H. Venn bei Aach., obschon nicht in Fred. angeführt. —

6. **elongatum** L. — Rhp. (F.) · umfasst das viel häufigere, damals noch nicht aufgestellte *geminum* mit. — Elbf. (Geilenk. - C.) — Kref. · Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — *H. W. N.* —

— **v. fraudulentum** Ganglb. — Siegmdg. [Frings] in Samml. R. - ♂♀ - Hubenth. vid. —

7. **geminum** Krtz. — Elbf. (C. - boreale Hochh.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Brohltal (Andr.) — Siegmdg., Kottenforst, Oberwerth, Elztal (♂♂ - Bernh. vid. - R.) — *H. W.* —

8. **laevipenne** Heer — Elbf. (Geilenk. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - dentatum Kelln.) — Bonn, Ahrw., Kob., U. Nahe, St. (Epp. vid. part. - R.) — *H. W. N.* —

9. **castaneipenne** Kolen. — Brohltal (1 ♂ - Andr.) - Hubenth. vid. — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

10. **fulvipenne** Grav. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **Letzneri** Gerh. — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) —

11. **brunnipes** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Stücke von Kref. (Geilenk.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Siegindg., Nettetal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

12. **fovulum** Steph. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - punctatum Zett.!) - s. oben — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Siegindg., Oberwerth, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

13. **filiforme** Grav. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. (Epp. vid. - Geilenk.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Siegindg. [1 - Frings], Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

14. **longulum** Grav. — Rhp. (F.) — Elbf. (C) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Siebengbg., Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**dilutum** Er. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] u. „am Rhein“ [Mink] = bei Kref. - Fauv. für Kref. [vom Bruck] - in Samml. Hildebr. ohne Fundort (Miss. Steyl) - desgl. in Samml. Bruck - in Samml. Mink fehlend (Lange) — *G.* für Elbf. [1 aus Samml. Stachelhausen mit „Bestimmung richtig?“] - das Stück ist pallidum — *N.* - nicht *H. W.* —]

15. **pallidum** Nordm. — Elbf. (C.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth. (1 - R.) — *H. W. N.* —

— **spadiceum** Er. — Eichh., Berl. E. Z. 66, für Jülich. — Nicht *H. N.* - in *W.*? — Ganglb. Käf. M.: Alpengebiet, Frankreich. —

Pseudobium Rey.

1. **labile** Er. — Ahrw. (einige Stück - Fuß, Berl. E. Z. 66) - so Samml. Fuß — Sonst im Mittelmeergebiet [Ganglb. Käf. M.] —

Achenium Curt.

1. **depressum** Grav. — Saarl. (Gabr.) — Belg. u. *H.* —

2. **humile** Nic. — Kleve (1 - Fuß, Berl. E. Z. 67) — Kob. (1 - Reitt. vid. - Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Belg., *H. W. N.* —

Dolicaon Lap.

1. **biguttulus** Lac. — Düssdf. (v. Hagens - B. IV. 298) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 57) — Rheydt (2 - Epp. vid. - Geilenk. — Südl. Mitteleuropa [Gangl. Käf. M.] —

Cryptobium Mannh.

1. **fracticorne** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.)
— Ahrw., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Staphylininae.**Xantholinini.****Leptacinus** Er.

1. **parumpunctatus** Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — *W. N.* —
2. **batychrus** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.)
— Kob. (Gabr.) — Laach. See, U. Nahe, St. (R.) — *H. W.* —
3. **formicetorum** Maerk. — Duisb., Bonn (F.) — U. Solg.
(G.) — Kref. (Epp. vid. - Geilenk.) — Linz (Wasm., D. E. Z.
94) — Rolandseck (Reichenesp.) — Brohltal (Andr.) — Blumsay
(Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Xantholinus Serv.

1. **punctulatus** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.)
— Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
a. **Thomsoni** Schwarz — Saarl. (Gabr.) — Blumsay (Andr.)
— Bonn (R.) — *H.* —
2. **angustatus** Steph. — Ahrw. (Fuß) — Saarl. (Gabr.) —
Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —
3. **atratus** Heer — Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Oberwinter,
Saffenburg a. Ahr (Reichenesp.) — Brohltal (Andr.) — *W.* —
4. **glabratus** Grav. — Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.)
— Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Duisb. (1 - Urb.) — Kref. [1 -
Fischer] in Samml. R. — *H. W. N.* —
— **relucens** Grav. — R., Beitr. I, für Bonn [bei Formica rufa
u. unter Weidenrinde - Verhoeff] - Belegst. verloren. — Nicht
H. W. N. - deshalb zweifelhaft. —
5. **glaber** Nordm. — Bonn (v. Rantzau - F.) — Elbf. (Hubenth.
vid. - Geilenk.) — Brohltal (Andr.) — Siegmdg. [Frings], Ober-
werth, St. (R.) — *H. W. N.* —
6. **tricolor** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) —
Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
7. **distans** Rey — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. (Fuß) — Nettetal,
Rhens, St. (R.) — *W. N.* —
8. **linearis** Ol. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) —
Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) —
H. W. N. —
v. **longiventris** Heer — Ahrw. (Fuß) — Saarl. (Gabr.) —
Oberwerth (1 - R.) — *W. N.* —

Nudobius Thoms.

1. **lentus** Grav. — Aach. (Fürst. - F.) — Nev. (de R., Westf.

Pr. 98) — Kob. (Xambeu - Fauv.) — Duisb. (Urb.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Gauropterus Thoms. = **Eulissus** Epp.

1. *fulgidus* F. — Düssdf. (F.) — Elbf. (C. u. G.) — Kob. (1. Bockl.) — *H. W. N.* —

Baptolinus Krtz.

1. *pilicornis* Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (G.) — *W. N.* —

2. *longipes* Fauv. — Ahrw. (1 - Fuß - R. Beitr. I.) in Samml. Fuß 1 aus Böhmen, 1 ohne Fundort; Fuß hält die Angabe entschieden aufrecht. — Nicht *H. W. N.* - Frankreich, Deutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

3. *affinis* Pk. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — H. Venn, Kochem, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Othius Steph.

1. *punctulatus* Goeze — Aach., Kref., Düssdf. (F. - fulvipennis F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Siebengbg., Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

2. *laeviusculus* Steph. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — Bonn, bei Formica rufa (Verhoeff) — Belg. - Mittel-europa [Ganglb. Käf. M.] —

3. *melanocephalus* Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Mühlf.) — *H. W. N.* —

4. *myrmecophilus* Ksw. — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

Staphylinini.

Actobius Fauv.

1. *cinerascens* Grav. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Manderscheid, Laach. See, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. *signaticornis* Rey — Elbf. (C. - rivularis Ksw.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 68) — Arenberg, Elztal, St. (R.) — *H. N.* —

Neobisnius Ganglb.

1. *villosulus* Steph. — Aach., Kref. (F. - elongatulus Er.) — Elbf. (C.) — Vallendar, Güls (R.) — *H. W. N.* —

2. *procerulus* Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Fuß — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Nettetal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. *prolixus* Er. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv.) — Ahrw., U. Nahe (R.) -- *H. W. N.* —

Philonthus Steph.

1. **splendens** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Eupen (Heym.) — Kref. - Samml. Bruck u. [Brink] in Samml. R.) — *H. W. N.* —
2. **intermedius** Lac. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —
3. **laminatus** Creutz. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Siegmdg., Laach. See, Kob. (R.) — *H. N.* —
4. **laevicollis** Lac. — Vallendar, Chaussee nach Höhr, Anfang März (1 - Hubenth. vid. - R.) — *W. N.* —
[**montivagus** Heer — Kob., aus Genist nach Rheinhochwasser [1 - Mühlf.] in Samml. R. - Hubenth. vid. — Nicht *H. W. N.* - über die Gebirge von Mitteldeutschland u. a. verbr. [Ganglb. Käf. M.] —]
- [**nitidus** F. — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] - gegenüber der Samml. Bruck u. dem Verz. *C.* unrichtig. — Auch in andern Samml., so Fuß, Geilenk., Mühlf., Bocklet u. a. nicht aus Rhp. — *N.* - nicht *H.* - nach *W.* 83 Westf. —]
5. **cyanipennis** F. — Ahrtal (Fuß - Kraatz, Ins. D. II. 575) - Fundstelle der Wald bei Ringen (Fuß) — Heisterbach i. Siebengbg. (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — Kob. (Heym.) — Belg., *N.* —
6. **aeneus** Rossi — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Eupen (Heym.) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.*
7. **chalceus** Steph. — Elbf. (C. - proximus Krtz.) — Kref. - Samml. Brink - Hubenth. vid. — Bonn, Nettetal, Kob., U. Nahe, Kreuzn., St. (R.) — *H. W. N.* —
8. **addendus** Sharp. — Kleve (Fuß, D. E. Z. 84) — Brohltal (1 ♂ - Andr.) - Hubenth. vid. — Kref. [1 ♂ - Brink] in Samml. R. — R., Beitr. II für St., unrichtig. — *H.*, u. a. Roermond. —
9. **carbonarius** Gyll. — Elbf. (C.) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67 - tenuicornis) — Kref. [Brink] in Samml. R. — Duisb. (Urb.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Laach. See, Oberwerth (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
10. **temporalis** Rey — Rhp. (Kraatz, Berl. E. Z. 68 S. 351, nach ihm von Eichhoff zugesandten Stücken) - vermutlich Jülich, Wohnort von Eichh. — Sonst Jura, Alpen [Ganglb. Käf. M.] —
11. **atratus** Grav. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Winningen, Trier, U. Nahe, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —
12. **coerulescens** Boisd. = **Bodemeyeri** Eppelsh. — Schon von Kraatz a. d. Ahr gfd. [Ins. D. II. 586 - die Angabe über die Punktierung der Stücke mit bläulichen Flügeldecken lässt keine Deutung auf atratus zu] - daher je 1 in Samml. Bruck u. Fuß bei atratus. — Auf fast überfluteten Kiesbänken der Ahr zwischen Ahrw. und d. Walporzheimer Brücke 1894 zahlreich (Epp. vid. - R.), 1895 noch häufiger (Dorm.) - seitdem

nicht mehr. — Thüringen, Harz [Schilsky II.] - Fahrnau i. Baden [Fauna Germanica]. —

13. **rotundicollis** Mén. — Kref. (vom Bruck-Fauv.) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67 - scutatus) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

14. **ebeninus** Grav. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Saarl. (Gabr.) — Linz (R.) — *H. W. N.* —

15. **coruscus** Grav. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

16. **concinnus** Grav. — Elbf. (Epp. vid. - *G.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., Kochem (Bernh. vid. - R.) — *N.* —

[**dimidiatus** Sahlb. — Angabe in *F.* für Kref. u. Ahrtal [Mink u. vom Bruck] nach Fauv. 460 Note 2 von diesen zurückgenommen. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] trifft nach dem Belegst. der Samml. Corn. varius a. nitidicollis [Bernh. vid.] — Scheint auch Osteuropäer. —]

17. **sanguinolentus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Kochem, Strotzbüsch, Schalkenmehren (R.) — *H. W. N.* —

a. contaminatus Grav. — Horchheim, i. Gaswasser (1 - Mühlf.) — *H. N.* —

18. **immundus** Gyll. — Aach. (*F.* - fumigatus Er.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Bonn, Kob., U. Nahe (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

19. **debilis** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

20. **decorus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

21. **fuscipennis** Mannh. — Rhp. (*F.* - politus F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Siebengbg., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

22. **Mannerheimi** Fauv. — Kref. (*F.* - lucens Mannh.) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Saarl. (Gabr.) — Kreuzn. (1 - R.) — *H. W. N.* —

23. **varius** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. bimaculatus Grav. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — *W. N.* —

a. nitidicollis Lac. — Elbf. - Samml. Corn. als dimidiatus - Bernh. vid. — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) —

— **frigidus** Ksw. — *C.* für Elbf. [sehr selten - Corn.] - Belegst. verloren. — Nicht *H. W. N.* - über die Gebirge von Mitteleuropa verbr. [Ganglb. Käf. M.] —

24. **marginatus** Stroem — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - marg.

F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — *H. W. N.* —

25. **lepidus** Grav. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Kraatz - Fauv.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Rodderberg [Reichensp.], Remagen, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

26. **nitidulus** Grav. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (1 - C.) — *N.* —

27. **longicornis** Steph. — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

28. **cruentatus** Gmel. — Aach., Kref. (F. - bipustulatus Pz.) - Kref. in Samml. Bruck-Stücke daher (Geilenk.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

29. **varians** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - auch opacus Grav.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Ahrw., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

v. agilis Grav. — Saarl. (Gabr.) — St. (1 - Epp. vid. - R.) — *W. N.* —

30. **albipes** Grav. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Oberwerth, St. (Bernh. vid. - R.) — *W. N.* —

31. **fimetarius** Grav. — Aach., Kref., Bonn (F.) — Elbf. (Epp. vid. - G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

32. **cephalotes** Grav. — Aach., Kref. (F.) — Eupen (Heym.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

33. **sordidus** Grav. — Aach., Kref. (F.) — Eupen (Heym.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl., Preiß u. R.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

34. **fuscus** Grav. — Kref. (Mink - F.) — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — *H. W. N.* —

35. **umbratilis** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**corvinus** Er. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Ürdingen [Stollwerck] - *C.* für Elbf. [Corn.]. — Belegst. der Samml. Bruck sind ebeninus - Bernh. vid. -, der Samml. Mink ohne Fundort, von Mink präpariert, nicht corv. (Lange), der Samml. Corn. wohl verloren - jetzt concinnus u. and. Art. — Fauv. 462 Anni. kennt corv. nicht aus seinem Faunengebiet. — Nicht *H. N.* - nach *W. 85 Westf.* —]

36. **ventralis** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Schneifel [le Roi], Kob. (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

37. **discoideus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —

38. **quisquiliarius** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob., Winningen, U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
v. inquinatus Steph. — Elbf. (3 - G.) — Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — *N.*, u. im Alsenzthal nahe Münster a. Stein [R.] —
39. **rufimanus** Er. — Aach. (F.) — Ahrw. (B.) — nicht Elbf., wie F. angibt, nicht in C. — Kreuzn. (vom Bruck - Fauv.) — Ahrw., Winningen, Elztal, Trier, U. Nahe, St. (R.) — *W. N.* —
40. **fumarius** Grav. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck - u. [von Brink] in Samml. R. — Löhndorf (1 - Raderm.) — Siegmdg. [1 - Frings], Laach. See (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
41. **nigrita** Grav. — Nev. (de Rossi - C.) - Belegst. in Samml. Corn. — *H. W. N.* —
 [virgo] Grav. — F. für Elbf. [Corn.] - nicht in Verz. C. —]
42. **micans** Grav. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., Winningen (R.) — *H. W. N.* —
43. **fulvipes** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw., Kob., Kochem, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
 — **salinus** Ksw. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. verloren. — Nicht *H. W. N.* - auch Salzbodenbewohner, daher schwerlich bei Elbf. —
44. **punctus** Grav. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Moselufer gegenüber Winningen, U. Nahe (R.) — An sumpfigen Ufern, schwerlich, wie nach Fauna Germanica, in Wäldern an Baumsaft. — *H. W. N.* —
45. **tenuis** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — Siegmdg., Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
46. **pullus** Nordm. — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (1 - Bernh. vid. - R.) — *N.* —
47. **vernalis** Grav. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (G.) — Laach. See, Oberwerth. (R.) — *H. W. N.* —
48. **exiguus** Nordm. — Elbf. (1 - C.) — Kref. u. Ahrw. (vom Bruck u. Fuß - Fauv.) - von Ahrw. aus Samml. Fuß Bernh. vid. — *H. W.* —
 — **rubripennis** Ksw. — Zebe für Rhp. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. verloren. — *H. u. nach W. 84 Westf.* —
49. **astutus** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 60.) — Bonn, Saynthal, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
50. **nigritulus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - aterrimus F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. trossulus Nordm. — Duisb. (1 - Urb.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H.* —

51. **thermarum** Aub. — Elbf. (2 - Corn. - C.) - Belegst. verloren. — Cosmopolit [Ganglb. Käf. M.] —

52. **splendidulus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. [Brink] in Samml. R. — Duisb. (Urb.) — Bonn (Reichensp.) — Soon (Epp. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Staphylinus L.

1. **pubescens** Deg. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Aach., Duisb. (Urb.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **fossor** Scop. — Aach., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Sieben-gbg. - Samml. Bertkau — Ahrw. (Fuß-Fauv.) — U. Ahr (Heyd.) — Kochem, Soon (R.) — *H. W. N.* —

3. **fulvipes** Scop. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Eupen (Brink) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Tönnis-stein, Kob., Kochem (R.) — *H. W. N.* —

4. **stercorarius** Ol. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (2 - Andr.) — U. Ahr. (Heyd.) — *H. W. N.* —

5. **chalcocephalus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **latebricola** Grav. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Eupen (Brink) — Kob. (Bockl.) — St. (1 - R) — *H. W. N.* —

7. **caesareus** Cederh. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **erythropterus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **olens** Müll. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**tenebricosus** Grav. = **brachypterus** Fairm. — Nach W. 81 in Westf. ziemlich überall - Fügner, der auch bei Arnsberg, wo die Art nach Fricken, Naturgesch. der in Deutschl. einheim. Käfer, häufiger sein soll als olens, wiederholt sammelte, kennt sie nicht aus Westf. [Fügner briefl.] - nicht *H. N.*, noch Rhp. —]

10. **ophthalmicus** Scop. — Rhp. (F. - cyaneus Pk.) — Elbf. (C.) — Eifel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

11. **similis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Linz, St. (R.) — *H. W. N.* —

12. **macrocephalus** Grav. — Elbf. (2 - Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Bernh. vid. — *W.* —

v. alpestris Er. — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Bernh. vid. — *W.* —

13. **brunnipes** F. — Aach., Kref., Bonn (F.) — Elbf. (C.) u. G.) — Siegmdg., Kochem, St. (R.) — H. W. N. —
14. **fuscatus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — H. W. N. —
- [**mus** Brull. — F. für Düssdf. [Hildebr. - picipes Nordm.] - in B. u. Fauv. 413 nicht für Rhp. - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl) - nicht H. W. N. - südlichere Art. —]
15. **picipennis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Eifel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Nahe (R.) — H. W. N. —
16. **aeneocephalus** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - cupreus Rossi) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Neuenahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Soon (2 - v. Geyr.) — Bonn [le Roi] in Samml. R. — H. W. N. —
17. **fulvipennis** Er. — Bopp. (F.) — Ahrtal (Fuß) — U. Ahr (Heyd.) — Duisb. (Urb.) — Kob. St. (R.) — W. N. —
18. **pedator** Grav. — Bopp. (F. - rufipes Latr.) — U. Ahr (Fuß, Berl. E. Z. 61, u. Heyd.) — Oberstein (1 - Heyd.) — Bonn, U. Nahe (R.) — H. N. —
19. **ater** Grav. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Fuß — Elbf. (G.) — Winningen (1 - Bockl.) — Kreuzn. - Samml. Bruck. - dort, Theodorshalle (R.) — W. N. —
- [v. **rufipes** Verh. — Verh. Nat. Ver. 90 beschrieben nach einem bei Bonn gefundenen Stück, das sich bei einer späteren Prüfung [R.] als pedator erwies - jetzt verloren. —]
- [**falcifer** Nordm. — Fuß, Berl. E. Z. 61, für Ahrw. [1] - falc. als Südosteuropeär kommt nicht in Frage - minax Rey, aus H. angegeben, auf den Fauv. 419 Anm. u. Heyd, D. E. Z. 75, die Angabe beziehen möchten, nach Samml. Fuß, aus der nie etwas verloren gegangen, u. Samml.-Verzeichnis auch nicht, da die Art darin ganz fehlt. - bleibt nur Annahme der Verwechung mit ähnlich gefärbter einheimischer Art? —]
20. **globulifer** Geoffr. — Rhp. (F. - morio Grav.) — Elbf. (C.) — Aach. (Urb.) — Saarl. u. Eifel (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —
- v. **rubidus** Verh. — Godesberg (1 - Verhoeff - beschrieben) - Belegst. verloren. —
21. **compressus** Marsh. — Elbf. (Geilenk., D. E. Z. 92) — U. Solg. (G.) — Bonn, Kleve - Samml. Fuß. — H. —
- Ontholestes** Ganglb.
- I. **tessellatus** Geoffr. — Rhp. (F. - nebulosus F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Gabr. u. Bockl.) — Bonn, Kob. St. (R.) — H. W. N. —

2. **murinus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Emus Curt.

1. **hirtus** L. — Trier (Schnur · F.) — Elbf. (1 · C.) — Kleve (1 · Fuß) — Auch Bingen [B. IV. 157] u. *H. W. N.* —

Creophilus Mannh.

1. **maxillosus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Quediini.

Quedius Steph.

1. **longicornis** Krtz. — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (Epp. vid. - Geilenk., D. E. Z. 92.) — *H. N.* —

2. **brevis** Er. — Aach., Düssdf., Bonn (F.) - Kottenforst b. Bonn (Reichensp.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Blumsay (Bockl.) — Horchheim (Mühlf.) — *H. W. N.* —

3. **lateralis** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Laach. See, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

4. **brevicornis** Thoms. — Kleve - Samml. Fuß — Nettetal (1 · R.) — *H. N.* —

5. **ochripennis** Mén. — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Müddersheim b. Düren [aus Hamsterbau - 1 - v. Geyr] in Samml. R. - Bernh. vid. — Bonn, Laach. See, U. Nahe, St. (Epp. vid. - R.) — *H. N.* —

6. **fulgidus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F.) - unzweifelhaft den häufigeren, in *F.* fehlenden ochripennis mittreffend — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

7. **cruentus** Ol. — Stammform: Elbf. (1 - Corn. - C.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

8. **ventralis** Arag. — Kleve - Samml. Fuß — Kref. - Samml. Brink — Oberwerth (Bockl.) — Siegmdg. [1 - Frings], Niederwerth (R.) — *H. N.* —

9. **mesomelinus** Marsh. — U. Solg (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Nettetal, Kob., Winningen, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **maurus** Sahlb. — Fauv. 504 für. H. Venn [Chapuis · fagetii Thoms.] - daher Everts vid. [Col. Neerl.] - im rheinl. Teil des H. Venn wohl noch aufzufinden. — Nicht *H. W. N.* - Belegst. für N. 84 in Samml. Mühlf. ist mesomelinus [R.]. —

10. **xanthopus** Er. — Elbf. (Corn. · C.) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

11. **scitus** Grav. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

12 **cinctus** Pk. = **impressus** Pz. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **laevigatus** Gyll. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (Epp. vid. - Geilenk.) — *W.* —

14. **fuliginosus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Viersen [le Roi], Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

15. **tristis** Grav. — Elbf. (1 - C.) — Kleve, Kob. (Fuß) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

16. **molochinus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Eifel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**ochropterus** Er. — Fauv., Nachtr. 3, für Ahrw. [Fuß] - die ochropt. der Samml. Fuß sind picipes [Bernh. vid.] - ebenso die Tauschstücke von Ahrw. in Samml. Bruck. — Fundort Kleve in Col. Neerl., späterer Wohnort von Fuß, beruht, wie schon Col. Neerl. vermuten, sicher auf demselben Irrtum. — Nicht *H. W. N.* - im Hochgebirge. —]

17. **picipes** Mannh. — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Bruck — Bonn, Kob., Kochem, Soon (Epp. vid. - R.) — Angabe in F. für Bopp. [Bach] unrichtig, B. hat die Art nicht für Rhp. — *H. W. N.* —

— **dubius** Heer — *G.* für Nev. [1 - de Rossi] - Samml. de Rossi zerstreut. — Nach Ganglb. Käf. M. u. Vorkommen in *W.* möglich. —

18. **umbrinus** Er. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Elztal, St. (je 1 - Bernh. vid. - R.) — *W. N.* —

19. **fumatus** Steph. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

21. **nigriceps** Krtz. — Kref. (Mink - Kraatz, Ins. D. II. 510) - daher in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

— **limbatus** Heer — Fauv. für Ahrw. [Fuß] - Samml. Fuß anscheinend nur Berlin - in Samml. vom Bruck, auf den die Angabe wohl zurückgeht, nicht von Ahrw. — *N.* —

22. **humeralis** Steph. — Elbf. (C. - suturalis Ksw.) — Ahrw. (Fuß - Fauv., Nachtr. 3) — Siebengbg., Brohltal, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

23. **obliteratus** Er. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - marginalis Krtz.) — Sayntal, Laach. See, Kob., Kreuzn. (Bernh. vid. - R.) — *N.* —

[**praecox** Grav. — *F.* für Kref. u. Düssdf. - trifft wohl den *fumatus* Steph. = *praecox* Er. - *praec.* Grav. auch Südeuropäer, u. *fum.* Steph. von Kref. in Samml. Bruck. —]

24. **maurorufus** Grav. — Kref. (F.) — Elbf. (C. - auch modestus Krtz.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 60 - modestus Krtz.) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Wiedtal, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

25. **riparius** Kelln. — Nev. (1 - de Rossi - C.) — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 60) - Belegst. in Samml. Fuß. — Sayntal (4 - R.) — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

[**scintillans** Grav. — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. C. —]

26. **auricomus** Ksw. — Elbf. (v. Hagens u. Corn. - C.) - daher beschrieben Stett. E. Z. 63 - tomentosomaculatus Corn. — *N.* u. Verviers [Col. Neerl.] —

27. **rufipes** Grav. — Aach. (Urb.) — Brohltal (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — Schmittenhöhe (2 - Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

28. **semiaeneus** Steph. — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — *H.* [n. sltn. - Col. Neerl.], *N.* —

29. **picipennis** Heer — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

30. **boops** Grav. [Stammform, v. brevipennis Fairm. nur im Süden] — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

31. **fulvicollis** Steph. — Eupen (2 - Heym.) — Thüringen u. im Osten [Schilsky II.] —

Velleius Mannh.

1. **dilatatus** F. — Bopp. (F.) — Nev. (G.) — Kleve (Fuß) — Kref. - Samml. Bruck — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Bonn - Samml. Bertkau — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

Heterothops Steph.

1. **praevia** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Brohltal (Andr.) — Müddersheim, aus Hamsterbau [v. Geyr], Niederwerth, Oberwerth, Winningen (R.) — *H. W. N.* —

2. **dissimilis** Grav. — Aach., Kref. (F.) — Saarl. (Gabr.) — Blumsay (Mühlf.) — Laach. See, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **quadripunctula** Grav. — Elbf. (C.) — Kref. (Mink - Fauv.) — Ahrw. (Fuß) — *H. N.* —

Astrapaeus Grav.

— **ulmi Rossi** — *F.* für Aach. [Kaltenbach] - nach Fauv. 540 in seinem ganzen Faunengebiet verbreitet, außer Holland, und noch bei Namur gefunden. — Angabe daher wohl richtig - Samml. Först. ergibt nichts. —

Euryporus Er.

1. **picipes** Pk. — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kleve, Düssdf. (Col. Neerl.) — Viersen [1 - le Roi] in Samml. R. — Belg., H. N. —

Tachyporinae.**Bolitobiini.****Mycetoporus** Mannh.

1. **splendidus** Grav. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Siebengbg., Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

2. **Baudueri** Rey — Aach., Kref., Düssdf. (F. - nanus Gyll.) - in B. IV. 138 diese Fundorte bei nan. Grav. = nan. Er. — Elbf. (C. - nanus Er.) — Kob., St. (R.) — H. W. N. —

3. **brunneus** Marsh. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - lepidus Grav.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Vallendar, Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — H. W. N. —

4. **longulus** Mannh. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (v. Hagens - G.) — Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Brohltal (1 - Bernh. vid. - R.) — W. N. —

5. **ruficornis** Krtz. — Düssdf. - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — W. N. —

6. **forticornis** Fauv. — Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Schmittenhöhe (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. - Bernh. vid. — H. —

7. **clavicornis** Steph. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - pronus Er.) — Kref., Rheydt (Epp. vid. - Geilenk.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Schmittenhöhe (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. - Bernh. vid. — H. W. N. — Hierhin wohl noch Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 466) —

8. **splendens** Marsh. — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

9. **Märkeli** Krtz. — Elbf. (1 - C.) - Belegst. in Samml. Corn. mit Epp. vid. — Düssdf. (Everts, D. E. Z. 92) - näheres nicht mehr feststellbar — Eupen (3 - Heym.). — Nicht H. W. N. - Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

10. **rufescens** Steph. — Kref. (Mink - F. - lucidus Er.) - daher in Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. - u. Samml. Brink - nicht Ahrw. [Fuß], wie Fauv. angibt. — Duisb. (Urb.) — Jülich - Samml. Scriba (Neum.) — H. W. N. —

11. **punctus** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kochem (Bernh. vid. - R.) — H. W. N. —

Bryoporus Krtz.

1. **rufus** Er. — Kref. (Mink - Fauv.) — Elbf. (Epp. vid. - G.)

— Eupen (Heym.) — Ahrw. (Fuß) — Horchheim [1 - Mühlf.] in Samml. R. - Bernh. vid. — *W. N.* —

2. *cernuus* Grav. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Kleve (Fuß - Fauv.) — Kref. u. Homberg, von Fauv. 558 aus *B.* angegeben, werden in *B.* IV. 134 nicht angeführt. — *H. N.* —

Bolitobius Mannh.

1. *striatus* Ol. — Düssdf. u. Ahrw. (vom Bruck u. Fuß - Fauv.) - Düssdf. in Samml. Bruck — Elbf. (1 - aus Samml. Stachelhausen - G.) — *W. N.* —

[*bicolor* Grav. — *F.* für Homberg [Pliester] — Nicht *H. W.* - in *N.* - Angaben für Homb. meist zweifelhaft. —]

[*trimaculatus* Pk. — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. *C.* —]

2. *trinotatus* Er. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. *exoletus* Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

4. *thoracicicus* F. = *pygmaeus* F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. *biguttatus* Steph. — Laach. See, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *N.* —

5. *lunulatus* L. — Rhp. (*F.* - *atricapillus* F.) — Elbf. (*C.*) — Eifel (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

6. *pulchellus* Mannh. — Kref. (*F.* - *lunulatus* L.!) - daher in Samml. Bruck - lun. L. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — *W. N.* —

Bryocaris Lac.

1. *cingulata* Mannh. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck u. [von Brink] Samml. R. — Eupen (Heym.) — Elbf. (*C.*) — Kleve, einmal sehr zahlreich (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Kleve u. Jülich - Samml. Scriba (Neum.) — *H. W. N.* —

2. *analis* Pk. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Bopp. (R.) — *H. W. N.* —

3. *formosa* Grav. — Elbf. (Corn. - C.) - daher 1 in Samml. Corn. — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W.* —

Tachyporini.

Conosoma Krtz.

1. *litoreum* L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Siegmdg., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. *pubescens* Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **immaculatum** Steph. — Kref., Düssdf. (*F.* - *fusculum*
Grav.) — Elbf. (*C.*) — St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **pedicularium** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp.
(*B.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **bipunctatum** Grav. — Düssdf. (*F.*) — Duisb. (Urb.) —
Kref. - Samml. Bruck — Kleve (Col. Neerl.) — *H. W. N.* —

[**binotatum** Grav. — *F.* für Aach. [Först.] - nach Fauv. 609
Anm. jedenfalls bipustulatum. — Nicht *H. W. N.* — Deutschl.
u. a. [Ganglb. Käf. M.] —]

— **bipustulatum** Grav. — *F.* mit binot. Grav. nach Fauv.
l. c. hierhin — Col. Neerl. für Kleve u. Kref. - von Kref. nicht
in Samml. Bruck - Kleve wohl richtig, da in *H. W.* —

Lamprinus Heer.

1. **erythropterus** Pz. — Kleve - 1 - Samml. Fuß — Elbf.
(1 - aus Samml. Stachelhausen - *G.*) — *W.* —

Lamprinodes Luze.

1. **saginatus** Grav. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) —
Düssdf. (Heyd.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Linz (Wasm., D.
E. Z. 94) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W.* —

2. **haematopterus** Krtz. — Elbf. (Stachelhausen - *C.*) - daher
in Samml. Bruck u. Fuß — Elbf. (Heyd.) — Linz (Wasm., D.
E. Z. 94) — *H.* —

Tachyporus Grav.

1. **nitidulus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *brunneus* F.) —
Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **macropterus** Grav. — Kref., Düssdf. (*F.* - *scitulus* Er.) -
Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Laach.
See (R.) — *H. W. N.* —

3. **pusillus** Grav. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf.
(*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

4. **transversalis** Grav. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) —
H. W. N. —

5. **ruficollis** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch posti-
cus Först. von Aach.) — Elbf. (*C.*) — Kob., Kochem (R.) —
H. W. N. —

6. **atriceps** Steph. — Kref.. Düssdf. (*F.* - *humerosus* Knoch)
— Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) —
H. W. N. —

7. **chrysomelinus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl.
(Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

8. **hypnorum** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.)
— Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **solutus** Er. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (2 - R.) — *H. W. N.* —

10. **formosus** Matth. — Kref. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

11. **abdominalis** F. — *F. u. B.* für Aach., Kref., Düssdf., Elbf., Bopp. - von Fauv. 596 nicht für Rhp. aufgenommen. — Doch Elbf. (Corn. - *C. ruficeps* Krtz.) - Belegst. Bernh. vid. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Nicht *H. W. N.* — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

12. **obtusus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Tachinus Grav.

1. **flavipes** F. — Rhp. (F.) — Elbf., U. Solg. (G.) — Ahrw. (Fuß - Kraatz, Ins. D. II. 404) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **proximus** Krtz. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — St. (1 - Hubenth. vid. - R.) — *H. W.* —

3. **humeralis** Grav. — Aach., Düssdf., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

4. **marginatus** Gyll. — Elbf. (1 - Geilenk. - *C.*) - Belegst. in Samml. Corn. - Hubenth. vid. — Norddeutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

5. **subterraneus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Aach. (Urb.) — Kob., Kochem (R.) — *H. W. N.* —

6. **bicolor** Grav. — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal (Andr.) — Kob. (R.) —

6. **bipustulatus** F. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

7. **scapularis** Steph. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 61 - *palliolatus* Krtz.) - Belegst. Bernh. vid. — *H. W. N.* —

8. **pallipes** Grav. — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

9. **fimetarius** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

10. **rufipes** Deg. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

11. **laticollis** Grav. — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

12. **marginellus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Viersen [le Roi], Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

13. **collaris** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

14. **rufipennis** Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Tönnisstein, St. (je 1 - R.) — Belg., W. —

15. **elongatus** Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — H. Venn (Chapuis - Fauv. 577 u. Fred.) — Eupen (Brink) — Ahrw. (Fuß) — Siegmdg. [2 - Frings] u. Winningen [1 - Bockl.] in Samml. R. — H. W. N. —

Leucoparyphus Krtz.

1. **silphoides** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — H. W. N. --

Hypocryptini.

Hypocryptus Mannh.

1. **longicornis** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

2. **laeviusculus** Mannh. — Aach. (Först. - F.) — Kref. (1 - Epp. vid. - Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — H. W. N. —

— **discoideus** Er. — F. für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Düssdf. [Braselm.] - Belegst. in Samml. Bruck ist longicornis [Bernh. vid.] — doch wohl in Rhp., da H. W. N. —

3. **seminulum** Er. — Aach., Kref. Düssdf. (F. - auch pulicarius Er.) — Elbf. (C.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — H. W. N. —

4. **ovulum** Heer — Niederwerth (1 - Bernh. vid. - R.) — H. —

Habrocerini.

Habrocerus Er.

1. **capillaricornis** Grav. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Kob. (R.) — H. W. N. —

Trichophyini.

Trichophya Mannh.

1. **pilicornis** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß - Fauv.) — Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Aleocharinae.

Dinopsini.

Dinopsis Matth.

1. **erosa** Steph. — Kref. (F. - laticollis Er.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Sayntal (1 - R.) — H. W. N. —

Gymnusini.

Gymnusa Grav.

1. **brevicollis** Pk. — Kref. (F.) — daher in Samml. Bruck — Duisb. (1 - Urb.) — Fauv. für Elbf. [v. Hagens] - jedenfalls variegata, die in C. so angeführt. — *H. W.* —
2. **variegata** Ksw. — Elbf. (v. Hagens - C.) - daher in Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — *H.* —

Myllaenini.

Myllaena Er.

1. **dubia** Grav. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

2. **intermedia** Er. — Kref., Düssdf. (F.) - Tauschstücke von Kref. (Epp. vid. - Geilenk.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Brohltal (Andr.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **gracilicornis** Fairm. — Ahrw. - von Fuß in Samml. Scriba (Neum.) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — *H.* —

4. **Kraatzi** Sharp. — Düssdf. (Krumbach - Kraatz, Ins. D. II. 1058 - glauca Aub.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59 - glauca Aub.) - Belegst. Bernh. vid. — Nettetal, Elztal, St. (Bernh. vid. - R.) — Hierhin jedenfalls C. mit elongata Matth. für Elbf. [1 - v. Hagens] - da noch in Cat. Col. 91 elong. Matth. = glauca Aub. - elong. auch nicht in *H. W. N.* — Deutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

4. **brevicornis** Matth. — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - gracilis Heer) — Siebengbg., Kob., Winningen (R.) — *H. W. N.* —

5. **gracilis** Matth. — Bonn (Kraatz, Stett. E. Z. 53 - forticornis Krtz.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Bernh. vid. *H. N.* —

6. **minuta** Grav. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Kob. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

7. **infuscata** Krtz. — Ahrw. (Fuß - Fauv. 629) - Belegst. aus Samml. Fuß - Bernh. vid. — *H.* —

Pronomaeini.

Pronomaea Er.

1. **rostrata** Er. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — *N.* —

Hygronomini.

Hygronoma Er.

1. **dimidiata** Grav. — Kref., Bonn (F.) — Duisb. (Urb.) —

Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Laach. See, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Oligotini.

Oligota Mannh.

1. **flavicornis** Lac. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Elbf. (*C.*) — Kreuzn. [1 - Reichensp.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **granaria** Er. — Aach. (daher beschrieben - *F.* - pentatoma Först.) — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Jülich - Samml. Scriba (Neum.) — Elbf. (1 - *C.*) — Ahrw. (Fuß - Fauv. 657) — *H. W. N.* —

3. **inflata** Mannh. = **subtilis** Er. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Düssdf. [Hildebr.] - nach *B.* IV. 108 noch nicht in Rhp. - auch nicht in Samml. Bruck — Elbf. (1 - *C.*) — Ahrw. (Fuß - Fauv 659) — *H. W. N.* —

4. **pusillima** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Gabr. u. R) — *H. W. N.* —

Bolitocharini.

Brachida Rey.

1. **exigua** Heer — Ahrw. (Fuß - Fauv. 647) — Rodderberg (1 - Reichensp.) — Brohltal (1 - Andr.) — Vallendar, Schmittenhöhe (R) — *N.* —

Encephalus Westw.

1. **complicans** Westw. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Stachelhausen - *C.*) — Kref. (Mink - Fauv. 630) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — *H. W. N.* —

Gyrophaena Mannh.

1. **pulchella** Heer — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

2. **affinis** Sahlb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. - (*C.*) — Kob., U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **nana** Pk. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (*F.*) - Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **gentilis** Er. — Bonn (v. Rantzau - *F.*) — Kref. (Mink - Fauv.) — Elbf. (Epp. vid. - *G.*) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Bonn, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. —*

5. **bihamata** Thoms. — Kref. - Samml. Bruck - Bernh. vid. — Brohltal (♂ - Andr.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

6. **fasciata** Marsh. — Aach., Düssdf., Bonn (*F.* - congrua Er.) - von Fauv. 637 nicht für Rhp. aufgenommen - doch Elbf. (*C.*) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — Düssdf. (Scriba vid. - Geilenk.) — *H. W. N.* —

7. **laevipennis** Krtz. — Kref. (vom Bruck - Fauv. 639) - daher in Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Ahrw. - von Fuß mit Epp. vid. in Samml. Scriba (Neum.) — *W.* —

8. **lucidula** Er. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Opladen (Dr. Müller - Geilenk.) — Neuwied (Scriba vid. - Neum.) — *H. N.* —

9. **Poweri** Crotch — Düssdf. (Steinicke - Eppelsh., D. E. Z. 78) — Elbf. - Samml. Scriba (Neum.) — Kref. - Samml. Brink - Hubenth. vid. — Laach. See (σ - Andr.) — Kondertal b. Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H.* —

10. **minima** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

11. **manca** Er. — Elbf. (v. Hagens - *C.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See (R.) — *H.* —

12. **strictula** Er. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

13. **polita** Grav. — Kref. (Epp. vid. - Geilenk.) — Saarbr. - Samml. Fuß - daher auch, von Eichh., in Samml. Scriba (Neum.) — Brohltal (Andr.) —

— **boleti** L. — *F.* für Aach. [Först.] - Samml. Först. ergibt nichts. — Fauv. 646 für Kref. [Mink] - daher nicht in Samml. Bruck. — Noch nicht in *H. W. N.* - fraglich. —

14. **laevicollis** Krtz. — Aach. (Först. - Kraatz, Ins D. II. 363) — Kref. (vom Bruck - Fauv.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Belg. —

Placusa Er.

— **complanata** Er. — *C.* für Elbf. [v. Hagens] - in Samml. Corn. [jetzt] tachyporoides - Bernh. vid. — Nicht *H. W. N.* —

— **humilis** Er. — *C.* für Elbf. [2 - Corn.] - Belegst. in Samml. Corn. [jetzt] tachyporoides - Bernh. vid. — Nicht *H. W. N.* —

1. **pumilio** Grav. — Elbf. (*C.* u. - Epp. vid. - *G.*) — Schmittenhöhe, Oberwerth (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

2. **tachyporoides** Waltl. — Düssdf. (*F.* - infima Er.) — Elbf., Nev. (*C.* u. *G.*) — Nettetal, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

3. **adscita** Er. — Elbf. (*C.*) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv. 670) — St., unter Eichenrinde (Bernh. vid. - R.) — Belg., *N.* —

Thectura Thoms.

1. **cuspidata** Er. — Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Brohltal, Laach. See, Soon (R.) — *H. W. N.* —

Homalota Mannh.

1. **plana** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Jülich - Samml. Scriba

(Neum.) — Elbf. (C.) — Siegmdg. [Frings], Nettetal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Silusa Er.

1. **rubra** Er. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Linz (Wasm., D. E. Z. 02 - dazu Münch. Kol. Z. I. 394) — Kob., Soon, im Spätherbst in Pilzen (R.) — *H. W. N.* —

2. **rubiginosa** Er. — Elbf. (C.) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 58, u. Heyd.) — Nettetal, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Leptusa Krtz.

1. **angusta** Aub. — Elbf. (Corn. - C. - analis Gyll.) — Arenberg (Hubenth. vid. - R.) — *N.* —

2. **haemorrhoidalis** Heer — Elbf. (Corn. - C.) — Laach. See, Brohltal (Andr.) - Bernh. vid. — Schneifel [le Roi], Sayntal, St. (R.) — *W. N.* —

3. **ruficollis** Er. — Aach., Kref. (F. - Oxypoda rufic.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Rhens, St. (R.) — *H. W. N.* —

Euryusa Er.

1. **optabilis** Heer — Aach., Düssdf. (F. - linearis Maerk.) — Elbf. (C.) — Bopp. (v. Hagens, Berl. E. Z. 65) — Kob., Rhens, St. (R.) — *H. N.* —

2. **sinuata** Er. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Stachelhausen - C.) — Bonn (R.) — *H. N.* —

Tachyusida Rey.

gracilis Er. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck - Oxypoda grac.] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - in Samml. Mink fehlend (Lange). — Nicht *H. W. N.* —]

Phymatura Sahlb.

— **brevicollis** Krtz. — *C.* für Elbf. [1 - Corn. - Bolitochara] - Belegst. verloren. — Nicht *H. W. N.* —

Bolitochara Mannh.

1. **lucida** Grav. — Aach. (Fürst. - F.) — U. Ahr (Heyd.) — *N.* —

2. **lunulata** Pk. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **bella** Maerk. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Laach. See, Sayntal, U. Nahe, St. (R.) — *H.* —

Autalia Mannh.

1. **impressa** Ol. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **rivularis** Grav. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (G.) — Brohltal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**puncticollis** Sharp. — *C.* für Elbf. [Corn.] - trifft *rivularis*, die in *C.* fehlt - so schon *F.* u. *W.* 63 für Elbf. [Corn.] - *punctic.* nach Ganglb. Käf. M. auch in Nordeuropa u. den Alpen. —]

Myrmeconiini.

Falagria Mannh.

1. **sulcata** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
2. **sulcatula** Pk. — Aach., Kref., Bonn (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
3. **thoracica** Curt. — Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 34) — Prüm (Reichensp.) — Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Bonn, Kob., St. Goar (R.) — *H. W. N.* —
4. **nigra** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
5. **obscura** Grav. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob., Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Borboropora Krtz.

1. **Kraatzi** Fuß — Ahrw. (daher nach 6 Stück beschrieben - Fuß, Berl. E. Z. 62 - später noch einigemal dort gefunden - Fuß, l. c. 65) — Frankreich, Tirol, Ungarn [Ganglb. Käf. M.] —

Tachyusa Er.

1. **atra** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Nettetal, U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.*
2. **leucopus** Marsh. — Ahrw. - Samml. Fuß — Nettetal (1 - R.) — *H. W.* —
3. **umbratica** Er. — Aach., Düssdf., Bonn (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hamm. W. (Andr.) — U. Nahe, Kreuzn., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W.* —
4. **exarata** Er. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) - Belegst. Bernh. vid. - daher auch in Samml. Bruck — *W.* —
5. **scitula** Er. — Düssdf. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Aach. (Col. Neerl.) — *H. N.* —
6. **coarctata** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Nettetal, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.*
7. **constricta** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hamm. W. (Andr.) — Mühlental b. Ehrenbreitst., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
8. **balteata** Er. — Aach. (Fürst. - *F.*) — Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Tönnisstein, Kob., U. Nahe (R.) — *H.* —

Gnypeta Thoms.

1. **carbonaria** Mannh. — Düssdf. (*F. - labilis* Er.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kreuzn. (Neum.) — Brohltal, Nettetal, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **ripicola** Ksw. — Elbf. (*C. - coerulea* Sahlb.) — Saynbachmdg. (1 - R.) — Oberwerth, an den Tümpeln zu Wintersanfang in Menge gesiebt (Mühlf. u. R.) — *W.* — Hierhin wohl *C.* mit Homalota carbonaria Sahlb. für Elbf. - Belegst. aus Samml. Corn. verloren. —

3. **velata** Er. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Neuwied (Neum.) — Ahrw., Nettetal, Sayntal, Oberwerth (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

Brachyusa Rey.

1. **concolor** Er. — Duisb. (Urb.) — Neuwied i. Rheingenist (Neum.) — Oberwerth (Bernh. vid. - R.) — *H.* —

Aleuonota Thoms.

1. **atricapilla** Rey = **rufotestacea** Krtz. — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — St. (3 - Bernh. vid. - R.) — *N.* —

2. **gracilenta** Er. — Elbf. (1 - Corn. - *C. - splendens* Krtz.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Jülich - Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) — *H. N.* —

— **pallens** Rey — Eichhoff, Berl. E. Z. 66, für Jülich - pallens! - ob pall. Rey oder pall. Redtb.? - im Verzeichnis von Kraatz 1869 werden beide pallens als Arten geführt. — Col. Neerl. stellen die Angabe hierhin, aber pall. Rey nicht in *H. W. N.*, pall. Redtb. in *W. N.* —

3. **macella** Er. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) - daher in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) — Ahrw. - Samml. Fuß — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — Mittel-europa [Ganglb. Käf. M.] —

Atheta Thoms.¹⁾.

1. **subtilissima** Krtz. — Elbf. (2 - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Ahrw. (1 - Fuß) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

2. **delicatula** Sharp — Elbf. (1 - *C.*) — Jülich (Eichh. - Kraatz, Berl. E. Z. 71) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

3. **longula** Heer — Ahrw. (Kraatz, Ins. D. II. 230 - *thinobioides* Krtz. - u. Fuß, Berl. E. Z. 62) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Wiedtal, Sayntal, Nettetal, Bertrich (Bernh. vid. - R.) — *H.* —

1) Homalota atra Er., in *F.* für Düssdf., u. socialis Pk., in *F.* für Aach., Kref. u. a., blieben ungedeutet. —

4. **fragilicornis** Krtz. — Ahrtal (daher beschrieben - Kraatz, Ins. D. II. 202) - Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 60 u. 62) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

5. **fragilis** Krtz. — Ahrtal (Kraatz, Ins. D. II. 202, u. Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kref. - Samml. Bruck — Jülich - Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum., D. E. Z. 07) — Manderscheid, am Dörrebach b. St. (Bernh. vid. - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

6. **fluviatilis** Krtz. — Ahrtal (Kraatz, Ins. D. II. 223, u. Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kref. - Samml. Bruck — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Nettetal (1 - Bernh. vid. - R.) — N. —

7. **gracilicornis** Er. — Ahrtal (Kraatz, Ins. D. II. 200, u. Fuß, Berl. E. Z. 58 u. 62) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Bertrich (R.) — Kraatz, l. c. noch für Barmen - doch nicht im Verz. C. — W. —

8. **luteipes** Er. — Kref. (Mink - F.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — H. —

9. **gregaria** Er. — Kref. (F. - Tachyusa immunita Er.) — Elbf. (C.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — H. W. N. —

10. **appulsa** Scriba — Jülich (daher beschrieben - Scriba, Berl. E. Z. 67) - Finder Eichh., Berl. E. Z. 66, - daher in Samml. Bruck — Deutschland. Frankreich [Ganglb. Käf. M.] —

11. **currax** Krtz. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Sayntal, am Gräfenbach im Soon (Hubenth. vid. - R.) — H. N. —

12. **rivulorum** Thoms. — Am Dörrebach b. St. an der 1., hölzernen, Brücke, Mai 1900 (1 - Bernh. vid. it! - R.) - anscheinend neu für Deutschland - Cat. Col. nur Schweden. —

13. **cambrica** Wollast. — Ahrtal (daher u. a. beschrieben - Kraatz, Ins. D. II. 201 - velox Krtz.) - Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Elbf. (C. u. G.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66 — Sayntal, am Dörrebach b. St. (Bernh. vid. - R.) — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

14. **debilicornis** Er. — Bonn, am Rheinufer (Kraatz, Ins. D. II. 201) — Eupen (3 - Heym.) — H. —

15. **Eichhoffi** Scriba — Jülich (daher beschrieben - Scriba, Berl. E. Z. 67) - Finder Eichhoff, Berl. E. Z. 66 — Elbf. (C. - aegyptiaca Motsch.) - daher in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

16. **sulcifrons** Steph. — Aach., Kref. (F. - pavens Er.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — St. (2 - Bernh. vid. - R.) — H. W. N. —

17. **insecta** Thoms. — Elbf. (2 - C.) — Kref. - Samml. Bruck

— Jülich (Eppelsh., Berl. E. Z. 75) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Kob., bes. auf Oberwerth, U. Nahe, St (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

18. **languida** Er. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Oberwerth (Mühlf. u. R.) — Eichh., Berl. E. Z. 66, für Jülich trifft lang. Scriba = insecta [Eppelsh., Berl. E. Z. 75] — *H.* —

v. longicollis Rey — Saarl. (Gabr.) — Jülich - Samml. Scriba (Neum.) — Nettetal, Oberwerth, St. (Bernh. vid. - R.) *N.* —

19. **luridipennis** Mannh. — Elbf. (Corn. - C.) — Düssdf. - Samml. Bruck — Ahrw., Vallendar, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

20. **Gyllenhali** Thoms. — Bonn (1 - Kraatz, Berl. E. Z. 71 - londinensis Sharp) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. - Bernh. vid. — *H. N.* —

21. **terminalis** Grav. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - term. Gyll.!) - Belegst. der Samml. Fuß hierhin, nicht zu Gyllenhali. — *H. W.* —

22. **melanocera** Thoms. — Elbf. (C.) — Kleve - Samml. Fuß — Duisb. (Urb.) — Sinzig (Andr.) - Belegst. Bernh. vid. — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Nettetal, Wiedtal, Oberwerth, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

23. **sequanica** Bris. — Winningen a. Moselufer (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — *N.* —

24. **elongatula** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Nettetal, Kob., Elztal, U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

25. **hygrotopora** Krtz. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Brohltal (1 ♂ - Andr.) — Nettetal, Kob., Elztal (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

26. **gemina** Er. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — *H. N.* —

[**fusca** Sahlb. — F. u. C. für Elbf. [Corn.] - Belegst. der Samml. Corn. verloren - doch unzweifelhaft laticollis Steph. treffend trotz der Stellung bei melanocera in C. - so B. IV. 296: vernacula = fusca Sahlb., W. 72 Nr. 100 und die fusca Sahlb. der Samml. Bruck u. Fuß. — Nordeuropa. —]

[**hygrobia** Thoms. — C. für Elbf. [nicht selten - Corn.] - die beiden Belegst. der Samml. Corn. sind hygrobia Rey = hygrotopora - Hubenth. vid. — Schweden, Finnland [Cat. Col.] —]

27. **dæbilis** Er. — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kref. u. Homberg - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

[*laticeps* Thoms. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. verloren, doch jedenfalls die in *C.* fehlende, von Elbf. [Corn.!] aber in Samml. Scriba [Neum. briefl.] befindliche *complana*. — Fauv. 728 für Kref. [Mink] - ebenso wohl *complana*, die von Kref. in Samml. Bruck - die lat. der Samml. Mink sind [jetzt] mortuorum [Hubenth. vid. - Lange] — Nicht *H. W. N.* — Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —]

28. **complana** Mannh. — Kref. - 2 - Samml. Bruck - Bernh. vid. — Elbf. - von Corn. in Samml. Scriba (Neum.) — Nettetal, Wiedtal, Sayntal (je 1 - Bernh. vid. - R.) — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

29. **vilis** Er. — Elbf. (1 - Corn - *C.*) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

30. **tabida** Ksw. — Kref. (Kraatz, Ins. D. II. 325) - Finder nicht angegeben, auch nicht in Stett. E. Z. 50, wo beschrieben - 2 von Kref. in Samml. Bruck, Fundort auf dem Namenszettel, doch nicht anzuzweifeln. — Mittel- u. Süddeutschl. [Schilsky II.] —

[*flavipes* Thoms. — *G.* für Elbf. [1 aus Samml. Stachelhausen - atricilla Er.] mit „Vorkommen doch zweifelhaft“. — An den Meeresküsten [Cat. Col.] - daher wohl nicht bei Elbf. —]

31. **punctipennis** Krtz. — Kref. (1 - Mink - in Samml. Kraatz - Ins. D. II. 232) — Elbf. (Corn. - im Wiener Hofmuseum - Col Neerl. I. 209) — Thüringen [Hubenth., D. E. Z. 08 S. 106] —

32. **deplanata** Grav. — Ahrw. (Kraatz, Stett. E. Z. 58, u. Fuß, Berl. E. Z. 58 u. 60) — *W. N.* —

33. **angustula** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

34. **aequata** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

35. **linearis** Grav. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

36. **incana** Er. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — *H. W. N.* —

37. **brunnea** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (*F.* - auch *depressa* Grav.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

38. **hepatica** Er. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Elbf. (*C.* u. Geilenk.) — Kleve (Fuß) — Saarl. (Gabr.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

39. **occulta** Er. — Elbf. (*C.*) - daher in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) — Kob. (2 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

40. **fungivora** Thoms. — Jülich, in Samml. Scriba mit Epp.

vid. (Neum.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

41. **excellens** Krtz. — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — Elbf., in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum., D. E. Z. 07) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

42. **monticola** Thoms. — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — Eupen (Heym) — Sayntal (1 - Hubenth. vid. - R.) — N. —

43. **corvina** Thoms. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) - Belegst. Bernh. vid. — Ahrw. (Fuß - Fauv 727) — H. W. N. —

44. **arcana** Er. — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. der Samml. Corn. verloren (Geilenk.) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

45. **inhabilis** Krtz. — Barmen (daher beschrieben nach einem Funde von Stachelhausen - Kraatz, Ins. D. II. 251) — Elbf. (1 - C.) — H. u. N. [Wiesbaden - Ganglb. Käf. M.] - sonst noch Leipzig [Hubenth. briefl.] —

46. **picipes** Thoms. — Elbf. (Corn. - C.) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — N. —

47. **angusticollis** Thoms. — Elbf. - Samml. Geilenk. — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Müddersheim b. Düren [aus Hamsterbau - v. Geyr], Kob. (R.) — Bernh. vid. omn. — H. N. —

[**ravilla** Er. — C. für Elbf. [Corn.] - Belegst. verloren, doch jedenfalls angusticollis, die in Cat. Col. 83 synonym, entsprechend der Ansicht von Eppelsheim. — Stücke von Elbf., mit Epp. det. von Geilenk. angegeben, waren angustic. [Bernh. vid.] — Nur Österreich in Schilsky II. —]

48. **palustris** Ksw. — Elbf. (C.) — Kleve - Samml. Scriba (Neum.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw., Nettetal, Kob., Elztal (Bernh. vid. - R.) — H. N. —

49. **luctuosa** Rey — Fuß, Berl. E. Z. 58 für Ahrw. - die Art fehlt in Samml. u. Samml.-Verzeichnis Fuß — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

50. **aegra** Heer — Elbf., nicht selten (Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Bernh. vid. - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

51. **atomaria** Krtz. — Elbf. (Corn. - C) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

52. **inquinula** Grav. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F') — Elbf. (C.) — Brohltal (R.) — H. W. N. —

53. **mortuorum** Thoms. — Elbf. (Hubenth. vid. - Geilenk.) — Kref. in Samml. Mink (Hubenth. vid. - Lange) — Tönnisstein, Soon (Bernh. vid. - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

54. **amicula** Steph. — Elbf. (C.) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Kob. (Gabr.) — Sayntal, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

55. **indubia** Sharp. — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 73) - nicht auch Ahrw., wie in Fauv. 702 - Belegst. Bernh. vid. — Elbf. - Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) — *H.* —

56. **palleola** Er. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv. 706) — Burgbrohl (Andr.) - Belegst. Bernh. vid. — *H. W. N.* —

57. **testaceipes** Heer — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65 - brevicollis Baudi) - daher in Samml. Bruck — Bernh. vid. omn. — Kleve - von Fuß in Samml. Scriba (Neum.) — *W. N.* —

58. **dilaticornis** Krtz. — Kref. (Mink - Fauv. 709) - daher in Samml. Bruck — Ahrw. (1 - Fuß) — Sinzig (1 - Andr.) — Bernh. vid. omn. — *N.* —

59. **scapularis** Sahlb. — Düssdf. (Hildebr. - F. - ochracea Er.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Eupen (Heym.) — *N.* - Hertogenwald [Heym.]. —

60. **clancula** Er. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (2 - Corn. - C.) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — *H.* —

61. **subterranea** Rey — Ahrw. (Fuß - Fauv. 708) - Belegst. aus Samml. Fuß Bernh. vid. — *N.* —

62. **nigricornis** Thoms. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. u. Ahrw. (Mink u. Fuß - Fauv. 724) — Kleve u. Jülich - Samml. Scriba (Neum.) — Brohltal (1 - Andr.) - Bernh. vid. — *H. N.* —

63. **divisa** Maerk. — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Bruck — Sinzig (Andr.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

64. **basicornis** Rey — Laach. See, Oberwerth (Bernh. vid. - R.) — *N.* —

65. **autumnalis** Er. — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — Mittel-europa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

66. **oblita** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — Düssdf. - Samml. Bruck — Vallendar, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

67. **coriaria** Krtz. — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 u. 65) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — Brohltal (Andr.) - Belegst. Bernh. vid. — *H. N.* —

68. **nitens** Fuß — Ahrw. (daher nach 3 Stück beschrieben - Fuß, Berl. E. Z. 68) - davon 1 in Samml. Kraatz, 1 in Samml. Fauv. gelangt. — Everts besitzt 1 aus den Seealpen [Col. Neerl.] —

69. **gagatina** Baudi — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

70. **sodalis** Er. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Vallendar, Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

71. **pallidicornis** Thoms. — Elbf. (2 - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - humeralis Krtz.) — Laach. See, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *W. N.* —

72. **nigritula** Grav. — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Brohltal (Andr.) — Andernach, Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

73. **liturata** Steph. — Elbf. (C. - lit. Pk. - u. - Epp. vid. - Geilenk.) — *W.* —

[**boletophila** Thoms. — R., Beitr. I für Ahrw. [Fuß] - Belegst. sind paradoxa - cf. diese. —]

74. **nitidicollis** Fairm. — Elbf. (Corn. - Scriba, Berl. E. Z. 71 - ignobilis Sharp.) - nicht in Verz. C. — Kob. (Hubenth. vid. - Heym.) — Soon (Bernh. vid. - R.) — *W. N.* —

75. **crassicornis** F. — Elbf. (C. - sericans Grav.) — Brohltal (Andr.) - Belegst. Bernh. vid. — Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

76. **pilicornis** Thoms. — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum., D. E. Z. 07) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) - Belegst. Bernh. vid. — *H. W. N.* —

77. **xanthopus** Thoms. — Elbf. (C.) — Kref., Ahrw. - Samml. Bruck — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

78. **trinotata** Krtz. — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Jülich - Samml. Scriba (Neum., D. E. Z. 07) — Tönnisstein, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

79. **triangulum** Krtz. — Duisb., an einer Stelle einmal in Pilzen im Spätherbst zahlreich (Urb.) - Belegst. in Samml. R. - Bernh. vid. — Amsterdam [Col. Neerl.] —

80. **euryptera** Steph. — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - validicornis Maerk.) — Kref. in Samml. Brink - Hubenth. vid. — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —¹⁾

81. **aquatica** Thoms. — Elbf. (Corn. - Scriba, Berl. E. Z. 71 - subaenea Sharp) - so auch *W.* 68 - nicht in Verz. C. - statt dessen wohl *aquatilis* Thoms. — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — — *H. N.* —

— **valida** Krtz. — Elbf. - von Corn. in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) - doch Alpen, Schlesien u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

82. **Pertyi** Heer — Elbf. (2 - Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß) — Kreuzn. (Epp. vid. - Neum.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. - Hubenth. vid. — *H. N.* —

1) *incognita* Sharp. — Hertogenwald, zahlreich [Heym.] - wohl auch im rheinl. Teil des H. Venn. —

83. **castanoptera** Mannh. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Brink - Hubenth. vid. — Eupen (Heym.) — Brohltal (Andr.) - Bernh. vid. — Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**aquatalis** Thoms. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. verloren - doch wohl statt *aquatica* Thoms., die Scriba u. nach Corn. auch *W.* 68 daher angeben, *C.* nicht mehr anführt. — Nicht *H. W. N.* - Schweden, Schlesien, Frankreich [Ganglb. Käf. M.] —]

84. **hypnorum** Ksw. -- Elbf. (Corn. - *C.*) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Kleve, Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 68 - *silvicola* Fuß) — Eupen (Heym.) — Siebengbg. (1 - R.) — *H. N.* —

85. **pagana** Er. — Elbf. (*C.*) - daher noch 1 ♂ in Samml. Corn. - auch in Samml. Scriba (Neum.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) - Belegst. Bernh. vid. — *H.* —

86. **longiuscula** Grav. — Kref., Düssdf. (*F.* - *umbonata* Er.) — Elbf. (Corn. - *C.* u. Samml. Corn. - *vicina* Krtz.!) — Oberwerth (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

87. **nitidula** Krtz. — Elbf. (*C.*) — Elbf., Ahrw., Kreuzn. - Samml. Scriba (Neum., D. E. Z. 07) — Saarl. Gabr.) — Nettetal, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

88. **oblonga** Er. — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H.* —

89. **graminicola** Grav. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Tauschstücke von Kref. (Epp. vid. - Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth (R.) — *H. W.* —

90. **vestita** Grav. — Barmen (Stachelhausen - *G.*) — Elbf. (Epp. vid. - Geilenk., D. E. Z. 92) — *F.* für Kref. [vom Bruck] - Belegst. der Samml. Bruck sind *marcida* [Bernh. vid.] — *H. W.* —

91. **contristata** Krtz. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — Eupen (1 - Heym.) — Nicht *H. W. N.* - Westl. Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

92. **cadaverina** Bris. — Ahrw. (Fuß - Fauv. 694) - daher bezeichnet in Samml. Bruck — Brohltal (1 - Andr.) — Bernh. vid. omn. — *C.* u. *G.* für Elbf. - daher in Samml. Corn. - 1 - verdorben - in Samml. Geilenk. jedenfalls *episcopalis* (Geilenk. briefl.) — *H. N.* —

93. **atramentaria** Gyll. — Aach., Kref. (*F.* - *atram.* Grav.) — Elbf. (*C.* u. - Epp. vid. - Geilenk.) — Ahrw. - von Fuß in Samml. Scriba (Neum.) — *H.* —

94. **picipennis** Mannh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Eupen (7 - Heym.) — Fauv. 693 für Ahrw. [Fuß] - nicht in Samml. Fuß — *H. N.* —

95. **episcopalis** Bernh. — Societ. Entomol. 1910 Nr. 20 beschrieben u. a. aus Rhp. - nach einem von Andr. bei Burgbrohl in einem Pilz gefundenen Stück — Siebengbg. - Samml. Corn. —

als *cadaverina* — Soon, Glantal, Kob. (R.) — Bernh. vid. omn. — Österreich, Ungarn, Schweiz [Bernh. l. c.] —

[**subrugosa** Ksw. — Fuß, Berl. E. Z. 58, für Ahrw. - in Samml. Fuß nur Schweiz - doch möglich in Rhp. nach Kraatz, Ins. D. II. 303 —]

96. **intermedia** Thoms. — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 301) — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. (Fuß - Fauv. 691) - Belegst. Bernh. vid. - daher auch in Samml. Scriba (Neum.) — *H. W.* —

97. **putrida** Krtz. — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) -- Brohltal (1 - Andr.) - Bernh. vid. — *W.*, bei Hilchenbach [Kraatz vid. - *W.* 71] u. *N.* —

98. **livida** Rey — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Düssdf. - 1 - Samml. Bruck — *W.*, bei Hilchenbach [Kraatz vid. - *W.* 71] —

99. **marcida** Er. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck - Bernh. vid. — Elbf. (C.) — Kob., Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

100. **laevana** Rey — Elbf. (2 - Corn. - C.) — *H. W. N.* —

101. **nigripes** Thoms. — Ahrw. (Fuß - Fauv. 689 - *villosula* Krtz.) - Belegst. aus Samml. Fuß Bernh. vid. — *H.* —

102. **parvula** Mannh. — Aach., Kref. (F. - auch *pulicaria* Er.) - Kref. [Brink] in Samml. R. - Hubenth. vid. — Duisb. (Urb.) - Belegst. Bernh. vid. — Kob. (1 - Bockl.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H.* —

103. **sordidula** Er. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. der Samml. Corn. verloren. — *H. W. N.* —

104. **celata** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Bernh. vid. — Jülich - Samml. Scriba (Neum.) — Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

105. **arenicola** Thoms. = *germana* Sharp — Jülich (Eichh. - Scriba, Berl. E. Z. 71 S. 159) — *H.* —

106. **zosterae** Thoms. — Elbf. (C.) - daher in Samml. Scriba mit Fauv. vid. (Neum.) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Bernh. vid. — Brohltal (1 - Andr.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

107. **paradoxa** Rey — Ahrw. - 2 - Samml. Fuß als boleto-phila Thoms. — Müddersheim b Düren [aus Hamsterbau - 1 - v. Geyr] in Samml. R. — Bernh. vid. omn. — Mitteldeutschl. u. a. [Schilsky II.] —

108. **longicornis** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. St. (R.) — *H. W. N.* —

109. **melanaria** Mannh. — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb. (1 - Urb.) - jetzt in Samml. R. - Bernh. vid. — *H. N.* —

110. **sordida** Marsh. — Kref., Düssdf. (F. - *lividipennis* Sahlb.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

111. **pygmaea** Grav. — Elbf. (C.) — Jülich - Samml. Scriba (Neum.) — Kref. - Samml. Brink - Hubenth. vid. — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Nettetal (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
112. **aterrima** Grav. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) - Duisb. (Urb.) - Belegst. Bernh. vid. — *H. W. N.* —
113. **parva** Sahlb. — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 320 - stercoraria Krtz.) — Elbf. (1 - Epp. vid. - Geilenk.) — Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
114. **parens** Rey — Barmen (Stachelhausen - C) — Elbf. - Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) - daher in Mehrzahl in Samml. Fuß — Eupen (Heym.) — *H.* —
115. **nigerrima** Aub. — Elbf. (2 - C.) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — Fuß, Berl. E. Z. 62, für Ahrw. - in Samml. Fuß nur 1 aus Hessen — Deutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —
116. **orphana** Er. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck u. [von Brink] Samml. R. - Hubenth. vid. — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —
117. **fungi** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- v. modesta** Motsch. — Ahrw. - 1 - Samml. Bruck. - Bernh. vid. —
- v. orbata** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *N.* —
118. **clientula** Er. — Kref. (Mink - Fauv. 679) — Elbf. - von Corn. in Samml. Scriba mit Fauv. vid. (Neum.) — Kob. (1 - R.) — In den Rheingegenden nicht selten (Kraatz, Ins. D. II. 321 - pulchra Krtz.) — *H. N.* —
119. **fuscipes** Heer — Ahrw. (daher beschrieben - Fuß, Berl. E. Z. 68 - affinis Fuß) — Kob. (Bernh. vid. - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —
120. **laticollis** Steph. — Kref., Düssdf. (F. - vernacula Er.) — Elbf. (C. - fusca Sahlb.) - s. diese hinter Nr. 25 — Ahrw. Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
121. **subsinuata** Er. — Elbf. (C. - castaneipes Steph.) - die früher = subs. Er. — Ahrw. (Fuß - Fauv. 675) - daher in Samml. Bruck — *H.* —
122. **analis** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. St. (R.) — *H. W. N.* —
123. **soror** Krtz. — Bonn (daher beschrieben - Kraatz, Ins. D. II. 257) — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 (— *H. N.* —
124. **cavifrons** Sharp — Elbf. (1 - Epp. vid. - G.) — Duisb.

(1 - Urb.) - Belegst. Bernh. vid. — Kref. - Samml. Brink — Brohltal (3 - Andr.) - Hubenth. vid. — *H.* —

125. **talpa** Heer — U. Solg. (*G.*) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — *H. W. N.* —

126. **validiuscula** Krtz. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - in Samml. Corn. mit Epp. vid. — *H.* —

127. **exilis** Er. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **indocilis** Heer = pallens Redtb. — Hierhin wohl, nicht zu pall. Rey, die von Eichh., Berl. E. Z. 66, für Jülich angegebene „pallens“ - s. o. Aleuonota pallens. — *W. N.* —

Sipalia Rey.

1. **circellaris** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **caesula** Er. — Elbf. (1 - *C.*) — Kref. (Fuß - Fauv. 706) - Belegst. aus Samml. Fuß Bernh. vid. - Kref. auch Samml. Bruck — *H. W.* —

Notothecta Thoms.

1. **flavipes** Grav. — Aach., Bonn (*F.*) — Bonn, Rolandseck (Reichensp.) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Horchheim (Mühlf.) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **confusa** Maerk. — Elbf. (v. Hagens - *C.*) — *H. W. N.* —

3. **anceps** Er. — Bonn (v. Rantzau - *F.*) — Elbf. (v. Hagens - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Rolandseck (Reichensp.) — Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Brohltal (Andr.) — Horchheim (Mühlf.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Dadobia Thoms.

1. **immersa** Er. — Jülich (1 - Eichh., Berl. E. Z. 66 - „immer- sa“) - damals = imm. Er. nec. Thoms. — Laach. See, Oberwerth, Kondertal b. Kob. (R.) -- *N.* —

Tomoglossa Krtz.

— **luteicornis** Er. — *F.* für Kref. [Mink] u. Düssdf. [Bra- selm.] - in Samml. Mink fehlend (Lange) - auch in Samml. Bruck nicht von Kref. — Nicht wahrscheinlich, da nicht in *H. W.* —

Schistoglossa Krtz.

1. **viduata** Er. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Bernh. vid. — *H.* —

Callicerus Grav.

1. **obscurus** Grav. — Aach., Kref. (*F.* - Homal. callicera Grav.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Brohltal (Andr.) — *W. N.* —

2 **rigidicornis** Er. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — Kochem, St. (R.) — Col. Neerl. noch für Kref. - nicht in Samml. Bruck. — N. —

Thamiaraea Thoms.

1. **cinnamomea** Grav. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Remscheid, St. (R.) — H. W. N. —

2. **hospita** Maerk. — Elbf. (1 - C.) — Kref., Ahrw. - Samml. Fuß — Tönnisstein, Kob. (je 1 - R.) — H. W. N. —

Astilbus Steph.

1. **canaliculatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Zyras Steph. = Myrmedonia Er.

1. **collaris** Pk. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Nev., Elbf. (C.) — Kob. (Mühlf.) — Ahrw., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

2. **Haworthi** Steph. — Elbf. (3 - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Laach. See (1 - R.) — H. N. —

3. **funestus** Grav. — Kref., Bonn, Bopp. (F.) - Stücke von Kref. (Geilenk.) — Elbf. (C.) — Kob., Kochem (R.) — H. W. N. —

4. **cognatus** Maerk. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

5. **humeralis** Grav. — Kref., Düssdf., Bonn (F.) — Elbf. (C.) Kochem, St. (R.) — H. W. N. —

6. **similis** Maerk. — Kref. - Samml. Bruck — U. Nahe (1 - Bernh. vid. - R.) — H. N. —

7. **erraticus** Hagens — Elbf. (v. Hagens, Naturw. Verein Elbf. 63 u. Berl. E. Z. 65) - von den 3 gfdn. Stücken noch 1 in Samml. Hagens (Dom. Hag.) — Nicht H. - in Deutschl. anscheinend nicht wieder aufgefunden - nach den Synonymen Sicilien, Marocco (Berl. E. Z. 70 S. 25 u. Berl. E. Z., neue, 84 S. 365.) —

8. **limbatus** Pk. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

9. **lugens** Grav. — Kref., Bonn, Bopp., Kreuzn. (F.) — Elbf. (C.) — Unkelbach (Reichensp.) — Kochem (1 - R.) — H. W. N. —

10. **laticollis** Maerk. — Kref., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — Bonn (je 1 - Reichensp. u. R.) — H. W. N. —

11. **confragrosus** Hochh. — Düssdf. oder Ahrw. (nach einem Funde von Fuß beschrieben - Kraatz, Berl. E. Z. 59 - Fussi Krtz.) — Deutschland, Frankreich u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

12. **plicatus** Er. — Elbf. (v. Hagens, Berl. E. Z. 65) — St. 1 ♂ - R.) — H. —

Lomechusa Grav.

1. **strumosa** Grav. — Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Tüddern b. Heinsberg (Schmitz) — Eupen (Brink) — Stommeln (1 - Raderm.) — Ahrw. - Samml. Bruck — Bonn, Kob., Oberwinter (Reichensp.) — Kob. (1 - Preiß) — *H. W. N.* —

Atemeles Steph.

1. **emarginatus** Pk. — die Art: Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Eupen (Brink) — Kob. (Preiß) — Trier (Mühlf.) — Ahrw., Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* — Stammform: Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Bonn, Kob. (Wasm. vid. - Reichensp.) —

a. **nigricollis** Krtz. — Kref. (daher u. a. beschrieben - Kraatz, Ins. D. II. 117) — Bopp. (Neum.) — *N.* —

a. **recticollis** Wasm. — Bonn, Kob. (Wasm. vid. - Reichensp.) —

2. **pubicollis** Bris. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62 - inflatus Zeit.) - früher für infl. Krtz. — Bonn (Reichensp.) — Linz (Wasm., !). E. Z. 94) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H.* —

3. **paradoxus** Grav. — die Art: Aach., Bonn, Bopp. (*F.*) — Barmen (*C.*) — Elbf., Nev. (G. u. v. Hagens, Berl. E. Z. 65) — Kob. (Preiß) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* — Stammform: Erpel (Wasm. vid. - Reichensp.) —

a. **laticollis** Wasm. — Erpel (Wasm. vid. - Reichensp.) —

Aleocharini.**Phloeodroma** Krtz.

1. **concolor** Krtz. — Elbf. (Corn. *C.*) - daher in Samml. Fuß — Dortmund [Neum.] —

Phloeopora Er.

1. **testacea** Mannh. = **reptans** Er. — Bonn (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Belegst. von Elbf. [Samml. Corn.], U. Solg. [Samml. Geilenk.], Kref. u. Homberg [Samml Bruck] Bernh. vid — *H. W. N.* —

2. **teres** Grav. = **corticalis** Er. — Bopp. (*B. IV. 106* - cortic. Grav.!) — Elbf. (Corn. - *C.* - cortic. Grav.) - Belegst. aus Samml. Corn. Bernh. vid. — Burgbrohl (5 - Andr.) — Duisb. [1 - Urb.], Tönnisstein (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **opaca** Bernh. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. unter cortic. - Bernh. vid. — Fundort gesichert durch die Bezettelung an der Nadel und die Art der Corneliuschen Präparation. — Südfrankreich, Ungarn [Cat. Col.] —

4. **corticalis** Grav. = **latens** Er. — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

Ilyobates Krtz.¹⁾.

1. **nigricollis** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - von Kref.,

1) Il. brevicornis Wasm. von Linz [D. E. Z. 02] ist Stenus *rubra* [Wasm., D. E. Z. 03]. —

Kreuzn. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß) — Bonn, Tönnisstein, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

2. *propinquus* Aub. — Elbf. (C. - rufus Krtz.) — Nev. (de Rossi - G.) — Ahrw. (Fuß) — Brohltal (Andr.) — *H. W. N.* —

Calodera Mannh.

1. *nigrita* Mannh. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — Col. Neerl. noch für Kref. u. Elbf. — *H. N.* —

2. *protensa* Mannh. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — *W.* —

3. *aethiops* Grav. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Oberwerth (R.) — *H. N.* —

— *uliginosa* Er. — F. für Aach. [Fürst.] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] - in Samml. Mink ohne Fundort (Lange) - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. — Nicht *H. W. N.* - Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

[*riparia* Er. — F. für Kref. [vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] - Belegst. in Samml. Bruck ist *rufescens* [Hubenth. vid.] - Elbf. durch Verz. C. berichtigt. — Doch wohl in Rhp., da Roermond [Col. Neerl.] - nicht *W. N.* —]

4. *rufescens* Krtz. — Kref. (Col. Neerl.) - daher in Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

Chilopora Krtz.

1. *longitarsis* Er. — Aach., Kref., Bonn (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Vallendar, St.-Goar, U. Nahe, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

2. *rubicunda* Er. — Elbf. (v. Hagens - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. - von Fuß in Samml. Scriba (Neum.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (1 - Epp. vid. - R.) — *H.* —

Ityocara Thoms.

rubens Er. — F. für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. C. —]

Amarochara Thoms.

1. *umbrosa* Er. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Tönnisstein, Oberwerth, Moselufer b. Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. *forticornis* Lac. — Elbf. (C.) - Elbf. (Neum.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Brohltal (1 - Andr.) — Saarl. (Gabr.) — *W. N.* —

Ocalea Er.

1. *badia* Er. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob., Winningen, St (R.) — *H. W. N.* —

2. *concolor* Ksw. — Nettetal, Elztal, Guldenbachtal b. St., stets nach Hochwasser im Bachgenist (Bernh. vid. - R.) — Deutschland, Frankreich [Ganglb. Käf. M.] —

3. **picata** Steph. — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Brohltal, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**rivularis** Mill. — Fuß, Berl. E. Z. 58, für Ahrw. - in Samml. Fuß von rivul., damals synonym mit *picata*, nur 1 aus Österreich, pic. mehrfach von Ahrw. — Eppelsh., D. E. Z. 78, für Rhp. - ohne jede nähere Angabe, vielleicht nur Wiederholung von Fuß - ob aus Rhp. in Samml. Eppelsh., gelang nicht zu ermitteln. — Nicht *H. W. N.* 64 trifft nach den Belegst. [in Samml. Mühlf. - Bernh. vid.] *picata*, —]

Ocyusa Krtz.

1. **maura** Er. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck-Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

2. **inconspicua** Er. — Düssdf. (Braselm. - F.) — Elbf. (C.) - in Samml. Corn. mit Scriba vid. (Geilenk.) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

3. **incrassata** Rey — Kleve - Samml. Fuß - daher in Samml. Kraatz (Hubenth. briefl.) — Duisb. (1 - Urb.) — Kref. - Samml. Brink-Hubenth. vid. — Laach. See (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

[**Euryalea** Rey.

decumana Er. — Schilsky II. für Westdeutschl. - doch Epp., D. E. Z. 75 S. 401, nur für die Rheinpfalz. —]

[**Ocyusida** Bernh.

rufescens Krtz. — Col. Neerl. mit ? für Kref. — nicht in Samml. Bruck - nicht *H. W. N.* — Näheres über die Angabe nicht feststellbar. --]

Oxypoda Mannh.

1. **spectabilis** Maerk. — Elbf. (C. - ruficornis Gyll.) — Eupen (4 - Heym.) — Schmitttenhöhe (1 - R.) — *H. W.* —

2. **lividipennis** Mannh. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - luteipennis Er.) — Duisb. (Urb.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **opaca** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **vittata** Maerk. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn., Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — Kreuzn. (Reichensp.) — *H. W. N.* —

5. **longipes** Rey — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

6. **elongatula** Aub. = **longiuscula** Grav. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Siegmdg., Laach. See, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

7. **nigrocincta** Rey — Düssdf. - eine unbestimmte Oxyp.

der Samml. Fuß mit Fundort an der Nadel erwies sich als nigroc. [Bernh. vid.] — Frankreich u. a. [Cat. Col.] —

8. **lentula** Er. — Bonn (Kraatz, Ins. D. II. 169) — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Scriba (Neum.) — *N.* —

9. **vicina** Krtz. — Elbf. (*C. - humidula* Krtz.) — U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *N.* —

10. **induta** Krtz. — Elbf. - von Corn. in Samml. Scriba mit Epp. vid. (Neum.) — Brohltal (2 - Andr.) - Hubenth. vid. — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

11. **umbrata** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch cuniculina Er.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *N.* —

12. **sericea** Heer — Ahrw., Laach. See, Kob., U. Nahe, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

13. **Doderoi** Bernh. — Soon (1 - Bernh. vid. it.! - R.) — Österreich, Italien u. a. [Cat. Col.] —

14. **exoleta** Er. — Kreuzn., unter einem Gradierhaus von Theodorshalle (1 - Bernh. vid. - R.) — *H.* - in *N.* auch an Sälinen. —

15. **exigua** Er. — Elbf. (Corn. - *C.*) - daher in Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — *H. N.* —

— **rugulosa** Krtz. — Col. Neerl. für Düssdf. - näheres nicht ermittelt - ob nach v. Hagens? - in dessen Samml. ohne Fundort (Dom. Hag.) — *H.*, daher wohl möglich. —

16. **alternans** Grav. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

17. **formosa** Krtz. — Elbf. (*C. u. - Epp. vid. - Geilenk.*) — Sinzig (Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — *N.* —

18. **planipennis** Thoms. — Elbf. (*C. - silvicola* Krtz. - *u. - Epp. vid. - G.*) — Kob. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

19. **togata** Er. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Pruck — U. Nahe (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

20. **haemorrhoa** Mannh. — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Brohltal (Andr.) — Schneifel b. Form. exsecta (Reichensp.) — Blumslay, Horchheim (Mühlf.) - Hubenth. vid. — *H. N.* —

21. **formiceticola** Maerk. — Bonn (v. Rantzau - *F.*) — Elbf. (Epp. vid. - *G.*) — Brohltal (Andr.) — Blumslay, Horchheim (Mühlf.) - Hubenth. vid. — Bonn (Epp. vid. - R.) — *H. N.* —

22. **amoena** Fairm. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Düssdf. - Samml. Fuß - Belegst. Bernh. vid. — *H. N.* —

23. **annularis** Mannh. — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Horchheim (Mühlf.) - Hubenth. vid. — Kob. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

24. **ferruginea** Er. — Elbf. (*C.* - *solitaria* Krtz.) — Düssdf. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Ahrtal - Samml. Bruck — Kreuzn. (1 - Bernh. vid. - R.) — Mitteleuropa [Cat. Col.] —

25. **brachyptera** Steph. — Elbf. (*C.* u. - Epp. vid. - *G.*) — *H. N.* —

Stichoglossa Fairm.

1. **semirufa** Er. — Kleve - 2 - Samml. Fuß — Winningen (1 - Bernh. vid. - R.) — Roermond u. a. [Col. Neerl.]. —

2. **corticina** Er. — Aach., Bonn (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **prolixa** Grav. — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. - Bernh. vid. — *H. W.* —

Thiasophila Krtz.

1. **angulata** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **canaliculata** Rey — In Rhp. zuerst von v. Hagens entdeckt (Wasm., D. E. Z. 94 S. 273) — Linz (Wasm., l. c.) - dort u. Schneifel, bei Formica exsecta (Reichensp.) - Bernh. vid. — Deutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

3. **inquilina** Maerk. — Elbf. (v. Hagens - *C.*) — Kleve (Col. Neerl.) — Roermond [Col. Neerl.], *N.* —

Cratarea Thoms.

1. **suturalis** Mannh. — Kref. (*F.* - *praetexta* Er.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —

Microglossa Krtz.

1. **pulla** Gyll. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Brohltal (Andr.) — Cob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **nidicola** Fairm. — Gerresheim b. Elbf., in Nestern von Hirundo riparia (Corn. - *C.*) — Neuwied (1 - Bickhardt, briefl.) — *H. N.* —

3. **gentilis** Maerk. — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Bopp. (v. Hagens, Berl. E. Z. 65) — Brohltal (Andr.) — Nettetal, Kob. (R.) — *H. N.* —

4. **marginalis** Grav. — Bopp. (v. Hagens, l. c. - *rufipennis*) — *W. N.*

— **picipennis** Gyll. — Ganglb. Käf. M. für Rhp. [Kraatz] - Quelle?, nicht Ins. D. II. — Corn., Stett. E. Z. 60 S. 273 für Elbf. - nicht im Verz. C. — *N.* —

Homoeusa Krtz.

1. **acuminata** Maerk. — Bonn, Bopp. (*F.* - *Euryusa*) — Elbf.

(C.) — Kref. - von Mink in Samml. Scriba (Neum.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Dinarda Mannh.

1. **dentata** Grav. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Tüddern b. Heinsberg (Schmitz) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.*

v. **Maerkeli** Ksw. — Düssdf., Bonn (*F.*) — Elbf. (v. Hagens - C.) — Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Horchheim (Mühlf.) - Hubenth. vid. — Bonn (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. **Hagensi** Wasm. — Honnef [v. Hagens] u. Linz (Wasm., l. c.) — U. Ahr (Heyd.) — Witterschlick, Linz, Schneifel (Wasm. vid. - Reichensp.) —

v. **pygmaea** Wasm. — Linz (Wasm. l. c.) — Obercassel, Erpel, Brodenbach (Wasm. vid. - Reichensp.) — *H. N.* —

Aleochara Grav.

1. **curtula** Goeze = **fuscipes** Grav. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **crassicornis** Lac. — Aach., Kref., Bonn (*F.* - rufipennis Boisd.!) — Elbf. (*C.* - *lateralis* Heer) — Duisb. (Urb.) — Kob., Winningen, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **laticornis** Kratz. — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 62) - Belegst. Bernh. vid. — Südl. Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

4. **lata** Grav. — Elbf. (C.) — Brohltal, im ersten Frühjahr an Aas, erst einige Tage später stellt sich dann *curtula* ein (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn [Frings] in Samml. R. — *H. N.* —

5. **brevipennis** Grav. — Düssdf. (*F.*) — Elbf. (Epp. vid. - G.) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth (1 - Mühlf.) — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. **curta** Sahlb. — *F.* für Aach. [Fürst.] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] - von Kref. nicht in Samml. Bruck — Fundort Elbf. in *F.* durch Verz. *C.* berichtigt — *W.*, nicht *H. N.* —

6. **puberula** Klug — Löhndorf (1 - Hubenth. vid. - Raderm.) — Kob., von einem Koblenzer Sammler, Herbst 09 (1 - Hubenth. vid. - R.) — Rheinbayern [Schilsky II.], Frankreich u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

7. **intricata** Mannh. = **bipunctata** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - bipunct. Grav.) — Elbf. (*C.* - bipunct. Ol.) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **morion** Grav. — Aach. (*F.*) — Elbf. (C.) — Kref., Ahrtal - Samml. Bruck — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

9. **tristis** Grav. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Remscheid (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

10. **moesta** Grav. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (C. u. - Epp. vid. - Geilenk.) — *H. W.* —

11. **sparsa** Heer — Elbf. (*C. - succicola* Thoms.) — Neuenahr (Bernh. vid. - Heyd.) — Brohltal, Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *H. N.* —

12. **inconspicua** Aub. — Elbf. (*C.*) — Düssdf., Ahrw. (Fuß) - Ahrw. - Samml. Scriba (Neum.) — Laach. See, Winningen, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

13. **lanuginosa** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., Trier, St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

14. **lygaea** Krtz. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) - Belegst. aus Samml. Fuß Hubenth. vid. — Hessen, Thüringen u. a. [Schilsky II.] —

15. **rufitarsis** Heer — Elbf. (*C. u. - Epp.* vid. - Geilenk.) - Elbf. - Samml. Scriba (Neum.) — *W.* —

[**vagepunctata** Krtz. — *C.* für Elbf. [sehr selten - Corn.] — Ganglb. Käf. M. u. Cat. Col.: Ungarn, Österreich - Belegst. der Samml. Corn. ist auch nicht vagep. —]

16. **villosa** Mannh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob., St. (Bernh. vid. - R.) — *W. N.* —

17. **sanguinea** L. — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) - von Elbf. u. Ahrw. in Samml. Scriba (Neum.) — St. (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

18. **fumata** Grav. = *mycetophaga* Krtz. — Elbf. (*C. - mycet.*) - Stücke daher (Bernh. vid. - Heyd.) — Von Aach., Kref. [Samml. Bruck], Brohltal [Andr.], Andernach, Laach. See [R.] Bernh. vid. — *H.* —

19. **moerens** Gyll. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Remscheid, Soon (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

20. **haemoptera** Krtz. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. verloren — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) - Belegst. Bernh. vid. — Jülich (Col. Neerl.) — *N.* —

[**tenuicornis** Krtz. — R., Beitr. II., für St. - trifft *sanguinea* - Bernh. vid. —]

21. **laevigata** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - auch bisingnata* Er.) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) - Belegst. Bernh. vid. — U. Nahe (Bernh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

22. **maculata** Bris. — Neuenahrer Berg - 1 - Samml. Fuß - Bernh. vid. — St. (1 - Bernh. vid. - R.) — Frankreich [Ganglb. Käf. M.] —

23. **spadicea** Er. — *F.* für Ürdingen [Stollwerck - *Ocalea procera* Er.] — Saarl. (Gabr.) — *H.* —

[**cuniculorum** Krtz. — Fuß, Berl. E. Z. 67, für Berg Neuenahr - trifft *maculata* - Belegst. Bernh. vid. —]

24. **ruficornis** Grav. — Elbf. (1 - *C.*) — Kref. - 1 - Samml.

Bruck — Ahrw. (Fuß) — Kob (Bockl.) — Laach. See, U. Nahe,
St. (R.) — *H. W. N.* —

25. **erythroptera** Grav. — Duisb. (1 ♂ - Urb.) — *H. N.* —
26. **bilineata** Gyll. — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Scriba
(Neum.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

27. **verna** Say — Elbf. (C. - binotata Krtz.) — Ahrw. - Samml.
Fuß — *H. N.* —

28. **bipustulata** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - nitida* Grav.)
— Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W.*
N. —

[**obscurella** Grav. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - in Samml.
Bruck nur Ostende. — Nur an der Meeresküste. —]

Pselaphidae.

[Die Psel. der Samml. R. haben ausnahmslos Reitter vorgelegen.]

Euplectini.

Trimium Aubé.

1. **brevicorne** Reichb. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. -
C.) — Kref. - Samml. Bruck. — Brohltal (1 - Andr.) - Reitt. vid.
— *H. W. N.* —

Euplectus Leach.

[**rhenanus** Reitt. — Fauna Germanica nur für Rhp. - doch
beschrieben aus Dürckheim in Rheinbayern, Ins. D. III. II., u.
anscheinend weiter nicht bekannt geworden [cf. Ganglb. Käf.
M. u. Schilsky II.] —]

1. **Erichsoni** Aub. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Heyd.
vid. — Mittel- u. Süddeutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

2. **Fischeri** Aub. — Aach. (Först. - *F.* - Tischeri Maerk.) —
Elbf. (v. Hagens - C.) - Elbf. (G.) — *N.* —

3. **piceus** Motsch. — Kref. - 1 - Samml. Bruck - sulcatus
Saulcy - mit Saulcy vid. — *H. N.* —

4. **nanus** Reichb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch Kirby
Denny) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Gabr.) — Nettetal (1 - R.) —
H. W. N. —

5. **sanguineus** Denny — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb. (Urb.)
— St. (1 - R.) — *H. W. N.* —

6. **signatus** Reichb. — Kref. (Mink. - *F.*) — Düssdf. (Braselm.
u. Hildebr. - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Oberremmel [Reichensp.]
in Samml. R. - Hubenth. vid. — U. Nahe (Reichensp.) — *H. W. N.* —

7. **punctatus** Muls. — Kref. - Samml. Bruck mit Saulcy vid.
— N. —

8. **Karsteni** Reichb. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf.
(Corn. - C.) — Bopp. (B.) — Kob. St. (R.) — H. W. N. —

Biblopectus Reitt.

1. **ambiguus** Reichb. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bopp. (B.) — Kref. - Samml. Bruck mit Saulcy vid. — H. W. N. —

2. **minutissimus** Aub. — Saarl. (1 - Gabr. - Gerh., D. E. Z. 98 S. 386) - nach Mitteilg. von Gabr. ♀ — Frankreich u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

Bibloporus Thoms.

1. **bicolor** Denny — Kref. (Mink u. vom Bruck - F. - bicol. Kirb.) - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. — Duisb. (1 - Urb.) — H. W. N. —

Trichonychini.

Trichonyx Chaud.

1. **sulcicollis** Reichb. — Düssdf. (Hildebr. - F.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. —

Amauronyx Reitt.

1. **Maerkeli** Aub. — Elbf. (C. u. G.) — Kref. - Samml. Bruck — H. Venn (Fred.) — Schalkenmehren (Heyd.) — N. —

Batriscini.

Batriscus Lap.

1. **formicarius** Aub. — Düssdf. (Braselm. - F.) - daher (Heyd.) — Bopp. (B.) — Kleve, Ahrw. (Fuß) — H. W. N. —

Batriscodes Reitt.

1. **Delaportei** Aub. — Düssdf. (Braselm. - F.) — Bopp. (B.) — St. (1 - R.) — Col. Neerl. für Kleve u. Kref. — N., nicht H. W. —

2. **venustus** Reichb. — Düssdf. (Braselm. - F.) — Bopp. (B.) — H. N. —

3. **oculatus** Aub. — Düssdf. (Braselm. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Reitt. vid. — Südl. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

Bryaxini.

Brachygluta Thoms.

1. **Lefebvrei** Aub. — Kreuzn. in Samml. Mink (Lange) — Col. Neerl noch für Kref. u. Düssdf. - nicht in Samml. Bruck - noch Samml. Hagens (Dom. Hag.) — Nicht H. W. N. - Mittel-europa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

2. **xanthoptera** Reichb. — Bopp. (B.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Oberwerth (Mühlf.) - Reitt. vid. — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Saulcy vid. — U. Nahe (1 - R.) — *H. W. N.* —

— **haemoptera** Aub. — Nach Reitt., Ins. D. III. II. 43, in Rhp. aufgefunden - Col. Neerl. für Kref., Düssdf. — Nicht in Samml. Bruck, noch Mink [Lange], noch *H. W. N.* — Näheres nicht ermittelt. —

3. **fossulata** Reichb. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — Ahrw., Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **Helperi** Schmidt — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Saulcy vid. - dort an den Gradierhäusern von Theodorshalle (R.) — *H. N.* —

5. **haematica** Reichb. — Rhp. (F.) — Aach. (F. - emarginata Först.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Sieg-mdg., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

v. **perforata** Aub. — Saarl. (σ^7 - Gabr.) —

Reichenbachia Leach.

1. **juncorum** Leach. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Eupen (Heym.) — *H. N.* —

2. **impressa** Pz. — Kref. Düssdf. (F) — Elbf. (Corn. - C.) — Bopp. (B.) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

[**antennata** Aub. — Schilsky II. für Rhp. - nach Mitteig. von Schilsky irrtümlich angegeben. —]

Bryaxis Leach.

1. **longicornis** Leach. — Aach., Bopp., Kref., Düssdf. (F - sanguinea F.) — Elbf. (C. u. - Reitt. vid. - G.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

Bythinini.

Bythinus Leach.

1. **bulbifer** Reichb. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Kref. - Samml Brink - Reitt. vid. — Elbf. (Corn. - C) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **clavicornis** Pz. — Nev. (Reitt. vid. - de R., Verh. Nat. Ver. 82) — Landskrone a. d. Ahr (Heyd.) — Kob. (2 - R.) — *H.* —

3. **Curtisi** Leach. — Aach. Düssdf. (F) — Elbf. (C. u. G.) — Kob. (Mühlf.) — Kob. Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

4. **nodicornis** Aub. — Bopp. (B.) — Elbf. (Reitt. vid. - G.) — Brohltal (Andr.) - Reitt. vid. — Kob. (2 - R.) — *N.* —

5. **securiger** Reichb. — Kref. (vom Bruck - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

6. **macropalpus** Aub. — Nev. (de Rossi - C. - distinctus

Chaud.) u. de R. mit Reitt. vid. in Verh. Nat. Ver. 82 — Elbf. (G.) — Kob. (3 - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

7. **Burrelli** Denny — Aach, Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bopp. (B.) — H. Venn (Fred.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Siebengbg. (R.) — W. N. —

8. **validus** Aub. — Kref. - mehrfach - Samml. Bruck mit Saulcy vid. — Belg. u. W. N. —

9. **puncticollis** Denny — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck u. Geilenk. — Kob. (1 - R.) — H. W. N. —

Tychus Leach.

1. **niger** Pk. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Siebengbg., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

a. **dichrous** Schmidt — Nev. (1 - de Rossi - G.) — Duisb. (1 - Urb.) — N. —

Pselaphini.

Pselaphus Hbst.

1. **Heisei** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Nettetal, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

2. **dresdensis** Hbst. — Kref., Düssdf. Bopp., (F.) — Elbf. (v. Hagens u. Corn. - C.) — Saarl. (Gabr.) — H. W. N. —

Ctenistini.

Chennium Latr.

1. **bituberculatum** Latr. — Bopp., zahlreich (B. III. 303) — Siebengbg. (v. Hagens, Berl. E. Z. 57 u. 65) — Kleve (v. Hagens-Fuß, Berl. E. Z. 67) - daher in Samml. Fuß — Neuenahr (1 - R.) — H. N. —

Tyrini.

Tyrus Aubé.

1. **mucronatus** Pz. — Schon Zebe für Rhp. - Fundort, Finder? — Duisb. (zahlreich - Urb.) - daher in Samml. R. — W. N. —

Clavigeridae.

Claviger Preyssl.

1. **testaceus** Preyssl. — Aach., Altenahr, Bopp. (F. - foveolatus Müll.) — Elbf. (Corn. - C.) — U. Ahr, gemein, meist bei Lasius flavus (Heyd.) — Bonn, Siebengbg., St. (R.) — H. W. N. —

2. **longicornis** Müll. — Bopp. (Bach - F.) — Elbf. (Corn. u. Stachelhausen - C.) — Kleve (Col. Neerl.) — H. Venn (Fred.) —

Walporzheim, bei *Lasius fuscus* (Heyd.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Scydmaenidae.

Cephenniini.

Euthia Steph.

1. *plicata* Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml Bruck — Schneifel u. Linz bei *Formica exsecta* (Reichensp.) - Hubenth. vid. — *W. N.* —

2. *scydmaenoides* Steph. — Kref., Düssdf. (*F.* - abbreviatella Er.) - Kref. in Samml. Bruck mit Saulcy vid. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. Reitt. vid. — *H. N.* —

Cephennium Müll.

1 *thoracicum* Müll. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Corn. - C.) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — Duisb., Siebengbg. (Urb.) — Unkelbach (Reichensp.) — Kob., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

Neuraphes Thoms.

1. *angulatus* Müll. — Aach. (Fürster - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb. (Urb.) — *H. N.* —

2. *rubicundus* Schm. — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — Nev. (de R., Verh. Nat. Ver. 82) — Brohltal (1 - Andr.) - Reitt. vid. — *H. N.* —

3. *carinatus* Muls. — Kref. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *N.* —

4. *elongatulus* Müll. — Aach., Kref. (*F.* - *elongatus* Müll.!) — Elbf. (Corn. - C.) - Elbf. (Müller-Hubenth. vid. - Geilenk.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. *longicollis* Motsch. — Elbf. - Samml. Corn. - Belegst. Reitt. vid. — Siebengbg. [1 - Verhoeff], Tönnisstein, Kob. in Samml. R. - Reitt. vid. — *H. N.* —

6. *Sparshalli* Denny — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. verloren. — *H. N.* —

Stenichnus Thoms.

1. *Godarti* Latr. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (*F.*) — Bonn (Reichensp.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — *W. N.* —

2. *scutellaris* Müll. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb (Urb.) — *H. W. N.* —

3. *collaris* Müll. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp (*B.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — Laach. See, Nettetal, Kob., St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **pusillus** Müll. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (Mink u. vom Bruck. - *F.*) - daher nicht in Samml. Bruck — *W. N.* —

5. **exilis** Er. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Saulcy vid. — *W. N.* —

Euconnus Thoms.

1. **Maecklini** Mannh. — Saarbr. (*B.* III. 296) — Finder? — *N.* —

2. **Wetterhalli** Gyll. — Düssdf. (Braselm. - *F.* - quadratus Müll.) — Elbf. (C. u. - Reitt. vid. - *G.*) — Saarl. (Gabr.) — *N.* —

[**Motschulskyi** Stm. — *F.* für Aach. [Först. - Motsch. Smidt] - in *B.* III. 297 als zweifelhaft bezeichnet - nicht in Samml. Förster. — Nicht *H. W. N.* - Osteuropäer [Ganglb. Käf. M.] —]

3. **denticornis** Müll. — Aach. (Först. - *F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Saulcy vid. — St. (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

4. **rutilipennis** Müll. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) — Duisb (1 - Urb.) — *H. N.* —

5. **hirticollis** Ill. — Kref. (vom Bruck. - *F.* - hirtie. Gyll.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) - Reitt. vid. — Kob. (Mühlf.) — Nettetal (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

6. **pubicollis** Müll. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (C. u. - Reitt. vid. - *G.*) — Kob. (1 - Reitt. vid. - *R.*) — *N.* —

Scydmaenini.

Scydmaenus Latr.

1. **tarsatus** Müll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Wiedtal, Kob. (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

2. **Hellwigi** Hbst. — Bopp. (*B.*) - nicht auch Elbf. [Corn.], wie *F.* angibt, nicht in *C.* — Col. Neerl. für Düssdf. — *N.* —

Silphidae.

Cholevinae.

Choleva Latr.

1. **spadicea** Stm. — Aus Rhp. in Samml. Bruck — Ahrtal - 1 - Samml. Fuß — St. (1 - Heyd. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

2. **oblonga** Latr. = *intermedia* Krtz. — Düssdf. (Hildebr. - Kraatz, Stett. E. Z. 52) — Kref. - Samml. Bruck mit Kraatz vid. — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Ulbr.] u. Kreuzn. in Samml. R. - Heyd. vid. — *H. N.* —

[**elongata** Pk. = *lucidicollis* Reitt. — *F.* für Aach., Kref., Düssdf. [*angustata F.*] - in *B.* I. 157, mit denselben Fundorten,

ziemlich sicher erkennbar = elong. Pk. - doch damals Sturmi Bris. noch nicht aufgestellt. — C. für Elbf. [angust. F.] — Aus Rhp. nicht in den älteren Samml., Mink [Lange briefl.], vom Bruck, Förster, Fuß, noch den neueren, Geilenk., Bockl., Mühlf., Andr., R. u. a. — Belegst. in Samml. Corn. von Elbf. ist Sturmi ♀. — Danach elong. Pk. in Rhp. wohl fehlend; die alten Angaben mögen sich sämtlich auf Sturmi, die noch in Col. Neerl. nicht getrennt, beziehen. — Für H. W. N. angegeben. —]

3. **Sturmi** Bris. — Elbf. - Samml. Corn. - 1 ♀ - Reitt. vid. — Duisb. [1 ♂ - Urb.] u. Kref. [1 ♀ Ulbr.] in Samml. R. — Brohltal (♂♀ - Andr.) — Bonn [1 ♂ - Frings] in Samml. R. - Reitt. vid. — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

4. **cisteloides** Fröl. — Aach., Kref. (F. - castanea Stm.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref., Bonn (Kraatz, Stett. E. Z. 52) — Laach. See, Kob., St. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

5. **agilis** Ill. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

Nargus Thoms.

1. **velox** Spence — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) — Düssdf., Bonn (Kraatz, Stett. E. Z. 52) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Wiedtal, Kob. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

2. **Wilkini** Spence — Aach., Kref. (F. - praecox Er.) — Elbf (C.) — Laach. See, Kob., St. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

3. **brunneus** Stm. — Brohltal, Rhens, St. (Heyd. vid. - R.) — N. —

4. **anisotomoides** Spence — Aach., Düssdf. (F.) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr (Heyd.) — Oberwerth (Mühlf.) — Winningen (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

Catops Pk.

1. **fumatus** Spence — Rhp. (F.) — Elbf. (v. Hagens - C.) — Löhndorf (Raderm.) — Brohltal (Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — St. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

2. **Watsoni** Spence — Elbf. (Corn. - C.) — Nev. (de R.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Nettetal, Kob. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

3. **alpinus** Gyll. — Rhp. (Kraatz, Stett. E. Z. 52) — Elbf. (Corn. - C.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — St. (1 - Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

4. **picipes** F. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (Corn. - C.) — Brohltal (Andr.) — Kreuzn. (Heyd.) — Rhens, St. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

5. **fuscus** Pz. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — H. W. N. —

6. **nigricans** Spence — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob., St. (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. flavicornis Thoms. — Düssdf. - 1 - von Fuß - Samml. Bruck - Belegst. Hubenth. vid. — *N.* —

7. **fuliginosus** Er. — Brohltal (Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Kob., St. (Heyd. vid. - R.) - Angabe in *F.* für Elbf. [Corn.] gegenüber Verz. *C.* unrichtig. — *W. N.* —

8. **grandicollis** Er. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — Belg. u. *H. W. N.* —

9. **nigrita** Er. — Aach., Kref. (*F.* - nigr. Gyll.) — Elbf. (Corn. - *C.* - affinis Steph.) — Brohltal (Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Heyd. vid. - R.) — *H. N.* —

10. **coracinus** Kelln. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Reitt. vid. — Brohltal (♂ - Andr.) — Schmittenhöhe (♂ - Reitt. vid. - R.) — *W.* —

11. **morio** F. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Heym.) — *H. W. N.* —

12. **neglectus** Krtz. — Brohltal (1 ♂ - Andr.) — Laach. See [Voigt], Vallendar (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

13. **chrysomelooides** Pz. — Kref., Mörs (Mink u. vom Bruck - *F.*) - Kref. in Samml. Brink — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Rhens (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

14. **tristis** Pz. — Rhp. (*F.*) — Aach., Düssdf., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Soon (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Nemadus Thoms.

1. **colonooides** Krtz. — Nettetal (1 - Heyd. vid. - R.) — Col. Neerl. für Kref. - nicht in Samml. Bruck. — *N.* —

Ptomaphagus Ill.

1. **varicornis** Rosh. — Kref., Ahrw. - Samml. Bruck — Oberwerth (Mühlf. u. R.) — *N.* —

2. **subvillosum** Goeze = sericeus Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - wohl den sericatus, den *B. I.* 162 noch nicht anführt, mittreffend — ebenso vielleicht Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst verloren — Saarl. (Gabr.) Löhndorf - 1 ♂ Samml. Raderm. — Nettetal (1 ♂ - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **sericatus** Chaud. — Saarl. (Gabr.) — Duisdorf - Samml. Raderm. — Horchheim, Oberwerth, nicht selten (♂♂ - Heyd. vid. - R.) — *H. N.* —

Colon Hbst.

1. **latum** Krtz. — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — *N.* —

[**clavigerum** Hbst. — *F.* für Elbf. [Corn.] - berichtet durch Verz. *C.* — *B.* I. 164 für Kref., I. 396 nicht mehr für Rhp. - auch nicht in Samml. Bruck. —]

[**affine** Stm. — *F.* für Kref. [Minck u. vom Bruck] - in *B.* I. 163 ff. u. 398 nicht für Rhp. - auch nicht in Samml. Bruck. — Nicht *H. W. N.* —]

2 angulare Er. — *F.* für Aach. [Först.] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] - in *B.* I. 396 nicht für Rhp. - daher auch nicht in Samml. Bruck — Elbf., Nev. (Corn. u. de Rossi - *C.*) — Eupen (1 - Heym.) — *W. N.* —

3. dentipes Sahlb. — Kettwig - 1 ♂ - Samml. Fuß — Vallendar (2 ♂ - R.) — *H. N.* —

4. Zebei Krtz. — Elbf. - 1 - in Samml. Corn. - Reitt. vid. - das Belegst. des in *C.* für Elbf. angegebenen puncticolle. — *N.* —

5. brunneum Latr. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Ahrw. - Samml. Fuß — Wiedtal, Kob. (Heyd. vid. - R.) — *H. N.* —

v. episternale Czwal. — Schmittenhöhe (1 - Reitt. vid. - R.) —

[**calcaratum** Er. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck - nanum Er., pygmaeum Er.] - in *B.* nicht für Rhp. - auch nicht in Samml. Bruck — *H. N.* - deshalb wohl noch aufzufinden. —]

6. fusculum Er. — Kref. (*B.* I. 395 - serripes Sahlb.) - Kref. (Geilenk.) - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (1 - Corn. - *C.* - serripes Sahlb.) - Belegst. Reitt. vid. — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

[**puncticolle** Krtz. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. aus Samml. Corn. ist Zebei - Reitt. vid. —]

7. viennense Hbst. — Kref. (*B.* I. 395) - daher in Samml. Bruck - Reitt. vid. — Nev. (de Rossi - *G.*) -- *W. N.* —

Silphinae.

Necrophorus F.

1. germanicus L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Sinzig (Andr.) — Soon (v. Geyr) — *H. W. N.* —

a. bipunctatus Krtz. — Hild. H. (1 - *G.*) — *N.* — In Schilsky II. noch a. frontalis Fisch. für Elbf. und a. speciosus Schulze für Rhp. - Näheres [Bestimmungssendung?, von Geilenk.?, wie zu vermuten] nicht mehr zu ermitteln. — a. specios. in *N.* —

2. humator Goeze — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Duisb. (Urb.) -- Brohltal (Andr.) — Soon (v. Geyr) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. interruptus Steph. — Rhp. (*F.* - fossor Er.) — Kref., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) —

Soon (v. Geyr) — Rhp. (Reitt., Ins. D. III. II. 320 - a. ♂ gallicus Duv.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65 - gallicus Scriba) — *H. W. N.* —

4. **investigator** Zett. — Kref., Düssdf. (*F.* - ruspator Er.) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Soon (v. Geyr) — Schneifel [1 - le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

5. **sepultor** Charp. — Düssdf. (Brasel. u. Hildebr. - *F.*) — Ahrtal in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl) — *H.*, u. a. Roermond, *W. N.* —

6. **vespilloides** Hbst. — Rhp. (*F.* - mortuorum *F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob. St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **vespillo** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **vestigator** Hersch. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. **Rautenbergi** Reitt. — Trier (1 - Heyd.) — *N.* —

Necrodes Leach.

1. **litoralis** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Mörs (Schneid.) — Kottenforst (Frings) — Soon (v. Geyr) — Siegmdg., St. (R.) — *H. W. N.* —

Thanatophilus Sam.

1. **dispar** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W.* —

2. **sinuatus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kochem, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **rugosus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Oeceoptoma Sam.

1. **thoracicum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Blitophaga Reitt.

1. **opaca** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **undata** Müll. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - reticulata *F.*) — U. Solg. (*G.*) — Nev. (1 - de R., Westf. Pr. 98) — Tönnisstein, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Xylodrepa Thoms.

1. **quadripunctata** Schreb. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kochem, Kob., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

Silpha L.

1. **carinata** Hbst. — Kref. (*F.*) — nicht auch Elbf., wie in *F.*

(C.) — Eupen (Brink) — Kottenforst, Konderwald b. Kochem, Soon (R.) — *H. W. N.* —

2. **obscura** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg., Vohwinkel (G.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. **granulata** Thunbg. = **tristis** Ill. — Kref. (F.) — Elbf., nicht selten und die dort fehlende *obscura* vertretend (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Blumslay (Bockl.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

4. **tyrolensis** Laich. — Kottenforst [1 - Reichensp.] in Samml. R. - Hubenth. vid. — Auch in Belg. u. Holland aufgefunden [Col. Neerl.] —

Ablattaria Reitt.

1. **laevigata** F. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (G. polita Sulz.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Linz, St. (R.) — *H. W. N.* —

Phosphuga Leach.

1. **atrata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **brunnea** Hbst. — Elbf. (G.) — Bonn (1 - R.) — *W. N.* —

Agyrtini.

Ecanus Steph.

glaber F. — B. I. 474 für Düssdf. u. Elbf. (v. Hagens-Agyrtes glaber Pk.) - C. für Elbf. [Corn. u. v. Hagens] — Belegst. der Samml. Corn. ist ein Agyrtes bicolor von Elbf., der im Verz. C. u., nach Mitteilung von Geilenk., auch in den Aufzeichnungen von Corn. fehlt. — Beschränkung des Irrtums auf den Fund von Corn. allein bei dessen Verbindung mit v. Hagens nicht anzunehmen; zudem hat auch v. Hagens den bei Düssdf. öfter gefundenen Ag. bic. daher nicht angegeben. In Samml. Hagens fehlt die Art ganz (Dom. Hag.). — Norddeutschland, Nordeuropa [Ganglb. Käfer M.] —]

Agyrtes Fröl.

1. **bicolor** Lap. — Düssdf., in Mehrzahl - Samml. Fuß und Samml. Bruck — Elbf. - 1 - in Samml. Corn. als Hadrambe glabra — Jülich (Eichh. - W. 109) — Wesel (Beckers, D. E. Z. 92) — *H. W. N.* —

2. **castaneus** F. — Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (G.) — Kob. (Bockl.) — Siegmdg. [Frings], Rhens, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

Liodidae.

Liodini.

Triarthron Schmidt.

1. **Maerkeli** Schmidt — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher 1 in Samml. Bruck — Duisb. (1 - Urb.) — *H. N.* —

Hydnobius Schmidt.

1. **multistriatus** Gyll. — Bonu, Vallendar (je 1 - Hubenth. vid. - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

2. **punctatus** Stm.

a. **punctatissimus** Steph. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Ahrw. (1 · Fuß) — *H. W. N.* —

3. **strigosus** Schmidt — Elbf. (1 - Drescher u. Ostheide - *G.*) - von Reitt. best. (Geilenk.) — *H.* —

Liodes Latr.

1. **cinnamomea** Pz. — Aach., H. Venn, Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — *W. N.* —

v. **oblonga** — H. Venn [1 ♀ - le Roi] in Samml. R. - Heyd. vid. — *N.* —

2. **silesiaca** Krtz. — Kref. (1 - Ulbr.) - jetzt in Samml. R. - Hubenth. vid. — *N.* —

3. **Triepkei** Schmidt — Kondertal b. Kob. (1 - Reitt. vid. - R.) — *H. N.* —

4. **brunnea** Stm. — Kref. (Mink - *F.*) — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *W. N.* —

5. **dubia** Kugel. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *dubia* Pz.) - Kref. (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Bopp. (B. I. 183.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Brohltal (Andr.) — Kreuzn. - Samml. Bruck. — Trier (Reitt. vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* —

[v. **obesa** Schmidt — Col. Neerl. für Elbf. — nach auf Corn. beruhender Angabe in *W.* 109 - nicht mehr im Verz. *C.* —]

6. **calcarata** Er. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) -- Elbf. (Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (Reitt. vid. - R.) — *H. N.* —

7. **ovalis** Schmidt — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck - daher (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

8. **nigrita** Schmidt — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.* - u. Erichs. Ins. D. III. 69) - daher in Samml. Bruck — Ahrw. - Samml. Fuß — Vallendar (1 - Reitt. vid. - R.) — *N.* —

[**hybrida** Er. — Ev., D. E. Z. 92 für Kref. - an sich, da in *N.*, möglich - durch Samml. vom Bruck, auf den die Angabe sicher zurückgeht [Vorbemerkg. V.], nicht gestützt. —]

[**pallens** Stm. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - in *B. I.* 478 nicht für Rhp. - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl) - *W.* 109, nicht *H. N.* —]

9. **rotundata** Er. — Eupen (1 - Heym.) — *W.* [Suffrian.] —
 10. **badia** Stm. — Kref., Düssdf. (*F.*) - von Kref. nicht in Samml. Bruck. — Da Belg. *H. N.*, unzweifelhaft richtig. —
 11. **parvula** Sahlb. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck - Reitt. vid. — Mittel-europa [Ganglb. Käf. M.] —

Agaricophagus Schmidt.

1. **cephalotes** Schmidt — Ahrw. - 2 - Samml. Fuß — Kreuzn. - 1 - Samml. Bruck — *W. N.* —

Colenis Er.

1. **immunda** Stm. — Aach., Kref. (*F.* - dentipes Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Kob. (1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Nettetal, St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Cyrtusa Er.

1. **subtestacea** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — *W. N.* —

[**subferruginea** Reitt. — Fauna Germanica für Rhp. - anscheinend entnommen aus Schilsky II. - doch nur *N.* —]

2. **minuta** Ahr. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - nur Kreuzn. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Duisdorf - Samml. Raderm. — *H. W. N.* —

3. **pauxilla** Schmidt — Elbf (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

4. **latipes** Er. — Kreuzn. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

Agathidiini.

Anisotoma Ill.

1. **humeralis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **v. clavipes** Hbst. — Oberwerth (1 - R.) — *H.* —

- 2 **axillaris** Gyll. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher - 1 - Samml. Fischer — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

3. **castanea** Hbst. — Schon von Zebe für Rhp. angegeben. — Duisb. (Urb.) - daher in Samml. R. — Col. Neerl. für Elbf. u. Essen - Elbf, auf *W.* 110 beruhend, durch Verz. C. berichtigt. — *W. N.* —

4. **glabra** Kugel. — Kref. (*F.*) — Düssdf. (*B.*) — Elbf. (Geilenk. - *G.*) — *H. N.* —

5. **orbicularis** Hbst. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck

— Elbf. (v. Hagens - C.) — Laach. See [Reichensp.] in Samml.
R. — H. W. N. —

Amphicyllis Er.

1. **globus** F. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

a. **ferruginea** Stm. — Kob. St. (Reitt. vid. - R.) — W. N. —

2. **globiformis** Sahlb. — Schon von Zebe für Rhp. angegeben. — Kref. - Samml. Bruck — Vallendar (1 - R.) — H. W. N. —

Agathidium Ill.

1. **nigripenne** F. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (v. Hagens - C.) — Siegmdg., Kob., St. (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

2. **atrum** Pk. — Aach. (Fürst. - F.) — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

3. **seminulum** L. — Aach., Kref. (F.) — Düssdf. (B.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — H. W. N. —

4. **laevigatum** Er. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Brink], Kob. (je 1 - Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

5. **badium** Er. — Aach., Kref. (F.) — Ahrw. (Fuß) — Kob. (Reitt. vid. - R.) — W. N. —

6. **marginatum** Stm. — Düssdf., Ahrw. (Fuß) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Hild. H. (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

7. **varians** Beck — Nev. (3 - de Rossi - C.) — Brohltal (mehrgefach - Andr.) - Reitt. vid. — W. N. —

8. **rotundatum** Gyll. — Elbf. (2 - Ostheide - Reitt. vid. - G.) — Kref. - Samml. Bruck — Oberwerth (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

9. **mandibulare** Stm. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Kref. (Geilenk.) - daher, nicht Ahrw., wie Beitr. I, in Samml. Fuß — Arenberg (1 ♂ - Hubenth. vid. - R.) — W. —

10. **nigrinum** Stm. — Kref. (vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck. — Nev. (1 - de Rossi - G.) — Soon (1 - Reitt. vid. - R.) — W. —

Clambidae.

Calyptomerus Redtb.

1. **dubius** Marsh. — Aach. (Fürst. - F. - enshamensis Steph.) — Kref. (vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck - Reitt. vid. — Kob., in Kellern, zahlreich (Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — H. W. N. —

[**alpestris** Redtb. - Schilsky II. für Rhp. - Quelle nicht mehr feststellbar - nach Ganglb. Käf. M. in den Hochgebirgen. —]

Clambus Fisch.

1. **minutus** Stm. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Sayntal, Kob. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. **punctulum** Beck — Kref. (Mink - Kraatz, Berl. E. Z. 68 - punct. Gyll.) — Elbf. (Corn. - C. - punct. Gyll.) — Europa [Ganglb. Käf. M.] —

3. **armadillo** Deg. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Reitt. vid. — Elbf. (Corn. - C.) — Saarl. (Gabr.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

4. **pubescens** Redtb. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — hierhin vielleicht *B.* I. 398 mit coccinelloides Kirb. für Kref., doch pubescens Redtb. von Kref. nicht in Samml. Bruck — *H. W. N.* —

Leptinidae.

Leptinus Müll.

1. **testaceus** Müll. — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) — Elbf., Nev. (v. Hagens u. de Rossi - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kob. (1 - R.) — *H. W.* —

Corylophidae.

Sacium Lec.

— **rhenanum** Reitt. — Schilsky II. für Rhp. - Reitt. gibt in l'Abeille 1878 nur an, es lägen ihm Stücke aus dem Rheintal u. Frankfurt vor - Rhp. danach nicht sicher. — *N.* —

Arthrolips Wollast.

— **obscurus** Sahlb. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. verloren. — Nicht *H. W.*, in *N.* —

[**piceus** Com. -- *B.* III. 168 für Bopp. - nicht *H. W. N.* — Frankreich, Schlesien u. a. [Ganglb. Käf. M.] —]

Sericoderus Steph.

1. **lateralis** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - Clypeaster lividus Dej.) — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Corylophus Steph.

1. **cassidoides** Marsh. — Kref. (vom Bruck - F.) - daher in

Samml. Bruck - Reitt. vid. — Düssdf. (Hildebr. - F.) — *H. W. N.* —

Orthoperus Steph.

1. *brunnipes* Gyll. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — *H. W. N.* —
2. *atomus* Gyll. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (1 - Corn. - C. - picatus Marsh.) — Kref. - Samml. Bruck - corticalis Redtb. - Reitt. vid. — *H. W. N.* —
3. *coriaceus* Rey — Ehrenbreitstein (Gerh. vid. - Gabr.) — Deutschland a. a. [Ganglb. Käf. M.] —
4. *atomarius* Heer — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W.* —

Sphaeriidae.

Sphaerius Waltl.

1. *acaroides* Waltl — Schon von Zebe für Rhp. angegeben. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Im unteren Brohltal einmal Mitte Mai sehr zahlreich (R.) — *W.* —

Ptiliidae¹⁾.

[Trichopterygidae.]

Ptenidiini.

Nossidium Er.

1. *pilosellum* Marsh. — Ehrenbreitstein (Gerh. vid. - Gabr.) — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

Ptenidium Er.

1. *laevigatum* Er. — Aach. (Först. - F. - laev. Gillm.) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —
2. *fuscicorne* Er. — Kref. (vom Bruck - Erichs., Ins. D. III. 37 u. F.) — Brodenbach (1 - Hubenth. vid. - R.) — *H. N.* —
3. *pusillum* Gyll. — Aach., Kref. (F. - auch apicale Stm.) - Kref. in Samml. Bruck mit Erichs. vid. — Elbf. (Corn. - C. - auch evanescens Marsh.) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
4. *longicorne* Fuß — Ahrw. (daher nach 2 Stück beschrieben - Fuß, Berl. E. Z. 68) — In Württemberg wieder aufgefunden [Ganglb. Käf. M.] —
5. *nitidum* Heer — Tönnisstein, mehrfach (Hubenth. vid. - R.) — Ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

1) Hierzu Bergroth, D. E. Z. 07 S. 573, u. Fauna Germanica II., wo der neue Namen angenommen ist.

Ptiliini.

Ptiliolum Flach.

1. **Kunzei** Heer — Aach. (Först. - *F.* - Kunz. Chevr.) — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

2. **Spencei** Allib. — Aach. (Först. - *F.* - oblongum Maerk. - daher auch als fuscipenne Först. beschrieben) — Kref. (vom Bruck - *F.*) — *H. W. N.* —

[**fuscum** Er. — *B. I.* 174 für Kref. [fuscum Walt] - nach vom Bruck, in dessen Samml. der Fundort auf dem Namenszettel, das einzige Stück aber aus England. — Nicht *H. W. N.* —]

Oligella Flach.

1. **foveolata** Allib. — Aach., Kref. (*B. I.* 172) - Kref. (Geilenk.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

Ptilium Er.

1. **minutissimum** Web. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck. — *H. N.* —

2. **exaratum** Allib. — Aach. (Först. - *F.* - canaliculatum Maerk.) — *H. W. N.* —

3. **myrmecophilum** Allib. — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Col. Neerl. für Kref. - in Samml. Bruck nicht daher. — *W. N.* u. über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

Ptinellini.

Ptinella Motsch.

1. **testacea** Heer — Saarbr. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck - Kref. (1 - Geilenk.) — *H. W. N.* —

2. **aptera** Guér. — Saarbr. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck - Kref. (Geilenk.) — *H. N.* —

v. **ratisbonensis** Gillm. — Bopp. (*B.*) —

[**tenella** Er. = **angustula** Gillm. — Ev., D. E. Z. 92 [**angustula** Gyll.], für Kref. - jedenfalls nach vom Bruck [Vorbemerkg. V.] - in dessen Samml. nur England. —]

Pteryx Matth.

1. **suturalis** Heer — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Reitt. vid. — *W. N.*

Acrotrichini.

[Trichopterygini.]

Nephanes Thoms.

1. **Titan** Newm. — Aach. (Först. - *F.* - *curtus* Allib.) — Kref. (*B. I.* 171) — *H. N.* —

Acrotrichis Motsch. = **Trichopteryx** Kirb.

1. **grandicollis** Mannh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
2. **Montandoni** Allib. — Ehrenbreitstein (Gerh. vid - Gabr.) — *H.* —
3. **thoracica** Waltl — Aach., Kref. (*F.*) — Kref. - Samml. Bruck - thorac. Gillm. - mit Matth. vid. — *H.* —
4. **atomaria** Deg. — Aach., Kref. (*F.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Matth. vid. — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —
5. **intermedia** Gillm. — Elbf. (Müller - Hubenth. vid. - Geilenk.) — *H. N.* —
6. **fascicularis** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Matth. vid. — Elbf. (*C.*) - Elbf. (Müller - Hubenth. vid. - Geilenk.) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
7. **brevipennis** Er. — Aach., Kref. (*F.* - brevip. Stm. u. *pumila* Er.) — Bopp. (*B.* - *pum.* Er.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Hierhin wohl *C.* mit *longicornis* Mannh. für Elbf. [Corn.] - Belegst. verdorben. — *H. W. N.*
- **Chevrolati** Allib. — *F.* für Aach. [Fürst. - parallelogramma Gillm.] - in *B. I.* 170 nicht für Rhp. aufgenommen, doch *H. N.*, daher wohl richtig. —
8. **sericans** Heer — Aach. (Fürst. - *F.* - *depressa* Stm.) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
9. **dispar** Matth. — Kref. - Samml. Bruck mit Matth. vid. — *H.* —

Scaphidiidae.**Scaphidiini.****Scaphium** Kirb.

1. **immaculatum** Ol. — Trier, aus Moos gesiebt (Mühl.) - daher in Samml. R. — *H. N.* —

Scaphidium Ol.

1. **quadrimaculatum** Ol. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Siebengbg., Kochem, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

Scaphosomini.**Scaphosoma** Leach.

1. **agaricinum** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
2. **subalpinum** Reitt. — Düssdf. (Col. Neerl. mit Ev. vid.) -

daher in Samml. Bruck - Reitt. vid. — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

3. **assimile** Er. — *F.* für Homberg [Pliester] — Elbf. (2 - Corn. - C.) — Kref., Düssdf. - Samml. Bruck - Reitt. vid. — St. (1 - Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **boleti** Pz. — Aach., Düssdf. (B. I. 168) — *H. W. N.* —

— [**limbatum** Er. — *B.* I. 476 für Düssdf. - geht unzweifelhaft auf v. Hagens zurück, der subalpinum als limbatum von Düssdf. an Everts sandte [Col. Neerl.] - ebenso ist limb. von Düssdf. in Samml. Bruck das subalp. [Reitt. vid.] — Nicht *H. W. N.*] —

Histeridae.

[Die H. der Samml. R. von Hubenth. revidiert.]

Hololeptini.

Hololepta Pk.

— **plana** Sulz. — *F.* für Aach. [Meigen] u. Homberg [Pliester] - nicht *H. W. N.*, in Samml. Först. ohne Fundort - wohl unrichtig. —

Histerini.

Platysoma Leach.

1. **frontale** Pk. — Elbf. (2 - Drescher u. Ostheide - Reitt. vid. - G.) — *W. N.* —

2. **compressum** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *depressum* F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Borbeck (Geilenk.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *W. N.* —

Cylistosoma Lewis.

1. **oblongum** F. — Aach. (Först. - *F.*) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

2. **angustatum** Hoffm. — Aach. (Först. - *F.*) — Duisb. (Urb.) — Löhndorf (Raderm.) — *H. W. N.* —

Hister L.

1. **quadrimaculatus** L. — Düssdf., Bopp. (*F.*) — nicht Elbf. wie *B.* I. 300 angibt, nicht in *C.* — U. Nahe, St. (R.) — *W. N.* —

v. **gagates** Ill. — Kob. (Bockl.) — St. (1 - R.) — *W. N.* —

2. **helluo** Truqui — Ahrw., in morschem Holz und unter Steinen am Ahrufier (Fuß, Berl. E. Z. 59) — *H. W. N.* —

3. **unicolor** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Soon (v. Geyr) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. **distinctus** Er. — Ahrw., in einem Weinberg in faulenden, als Dünger dienenden Kuhhaaren (Fuß, Berl. E. Z. 60) — *N.* —

5. **merdarius** Hoffm. — Kref., Düssdf. (*F.* - merd. Pk.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Blumslay (Hubenth. vid. - Bockl.) — Tönnisstein, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —
6. **cadaverinus** Hoffm. — Rhp. (*F.* - cadav. Pk.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
7. **striola** Sahlb. = **succicola** Thoms. — Kleve (1 - Fuß, Berl. E. Z. 73) - nicht Ahrw., wie Beitr. I — Elbf. (2 - Kraatz vid. - *C.*) — Eupen (3 - Heym.) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —
8. **terricola** Germ. — Elbf. (Corn. - *C.*) - dort - 1 - vom Monographen Schmidt bestimmt, jetzt in dessen Samml. (Geilenk.) — *W. N.* —
9. **stercorarius** Hoffm. — Rhp. (*F.* - sterc. Pk.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
10. **bipustulatus** Schrk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - sinuatus Pk. u. fimetarius Pk.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
11. **purpurascens** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
- a. **niger** Schmidt — Tönnisstein (1 - R.) — *N.* —
12. **marginatus** Er. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) — Ahrw. (Fuß) — Brohltal (1 - Andr.) — Viersen [1 - le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —
13. **neglectus** Germ. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Kob. (1 - jetzt in Samml. Hubenth. - Bockl.) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —
14. **ventralis** Mars. — Elbf. (1 - Schmidt vid. - *G.*) — Kob. (Bockl.) - Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —
15. **carbonarius** Hoffm. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Kob. (Bockl.) — Bonn, Laach. See, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
16. **stigmosus** Mars. — Ahrw. - Samml. Fuß — *H.* —
17. **quadrinotatus** Scrib. — Rhp. (*F.* - quadrin. Pz.) — Elbf. (*C.*) — Borbeck (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
- [**sinuatus** Ill. — *B. I.* 301 für Elbf. [*uncinatus* Ill.] - nicht in Verz. *C.* —]
18. **funestus** Er. — Ahrw. - Samml. Fuß — Bopp. - Samml. Bruck — Brohltal (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — Blumslay (Bockl.) - Hubenth. vid. — Soon (v. Geyr) — St. (1 - R.) — *N.* —
19. **bissexstriatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —
20. **duodecimstriatus** Schrk. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —

21. **bimaculatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

22. **corvinus** Germ. — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) — Blumsay (Hubenth. vid. - Bockl.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

Dendrophilus Leach.

1. **punctatus** Hbst. — Aach., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — H. W. N. —

2. **pygmaeus** L. — Aach., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal (Andr.) — Blumsay (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — H. W. N. —

Paromalus Er.

1. **complanatus** Pz. — Kref. (F.) · daher 1 in Samml. Bruck — nicht Elbf., wie B. I. 306 angibt, nicht in C. — Mittel-europa [Ganglb. Käf. M.] —

2. **parallelepipedus** Hbst. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) — W. N. —

3. **flavicornis** Hbst. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - F.) — Elbf. (C.) - daher in Samml. Bruck — Borbeck (Geilenk.) — Nettetal, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Hetaciini.

Hetaerius Er.

1. **ferrugineus** Ol. — Rhp. (F. - quadratus Kugel.) — Elbf. (C.) — Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Walporzheim (Heyd.) — Bonn, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

Saprinini.

Myrmetes Mars.

1. **piceus** Pk. — Duisb. (Heinemann - F. - Saprinus pic.) — Düssdf. (B. I. 307) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Kref. (Geilenk.) — Brohltal (Andr.) — Blumsay (Mühlf.) - daher in Samml. R. — H. W. N. —

Gnathoneus Duv.

1. **rotundatus** Kugel. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Brohltal (Andr.) — St. (R.) — H. W. N. —

v. **suturifer** Reitt. — Laach. See (1 - Hubenth. vid. - R.) — Bisher Caucasus [Cat. Col.] —

2. **punctulatus** Thoms. — Vallendar, Kob., St. (R.) — H. N. —

Saprinus Er.

[**semipunctatus** F. — F. für Düssdf. [Braseltn.] - von B. nicht aufgenommen - nicht H. W. N. - Südeuropäer. —]

1. **rugifer** Pk. — Gerresheim bei Elbf., in Nestern der Uferschwalbe (*C.*) — Elbf. an Aas (1 - *G.*) — Ahrw. (Fuß) — Düssdf. (Everts, D. E. Z. 92) — Norddeutschland u. a.: [Ganglb. Käf. M.] —

2. **semistriatus** Scriba — Rhp. (*F.* - nitidulus *F.*) — Elbf. (*C.*) — Blumslay (Bockl.) — Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **politus** Brahm — Aach., Düssdf., Bonn (*F.* - speculifer Pk.) — Düssdf. in Samml. Bruck — Nev. (1 - de Rossi - *C.*) — Trier (Mühlf.) — Beuel, am Rheinufer (*R.*) — *N.* —

4. **aeneus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Gerolstein, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

v. **immundus** Gyll. — Zebe für Rhp. — *H. verbr.*, *N.* —

5. **virescens** Pk. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — nicht Elbf., wie *B. I.* 309 angibt, nicht in *C.* — *H. N.* —

6. **conjugens** Pk. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Beuel, am Rheinufer (*R.*) — *H. W. N.* —

7. **specularis** Mars. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) - Belegst. Hubenth. vid. — Ahrtal [v. Hagens] u. Düssdf. (*B. I.* 501 - specularis Bach!) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

8. **rugiceps** Dft. = **quadrinstriatus** Hoffm. — Kref., Düssdf. (*F.* - quadr. Pk.) — U. Solg. [v. Hagens] u. Borbeck (*G.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Beuel (*R.*) — *H. W. N.* —

9. **rugifrons** Pk. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Beuel (*R.*) — *H. W. N.* —

10. **metallicus** Hbst. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Beuel (*R.*) — *H. W.* —

Abraeini.

Teretrius Er.

1. **picipes** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —

Plegaderus Er.

1. **saucius** Er. — Kob. (1 - Bockl.) — *W. N.* —

2. **vulneratus** Pz. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - *F.*) — Elbf. (Geilenk.) — Duisb., zahlreich (Urb.) — Düssdf. [Hens.], Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

3. **caesus** Hbst. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - *F.*) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

4. **dissectus** Er. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - *F.*) - daher in Samml. Bruck. — *N.* —

Onthophilus Leach.

1. **sulcatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — U. Solg. (v.

Hagens - G.) — nicht Elbf., wie B. I. 312 angibt, nicht in C. — Trier (Mühlf.) — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **striatus** Forst. — Rhp. (*F.* - *striat.* *F.*) — Aach., Kref., Bopp. (*B.*) -- Elbf. (Corn. - *C.*) — Siegmdg. [Frings], Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Abraeus Leach.

1. **globulus** Creutz. — Ahrw. (Fuß) -- *W. N.* —

-- **granulum** Er. — *F.* für Aach. [Forst.] - nicht *H.*, nach Col. Neerl. in Belg., daher wohl richtig. —

2. **globosus** Hoffm. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - *F.*) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Ahrw. (Fuß) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Acritus Lec.

1. **minutus** Hbst. — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) - daher in Samml. Bruck. — *N.* —

2. **homoeopathicus** Woll. — Ahrw. (daher beschrieben - Fuß, Berl. E. Z. 68 - rhenanus) — Ungarn u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

[**Hopffgarteni** Reitt. — Reitt., D. E. Z. 78, gibt an, er habe ein Stück von Fuß aus' Kleve zur Ansicht erhalten, die Art sei also auch in Deutschland einheimisch. Darauf gegründet auch Schilsky I. u. II. für Rhp., ebenso Col. Neerl. — Fuß hat aber, wie er dem Verfasser mitteilt, die Art nicht gefunden, noch aus Rhp. erhalten; in Samml. Fuß auch nur 1 aus Ungarn. Wahrscheinlich ist dieses als unbestimmtes Tauschstück übersandt, und der Wohnort des Einsenders als Fundort betrachtet worden. — Österreich [Schilsky II.] —]

3. **nigricornis** Hoffm. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —

[**sulcipennis** Fuß — Col. Neerl. für Rhp. - beschrieben, Berl. E. Z. 68, nach 2 Stücken von Königsberg - wohl monstr. ? - seitdem nur wieder in Schlesien aufgefunden [D. E. Z. 96 S. 180]. —]

Hydrophilidae.

Helophorinae.

Helophorus F.

1. **rufipes** Bosc. — Kleve, aus Ufergenist nach Rheinhochwasser (1 - Fuß, Berl. E. Z. 67) - Belegst. in Samml. Fuß — *H. verbr.*, *N.*, Gonsenheimer Sand. —

2. **nubilus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) -- Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **tuberculatus** Gyll. — Elbf. (2 - Corn. - C.) - noch in Samml. Corn. — *H.* —
4. **aquaticus** L. — Rhp. (*F.* - *grandis* Ill.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
5. **avernicus** Muls. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (2 - Fuß, Berl. E. Z. 65) — St. (1 - Gerh. vid. - R.) — *H. W.* —
6. **brevipalpis** Bed. — Brohltal (Andr.) — Oberwerth (Mühlf.) — Ahrw., Kob., U. Nahe (Gerh. vid. - R.) — *C.* für Elbf. [Corn.] - Belegst. sind griseus Hbst., den *C.* für Elbf. nicht anführt - Schilsky vid. — Ganz Deutschland [Schilsky II.] —
7. **affinis** Marsh. — Elbf. (Corn. C.) - Belegst. Schilsky vid. *H. W. N.* —
8. **griseus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. - Samml. Corn. als brevipalpis Bed. — Bonn, Kob. (Gerh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
9. **granularis** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Saarl. (Gabr.) — Schneifel [le Roi], Tönnisstein (R.) — *H. W. N.* —
10. **viridicollis** Steph. — Rhp. (*F.* - *aquaticus* L.) - der in B. I. 124. 467 = *aeneipennis* Thoms. — Elbf. (Corn. - C.) — H. Venn (Fred.) — Saarl. (Gabr.) — H. Venn, Schneifel [le Roi], Soon (Gerh. vid. - R.) — *H. W. N.* —
- [**dorsalis** Marsh. — B. I. 124 für Elbf. - nicht in *C.* —]
11. **quadrisignatus** Bach — Aach. (daher - Finder Kaltenbach - beschrieben B. I. 389) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63) - daher in Samml. Bruck — Brohltal, Tönnisstein (Andr. u. R.) - Hubenth. vid. — *H.* —
12. **laticollis** Thoms. — Elbf. (Corn. - C.) — Nev. (Kellner vid. - de R., Verh. Nat. Ver. 82) — Nicht *H. W. N.* - Nord- u. Osteuropa [Ganglb. Käf. M.]. —
13. **pumilio** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —
14. **nanus** Stm. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (B.) — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Corn. — *H. W. N.* —

Hydraeninae.

Hydrochus Leach.

1. **elongatus** Schall. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Ulmener Maar [le Roi], Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
2. **carinatus** Germ. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — St. (R.) — *H. W. N.* —
3. **brevis** Hbst. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — *H.* —
- **nitidicollis** Muls. — Unter dem Fundort „Kref.“ auf dem

Namenszettel einige Stück in Samml. Bruck - Schilsky vid. — Nicht *W. N.*, insbes. nicht *H.* — Cat. Col. nur Frankreich - daher nicht unzweifelhaft. —

4. **angustatus** Germ. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Saarbr. (*B.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Brohltal (Andr.) — *H.* Venn [le Roi], Manderscheid, Rheinböllen (*R.*) — *H. W. N.* — Hierhin vielleicht *F.* mit crenatus *F.* für Aach., Kref., Düssdf. —

Ochthebius Leach.

1. **exsculptus** Germ. — Neandertal (v. Hagens - *C.*) — Düssdf. — Samml. Bruck — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

2. **gibbosus** Germ. — Ahrtal - Samml. Bruck — Nettetal, Sayntal, St. (Schilsky vid. - *R.*) — *N.* —

3. **bicolon** Germ. — Neandertal (v. Hagens - *C.*) — Elbf. - Samml. Corn. - Belegst. Schilsky vid. — *H. N.* —

4. **impressus** Marsh. — Aach., Kref. (*F.* - *pygmaeus* *F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. N.* —

5. **metallescens** Rosh. — Nettetal (1 - Gerh. vid. - *R.*) — *N.* —

6. **foveolatus** Germ. — Ahrtal - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M]. —

7. **pusillus** Steph. = **margipallens** Latr. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Düssdf. (von Fuß erhalten - Schilsky, briefl.) — *H.* —

Hydraena Kugel.

1. **testacea** Curt. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Manderscheid, Nettetal (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **palustris** Er. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — von Kref. nicht in Samml. Bruck - sonst nicht wieder aufgefunden - doch *H. W. N.* —

3 **riparia** Kugel. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Neandertal (v. Hagens - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

4. **nigrita** Germ. — Aach. (Fürst. - *F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Aach., Düssdf. - Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

[**angustata** Stm. — *F.* für Aach. [Fürst. - *ang.* Dej.], u. *C.* für Elbf. [Corn.] — Angabe für Aach. schon in *B. I.* 129 bezweifelt - Belegst. der Samml. Corn., darunter 1 ♂, sind longior Rey - Reitt. et Hubenth. vid. — 1 ♂ von Düssdf. in Samml. Fuß als angust. Steph. ebenfalls - Heyd. et Hubenth. vid. — Nach Ganglb. Käf. M. auch Frankreich u. Südeuropa. —]

5. **longior** Rey — Elbf. - Samml. Corn. — Düssdf. - 1 - Samml. Fuß — vermutlich auch Aach. - cf. *angustata*. — Westfalen u. a. [Ganglb. Käf. M]. —

6. **gracilis** Germ. — Elbf. (Corn. - C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Düssdf. - Samml. Bruck — Kob. (1 - Preiß) — Nettetal (1 ♂ - Schilsky vid. - R.) — F. für Bopp. [Bach] - in B. nicht für Rhp. — *H. W. N.* —

7. **pulchella** Germ. — In der Düssel bei Gruiten (Reitt. vid. - G.) — Hochdahl (1 - Wehnke vid. - Geilenk.) — *H. W. N.* —

8. **atricapilla** Waterh. — Kref. (vom Bruck - F. - flavipes Linz.) — Bopp. (B.) — Elbf. (Corn. - C.) — St. (1 - Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

9. **pygmaea** Waterh. — Elbf. (Corn. - C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Nettetal, St. (Schilsky vid. - R.) — *N.* —

Spercheinae.

Spercheus Kugel.

1. **emarginatus** Schall. — Aach. (Först. - F.) — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) - daher in Samml. Brink — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Hydrophilinae.

Berosini.

Berosus Leach.

[**spinulosus** Stev. — Nach Zebe in Rhp., sicher unrichtig, jedenfalls nicht nachweisbar - noch nicht bei Kreuzn., wo am ersten zu vermuten. —]

1. **signaticollis** Charp. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **luridus** L. — Aach., Bopp., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Hydrophilini.

Hydrous Dahl.

1. **piceus** L. — Rhp. (F.) — Kref., Düssdf., Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Brohlthal (Andr.) — Dottendorf b. Bonn (Frings) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **aterrimus** Eschsch. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kobl. (Bockl.) — *W. N.* —

Hydrophilus Deg.

1. **caraboides** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **smaragdinus** Bach. — Nach einem im Rheingenist bei Bopp. gefundenen, jetzt in Samml. Heyd. befindlichem Stück beschrieben (Bach, Stett. E. Z. 56, u. Heyd., D. E. Z. 75. S. 384.) — Auch in Böhmen [Schilsky II.] —

[**flavipes** Stev. — *F.* für Düssdf. [Braselm.] — Col. Neerl. für Kref. mit ? - daher nicht in Samml. Bruck. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten. —]

Hydrobiini.

Limnoxenus Rey.

1. **oblongus** Hbst. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

Hydrobius Leach.

1. **fuscipes** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (Stammform - R.) — *H. W. N.* —

v. **chalconotus** Steph. — Elbf. (1 - Schilsky vid. - *G.* - *aeneus* Sol.) — *H.* —

v. **subrotundus** Steph. — Kob. [Bockl.], Schalkm. Maar u. Laach. See [*le Roi*] in Samml. R. —

v. **Rottenbergi** Gerh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Bonn (1 - Gerh. vid. - R.) — *H. N.* —

Anacaena Thoms.

1. **globulus** Pk. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Nev. [de Rossi], Meerfeld. Maar u. Laach. See [*le Roi*] in Samml. R. — *H. W.* —

2. **limbata** F. — Aach., Bopp., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — *H. W. N.* — Stammform: Schneifel, Meerfeld. Maar u. Schalkm. Maar [*le Roi*], Bonn, Kob., U. Nahe (R.). —

a. **ochracea** Steph. — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Brink] in Samml. R. —

v. **nitida** Heer — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Laach. See [Reichenesp.] in Samml. R. —

3. **bipustulata** Marsh. — Brohltal (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — *H.* —

Crenitis Bed.

1. **punctatostriata** Letzn. — Schneifel [1 - *le Roi*] in Samml. R. - Hubenth. vid. — Hertogenwald [mehrzahl - Heym.] - Hessen, Harz u. im Osten [Schilsky II.] —

Philydrus Sol.

1. **minutus** F. — Schalkm. Maar [*le Roi*], Kob. (Gerh. vid. - R.) — *H. N.* —

2. **coarctatus** Gredl. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — *H.* —

3. **frontalis** Er. — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Elbf. - in Samml. Corn. — Duisdorf - in Samml. Raderm. — Stommeln [1 - Raderm.], Ulmener, Weinfelder u. Schalkm. Maar [*le Roi*] in Samml. R. — *H. W. N.* —

4. **quadripunctatus** Hbst. — Rhp. (*F.* - melanocephalus *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.* - melanoc. Ol.) — Kob. (Bockl.) — St. (Gerh. vid. - R.) — *H. N.* —

[**bicolor** *F.*

a. **maritimus** Thoms. — Schilsky II. für Rhp. - beruhend auf dem *N.* 179 angegebenen Funde in dem hier ausgeschiedenen Bezirk Wetzlar [Schilsky briefl.] - sonst noch nicht in Rhp. —]

5. **testaceus** *F.* — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - test. *F.!*) - der mit test. *F.* früher und noch in *B. I.* 132 vereinigte bicolor *F.* kommt als Salzwasserbewohner nicht in Betracht — Kref. in Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — Meerfelder Maar, Schalkm. Maar u. Laach. See [le Roi], St. (R.) — *H. N.* —

Helochares Muls.

1. **lividus** Forst. — Elbf. (Corn. - *C.*) - daher in Samml. Corn. — Pulvermaar [1 - le Roi] in Samml. R. — *H. N.* —

2. **griseus** *F.* — Elbf. in Samml. Corn. unter lividus — Kref. in Samml. Bruck — St. (R.) — Angaben in *F.* für Aach., Düssdf., Bopp. treffen den früher, noch in *B. I.* 133. 393 und *W.* 57, nicht getrennten lividus mit. — *H. N.* —

Cymbiodyta Bed.

1. **marginella** *F.* — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Stommeln - Samml. Raderm. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

Laccobius Er.

[Die Lacc. des Verz. *C.* sind von Gerhardt bestimmt. - *C. 15.*]

1. **minutus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Wauzenboden, Ulmener Maar [le Roi], H. Venn (Gerh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. **biguttatus** Gerh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Belg. u. *H.* —

3. **nigriceps** Thoms. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Hild. H. (*G.*) — H. Venn, Tönnisstein (Gerh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **maculiceps** Rottb. — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Hild. H. (*G.*) — Laach. See [le Roi], Bonn, Aggertal, Ahrw., Kob., St. (Gerh. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **scutellaris** Motsch. — Elbf. (1 - *G.* - atratus Rottb.) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — St. (Gerh. vid. - R.) — *H. N.* —

5. **alutaceus** Thoms. — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Holzmaar, Weinfeld. Maar [le Roi] in Samml. R. — *H. N.* —

6. **gracilis** Motsch. — Ahrw. - Samml. Fuß - viridiceps Rottb. - Belegst. Schilsky vid. — Süddeutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

Chaetarthriini.

Chaetarthria Steph.

1. **seminulum** Hbst. — Rhp. (F.) — Aach., Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — *H. W. N.* —

Limnebiini.

Limnebius Leach.

[Die Limn. des Verz. C. von Gerhardt revidiert. - C. 15.]

1. **truncatellus** Thunb. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - treffen wohl den noch in B. I. 130 nicht getrennten papposus mit. — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (Preiß) - Belegst. Schilsky vid. — Schalkm. Maar [1 ♂ - le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **papposus** Muls. — Düssdf. (B. I. 468) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

3. **crinifer** Rey — Kleve - Samml. Fuß als nitidus Marsh. - Belegst. Gerh. vid. — *H.* —

4. **nitidus** Marsh. — Elbf. (Corn. - C. - auch als Fussi Gerh.) — Ahrw. - Samml. Fuß - daher auch beschrieben als Fussi Gerh. in D. E. Z. 76 — Löhndorf. - Samml. Raderm. — Brohltal (♂ - Andr.) - Hubenth. vid. — Saarl. (Gabr.) — Holzmaar [le Roi] in Samml. R. — *H. N.* --

5. **picinus** Marsh. — Aach., Kref. (F. - atomus Dft.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

Sphaeridiinae.

Coelostoma Brull.

1. **orbiculare** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Weinfeld. Maar [le Roi], Laach. See, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Sphaeridium F.

1. **scarabaeoides** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **lunatum** F. — Bonn (R.) — *W.* —

2. **bipustulatum** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

v. **substriatum** Fald. — Saarl. (Gabr.) —

Cercyon Leach.

[*litoralis* Gyll. — F. für Elbf. [Corn.] - nicht in Verz. C. —]

1. **ustulatus** Preyssl. -- Aach., Kref. (F. - haemorrhous F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **lugubris** Ol. — Aach., Kref. (F. - obsoletus Gyll.) — Elbf. (C.) — Düssdf. - 1 - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — — *H. W. N.* —

3. **impressus** Stm. — Rhp. (*F.* - haemorrhoidalis *F.!*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

4. **haemorrhoidalis** F. — Rhp. (*F.* - flavipes *F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. **erythropterus** Muls. — Kref. [1 - Ulbr.], Bonn (Reitt. vid. - R.) —

5. **melanocephalus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

6. **marinus** Thoms. = aquaticus Lap. — Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Preiß) — Heyd. vid. omn. — *H. W.* —

7. **bifenestratus** Küst. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — *H.* —

8. **lateralis** Marsh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (2 - Preiß) - Belegst. Heyd. vid. - Kob. (Bockl.) - daher in Samml. R. — *H. W. N.* —

9. **unipunctatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. (Ulbr.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

10. **quisquilius** L. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — H. Venn, Sayntal, Trier (R.) — *H. W. N.* —

11. **terminatus** Marsh. — Kref. (vom Bruck - *F.* - plagiatus Er.) - daher 1 in Samml. Bruck -- Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

12. **pygmaeus** Ill. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (1 - Preiß) — Gerolstein (R.) — *H. W. N.* —

13. **nigriceps** Marsh. = centrimaculatus Stm. — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - auch pulchellus Heer) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

14. **tristis** Ill. — Düssdf. (Braselm. - *F.* - minutus *F.!*) — Kref. (*B.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Heyd. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

15. **granarius** Er. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

16. **convexusculus** Steph. = lugubris Pk. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (Mink. - *F.*) - daher - 1 - Samml. Fischer — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W.* —

17. **flavipes** Thunb. — Aach., Kref. (*F.* - analis Pk.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Megasternum Muls.

1. **boletophagum** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Cryptopleurum Muls.

1. **minutum** F. — Rhp. (*F.* - atomarium *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **crenatum** Pz. — Kob. (Oberst Schultze - Schilsky, D. E. Z. 91 S. 153) - Kob. (1 - Preiß) - Belegst. Heyd. vid. — Duisb. (1 - Urb.) — *H. N.* —

Cantharidae.

Homalisini.

Homalisus Geoffr.

1. **fontisbellaquei** Geoffr. — Aach., Bopp. (*F.* - *suturalis* Ol.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Lycini.

Dictyopterus Latr.

1. **Aurora** Hbst. — Aach. (Först. - *F.*) — Bopp. (*B.*) — Belg. [Col. Neerl.] u. *N.* —

[**rubens** Gyll. — Von Geilenk., D. E. Z. 92 S. 207, für Düssdf. [v. Hagens] angegeben, ins Verz. *G.* nach briefl. Mitteilung als unsicher nicht aufgenommen, weil die Angabe von zweiter Hand, nicht von v. Hagens stamme. In Samml. Hagens fehlt die Art ganz (Dom. Hag.). — Nicht *H. W. N.*, daher sicher unrichtig. —]

Platycis Thoms.

1. **Cosnardi** Chevr. — Bopp. (*B.* II. 427) — Laach. See, Schmittenhöhe (je 1 - Hubenth. vid. - R.) — *H.*, *W.* [Verhoeff, Verh. Nat. Ver. 90], *N.* —

2. **minuta** F. — Rhp. (*F.*) — nachweisbar nur 1 von Trier [Mühlf.] — *W. N.* —

Lygistopterus Muls.

1. **sanguineus** L. — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Siebengbg. (1 - Verhoeff) — *H. N.* —

Lampyridini.

Lampyris Geoffr.

1. **noctiluca** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Neuenahr (Heyd.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Phausis Lec. = **Lamprohiza** Motsch.

1. **splendidula** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Neuenahr (Heyd.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Phosphaenus Lap.

1. **hemipterus** Goeze — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Andernach (*B.*) — Remagen (Heyd.) — Kob., Kochem, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Cantharini.

Podabrus Westw.

1. **alpinus** Pk. — Aach. (Först. - F.) — H. Venn (Fred.) — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 63) — *H. W. N.* —

a. **annulatus** Fisch. — Kochem (R.) — Eupen (Heym.) —

a. **rubens** F. — Kottenforst (R.) — Hertogenwald - in Samml.

Brink — *W. N.* —

a. **Mocquerysi** Reiche — Elsenborn, Vallendar, St. (R.) —

Cantharis L. = **Telephorus** Deg.

1. **abdominalis** F. — H. Venn (Fred.) - dort die Stammform [Col. Neerl.] —

a. **cyanipennis** Bach — Ahrw. (Fuß) — Winningen (Bockl.)

— Kob. (Mühlf.) — Kochem (1 - R.) — Belegst. Heyd. vid. omn.

— 1 ♂ von Ahrw. stellt einen Übergang von der Stammform

dar. — Tönnisstein (R.) — *N.* —

2. **violacea** Pk. — Aach., Bopp., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Ahrw., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **Erichsoni** Bach. — Bopp. (B. II. 68) - der Telephorus ustulatus Bach der Ent. Kl. — Neandertal (v. Hagens - C.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Belg. [Col. Neerl.], *N.* —

4. **annularis** Mén.

v. **longitarsis** Pand. — U. Ahr (1 - Heyd.) — *N.* —

5. **fusca** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **rustica** Fall. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (1 - Heyd.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

— **tristis** F. — Zebe für Rhp. - nicht in B. I. 64, noch *H. W. N.* — 1 mit Bopp. bezettelt in Samml. Bruck - ob aber Bopp. der Fundort? —

7. **obscura** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **pulicaria** F. — Col. Neerl. für Düssdf. - näheres nicht ermittelt - in Samml. Hagens nicht daher (Dom. Hag.) - da Belg. *W. N.*, wohl auch in Rhp. —

8. **albomarginata** Maerk. — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — *W.* —

9. **nigricans** Müll. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - nigr. Ill.) — Elbf. (C.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **pellucida** F. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

11. **livida** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - liv. F.) — Elbf. (C.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

- a. rufipes** Hbst. — Rhp. (*F.* - *dispar* F.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
12. **figurata** Mannh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Trier (Mühlf.) — H. Venn (Fred.) - daher (Schilsky vid. - R.) -- Eupen (Heym.) — *H.* —
- a. scotica** Crotch — H. Venn - 1 mit der Stammform (Reitt. et Heyd. vid. - R.) — sonst noch nicht in Deutschland [Schilsky II.] —
13. **quadripunctata** Müll. — Col. Neerl. für Rhp. — Eupen (1 - Heym.) — Sonst im Süden und Osten von Deutschland [Schilsky II.] —
14. **sudetica** Letzn. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Ahrw. (von Fuß - in Samml. Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Eupen (Heym.) — Belg., *W. N.* —
15. **rufa** L. — Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Soon (v. Geyr) — Trier (Mühlf.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —
- a. liturata** Fall. — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —
16. **pallida** Goeze — Rhp. (*F.* - *bicolor* F.) - in B. = *bicolor* Pz! — Elbf. (1 - *G.*) — Soon (v. Geyr) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R) — *H. W.* —
17. **fulvicollis** F. = *thoracica* Redtb. — Aach., Düssdf. (*F.* - Rhagon. *fulvic.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Hild. H. (1 - Geilenk.) — Kref. - Samml. Bruck u. Ulbr. — Soon (v. Geyr) — H. Venn (R.) — *H. W. N.* —
18. **bicolor** Hbst. = *fulvicollis* Redtb. — Aach. (Fürst. - *F.* - *thoracica* Ol.) — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Fuß u. Ulbr. — Elbf. [Geilenk.] in Samml. R. — *H. W. N.* —
19. **paludosa** Fall. — Aach. (Fürst. - *F.*) — Kref. (Mink - *F.*) — Eupen (Heym.) — Arenberg b. Kob. (R.) — Belg., *W. N.* —
20. **lateralis** L. — Bopp. (*B.* - *oralis* Germ.) — Elbf. (*C.* - *oral.* Germ.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Nettetal, Kob., Trier (R) — *H. W. N.* —
21. **discoidea** Ahr. — Ahrw. - Samml. Fuß — nicht Elbf. wie *F.* angibt, nicht in Verz. *C.* — *H. W. N.* —
- a. liturata** Redtb. — *F.* für Elbf. [Corn. - *lineata* Suffr.] - = lin. Bach, *B.* II. 68 - nicht in Verz. *C.* —]
22. **haemorrhoidalis** F. — Rhp. (*F.* - *clypeata* Ill.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *H. N.* —
- Absidia** Muls.
1. **pilosa** Pk. — Elbf. (Corn. - *C.*) - daher [Geilenk.] in Samml. R. — Duisb. (Urb.) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — Vallendar (1 - R.) — Belg. [Col. Neerl.], *W.* —

Rhagonycha Eschsch.

1. **translucida** Kryn. — Elbf. (Corn. - *C.* - *rufescens* Letzn.) H. Venn (Fred.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Löhndorf (Raderm.) — Bonn, Gerolstein, Vallendar, Elztal (R.) — Hertogenwald [Brink], Belg., *W. N.* —

2. **lutea** Müll. = **fuscicornis** Ol. — Elbf. (Corn. - *C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Elztal, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **fulva** Scop. — Rhp. (*F.* - *melanura* F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **usta** Gemm. = **terminalis** Redtb. — *C.* für Elbf. [1 - Stachelhausen] - das Stück nicht in Samml. Corn. — Bei anderen angeblichen *usta* aus Rhp. erwies sich die schwarze Färbung der hinteren Flügeldeckenhälften als durch Ankleben der Unterflügel entstanden. — Im Süden u. Osten. —

4. **testacea** L. — *F.* für Rhp. [*test. F.*] - trifft wohl nur die damals noch nicht getrennte *limbata*, die *B. II. 70* allein für Rhp. angibt - desgl. *C.* für Elbf. nach den Belegst. der Samml. Corn. [Geilenk. briefl.] — Zuerst aufgfd. bei Horchheim in Gaswasser (Mühlf.) — Düssdf. [Hens.], Meerfeld. Maar [le Roi], Laach. See [le Roi u. Reichensp.], Vallendar (R.) — *H.* —

5. **limbata** Thoms. — Rhp. (*F.* - *test. F.!* - u. *B. II. 70*) — Elbf. - Samml. Corn. — Hild. H. (Geilenk.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. N.* —

[**femoralis** Brull. — Col. Neerl. für Rhp. — Nur *N.* u. im Süden u. Osten von Deutschland. —]

6. **lignosa** Müll. = **pallipes** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **elongata** Fall. — Aach. (Först. - *F.* - elong. Gyll.) — H. Venn (Fred.) — Kob. (1 von einem Koblenzer Sammler - Hubenth. vid. - R.) — *H.*, bei Venlo u. Maastricht, *W.*, *N.* —

8. **atra** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Pygidia Muls.

— **denticollis** Schumm. — Fred. für H. Venn - Fundort an der Gileppe bei Aachen [Ann. Belg. 18 S. 57] - daher wohl auch im Gebiet. — *N.* —

Silis Latr.

1. **ruficollis** F. — Laach. See (Fuß, Berl. E. Z. 63) — Breyeller See (Heym.) — Kref., zahlreich (Ulbr.) - daher in Samml. R. — *H. W.* —

Malthinini.**Malthinus** Latr.

[**biguttulus** Pk. — Nach Zebe in ganz Deutschland - in *B. II. 73* nicht für Rhp. aufgenommen, auch später nicht nach-

weisbar, in keinem Fundverzeichnis, noch einer zugänglichen Sammlung. — Col. Neerl. für Kref. - nicht durch Samml. Bruck bestätigt. — Belg. u. N. —]

1. **flaveolus** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elb. (*C.* - punctatus Fourc.) — Saarl. (Heyd.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **seriepunctatus** Ksw. — Nev. (de R., Westf. Pr. 94, u. *G.*) — *H. N.* —

3. **fasciatus** Ol. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

4. **glabellus** Ksw. — Everts, D. E. Z. 92, für Kref. - jedenfalls nach vom Bruck [Vorbemerkg. V], durch dessen Samml. nicht bestätigt — U. Ahr (Heyd.) — *N.* —

5. **frontalis** Marsh. — Aach. (*B. II. 432* - front. Steph. - u. Kiesw., Ins. D. IV. 529) — Düssdf. (*B. II. 432*) - jedenfalls der v. Hagenssche Fund in *G.* von U. Solg. — *W. N.* —

Malthodes Ksw.

[Die Malth. des Verz. *C.* sind von v. Kiesenwetter revidiert. - C. 38¹⁾.]

1. **marginatus** Latr. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* — Hierhin vielleicht *F.* mit biguttatus Pk. für Rhp. [Kiesw., Ins. D. IV. 535], wenn nicht etwa Druckfehler für biguttulus Pk. [*Malthinus*]. —

2. **mysticus** Ksw. — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Ahrw. - Samml. Fuß — *H. W.* —

3. **guttifer** Ksw. — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — *H. W. N.* —

4. **brevicollis** Pk. — Kref. (vom Bruck - *F.*) — Elbf. (*C.* - nigellus Ksw.) — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — *H. W. N.* —

5. **minimus** L. — Aach., Kref. (*F.* - auch sanguinicollis Fall.) — Bopp. (*B.* - sang. Fall.) — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — Kochem, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **flavoguttatus** Ksw. — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — *H. W.* —

7. **dispar** Germ. — Kref. (*B. II. 74*) — Elbf. (*C.*) — Laach. See, Brohltal (Hubenth. vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **maurus** Cast. — Aach., Kref. (*F.* - maurus Ziegl.) - in *B.* maur. Lap. — Nettetal (1 - Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. **misellus** Ksw. — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Belg., *W.* —

9. **hexacanthus** Ksw. — Elbf. (1 - *Corn.* - *C.*) — *W.* —

10. **spathifer** Ksw. — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — *H. W.* —

1) Die weiteren Angaben für Elbf. in *F.*, obscurellus Schüpp. u. a., mögen daher auf sich beruhen bleiben.

Drilini.

Drilus Ol.

1. **flavescens** Geoffr. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Neuenahr (Heyd.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — H. W. N. —
2. **concolor** Ahr. — Düssdf. - Samml. Fuß — Blumslay, Kob. (je 1 - Bockl.) — St. (1 - R.) — H. W. N. —

Malachiini.

Troglops Er.

1. **albicans** L. — Aach., Bonn, Bopp. (F. - Charopus angulatus F.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — W. N. —

Charopus Er.

1. **flavipes** Pk. — Aach., Düssdf. (F. - pallipes Ol.!) — Elbf. (C. - pall. Ol.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

Hypebaeus Ksw.

1. **flavipes** F. — Kref., Düssdf. (F.) - Düssdf. (Geilenk.) — Wiedtal, Elztal (R.) — W. N. —

Ebaeus Er.

1. **thoraciclus** Ol. — Aach., Düssdf., Bonn (F. - thor. F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

2. **pedicularius** Schrk. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C. u. Geilenk.) — Kordel nahe Trier [le Roi], Laach. See (je 1 - R.) — H. W. N. —

- [**appendiculatus** Er. — Everts, D. E. Z. 92, für Kref. - in Col. Neerl. als zweifelhaft. — Alte Angabe von vom Bruck [Vorbemerkg. V], in dessen Samml. nur Wien. — Nicht H. W. N. —]

3. **flavicornis** Er. — Aach. (Fürst. - F. - flav. Stm.) — Rheydt (Geilenk.) - Belegst. Hubenth. vid. — N. —

4. **lobatus** Ol. — Kettwig a. d. Ruhr (daher noch 1 Stück beschrieben - Mink, Stett. E. Z. 53 - limbatus) — Kref. - Samml. Bruck. — H. —

[Attalus] Er.

- analis** Pz. — F. für Bonn [Fürst. - Anthoc. an. Pz.] - von B. II. 439 nicht aufgenommen - Südeuropäer - in Samml. Fürst. fehlt auch der sonst regelmäßig eingeklebte Namenszettel. —]

Axinotarsus Motsch.

1. **ruficollis** Ol. — Kref., Düssdf., Bopp. (F. - rubricollis Marsh.) - Kref. in Samml. Bruck — Hild. H. (G.) — Bonn (1 - R.) — H. W. N. —

2. **pulicarius** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Eifel (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

3. **marginalis** Lap. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Bonn (R.) — Hertogenwald - in Samml. Brink, *H. W. N.* —

Malachius F.

1. **scutellaris** Er. — Bopp. (B.) — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — *W.* —

2. **aeneus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, bei Montreal [le Roi], Kob., Kochem (R.) — *H. W. N.* —

3. **marginellus** Ol. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **bipustulatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **viridis** F. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf., U. Solg. (G.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**spinipennis** Germ. — *F.* für Düssdf. [Hildebr. - spinip. Ziegl.] - in Samml. Hildebr.? (Miss. Steyl) - nicht *H. W. N.* - Südeuropäer. —]

6. **elegans** Ol. — Laach. See, Bopp. (B.) — U. Solg. (G.) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr, Kreuzn., Oberstein (Heyd.) — Winningen, Kob. (R.) — *W. N.* —

Cerapheles Rey.

1. **terminatus** Ménétr. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - Malach. ruficollis F.) — Kref. (B. - Malach. rufic. F.!) - Kref. (1 - Mink-Kraatz, Berl. E. Z. 62 S. 269 - rufic. = damals Er.) — Venlo [Col. Neerl.] —

Anthocomus Er.

1. **coccineus** Schall. = rufus Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - sanguinolentus F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65) — Viersen u. Breyeller See [le Roi], Remscheid (R.) — *H. W. N.* —

2. **bipunctatus** Harrer = equestris F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **fasciatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Dasytinae¹⁾.

Dasytes F.

1. **niger** L. — Elbf. (Corn. - C.) - daher in Samml. Bruck — Soon (v. Geyr) — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

1) Dasytes antiquus Schönh., in *F.* für Aach. [Fürst.], u. setosus Waltl., in *F.* für Bopp. [Bach], von *B.* nicht angeführt, blieben ungedeutet. —

[**obscurus** Gyll. — *C.* für Elbf. [Corn.] - Belegst. der Samml. Corn. sämtlich der in *C.* von Elbf. nicht angeführte aerosus - Schilsky vid. —]

2. **coeruleus** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., Kochem, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **aerosus** Ksw. — Elbf. - Samml. Corn. als *obscurus* - Belegst. Schilsky vid. — Jülich (Eichh. - Kiesw., Berl. E. Z. 67 S. 116, u. Heyd.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Horchheim i. Gaswasser zahlreich (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Kob. (Schilsky vid. - R.) — *H. N.* —

4. **plumbeus** Müll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - plumb. Ol. u. *flavip.* *F.*) - Kref. (Ulbr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Soon (v. Geyr) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. **subaeneus** Schönh. — Bopp. (*B.* II. 441 u. *scaber Suffr.*) — Ahrw. (Fuß) — Rodderberg (Verhoeff) — Bonn [Frings], St. (Schilsky vid. - R.) — *N.* —

6. **fusculus** Ill. — Ahrtal - Samml. Bruck — St. (Schilsky vid. - R.) — *W. N.* —

Psilotrix Redtb.

1. **cyaneus** Ol. — Koblenzer Stadtwald (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

Dolichosoma Steph.

1. **lineare** Rossi — Duisb. (Heinem. - *F.*) - Duisb. (Urb.) — Hild. H. (*G.*) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —

Haplocrenemus Steph.

1. **pini** Redtb. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Stachelhausen - *G.* - *impressus* Marsh.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 60) — Löhndorf (Hubenth. vid. - Raderm.) — Kob. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. ♀ **serratus** Redtb. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. —

2. **nigricornis** F. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Soon (v. Geyr) - Belegst. Schilsky vid. — Laach. See (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **virens** Suffr. — Bopp. (*B.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65 - *ahenus* Ksw.) — U. Ahr (Heyd.) — Winningen (Bockl.) - Belegst. Schilsky vid. — Trier (Mühlf.) — U. Nahe (Schilsky vid. - R.) — *N.* —

a. **tibialis** Schilsky — Kreuzn. · 1 · in Samml. Bruck als *tarsalis* Sahlb. - Schilsky vid. —

[**tarsalis** Sahlb. — *B.* II. 83 für Bopp. [*tars.* Gyll.] - nicht *H. W. N.* - früher öfters mit *ahenus* verwechselt [Fuß, Berl. E. Z. 65] - sicher unrichtig. — Col. Neerl. für Bonn - vielleicht statt Bopp — In Schilsky II. außer Hessen nur östliche Fundgebiete. —]

Trichoceble Thoms.

[**floralis** Ol. — *F.* für Elbf. u. Homberg [*flor.* Gyll.] - Elbf. nicht in Verz. *C.* - Homb. als einziger Fundort stets zweifelhaft - doch *W. N.* —]

1. **memnonia** Ksw. — Soon (1 - Schilsky vid. - R.) — Hessen, Oldenburg u. a. [Schilsky II.] —

Danacaea Lap.

1. **pallipes** Pz. — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — Bopp. (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Ahrw., St. (R.) — *W. N.* —

2. **nigritarsis** Küst. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — aus der Rheinprovinz von Kraatz erhalten (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *H. N.* —

Phloeophilini.

Phloeophilus Steph.

1. **Edwardsi** Steph. — Düssdf. (v. Hagens, Berl. E. Z. 57) - daher, von Braselm., in Samml. Heyd. — Kref. (Mink, Stett. E. Z. 59) - daher in Samml. Bruck - dort zahlreich (Ulbr.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kleve (Fuß) — *W. N.* —

Cleridae.

Clerini.

Denops Stev.

1. **albofasciata** Charp. — Nach einem bei Neuwied gefundenen Stück beschrieben (*B.* II. 88) — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kessenich b. Bonn (4 - R.) — Auch im Nachbargebiet bei Mainz [*N.*], sonst Südeuropa. — Fuß u. R. fanden sie an Weinbergspfählen. —

Tillus Ol.

1. **elongatus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Wiedtal, Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

2. **unifasciatus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn (R.) — *W. N.* —

Opilo Latr.

1. **domesticus** Stm. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — M.-Gladbach, Rheinberg (R.) — *H. W. N.* —

2. mollis L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —

Clerus F.

— **mutillarius** F. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - in Samml. Bruck nur 1 von Bonn - jedenfalls eingeschleppt, da dort nicht wieder aufgefunden. — *N.* verbr. —

Thanasimus Latr.

1. formicarius L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Allonyx Duv.

1. quadrimaculatus Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - von Düssdf. (Heyd.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Trichodes Hbst.

1. apiarius L. — Rhp. (F.) — Gruiten a. d. Düssel (2 - G.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. alvearius F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Rhöndorf, aus Anthophora-Bauten erzogen (Verhoeff) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Enopliini.

[Enoplium Latr.

serraticorne Ol. — Schilsky I. u. II. für Westdeutschland - nicht *W. N.* - aus Rhp. nicht bekannt - Südeuropa. —]

Orthopleura Spin.

— **sanguinicollis** F. — Kref. - 1 - Samml. Bruck - ob einheimisch? — Pfaffendorf b. Kob., an Holz aus dem Spessart. (1 - Bockl.) — Col. Neerl. für Düssdf. mit? — *N.* —

Corynetinae.

Corynetes Hbst.

1. coeruleus Deg. — Elbf. (Corn. - C.) — Horchheim (Mühlf.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

a. ruficornis Stm. — Aach., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Saarl. (Gabr.) — St. (1 - R.) — *W. N.* —

Necrobia Latr.

1. ruficornis F. — Elbf., Nev. (C.) — Elbf. u. Schlebusch (Geilenk.) — Beuel (R.) — *H. W. N.* —

2. violacea L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Siegmdg., Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Derodontidae.

Laricobius Rosh.

1. **Erichsoni** Rosh. — Aach., Kref. (Mink, Stett. E. Z. 59) — Elbf. (C. u. Geilenk., D. E. Z. 92) — Kref. - Samml. Fuß - Kref. (Schenkl. vid. - Ulbr.) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

Byturidae.

Byturus Latr.

1. **fumatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **tomentosus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **flavescens** Marsh. — Saarl. (Gabr.) —

Ostomidae.

Nemosomini.

Nemosoma Latr.

1. **elongatum** L. — Bonn, in Apfelbaummulm (2 - R.) — Oberkassel [1 - Reichensp.] in Samml. R. — *N.* —

Trogosita Ol. = **Tenebroides** Pill.

1. **mauritanica** L. — Rhp. (F.) — Elbf., aus Läden (C.) — Kob., im Proviantmagazin (Bockl.) — St., in Apfelbaummulm (R.) — *H. W. N.* —

Ostomini.

[**Ostoma** Laich.

ferrugineum L. — *F.* für Homberg [Pliester] - Vorkommen in Rhp. in B. I. 226 ausdrücklich verneint — Schnur für Trier - an sich schon zweifelhaft. — 1 in *N.* —]

Thymalus Latr.

1. **limbatus** F. — Birkenfeld (B. I. 227) — Ernster Wald b. Kochem (R.) — *W. N.* —

Sphaeritidae.

Sphaerites Dft.

— **glabratu**s F. — *F.* für Aach. [Heinemann] - auch in der Vorbemerkung S. 386 hervorgehoben - desgl. Kaltenb. Verh. Nat.

Ver. 58 S. 90. — In B. I. 156 nicht aufgenommen - nicht H. W. N., noch in Fred. vom H. Venn - Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] - sehr zweifelhaft. —

Nitidulidae.

Cateretini.

Cateretes Hbst. = **Cercus** Latr.

1. **pedicularius** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —
2. **bipustulatus** Pk. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — W. —
3. **rufilabris** Latr. — Aach., Kref. (F.) - Kref. (Geilenk.) — Elbf. (C.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

Heterhelus Duv.

1. **scutellaris** Heer = **sambuci** Er. — Rhp. (F. - samb. Maerk.) — Elbf. (C. - solani Heer!) — Sayntal, St. (R.) — W. N. —
2. **solani** Heer = **rubiginosus** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (daher beschrieben - B. I. 480 - rhenanus Bach) — Elbf. (C.) — Nev. (G.) — Ahrw. - 2 - Samml. Fuß — St. (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

Brachypterus Kugel.

1. **glaber** Steph. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - pubescens Schüpp.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — H. W. N. —
2. **urticae** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

Heterostomus Duv.

1. **pulicarius** L. = **gravidus** Ill. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (R.) — H. W. N. —
- v. **cinereus** Heer — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Reitt. vid. — Kob. (Reitt. vid. - R.) — H. —
- v. **linariae** Steph. — Elbf. (Corn. - C. - linariae Corn., Stett. E. Z. 63) — Bopp. (B. I. 480) — H. W. N. —
2. **villiger** Reitt. — Jülich (Gabr.) - Belegst. Reitt. vid. — N. —

Carpophilini.

Carpophilus Leach.¹⁾.

1. **hemipterus** L. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (Geilenk. - C.) — Kob., St. (R.) — H. N. —

1) Carp. bipunctatus Stm., in F. für Homberg [Pliester], blieb ungedeutet. —

a. quadrisignatus Er. — Kob., St., unter der Stammform (R.) — N. —

[**bipustulatus** Heer — Col. Neerl. für Elbf. - nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten von Deutschland. —]

2. sexpustulatus F. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Nitidulini.

[Ipidia Er.

quadrimaculata Quens. — *F.* für Düssdf. [Braselm. - quadri-notata F.] - nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten von Deutschland [Schilsky II.] —]

Amphotis Er.

1. marginata F. — Aach., Kref., Duisb. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Soronia Er.

1. punctatissima Ill. — Aach. (Meigen - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Duisb. (Urb.) — Düssdf. (Fuß) — Kob. (1 - Bockl.) — Schneifel [le Roi], Kochem (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

2. grisea L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Epuraea Er.

1. decemguttata F. — Kref., Düssdf. (F.) — Duisb. (Heym.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **silacea** Hbst. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] - in B. I. 202 nicht für Rhp. - daher auch nicht in Samml. Bruck - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl) — *N.* —

2. deppressa Gyll. — Aach. (Fürst. - *F.* - ochracea Er.) — Elbf. (C. - aestiva L.!) — Eupen (Heym.) — Kref. - Samml. Bruck - ochrac. Er. - mit Erichs. vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. bisignata Stm. — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

3. melina Er. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — St. (1 - Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **deleta** Er. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck - del. Dej.] u. Homberg [Pliester] - in B. I. 203, del. Er., nicht für Rhp. - daher auch nicht in Samml. Bruck - noch Samml. Mink (Lange). — *H. N.*, daher wohl noch nachweisbar. —

4. terminalis Mannh. — Kref., Düssdf. (*F.* - immunda Stm.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — *W. N.* —

5. neglecta Heer — Aach. (Fürst. - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kref. [Brink], St. (je 1 - Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **rufomarginata** Steph. — Aach. (Först. - *F.* - *parvula* Stm.) — Eupen (Heym.) — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — *H. W. N.* —

7. **variegata** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Eupen (Heym.) — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — *H. W. N.* —

8. **obsoleta** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Hubenth. vid. - Urb.) — Siegndg., Tönnisstein, Kob. (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

v. excisicollis Reitt. [= obsol. var. - Hubenth., Entom. Bl. 08 Nr. 12] — Brohltal (1 - Hubenth. vid. - *R.*) — Aufgestellt nach einem Stück aus Hannover, das noch in Samml. Bruck. —

9. **longula** Er. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Homberg - Samml. Bruck mit Reitt. vid. — Ahrw. (Fuß) — Brohltal (Andr.) — Kob. (1 - Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

a. **ornata** Reitt. — Brohltal (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — [**boreella** Zett. — *F.* für Kref. [Mink] - von B. I. 204 nicht aufgenommen - in Samml. Mink auch unrichtig bestimmt (Lange). — Nicht *H. W. N.*] —

[**angustula** Stm. — *F.* für Kref. [Mink] - so auch *B.* - doch in Samml. Mink unrichtig bestimmt (Lange). — Nicht *H. W. N.*] —

10. **pygmaea** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Eupen (Heym.) — Soon (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

11. **pusilla** Ill. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Düssdf. [Hens.] in Samml. R. Laach. See (1 - Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

12. **abietina** Sahlb. — St. (3 - Reitt. vid. it.! - *R.*) — *H.* —

13. **oblonga** Hbst. — Siebengbg. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. - nicht Kref. wie *F.* angibt. — Nev. (1 - de Rossi - *C.*) — Wiedtal (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

14. **florea** Er. — Rhp. (*F.* - *aestiva* Ill.) — Kref. (*F.* - *florea* Er.) - daher (Geilenk.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Hubenth. vid. - Urb.) — Stommeln (Hubenth. vid. - Raderm.) — Kob. (Bockl.) - Reitt. vid. — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

{**Micrarula** Reitt.

melanocephala Marsh. — *F.* für Homberg [Pliester] - in B. I. 204 nicht für Rhp. — *N.*, daher wohl noch nachweisbar. —]

Omosiphora Reitt.

1. **limbata** Ol. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. (Geilenk.) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß) — Kob. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Omosita Er.

1. **depressa** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Tönnisstein, St. (*R.*) — *W. N.* —

2. **colon** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

3. **discoidea** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Nitidula F.

1. **bipunctata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Borbeck (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (1 - R.) — H. W. N. —

2. **rufipes** L. — Kref., Düssdf., Bopp. (F. - obscura F.) — Elbf. (C.) — Siegmdg., St. (R.) — H. W. N. —

3. **carnaria** Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - quadripustulata F.) — U. Solg. (G.) — Siegmdg., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

Pria Steph.

1. **dulcamarae** Scop. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — St. Goar (R.) — H. W. N. —

Meligethes Steph.

[Die Angaben des Verz. C. sind von Reitter revidiert - C. 31 - ebenso nach der Bezettelung die der vom Bruckschen Sammlung entnommenen Fundorte.]

1. **hebes** Er. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — H. W. N. —

2. **rufipes** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - ruf. Deg.) — Elbf. (C.) — Jülich, Saarl. (Gabr.) — H. W. N. —

3. **lumbaris** Stm. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (C.) — Jülich (Gabr.) — H. W. N. —

4. **Försteri** Reitt. — Nach Funden von Aach. [Fürst.] u. Siebengbg [vom Bruck] beschrieben (Melig. Rev. in Brünn. Verhandl. Bd. 9). — H. N. —

5. **coracinus** Stm. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — H. W. N. —

a. **pumilus** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. —

v. **decoloratus** Fürst. — Aach. (daher beschrieben - F.) —

6. **subaeneus** Stm. — Elbf. (C.) — N. —

7. **coeruleovirens** Fürst. — Aach. (daher beschrieben - F.) — H. W. N. —

v. **subrubicundus** Reitt. — Nach Funden von Aach. [Fürst.] u. Kref. [vom Bruck] beschrieben (Melig. Rev.). — H. —

v. **rhenanus** Reitt. — In der Rheinprovinz (Leder-Reitt., Nachtr. I., Berl. E. Z. 72) — Aach. - von Fürst. in Samml. van de Poll (Col. Neerl.) —

8. **aeneus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — H. W. N. —

a. **coeruleus** Marsh. — Elbf. (C.) — N. —

9. **viridescens** F. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
 a. **azureus** Heer — Elbf. (G. - germanicus Reitt.) — *N.* —
 a. **discolor** Reitt. --- Elbf. (C. u. Reitt., Nachtr. II., Berl. E. Z. 72) — *H. N.* —
10. **Czwalinai** Reitt. — Elbf. (2 - C.) — Belg. u. *H.* —
11. **sympyti** Heer — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
12. **corvinus** Er. — Aach. (Fürst. - F.) — Duisb. (5 - Hubenth. vid. - Urb.) — Noch nicht *H. W. N.* - Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —
13. **subrugosus** Gyll. — Aach., Bopp. (F.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Loef (Gabr.) — *W. N.* —
 v. **substrigosus** Er. — Aach. (F.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — *N.* —
14. **serripes** Gyll. — Aach. (Fürst. - F. - daher auch beschrieben - exaratus Fürst. und quadridens Fürst.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —
15. **obscurus** Er. — Elbf. (daher nach einem Fund von Corn. beschrieben - Ins. D. III. 203) - dort zieml. selten (C.) — Duisb. (1 - Hubenth. vid. - Urb.) — *H. N.* —
16. **bidens** Bris. — Elbf. (1 - C.) — *H. N.* —
17. **umbrosus** Stm. — Aach. (F.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —
18. **maurus** Stm. — Aach. (F.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63). — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
 v. **durus** Reitt. — Nach Schilsky I. u. II. in Rhp. - näheres nicht ermittelt. — *N.* —
19. **incanus** Stm. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — *H. N.* —
 — **brachialis** Er. = **dives** Reitt. — Aach.? — Reitt., Berl. E. Z. 72, führt eine Angabe von Fürster in Aachen über die Lebensweise der Art an, die auf Beobachtung bei Aachen beruhen kann - daher wohl Aach. in Col. Neerl. — Da *H.*, wohl Aach. richtig. —
20. **picipes** Stm. — Aach. (Fürst. - F. - daher auch beschrieben - funebris Fürst.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
21. **flavipes** Stm. — Aach. - Samml. Fuß als ballotae Fürst. i. litt. - Belegst. Reitt. vid. — Aach. - Samml. Bruck — Elbf. (1 - C.) — Kob. (Gabr.) — *H. N.* —
22. **ochropus** Stm. — Aach. (Fürst. - F. - daher auch beschrieben - quadristriatus Fürst.) — Kref. (Mink - F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — *H. W.* —

23. **brunnicornis** Stm. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (C.) — H. W. N. —
24. **haemorrhoidalis** Först. — Aach. (daher beschrieben - F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Fuß — Brohltal (1 ♂ - Andr.) — H. —
25. **atramentarius** Först. — Aach. (daher beschrieben - F.) — H. —
26. **difficilis** Heer — Aach. (Först. - F.) — Kref. (Mink - F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — H. W. N. —
27. **Kunzei** Er. — Elbf. (2 - C.) — Aach. - Samml. Fuß — N. —
- v. **blandulus** Reitt. — In der Rheinprovinz (Reitt., Nachtr. I. Berl. E. Z. 72) — Aach. - von Först. in Samml. van de Poll (Col. Neerl.) — W. —
28. **morosus** Er. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — H. W. N. —
29. **viduatus** Stm. — Aach. (Först. - F. - daher auch beschrieben - melanarius Först.) — Kref. (Mink - F.) - daher in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) — H. W. N. —
- v. **luctuosus** Först. — Aach. (daher beschrieben - F.) — Elbf. (C.) — N. —
- m. **bituberculatus** Först. — Aach. (daher beschrieben - F.) —
- v. **aestimabilis** Reitt. — Elbf. (2 - C.) — Aach. (Schilsky, D. E. Z. 92, S. 197) — Col. Neerl. noch Kleve. —
30. **pedicularius** Gyll. — Aach. (Först. - F. - daher auch beschrieben - tenebrosus Först.) — Elbf. (C.) — Bopp. (B. I. 212) — Kref. (Mink - F.) - daher in Samml. Bruck. — H. W. N. —
31. **sulcatus** Bris. — Aach. (Först. - Reitt., Nachtr. I., Berl. E. Z. 72 - ranunculi n. sp.) — N. —
32. **assimilis** Stm. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — H. N. —
- [**distinctus** Stm. — F. für Aach. [Först.] - nicht H. W. N. - Südeuropäer [Ganglb. Käf. M.] - daher, trotz Angabe von Först. selbst, als unrichtig zu betrachten. —]
- **discoideus** Er. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - nicht H. W. N. - Österreich [Ganglb. Käf. M.] —
33. **rotundicollis** Bris. — Bonn (Col. Neerl.) - von einem holländischen Sammler gefunden, nun in Samml. Everts [Ev. briefl.] — N. —
34. **tristis** Stm. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - trist. Schüpp.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — W. N. —
35. **planiusculus** Heer — Aach. (Först. - F. - murinus Er.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — W. N. —
36. **lugubris** Stm. — Aach. (Först. - F. - daher auch be-

schrieben - ebeninus Först.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63) — H. W. N. —

v. gagatinus Er. — Aach. (daher beschrieben - F. - cristatus Först.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 60) — H. W. N. —

v. mellitulus Reitt. — In der Rheinprovinz (Leder-Reitt., Nachtr. I., Berl. E. Z. 72) — Aach. - von Först. in Samml. van de Poll (Coll. Neerl.) — N. —

37. **egenus** Er. — Elbf. (1 - C.) — H. W. —

38. **bidentatus** Bris. — Ahrw. - Samml. Fuß u. Samml. Bruck - Belegst. aus Samml. Fuß Heyd. vid. N. —

39. **erythropus** Gyll. — Aach. (Först. - F.) - von Aach., Köln, Siebengbg. auch beschrieben (F. - carinulatus Först.) — Kref. (Mink. - F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — H. W. N. —

v. carbonarius Först. — Aach. (daher beschrieben - F.) —

40. **solidus** Kugel. — Aach. (Först. - F. - sol. Ill.) — Kref. (Mink. - F.) — Bopp. (B.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Brohltal, Blumsay (Andr.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — H. W. N. —

41. **brevis** Stm. — In der Rheinprovinz (vom Bruck-Reitt., Melig. Revis.) - in Samml. Bruck mit „Rheinprovinz“. — W. N. —

Thalygra Er.

1. **fervida** Ol. — Aach., Kref. (F. - sericea Stm.) — Kref. u. Kreuzn. - Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — Brohltal (1 - Andr.) — Trier (Mühlf.) — H. W. N. —

Pocadius Er.

1. **ferrugineus** F. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Siegmdg., Gerolstein, Kochem, Kob. (R.) — H. W. N. —

Cyphramus Kugel.

1. **quadripunctatus** Hbst. — Elbf. (v. Hagens - C.) - daher in Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — W. —

2. **luteus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

v. fungicola Heer — Elbf. (Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — Kob. (R.) — H. W. N. —

Cybocephalini.

Cybocephalus Er.

1. **politus** Gyll. — Aach., Kref. (F. - exiguum Er.) - Kref. in Samml. Bruck — Bonn, Kob. (Reitt. vid. - R.) — W. N. —

Cryptarchini.

Cryptarcha Shuck.

1. **strigata** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

2. **imperialis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

Glischrochilus Murr. = *Ips* F.

1. **Olivieri** Bed. = quadripunctatus Ol. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - quadrip. Hbst.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

2. **quadriguttatus** Ol. — Rhp. (F. - quadrig. F.) — Elbf (C.) — Kob., St. (R.) — H. W. N. —

3. **quadripustulatus** L. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Bonn, Kochem, Soon (R.) — H. W. N. —

Pityophagus Shuck.

1. **ferrugineus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

Rhizophagini.

Rhizophagus Hbst.

1. **grandis** Gyll. — Soon, zu einer Zeit, als dort Dendroctonus micans häufiger war (R.) — W. N. —

2. **depressus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — H. W. N. —

3. **ferrugineus** Pk. — Rhp. (F.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. —

4. **perforatus** Er. — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Nettetal, Sayntal, Kob., St. (Heyd. vid. - R.) — H. N. —

5. **parallelocollis** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F) — Elbf. (Corn. - C.) — Horchheim (Mühlf.) — H. W. N. —

6. **dispar** Pk. — Kref., Bopp. (B.) — Elbf. (Corn. - C.) — W. N. —

7. **bipustulatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (Heyd. vid. - R.) — W. N. —

8. **politus** Hellw. — Rhp. (F.) — Aach., Kref., Bopp. (B.) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

a. **Brucki** Reitt. — Kref. - Samml. Bruck mit Reitt. vid. —

9. **parvulus** Pk. — Elbf. (C. u. G.) — W. N. —

10. **cibratus** Gyll. — Kref. (vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck mit Reitt. vid. — H. W. N. —

11. **aeneus** Richt. — Elbf. (1 - Corn. - C. - coeruleipennis Sahlb.) — Nev. (de Rossi - C.) — Eupen (1 - Heym.) — Sayntal (1 - R) — N. —

Cucujidae.

Monotomini.

Monotoma Hbst.

1. **conicocollis** Guér. — Duisb. (Heinem. - *F.* - conic. Chevr.) — Saarbr. (*B.* I. 266) — Elbf. (Corn. - *C.* - subquadrifoveolata Waterh.!) - nach dem Belegst. der Samml. Corn. hierhin — Siebengbg. [Reichenesp.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **angusticollis** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) - von *B.* nicht aufgenommen, doch in Samml. Först. bezettelt von der Hand Försters — Duisb. (Urb.) — Blumsay, Horchheim (Mühlf.) - daher in Samml. R. — *H. W. N.* —

3. **spinicollis** Aub. — Aach. (Heinem. - *B.* I. 407) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Col. Neerl. für Kref. — *W. N.* —

4. **picipes** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - picip. Pl.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

5. **bicolor** Villa = *quadricollis* Aub. — Aach. (Först. - *F.* - quisquiliarum Redtb.) — Kref. (*B.* I. 407) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

6. **longicollis** Gyll. — Aach. (Först. - *F.* - *flavipes* Kunze) — Kref. (*B.* I. 406) - daher in Samml. Bruck u. Fuß — Elbf. (*C.*) — Kob. (Reitt. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

Silvanini.

Silvanus Latr.

1. **surinamensis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - frumentarius F.) — Elbf., in Läden (Corn. - *C.*) — Fremdling, doch eingebürgert. — *H. W. N.* —

2. **bidentatus** F. — Kref. (Mink - *F.*) - 3 in Samml. Mink, Minkscher Präparationsart (Lange) - zwar ohne Fundort, doch da *H. W. N.*, Angabe in *F.* sicher richtig. —

3. **unidentatus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf., in Läden (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn, U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

4. **fagi** Guér. = *similis* Er. — Kref. (Mink - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Trier (1 - Mühlf.) — *H. W. N.* —

Psammoecini.

Psammoecus Latr.

1. **bipunctatus** F. — Kref. - Samml. Bruck - daher [Ulbr.] in Samml. R. — Laach. See, sehr selten (Fuß) — *H. N.* —

Uleiota

Uleiota Latr. = **Brontes** F.

1. **planata** L. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher in

Samml. Bruck — Bopp. (B.) — Elbf. (1 - Geilenk. - C.) — Düssdf. (Fuß) — H. W. N. —

Dendrophagus Schönh.

— **crenatus** Pk. — Angabe über die Lebensweise in Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 67 S. 53, ohne Fundortsangabe, ist nach dem Zusammenhang wohl auf Aachen zu deuten. — Doch nicht H. W. N. —

Cucujini.

[**Cucujus** F.

cinnaberinus Scop. — F. für Homberg [Pliester-sanguinolentus L.] - schon von B. I. 238 nicht aufgenommen. — Nicht H. W. N. - unzweifelhaft unrichtig - in Schilsky II. außer der unzutreffenden Angabe N. nur südliche und östliche Fundgebiete. —]

[**Phloeostichus** Redtb.

denticollis Redtb. — Col. Neerl. für Rhp. - jedenfalls nach Eichhoff, der aber [B. I. 520] die Art bei Hilchenbach in Westf. fand. —]

Laemophloeini.

Laemophloeus Steph.

1. **testaceus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (1 - C.) — Elbf., Essen (G.) — Kochem, Kob., Soon (R.) — W. N. —

2. **bimaculatus** Pk. — Kref. - 1 - Samml. Bruck — H. —

— **duplicatus** Waltl. — Zebe für Rhp. — Col. Neerl. für Düssdf. - in Samml. Hagens ohne Fundort (Dom. Hag.) — H. W. N., daher im Gebiet sicher noch aufzufinden. —

3. **minutus** Ol. — Aach. (Fürst. - F. · pusillus Schönh.) — H. W. —

[**turcicus** Grouv. — St., im Freien (1 - Reitt. vid. - R.) - eingeschleppt - Südosteuropa. —]

4. **ferrugineus** Steph. — Aach. (Fürst. - F.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — H. W. N. —

5. **ater** Ol. — Aach. (Fürst. - F.) — Kref. (vom Bruck - F., u. Erichs., Ins. D. III. 325) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Altenahr, Kob. (Reitt. vid. - R.) — N. —

6. **clematidis** Er. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Aach. u. Bopp. - Samml. Bruck — Kob. (Mühlf.) — H. W. N. —

Lathropus Er.

1. **sepicola** Müll. — Jülich, in Menge (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Col. Neerl. noch für Kref. u. Düssdf. - von Kref. nicht in Samml. Bruck — N. —

Cryptophagidae.

Telmatophilini.

Telmatophilus Heer.

1. **sparganii** Ahr. — Aach. (Först. - *F.*) — *H. N.* —
2. **caricis** Ol. — Aach. (Först. - *F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Gillenfeld, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
3. **brevicollis** Aub. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (1 - Reitt. vid. - *G.*) — *H. —*
4. **typhae** Fall. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) — Elbf. (*C.*) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

Cryptophagini.

Paramecosoma Curt.

1. **melanocephalum** Hbst. — Kref. (*F.* - bicolor Curt.) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Henoticus Thoms.

1. **serratus** Gyll. — Kob. (1 - Reitt. vid. - R.) — Belg. u. *H.* —
- **germanicus** Reitt. — Nach einem aus der Umgebung von Koblenz stammenden, jetzt in Samml. Reitt. befindlichen Stück beschrieben (Wiener E. Z. 06 S. 7). - Finder und genauer Fundort nicht mehr feststellbar [Reitt. briefl.] —

Pteryngium Reitt.

- **crenatum** Gyll. — *F.* für Düssdf. [Hildebr. - Cryptoph. cren. *F.*] - von *B.* I. 487 nicht aufgenommen - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl) — *W.* —

Micrambe Thoms.

1. **vini** Pz. = **villosa** Heer — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (daher u. a. beschrieben nach einem Funde von Corn. - Erichs., Ins. D. III. 373 - pilosula Er. -, u. *C.*) — Kob. (Reitt. vid. - R.) — *W. N.* —

2. **abietis** Pk. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (vom Bruck - *F.*) Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W.* —

Cryptophagus Hbst.¹⁾.

[Die Crypt. der Samml. R., sowie die aus der vom Bruckschen Sammlung entnommenen Funde von Reitter revidiert.]

1. **pubescens** Stm. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* - lapponicus Gyll.!) — Kref. - Samml. Bruck — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kreuzn. (Reichensp.) — Nettetal, St. (R.) — *H. W. N.* —

1) Cr. denticulatus Heer, in *F.* für Aach. [Förster], von *B.* nicht angeführt, blieb ungedeutet. —

2. **subdepressus** Gyll. — Trier (Reitt. vid. - Mühlf.) — Rhens (1 - R.) — W. N. —
3. **scanicus** L. — Rhp. (F.) — Aach. (B.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Kochem, Kob., St. (R.) — H. W. N. —
- a. **patruelis** Stm. — Duisb. (1 - Urb.) - Reitt. vid. — Saarl. (Reitt. vid. - Gabr.) — Kobern (Bockl.) - Hubenth. vid. — Nettetal (2 - R.) — N. —
4. **hirtulus** Krtz. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. [Brink], St. (je 1 - R.) — N. —
5. **Thomsoni** Reitt. — Brohltal (Andr.) - Reitt. vid. — Kob. (Reitt. vid. - Gabr.) — H. N. —
6. **saginatus** Stm. — Kref., Düssdf. (F. - sag. Schüpp.) - Kref. in Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) - Belegst. Hubenth. vid. — H. W. N. —
- [**subfumatus** Krtz. — C. für Elbf. [1 - Corn. - Kraatzi Reitt.] - Belegst. nicht subfum., nicht mehr sicher bestimmbar - Reitt. vid. — H., nicht W. N. —]
7. **dentatus** Hbst. — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — Kob., Soon (R.) — H. W. N. —
8. **pallidus** Stm. — Brohltal (Andr.) - Reitt. vid. -- Kref. [Ulbr.], Kob. (R.) — H. N. —
9. **scutellatus** Newm. — Kref. (B. - bicolor Stm.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (R.) — H. W. N. —
- [**dorsalis** Sahlb. — F. für Kref. [vom Bruck - dors. Gyll.] - so auch B. I. 252. — Aus Rhp. nicht in Samml. Bruck - nicht H. N., für W. angegeben. —]
10. **distinguendus** Stm. — Kref. (vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. —
11. **fumatus** Marsh. — Aach., Kref. (F. - fum. Gyll.) - Kref. in Samml. Bruck mit Erichs. vid. — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. —
12. **fuscicornis** Stm. — Bonn (2 - Kraatz, Stett. E. Z. 52) - in Samml. Kraatz keine Stücke mit Fundort Bonn, doch einige unbezettelt [Hubenth. briefl.] — W. 129 [von Reitt. best.] —
13. **badius** Stm. — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. --
14. **acutangulus** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — Vallendar, Kob. (je 1 - R.) — H. W. N. —
15. **cellaris** Scop. — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — Kob. (1 - R.) — H. W. N. —
16. **affinis** Stm. — Kreuzn. - Samml. Bruck - nicht Kref., wie F. angibt. — H. W. N. —

17. **pilosus** Gyll. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisdorf (Hubenth. vid. - Raderm.) — Brohltal (Andr.) - Reitt. vid. — Kob. (Gabr.) — Laach. See, Oberwerth, aus Kellern in Kob. (R.) — *H. W. N.* —

18. **punctipennis** Bris. — Nettetal, Oberwerth, in Mehrzahl (Reitt. vid. it.! - R.) - Frankreich [Ganglb. Käf. M.] - Magdeburg u. a. [Schilsky II.] —

19. **lycoperdi** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — Brohltal (Andr.) — Kref. [1 - Brink], Soon [1 - v. Geyr] in Samml. R. — *H. W. N.* —

20. **setulosus** Stm. — Elbf. (2 - C.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Ahrw. (Fuß) — Winningen (1 - R.) — *H. W. N.* —

21. **Schmidti** Stm. — Düssdf. (Hildebr. - F. - Schm. Leun.) — Aach. (B. I. 249) — Kref. - Samml. Bruck — Müddersheim b. Düren [aus Hamsterbau - v. Geyr] in Samml. R. — Löndorf (Hubenth. vid. - Raderm.) — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — *W. N.* —

[**baldensis** Er. — Eichh., Berl. E. Z. 66, für Jülich — *C.* für Elbf. - 1 - mit? — Nach Ganglb. Käf. M. nicht wohl möglich; das Belegst. der Samml. Corn. ist - gleichwie die schlesischen bald. nach Gerh., D. E. Z. 1900 S. 70 - *silesiacus* - Reitt. vid. —]

22. **silesiacus** Ganglb. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. als „*baldensis?*“ - Belegst. Reitt. vid. — Glatz [Schilsky II.] —

Emphyllus Er.

1. **glaber** Gyll. — Aach. (F.) — Kref., Düssdf., Bopp., Saarbr. (B.) — Duisb. (Urb.) — Rolandseck (Reichensp.) — Brohltal (Andr.) — *H. W. N.* —

Antherophagus Latr.

1. **nigricornis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. - Samml. Fischer — Elbf. (C.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — a. d. Mosel (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — *H. W. N.* —

2. **silaceus** Hbst. — Rhp. (F.) — Aach., Kref., Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Jülich (Eichh. l. c.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

3. **pallens** Ol. — Aach., Kref. (F. - pall. Gyll.) — Elbf. (C.) — Jülich (Eichh. l. c.) — Wesel (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Atomariini.

[**Caenoscelis** Thoms.

ferruginea Sahlb. — Col. Neerl. für Elbf. - nach Elbf. [Corn.] in W. 130 - durch Verz. C. berichtigt - doch *H. N.* —

Grobbenia Holdh.

1. *fimetarii* Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *tim.* Gyll.) — Elbf. (*C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Reitt. vid. — *H. W.* —

Atomaria Steph.

[Die Atom. der Samml. R., der Samml. Gabriel, sowie die aus der vom Bruck'schen Samml. entnommenen Funde sind von Reitter revidiert.]

1. *umbrina* Gyll. — Aach. (*B. I.* 255 - *fumata* Er.) — Elbf. (*C.*) - Belegst. Reitt. vid. — Eupen (Heym.) — Kref. - in Samml. Bruck mit Erichs. det.: *umbrina* Gyll. — *H. W.* —

2. *bella* Reitt. — Oberwerth [1 - Mühlf.] in Samml. R. - Reitt. vid. it.! — Sachsen u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

3. *nigriventris* Steph. — Kref. (*F.* - *nana* Er.) - daher in Samml. Bruck — Eupen (Heym.) — Elbf. (*C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

v. *puncticollis* Thoms. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Mitteldeutschl. [Schilsky II.] —

4. *linearis* Steph. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Nettetal, Wiedtal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. *Herminae* Reitt. — Elbf., mehrfach (Corn. - *C.*) - nach *W. 130* von Reitt. bestimmt. — *H. N.* —

alpina Heer — *F.* für Kref. [vom Bruck - *elongatula* Er.] - in Samml. Bruck nur von Prag. — Doch *H. N.* —]

6. *procerula* Er. — Nev. (de R., Ver. Nat. Ver. 82, mit Reitt. vid.) — Kref. - Samml. Bruck — *N.* —

7. *prolixa* Er. — Elbf. (daher u. a. nach einem Funde von Corn. beschrieben - Erichs., Ins. D. III. 382 -, u. *C.*) — Düssdf. - Samml. Fuß — Eupen (Heym.) — *W. N.* —

8. *fuscicollis* Mannh. — Kref., Düssdf. (*F.* - *umbrina* Gyll.!) - in *B. umbr.* Er. — Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) - Belegst. Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — Nettetal, Kob. (R.) — *W. N.* —

9. *impressa* Er. — Eupen (2 - Heym.) — Nettetal (1 - Reitt. vid. it.! - R.) — *W.* —

10. *munda* Er. — Birkenfeld (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — *H. N.* —

11. *mesomelaena* Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *mesomelas* Hbst.) - Kref. (2 - Reitt. vid. — Geilenk.) — Kob. (Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

12. *gutta* Steph. — Elbf. (1 - Reitt. vid. - *G.*) — Kob. (3 - R.) — *H. W. N.* —

v. *rhenana* Krtz. — Bonn (Kraatz, Stett. E. Z. 53. S. 97) — Bopp. (*B. I.* 488) - daher in Samml. Fuß — Kref., Siebengbg. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Kreuzn. (R.) — *N.* —

13. **atra** Hbst. — *B.* I. 259 für Aach., Kref. - von Kref. nicht in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Hubenth. vid. — hierhin wohl [Erichs. Ins. D. III. 292], nicht zu *apicalis* Er. die *atra* Gyll. in *F.* für Aach., Kref., Elbf. — *W. N.* —
14. **gravidula** Er. — Elbf. (1 - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Reitt. vid. — *H. W. N.* —
15. **nitidula** Heer — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — *B.* Ent. Kl. für Bopp. [basalis Er.] - in *B.* I. 259 nicht angeführt. — *H. N.* —
16. **fuscata** Schönh. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
17. **atricapilla** Steph. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Bockl. u. R.) — *H. W. N.* —
18. **bicolor** Er. = *berolinensis* Krtz. — Elbf. (Reitt. vid. - *tumulorum Villa* - *G.*) — Nettetal, Kob., St. (R.) — *H.* —
19. **Zetterstedti** Zett. — Kref., Siebengbg. - Samml. Bruck — Belg. u. *H.* —
20. **fusipes** Gyll. — Elbf. (Corn. - *C.*) — *B.* I. 256 für Kref. - jedenfalls nach vom Bruck, doch in Samml. Bruck nur Ostende. — *H. W.* —
21. **pusilla** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- **ornata** Heer — *C.* für Elbf. [2 - Corn.] - das eine noch vorhandene Stück in Samml. Corn. gehört anderer Art an - Reitt. vid. — *H.* —
22. **nigripennis** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.* - auch *pulchella* Heer - u. *G.*) — Kob., in Kellern, zahlreich (Mühlf. u. R.) — *H. W. N.* —
23. **turgida** Er. — Eupen (Heym.) — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — *W. N.* —
24. **apicalis** Er. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Reitt. vid. — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
25. **ruficornis** Marsh. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *terminata* Dahl.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Reitt. vid. — Kob. (R.) — *H. W. N.* —
26. **analis** Er. — Kref. (*F.* — an. Schüpp.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* - *testacea* Steph.) — Saarl. (Gabr.) — Nettetal, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —
27. **cognata** Er. — Elbf. (1 - Corn. - *C.* - *viennensis* Reitt.) - nach *W. 131* von Reitt. bestimmt — Kob. (1 - Reitt. vid. - *cognata* Er. - Mühlf.) — *N.* —

28. **rubicollis** Bris. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Reitt. vid. — Nicht *H. W. N.* — Mecklenburg u. im Süden u. Osten [Schilsky II.] —

29. **gibbula** Er. — Brohltal (1 - Andr.) - Hubenth. vid. — Arenberg b. Kob. (2 - R.) — *H. N.* —

Ootypus Ganglb.

1. **globosus** Waltl. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (Corn. - C. nigricalvis Steph.) — Eupen (Heym.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W.* —

Ephistemus Steph.

1. **globulus** Pk. — Aach. (F.) — Ahrtal (B.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Kob. (Gabr.) — Elztal, Kob. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. **ovulum** Er. — *F.* für Kref. [Mink] - von *B.* nicht aufgenommen. —

v. **dimidiatus** Stm. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Kob. (Reitt. vid. - Gabr.) —

Erotylidae.

Triplacini.

Tritoma F.

1 **bipustulata** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **binotata** Reitt. — Bonn (R.) — *H.* —

Triplax Pk.

1. **melanocephala** Latr. — Ahrw. - Samml. Fuß — Westdeutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

2. **aenea** Schall. — Aach. (Först. - F.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Belg., *W. N.* —

3. **russica** L. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Bonn, Laach. See, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

— **Lacordairei** Crotch — *F.* für Homberg [Pliester - ruficollis Dej.] — Nicht *H. N.* - für *W.* - 1 - angegeben. — Westl. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

— **scutellaris** Charp. — *F.* für Aach. [Först. - bicolor Marsh.!] — Nicht *H. W. N.* — Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. l. c.] —

4. **lepidia** Fald. — Oberwerth, Ende Juni (1 - Heyd. vid. - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. l. c.] —

Daenini.

Dacne Latr.

1. **rufifrons** F. — Aach., Düssdf. (F.) — Bonn, Nettetal, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **bipustulata** Thunb. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - humeralis F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Combocerus Bed.

1. **glaber** Schall. — Kref., Düssdf. (F. - sanguinicollis F.) — Elbf. (C.) — Remagen, Kob., St. (R.) — *W. N.* —

Diphyllini.

Diplocoelus Guér.

1. **fagi** Chevr. — Jülich (1 - Eichh., Berl. E. Z. 66) — *N.* —

Phalacridae.

Phalacrus Pk.

1. **grossus** Er. — Barmen [Stachelhausen] u. Nev. [de Rossi] (C.) — Siebengbg. - 1 - Samml. Bruck — *H. W.* —

2. **fimetarius** F. = **coruscus** Pz. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **Humberti** Rye — Elbf. (Reitt. vid. - G.) —

a. **rufipes** Tourn. — Aach. (von Först. - Flach vid. - Heyd.) —

3. **substriatus** Gyll. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — *H. N.* —

4. **caricis** Stm. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck u. [Ulbr.] Samml. R. — Bopp. (B.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — *H. W. N.* —

Olibrus Er.

1. **aeneus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **millefolii** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck mit Erichs. vid. — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

3. **corticalis** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R) — *H. W. N.* —

4. **pygmaeus** Stm. — Kref., Bonn (B.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

5. **flavicornis** Stm. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — Brohltal (nicht selten - Andr.) — *N.*

6. — **liquidus** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

7. **affinis** Stm. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

8. **bicolor** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

Stilbus Seidl.

1. **testaceus** Pz. — Aach., Kref., Bopp. (F. - geminus Ill.) — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

a. **unicolor** Flach — Saarl. (Gabr.) — H. —

2. **atomarius** L. — Aach., Kref. (F. - piceus Kn.) - Kref. in Samml. Bruck - piceus Steph. - mit Erichs. vid. — Elbf. (Corn. - C.) — Saarl. (Gabr.) — H. W. N. —

3. **oblongus** Er. — Ahrw. (Fuß) — Kob. (Reitt. vid. - Mühlf. u. R.) — H. W. N. —

Lathridiidae.

Dasycerini.

Dasycerus Brogn.

1. **sulcatus** Brogn. — Aach., Bonn (F.) — Birkenfeld, Saarbr. (B.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Siebengbg., Laach. See [Reichenesp.], Kob., St. (R.) — W. N. —

Lathridiini.

Lathridius Hbst. 1).

1. **lardarius** Deg. — Aach., Kref. (F.) - Kref. - Samml. Ulbr. — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

2. **angusticollis** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C. - angulatus Mannh.) — Duisb. (Urb.) — Brohltal (Andr.) — Wiedtal, Kob., St. (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

3. **Pandellei** Bris. — Elbf. (Corn. - C. - angusticollis Humm.) - Belegst. verloren — Eupen (Heym.) — H. W. N. —

4. **alternans** Mannh. — Col. Neerl. für Elbf. - so W. 132 nach Corn. - durch Verz. C. berichtigt — Eupen (zahlreich - Heym.) — W. N. —

5. **rugicollis** Ol. — C. für Elbf. [Corn.] - Belegst. ist constrictus, den C. nicht für Elbf. anführt - Reitt. vid. — Duisb. (massenhaft, tot in Kellern - Heym.) — W. N. —

6. **Bergrothi** Reitt. — Kref. [1 - Brink] in Samml. R. - Hubenth. vid. — N. [1] - Nord- u. Mitteleuropa, u., wie es scheint, sich immer mehr verbreitend [Ganglb. Käf. M.] —

1) Lathr. depressus Heyd., in F. für Kref. [vom Bruck], blieb ungedeutet. - In-litt.-Name nach Mitteilg. Heyd., nicht in Samml. Heyd., noch in Samml. Bruck. —

7. **constrictus** Gyll. — Aach. (daher beschrieben - *F.* - *limbatus* Först.) — Nev. (1 - de Rossi - *G.*) — Elbf. - Samml. Corn. als *rugicollis* Ol. - Reitt. vid. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

8. **nodifer** Westw. — Elbf., Nev. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — U. Ahr (1 - Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — H. Venn, Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* - über den größten Teil der Erde verbr. und erst in den letzten Jahrzehnten nach Mitteleuropa eingeschleppt [Ganglb. Käf. M.] —

Enicmus Thoms.

1. **hirtus** Gyll. — Düssdf. (Everts, D. E. Z. 92) — Soon (1 - Reitt. vid. - R.) — *H. N.* —

2. **minutus** L. — Rhp. (*F.*) — Kref. (*F.* - *assimilis* Mannh.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob. (Reitt. vid. · R.) — *H. W. N.* — Hierhin wohl *B. I.* 407 mit *scitus* Motsch. für Kref. —

3. **consimilis** Mannh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Soon (1 - Reitt. vid. - R.) — Deutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

[**testaceus** Steph. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - nicht nachweisbar. — *H. N.* —]

4. **rugosus** Hbst. — Aach. (Först. - *F.* - *planatus* Motsch.) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Nettetal (1 - Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**brevicornis** Mannh. — Col. Neerl. für Rhp. - nur *N.* —]

Cartodere Thoms.

1. **elongata** Curt. — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck mit Reitt. vid. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

2. **ruficollis** Marsh. — Duisb. (Heinem. - *F.* - *concinna* Schüpp.) - von *B. I.* 268 nicht aufgenommen — Kref. - Samml. Bruck mit Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

3. **filiformis** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck mit Reitt. vid. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Nev. (de R.) — Oberwinter [Reichensp.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

4. **filum** Aub. — Oberwinter [Reichensp.] in Samml. R. — Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

Corticariini.

Corticaria Marsh.

[Die Cort. der Samml. R. und die aus der vom Bruckschen Sammlung entnommenen Funde sind von Reitter revidiert.]

1. **pubescens** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob.

(Gabr.) — Ahrtal, Wiedtal, U. Nahe, St. (R. - auch piligera Mannh) — *H. W. N.* —

2. **crenulata** Gyll. — Kref. (*F.* - cren. Schüpp.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

3. **fulva** Com. — Elbf. (2 - *C.*) — Kob. (Gabr. u. R.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

4. **umbilicata** Beck — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

5. **longicornis** Hbst. — Saarl. (Gabr.) — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] - nicht in Samml. Bruck, noch im Verz. *C.* — *B. I. 272* für Düssdf. — *H.* —

6. **impressa** Ol. — Elbf. (*C.* - auch badia Mannh.) — Kob., Saarl. (Gabr.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

7. **abietum** Motsch. — Kref. - Samml. Bruck - Mannerheimi Reitt. — *N.* —

8. **linearis** Pk. — Kref. (*B. I. 272.*) — Elbf. (*C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

— **foveola** Beck — *F.* für Aach. [Först.] — nicht Elbf., wie *F.* angibt, nicht in *C.* — *N.* - Nordeuropa, Deutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

9. **longicollis** Zett. — Kref. - Samml. Bruck — Oberwinter, Kottenforst [Reichenesp.] in Samml. R. — *N.* —

10. **crenicollis** Mannh. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. als ferruginea Marsh. - Belegst. Reitt. vid. — *H.* —

11. **serrata** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

12. **elongata** Gyll. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) -- Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**ferruginea** Marsh. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - nach dem Belegst. der Samml. Corn. die für Elbf. in *C.* nicht angegebene crenicollis - Reitt. vid. — *H.* —]

Melanophthalma Motsch.

1. **transversalis** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - transv. Schüpp.) - Kref. in Samml. Bruck mit Reitt. vid. — Elbf. (*C.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —

2. **distinguenda** Com. — Bopp. (*B. I. 494*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —

3. **gibbosa** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - gibb. Pk.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal ($\sigma^7 \varphi$ - Andr.) - Hubenth. vid. — b. Euskirchen [1 σ^7 - Hens.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

4. **similata** Gyll. — Kref. (*F.* - auch parvula Mannh.) - daher in Samml. Bruck mit Reitt. vid. — Elbf. (*C.*) — Kob., Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

5. **fuscula** Gyll. — Aach. (*F.* - *fusc.* Meg.) — Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Kob., Saarl. (Gabr.) — Kob. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. **trifoveolata** Redtb. — Kref. (*B. I.* 409) - aus Rhp. nicht in Samml. Bruck — Elbf. (*G.*) — *W. N.* —

6. **truncatella** Mannh. — Kref. (*B. I.* 409) — Kob. (Reitt. vid. - Bockl. u. R.) — *H. W. N.* —

Holoparamecini.

[**Holoparamecus** Curt.

Ragusai Reitt. — Col. Neerl. für Rhp. — Nicht *H. W. N.* - Belg. [Col. Neerl.] - sonst Südeuropa. —]

Mycetophagidae.

Triphyllus Latr.

1. **bicolor** F. = **punctatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (*G.*) — Wiedtal (1 - R.) — *H. W. N.* —

Mycetophagus Hellw.

1. **quadripunctulatus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Siegmdg., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **piceus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - *variabilis* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Trier (R.) — *H. W. N.* —

3. **decempunctatus** F. — Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (1 - Fuß) — *W. N.* —

4. **atomarius** F. — Aach., Düssdf. (*F.*) - Düssdf. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

5. **quadriguttatus** Müll. — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 67) — Kob. (2 - Preiß) — *H. N.* —

6. **multipunctatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — *H. W. N.* —

7. **fulvicollis** F. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - *F.*) - daher in Samml. Bruck — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Ahrw. (Fuß) — *N.* —

8. **populi** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — *H. W. N.* —

Litargus Er.

1. **connexus** Geoffr. = **bifasciatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Typhaea Curt.

1. **stercorea** L. = **fumata** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Sphindidae.

Sphindus Chevr.

1. **dubius** Gyll. — Kref. (daher beschrieben - Mink, Stett. E. Z. 53 - humeralis Mink) — Düssdf. (B.) — Nev. (de Rossi - C.) — Laach. See (1 - R.) — *H. N.* —

Aspidiphorus Latr.

1. **orbiculatus** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Kref. (Geilenk.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Cisidae.

[**Hendecatomus** Muls.

reticulatus Hbst. — Angabe in Schilsky I. für Rhp. fällt weg - D. E. Z. 90 S. 190.]

Cis Latr.

1. **comptus** Gyll. — Elbf. (1 - G. mit Reitt. vid.) — Col. Neerl. noch für Düssdf. — *N.* —

2. **nitidus** Hbst. — Aach., Düssdf. (F. - nit. F.) - in B. Octotemnus nit. F. -- Bopp. (B. II. 113) — Elbf. (C. - nit. Mell.) — Kref. - Samml. Brink - Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

3. **Jacquemarti** Mell.

- v. **glabratus** Mell. — Aach. - Samml. Fuß - Belegst. Schilsky vid. — *W.* —

4. **boleti** Scop. — Rhp. (F. - bol. F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. **setiger** Mell. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Bonn (Schilsky vid. - R.) — *H. N.* —

6. **micans** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (1 - Preiß) - Belegst. Schilsky vid. — *H. W. N.* —

7. **hispidus** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - hisp. Pk.) — Elbf. (C.) — Brohltal, Kob. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **alni** Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

9. **bidentatus** Ol. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Kref., Ahratal - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — *H. N.* —

10. **vestitus** Mell. = **festivus** Schilsky -- Aach., Kref., Düssdf. (F. - festiv. Gyll.!) — Bopp. (B. II. 110 - festiv. Pz.) — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. Schilsky vid. — *H. W. N.* —

11. **oblongus** Mell. — Elbf. (1 - Reitt. vid. - pygmaeus Marsh. - G.) — Kref. (Heyd., D. E. Z. 75. S. 388) — *H. N.* —

12. **castaneus** Mell. — Elbf. (Corn. - C.) — Laach. See (Schilsky vid. - R.) — *H. N.* —

Rhopalodontus Mell.

1. **fronticornis** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Schilsky vid. — H. W. N. —

Ennearthron Mell.

1. **affine** Gyll. — Aach. (F.) — Elbf. (G.) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Kob. (Schilsky vid. - R.) — H. W. N. —

2. **cornutum** Gyll. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — H. W. N. —

3. **laricinum** Mell. — Elbf. (Geilenk. - G) - Belegst. Schilsky vid. — Mittel- u. Süddeutschl. [Schilsky II.] —

Octotemnus Mell.

1. **glabriculus** Gyll. — Kref. (Mink - F.) - daher (Geilenk.) - Belegst. Schilsky vid. — Elbf. (C.) — Saarl (Gabr.) — Kob., St. (Schilsky vid. - R.) — H. W. N. —

[**mandibularis** Gyll. — Col. Neerl für Rhp. - nicht H. W. N. —]

Colydiidae.

Colydiini.

Colydium F.

[**elongatum** F. — B. in Ent. Kl. für Bopp. - in der Fauna I. 231 nicht für Rhp. —]

1. **filiforme** F. — B. in Ent. Kl. für Bopp. - in der Fauna nicht für Rhp. — Kref. (3 - Geilenk.) — Kob. (1 - Bockl.) — Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —

Aglenini.

Aglenus Er.

1. **brunneus** Gyll. — Aach. (Fürst. u. Kaltenb. - F.) - daher in Samml. Bruck und Heyd. — Elbf. (Mühlf.) — H. N. —

Ditomini.

Ditoma Hbst.

1. **crenata** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Colobicus Latr.

1. **marginatus** Latr. — Bopp. (B. Ent. Kl.) — Kob. (Bockl.) — Kochem (1 - R.) — W. N. —

Synchita Hellw.

1. **humeralis** F. = **juglandis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. —

v. obsura Redtb. — Elbf. (Corn. - C.) —

Cicones Curt.

1. **variegatus** Hellw. — Kref., Düssdf. (F.) - von Düssdf. (Heyd.) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Brohltal (1 - Andr.) — Kochem (2 - R.) — *W. N.* —

Orthocerini.

Orthocerus Latr.

1. **clavicornis** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 60) — Alken [le Roi], U. Nahe (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

Apistini.

Apistus Motsch.

1. **Rondanii** Villa — Bopp, unter der Rinde eines alten Walnußbaums bei Ameisen (2 - B. I. 406) — Süddeutschland u. a. [Ganglb. Käf. M.] - trotzdem nicht ganz unbedenklich. —

Tarphiini.

Langelandia Aub.

1. **anophthalma** Aub. — Bonn, im Nettekovenschen Garten an amerikanischen Rebenwurzeln, u. U. Ahr bei Heimerzheim, in Weinbergen (Heyd.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M] —

Pycnomerini.

Pycnomerus Er.

1. **terebrans** Ol. — Bopp. (B. I. 234) — nicht auch Elbf., wie B. angibt, nicht in C. — *N.* —

Myrmecoxenini.

Myrmecoxenus Chevr.

1. **subterraneus** Chevr. — Bopp. (B. I. 406) — Linz (Wasm., D. E. Z. 94) — Elbf., Blumsley (Mühlf.) — Brohltal [Andr.] u. Blumsley in Samml. R. — U. Nahe (Reichensp.) — *H. W. N.* —

Deretaphrini.

Oxylaemus Er.

— **cylindricus** Pz. — Col. Neerl. für Düssdf. - in Samml. Hagens ohne Fundort (Dom. Hag.) — *N.* —

Teredus Shuck.

1. **cylindricus** Ol. — Düssdf. (Fuß) — Kochem, im Ernster Buchenwald (R.) — *W. N.* —

Anommatini.

Anommatus Wesm.

1. **duodecimstriatus** Müll. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Bonn,

im Nettekovenschen Garten, u. U. Ahr, in Weinbergen (Heyd.)
— *H. W.* —

Cerylonini.

Cerylon Latr.

1. *fagi* Bris. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Arenberg (1 - Hubenth. vid. - R.) — *H. N.* —
2. *histeroides* F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kochem, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
3. *ferrugineum* Steph. — Kref. (*F.* - *angustatum* Er.) — Elbf. (Geilenk. - *C.*) — Saarbr. - Samml. Fuß — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —
4. *deplanatum* Gyll. — Ahrw. (Fuß) — Oberwerth (1 - R.) — *H. W. N.* —

Endomychidae.

Sphaerosominae.

Sphaerosoma Leach. = **Alexia** Steph.

1. *globosum* Stm. — Ahrw. (Fuß) — Soon, in Pilzen (Reitt. vid. - R.) — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —
2. *pilosum* Pz. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Gabr.) — U. Ahr (Heyd.) — Winningen, St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —
3. *piliferum* Müll. — Aach. (Först. - *F.*) — Ahrw. (Fuß) — Soon, in Pilzen (Reitt. vid. - R.) — *N.* —

Mycetaeinae.

Symbiotes Redtb.

1. *latus* Redtb. — Düssdf. (*B. I.* 519 u. Fuß, Berl. E. Z. 67) - aus Samml. Fuß Hubenth. vid. — Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] - in *H.* nur gibberosus [Col. Neerl.]. —

Mycetaea Steph.

1. *hirta* Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Düssdf. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Endomychinae.

Dapsini.

Lycoperdina Latr.

1. *bovistae* F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Ahrw. (Fuß, Ent. Nachr. 82 S. 31) — Bonn - Samml. Bertkau — Kob. (1 - Bockl.) — Soon (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. succincta L. — Kreuzn. (B. III. 199) — Winningen (1 - Bockl.) — *W. N.* —

Endomychini.

Endomychus Pz.

[**armeniacus** Motsch. — Schilsky I. u. - mit? - II. für Rhp. - Quelle der unrichtigen Angabe nicht zu ermitteln [Schilsky brieflich] —]

1. coccineus L. — Aach., Brohl, Bopp. (F.) — Eupen (Brink) — Kottenforst - Samml. Fuß — Brohltal, einmal massenhaft (Frings) — Siebengbg., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Coccinellidae.

Epilachninae.

Epilachna Redtb.

[**chrysomelina** F. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Nach eingeholter Auskunft auf undecimmaculata F. in F. beruhend - die aber zu Argus zu stellen - so B. III. 191 - auch Südeuropäer. —]

1. Argus Geoffr. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - undecimmaculata F.!) — U. Solg. (G.) — Mörs (Schneid.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Subcoccinella Huber. ¹⁾.

1. vigintiquatuorpunctata L. — Rhp. (F. - globosa Schneid.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
a. limbata Moll. — Saarl. (Gabr. - saponariae Muls.) —
a. quadrinotata F. — Saarl. (Gabr.) —
a. haemorrhoidalis F. — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) —
 Brohltal (1 - Andr.) — *W. N.* —

a. centrimaculata de Rossi — Nev. (daher beschrieben - de R., Verh. Nat. Ver. 82) —

Cynegetis Redtb.

1. impunctata L. — Kref., Düssdf. (F. - aptera Pk.) — Elbf. (C. u. G.) — St. (R.) — *W. N.* —

Coccinellinae.

Hippodamiini.

Hippodamia Muls.

1. tredecimpunctata L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Siegmdg., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

1) S. v. *livida* Hbst., in C. für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet - das eine Stück der Samml. Corn. war *Aphidecta obliteratus* - Weise vid. —

a. Eichhoffi Seidl. — Fauna Baltica II. Aufl. beschrieben nach Fund von Eichhoff im westl. Deutschl. - Jülich, Saarbr. u. a. können als Fundorte in Betracht kommen. —

a. quadripunctata de Rossi — Nev. (daher beschrieben - de R., Verh. Nat. Ver. 82) —

a. Cornelii de Rossi — Nev. (de R., l. c.) —

a. undecimmaculata Harrer — Elbf. (G.) — W. —

a. spissa Weise — Elbf. (Corn. - C.) — W. N. —

a. contorta Weise — Elbf. (G.) —

a. C-nigrum Weise — Elbf. (C.) — W. —

a. Gyllenhali Weise — Elbf. (G.) — W. N. —

2. septemmaculata Deg. — Aach., Düssdf. (B. III. 171) — Elbf. (C.) — Soon (2 - v. Geyr) — Siegmdg. [1 - Frings] in Samml. R. — H. W. N. —

Adonia Muls.

1. variegata Goeze — Elbf. (C.) — Bonn, Ahrw., Kob. (R.) — H. W. N. —

a. immaculata Gmel. — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — N. —

a. constellata Laich. — Brohltal (1 - Andr.) — W. N. —

a. carpini Geoffr. — Nev. (de R., Verh. Nat Ver. 82 - angulosa Weise) — U. Ahr (Heyd. - biconstellata Sajo) — W. N. —

a. neglecta Weise — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Saarl. (Gabr.) — W. —

Anisosticta Dup.

1. novemdecimpunctata L. — Rhp. (F. - novemnd. F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

a. conjuncta Weise — Nev. (de Rossi - G.) —

a. maculata Corn. [nicht im Cat. Col.] — Elbf. (daher beschrieben - C. 55) —

[**Semiadalia** Crotch.

undecimnotata Schneid. — Nicht in F. - in B. III. 176 nur: „nicht überall und nicht gemein“ — W. N., daher wohl auch in Rhp. —]

Coccinellini.

Aphidecta Weise.

1. oblitteratus L. — Rhp. (F. - M-nigrum F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) -- Soon (v. Geyr) — Vallendar (2 - R.) — H. W. N. —

a. pallidus Thunb. — Brohltal (1 - Andr.) — W. N. —

a. sexnotatus Thunb. — Elbf. (C.) — W. N. —

a. fumatus Weise — Elbf. (C.) — Nev. (de Rossi - G.) —

Adalia Muls.

1. bipunctata L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

- a. interpunctata** Haw. — Nev. (de R., Verh. Nat. Ver. 82 - Herbsti Weise, pruni Weise) — *N.* —
a. unifasciata F. — Elbf. (*G.*) —
a. annulata L. — Nev. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (1 - Bockl.) - Belegst. Weise vid. —
a. pantherina L. = **tripustulata** Zschach — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — *N.* —
a. semirubra Weise — U. Ahr (Heyd. - inaequalis Weise) — *W. N.* —
a. sexpustulata L. — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — *W.* —
a. quadrimaculata Scop. — Elbf. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (*R.*) — *W. N.* —
a. marginata de Rossi — Nev. (de Rossi - *G.*) —
a. sublunata Weise — Elbf. (*G.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — *W. N.* —
a. lugubris Weise — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *W.* —
a. Kuntzi de Rossi [nicht im Cat. Col.] — Schlebusch (daher beschrieben - de R., Westf. Pr. 98) —

Coccinella L.

1. **septempunctata** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
a. quinquerotata Haw. — Elbf. (1 - *C.* - atomaria Weise) — U. Ahr (1 - Heyd. - externe punctata Weise) — *W.* —
2. **quinquepunctata** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —
3. **undecimpunctata** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - und. *F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Oberwerth (Weise vid. - *R.*) — *H. W.* —
a. variegata Weise — Güls, am Moselufer (Weise vid. - *R.*) —
4. **distincta** Fald.
a. magnifica Redtb. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 67 - labilis Muls.) — Blumslay (1 - Bockl.) - Belegst. Hubenth. vid. — *H. W.*, in *N.* andere Abart. —
5. **hieroglyphica** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —
a. flexuosa F. — Elbf. (*C.*) — *W. N.* —
a. marginemaculata Brahm — Nev. (de R., Verh. Nat. Ver. 82 - luctuosa Weise) — *W.* —
a. areata Pz. — Elbf. (*C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — Bonn (*R.*) — *W. N.* —
6. **decempunctata** L. — Rhp. (*F.* - variabilis Ill.) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

- a. **lutea** Rossi — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — W. N. —
 a. **octopunctata** Müll. — Elbf. (C.) — W. N. —
 a. **relicta** Heyd. — U. Ahr (Heyd.) — N. —
 a. **semicruciata** Gradl. — Nev. (de R.). —
 a. **recurva** Weise — Saarl. (Gabr.) —
 a. **humeralis** Schall. — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) —
 Laach. See (R.) — N. —
 a. **bella** Weise — U. Ahr (Heyd.) — N. —
 a. **bimaculata** Pont. — Elbf. (C. u. G.) — Brohltal (Andr.) — W. N. —
 a. **decempustulata** L. — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Rhens (Weise vid. - R.) — W. N. —
 a. **nigrina** Weise — Elbf. (G.) — W. N. —
 a. a. **Leimbachi**, **Clarae**, **Geilenkeuseri**, von de Rossi nach Funden bei Nev. beschrieben Westf. Pr. 98, und andere in C., G., de R., die der Cat. Col. nicht anführt, müssen dahingestellt bleiben. —
 7. **quatuordecimpustulata** L. — Aach., Kref., Laach. See, Bopp. (F. - quat. F.) — Elbf. (G.) — Trier (Mühlf.) — Strotzbüsch i. Eifel, St. (R.) — H. W. N. —
 8. **lyncea** Ol. —
 v. **agnata** Rosh. — Bopp. (B. III. 178 - duodecimpustulata F.) - nach der Beschreibung die Var. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61 - duod. F.) - Belegst. Weise vid. — Duisdorf, Löhndorf (Heyd. vid. - Raderm.) — Brohltal (1 - Andr.) — N. [duodec. F.] —
 9. **conglobata** L. — Rhp. (F. - impustulata L.) — Elbf. (C. - octodecimpunctata Scop.) — Nev. (G.) — Loef. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —
 a. **rosea** Deg. — Elbf. (C.) —
 a. **gemella** Hbst. — U. Ahr (Heyd.) — N. —
 a. **impustulata** L. — Elbf. (1 - C. - imp. Ill.) — N. —
 10. **quadripunctata** Pont. = marginepunctata Schall. — U. Solg., Nev., Elbf. (G.) — Bonn (R.) — H. W. N. —
 a. **sordida** Weise — Trier (Mühlf.) — N. —
 a. **sedecimpunctata** F. — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) — W. N. —

Micraspis Redtb.

1. **sedecimpunctata** L. — Rhp. (F. - duodecimpunctata L.) — U. Solg. (G.) -- U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —
 a. **duodecimpunctata** L. — Elbf. (1 - G.) — W. N. —

Mysia Muls.

1. **oblongoguttata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Kreuzn. (R.) — H. W. N. —
 a. **mixta** Walter — Ahrw. (Heyd.) — N. —

Anatis Muls.

1. **ocellata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
 a. **bicolor** Weise — Elbf. (G.) — Bonn (1 - R.) —
 a. **biocellata** Weise — Elbf. (G.) — Saarl. (Gabr.) — *N.* —
 a. **Böberi** Cederj. — Elbf. (G. - tricolor Weise) — Nev. (de R. - Verh. Nat. Ver. 82 - vulgaris Weise) — *W. N.* —
 a. **subfasciata** Weise — Elbf. (1 - G.) —
 a. **hebraea** L. — Elbf. (1 - G.) —

Halyzia Muls.

1. **sedecimguttata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Laach. See, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Vibidia Muls.

1. **duodecimguttata** Poda — Aach., Bopp. (F. - bissexguttata F.) — Elbf. (1 - Geilenk. - G.) — *H. W. N.* —

Myrrha Muls.

1. **octodecimguttata** L. — Kref. (Mink - F.) — Elbf. (C.) — Kref. [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —
 a. **ornata** Hbst. — Elbf. (1 - Corn. - C.) —
 a. **silvicola** Weise — Nev. (von de Rossi - Heyd.) — *N.* —

Thea Muls.

1. **vigintiuopunctata** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
 a. **vigintipunctata** F. — Elbf. (2 - C.) — Kob. (Bockl.) — *W.* —
 a. **signifera** Weise — Elbf. (Drescher u. Ostheide - G.) — *W. N.* —

Calvia Muls.

1. **decemguttata** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Eupen (Heym.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
 2. **quindecimguttata** F. — Rhp. (F. - bisseptemguttata F.) — Elbf. (G.) — *N.* —
 3. **quatuordecimguttata** L. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
 a. **ocelligera** Weise — Elbf. (2 - C.) —

Sospita Muls.

1. **vigintiguttata** L. — Aach., Kref. (F. - tigrina L.) u. Bopp. (B. - tigrina) - treffen die Art — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61 - tigrina) - Belegst. in Samml. Fuß zur Stammform. — *H.W.N.* —
 a. **tigrina** L. — Kob. (1 - Bockl.) — *N.* —
 a. **Linnei** Weise — U. Ahr (Heyd.) —

Propylaea Muls.

1. **quatuordecimpunctata** L. — Rhp. (*F.* - *conglobata* L.!) — Elbf. (*C.* - *congl.* L. v. *tessulata* Scop. - u. *G.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* — Dazu die a. a. *conglomerata* F., *fimbriata* Sulz. von Elbf. [*C.*] u. *maeandra* Waltl von Saarl. [Heyd.], die im Cat. Col. nicht angeführt werden. —

Chilocorini.

Chilocorus Leach.

1. **renipustulatus** Scriba — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **bipustulatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R., l. c.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Exochomus Redtb.

1. **quadripustulatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **flavipes** Thunb. — Rhp. (*F.* - *auritus* Schneid.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Ruhrtort, Borbeck (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

Platynaspis Redtb.

1. **luteorubra** Goeze — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - *villosa* Muls.) — U. Solg. (*G.*) — Vallendar, St. (R.) — *H. W. N.* —

Hyperaspini.

Hyperaspis Redtb.

1. **reppensis** Hbst. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — U. Nahe (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **campestris** Hbst. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Seymnini¹⁾.**Novius** Muls.

cruentatus Muls. — B. III. 192 für Aach. - danach jedenfalls Everts, D. E. Z. 92, für Aach., u. Schilsky I. u. II. für Rhp. — Nicht *H. W. N.*, besonders nicht in Fred. für H. Venn, noch in Belg. - sicher unrichtig. —]

Pullus Muls.

1. **ferrugatus** Moll. — Aach., Kref. (*F.* - *analisis* F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn (R.) — *W. N.* —

1) *Scymus abdominalis* M. B., in *F.* für Kref. [vom Bruck], u. *quadrinotatus* Megl., in *F.* für Aach. [Först.], blieben ungedeutet. —

2. **haemorrhoidalis** Hbst. — Elbf. (Corn. - C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **auritus** Thunb. — Bopp. (*B. - capitatus* F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn (R.) — *W. N.* —

— **subvillosum** Goeze.

a. **pubescens** Pz. — Hierhin wohl *F.* mit pub. Pk. für Düssdf. [Hildebr.] - in *B.* III. 195 zwar *fasciatus* Fourc. nicht für Rhp., doch *W. N.* —

4. **testaceus** Motsch.

a. **scutellaris** Muls. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. als *Nephus Redtenbacheri* - Belegst. Weise vid. — *H. N.* —

5. **suturalis** Thunb. — Rhp. (*F. - discoideus* F.!) — Elbf. (C.) — Kref. (Ulbr.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **limbatus** Steph. — Elbf. (G.) — Kob. [1 - Mühlf.] in Samml. R. — *N.* —

6. **ater** Kugel. — Aach., Kref. (*F. - ater* Ill.) — Elbf. (G.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —

Scymnus Kugel.

1. **nigrinus** Kugel. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

2. **abietis** Pk. — Aach. (Först. - *F.*) — Belg., *W. N.* —

3. **frontalis** F. — Aach., Kref., Ahrtal (*F. - auch flavilabris* Pk.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

4. **Apetzi** Muls. — Bopp. (*B.* III. 194) — Kreuzn. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *N.* —

5. **rubromaculatus** Goeze — Aach., Kref., Ahrtal (*F. - femoralis* Gyll., *flavipes* Ill., *parvulus* F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) - daher [1 - Mühlf.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Nephus Muls.

1. **quadrimaculatus** Hbst. — Aach., Kref. (*F. - quadrilunulatus* Ill.) — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, St. Goar, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **bipunctatus** Kugel. — Aach., Düssdf. (*F. - biverrucatus* Ill.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

[**Redtenbacheri** Muls. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. in Samml. Corn. ist *Pullus a. scutellaris*, den *C.* für Elbf. nicht anführt - Weise vid. — *H. N.* - je 1 —]

Clitostethus Weise.

1. **arcuatus** Rossi — Schmittenhöhe (1 - Weise vid. - R.) — *H. N.* —

Stethorus Weise.

1. **punctillum** Weise — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - minimus Pk.) - Kref. in Samml. Bruck - min. Rossi — Elbf. (*C.* - min. Rossi) — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Kob. (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

Rhizobiini.**Rhizobius** Steph.

1. **litura** F. — Rhp. (*F.*) - trifft jedenfalls chrysomeloides mit, der in *B.* noch nicht angeführt — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. **chrysomeloides** Hbst. — Elbf. (*G.*) — Bonn, Kob., St (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

Coccidula Kugel.

1. **scutellata** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*G.*) — Laach. See, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

- a. **arquata** Weise — Elbf. (Drescher u. Ostheide - *G.*) — Trier (Mühlf.) — *W.* —

2. **rufa** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Laach. See, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Helodidae.**Cyphonini.****Helodes** Latr.

1. **minuta** L. — Rhp. (*F.* - pallida F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn Brohltal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **marginata** F. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kochem, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Microcara Thoms.

1. **testacea** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - livida F. - Kref. - Samml. Fischer — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Cyphon Pk.

1. **variabilis** Thunb. — Aach., Kref. (*F.* - pubescens F. u. unicolor Ill.) — Elbf. (*C.*) — Kref. [Ulbr.], Oberwerth [Mühlf. Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

- **ochraceus** Steph. — *C.* für Elbf. [Corn. - pallidulus Boh.] Belegst. aus Samml. Corn. sind padi a. gratiosus - Schilsky vid. — Doch ochr. in *H.* verbr., auch in *N.* gefunden. —

2. **padi** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Laach. See (R.) — *H. W.* —

a. gratus Kolen. — Elbf. - Samml. Corn. als pallidulus
Boh. - Schilsky vid. —

3. **coarctatus** Pk. — Rhp. (*F.* - *griseus* F.!) — Düssdf. (*B.*
II. 426 - *fuscicornis* Thoms.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml.
Bruck — Laach. See [le Roi], Kob. (Reitt. vid. - R.) — *H.W.N.* —

a. palustris Thoms. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Siebengbg., St.
(Hubenth. vid. - R.) —

4. **Paykulli** Guér. — Düssdf. (v. Hagens - *B.* II. 426 - *nitidulus*
Thoms.) — Elbf. (*C. u.* - Reitt. vid. - *G.*) — *H. N.* —

Prionocyphon Redtb.

1. **serricornis** Müll. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. - Samml.
Bruck — Düssdf. - Samml. Euß — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Hydrocyphon Redtb.

1. **deflexicollis** Ill. — Neandertal, Nev. (*C.*) — H. Venu (Fred.)
— Ahrw., Bleialf [le Roi], St. (R.) — *H. W. N.* —

Scirtes Ill.

1. **hemisphaericus** L. — Rhp. (*F.*) -- Aach., Kref., Düssdf.
(*B.*) — Bonn, Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

Eubriini.

Eubria Latr.

1. **palustris** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Belg., *H.W.N.* —

Dryopidae.

[*Potamophilini.*]

Potamophilus Germ.

acuminatus F. — *F.* für Homberg [Pliester] - in *B.* I. 142
nicht aufgenommen. — Bei Rotterdam u. in *W.* je 1. —]

Dryopini.

Dryops Ol. = **Parnus** F.

[*striatopunctatus* Heer -- Col. Neerl. für Rhp. mit ? — Bei
Frankfurt - 1 - [*N.* 187] —]

1. **viennensis** Heer — Aach., Kref. (*F.* - *vienn.* Dahl.) —
Ahrtal, Laach. See (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Siegburg (R.) — *H. W.* —

2. **lutulentus** Er. — Kref. (vom Bruck - *F.*) — Hild. H. (*G.*)
— Siegburg, Soon (R.) — *H. W. N.* —

3. **auriculatus** Geoffr. = **prolifericornis** F. — Aach., Kref.,
Düssdf., Laach. See (*F.*) — Elbf. (*C.* - auch *niveus* Heer) —
Siegmdg., Pulvermaar, Ulmener Maar [le Roi], Nettetal, St. (R.)
— *H. W. N.* —

4. **luridus** Er. — Hild. H. (G.) — Ahrtal (Fuß u. Heyd.) — *H. W. N.* —

[**griseus** Er. — B. I. 139 als zieml. häufig an der Ahr - in Samml. Fuß nicht daher - nicht *W. N.* - *H. u.* sonst im Norden. —]

5. **Ernesti** Gozis = **auriculatus** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - auric. Ill.) — Elbf. (C.) — Siegburg, Weinfeld. Maar [le Roi], Laach. See, Nettetal, Wiedtal (R.) — *H. W. N.* —

6. **nitidulus** Heer — Elbf. (C. u. G.) — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

Helichus Er.

1. **substriatus** Müll. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

Helminthini.

Stenelmis Duf.

1. **canaliculata** Gyll. — Duisb. (Heinem. - F.) — Hochdahl, i. d. Düssel (1 - Geilenk. - G.) - Belegst. in Samml. Corn. — *W.* —

2. **consobrina** Duf. — Kob.-Lützel (1 - Bockl.) — Nettetal u. Kob. (je 1 - R.) — *N.* [Nassau a. d. Lahn - Buddeberg.] —

Limnius Müll.

1. **tuberculatus** Müll. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

Esolus Muls.

1. **angustatus** Müll. — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

2. **parallelepipedus** Müll. — Bopp. (B.) — Elbf. (Corn. - C.) — Col. Neerl. noch Ahrtal — *W. N.* —

3. **pygmaeus** Müll. — Elbf. (Corn. - C.) — von der Ruhr in Samml. Bruck mit Müll. vid. — *W. N.* —

Latelmis Reitt.

1. **Perrisi** Duf. = **Germari** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (1 - Bockl.) — *W. N.* —

2. **Volckmari** Pz. — Aach. (Fürst. - F.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) - in der Düssel (G.) — *H. W. N.* —

3. **opaca** Müll. — Ruhrtal (B.) — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. - Ahrw. (1 - R.) — *H. W. N.* —

4. **Müllerii** Er. — Elbf. (Corn. - C.) — Bernkastel, Kochem, Winningen (Reitt. vid. - R.) — *H. N.* —

Riolus Muls.

1. **cupreus** Müll. — Elbf. (Corn. - C.) — Düssdf. (Col. Neerl.) — Laach. See [1 - Voigt] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Helmis Latr.1. **Maugei** Bed.v. **Megerlei** Dft. — Ahrw., Laach. See, Elztal (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —v. **aenea** Müll. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck mit Müll. vid. — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — H. Venn [le Roi], Ahrw., Nettetal (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —[**Macronychus** Müll.]**quadrituberculatus** Müll. — *B. I.* 146: am Rhein — Zebe für Rhp. — Schnur für Trier. — Nicht nachweisbar. — In *N.* - 1 —]**Georyssidae.****Georyssus** Latr.1. **crenulatus** Rossi — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *pygmaeus* F.) — Elbf. (1 - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 - Bockl.) — Gerolstein, U. Nahe, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —**Heteroceridae.****Heterocerus** F.1. **obsoletus** Curt. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) — Laach. See (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — *H. N.* —2. **marginatus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —3. **fenestratus** Thunb. = **laevigatus** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp., Kob. (*B.*) — Nev. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Winningen (1 - Andr.) — Siegburg, Oberwerth, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —4. **fusculus** Ksw. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Brohltal (Andr.) - Hubenth. vid. — *H. W. N.* —[**pulchellus** Ksw. — *F.* für Aach. [Först.] u. Kref. [vom Bruck] - von *B. I.* 151 nicht aufgenommen. — Nicht *H. W. N.* - anscheinend [Ganglb. Käf. M.] nur die Typen von Leipzig bekannt - die mit ? bezeichneten, nicht ausgefärbten Belegst. der Samml. Bruck hält Reitt. für *fenestratus*. —]5. **hispidulus** Ksw. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher nicht in Samml. Bruck — Lippetal (*B.*) — *H. W. N.* —[**sericans** Ksw. — *F.* für Bonn [v. Rantzau] - nicht *H. W. N.* - von Bonn nicht wieder bekannt geworden. —]

Dermestidae.

Dermestini.

Dermestes L.

1. **vulpinus** F. — Rhp. (F.) — Aach., Kref., Bopp. (B.) - Bopp. in Samml. Bruck — nicht Elbf., wie B. angibt, nicht in C. — Soon (1 - v. Geyr) — H. W. N. —
2. **Frischi** Kugel. — Soon (v. Geyr) — Bonn (R.) — H. W. N. —
3. **murinus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, St., Söbernheim (R.) — H. W. N. —
4. **laniarius** Ill. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — U. Solg. (G.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —
5. **undulatus** Brahm — Aach., Kref., Düssdf. (F. - tessellatus F.!) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (B. II. 282 - tess. Ill.) — U. Solg. (G.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Soon (v. Geyr) — Brodenbach (R.) — H. W. N. — Hierhin der tess. F. von Aach. u. Kref. in Col. Neerl. —
6. **bicolor** F. — Bopp. (B.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — W. N. —
7. **lardarius** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Attagenini.

Attagenus Latr.

1. **Schäfferi** Hbst. — Aach., Bopp. (F.) — nicht Elbf., wie in B., nicht in C. — Kob. (Bockl. u. R.) — W. N. —
2. **piceus** Ol. — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn [1 - Frings], Kob. (R.) — H. W. N. —
- a. **megatoma** F. — Aach. (Först. - F.) — U. Ahr (Heyd.) —
3. **pellio** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Megatomini.

Megatoma Sam.

1. **undata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Neuenahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Globicornis Latr.

1. **marginata** Pk. — Duisb. (1 ♂ - Urb.) — Ahrw. (Fuß) — Kref. [1 ♂ - Ulbr.] in Samml. R. — W. N. —
- [**corticalis** Eichh. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Col. Neerl. für Jülich. — Beschrieben von Hilchenbach in Westf. [Berl. E. Z. 63 S. 437], Jülich der spätere Wohnort von Eichhoff. — Aus Rhp. nicht angegeben, noch in den Samml. —]
2. **nigripes** F. — Elbf. (G.) — U. Nahe (1 - Heyd. vid. - R.) — N. —
3. **fasciata** Fairm. — Düssdf. (Hildebr. - Kraatz [vid. !], Berl.

E. Z. 68) - daher in Samml. Fuß — Kob. (1 - Schilsky vid. - R.) — Sonst noch nicht in Deutschland - Frankreich [Ganglb. Käf. M.] —

Trogoderma Latr.

1. **nigrum** Hbst. = **glabrum** Hbst. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63) - U. Ahr (Heyd) — Andernach, Wiedtal (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Ctesias Steph.

1. **serra** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf., Nev. (*C.*) — Bonn, Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

Anthrenini.

Anthrenus F.

1. **pimpinellae** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Wesel (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**festivus** Rosh. — *G.* gibt 2 aus Samml. Stachelhausen stammende niederbergische Stücke an mit: Fundort vielleicht unrichtig. — Letzteres wohl unzweifelhaft - Westl. Mittelmeer [Ganglb. Käf. M.] —]

2. **scrophulariae** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **verbasci** L. — Rhp. (*F.* - varius *F.*) — Elbf. (*C.*) -- *H. W. N.* —

4. **museorum** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

5. **fuscus** Ol. — Düssdf. (*F.* - claviger Er.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck u. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Trinodini.

Trinodes Latr.

1. **hirtus** F. — Aach., Düssdf. (*F.*) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

[Orphilini.]

[Orphilus] Er.

niger Rossi = **glabratu**s F. — Everts, D. E. Z. 92, für Kref. - geht auf vom Bruck zurück [Vorbemerkg. V], in dessen Samml. nicht aus Rhp. — Im Süden u. Osten von Deutschland. —]

Nosodendridae.

Nosodendron Latr.

1. **fasciculare** Ol. — Aach., Kref., Düssdf., Duisb. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Düssdf. in Samml. Fuß — Horchheim (Mühlf.) — U. Nahe (2 - R.) — *H. W. N.* —

Byrrhidae.

Limnichini.

Limnichus Latr.

1. **pygmaeus** Stm. — Aach. (B. I. 295) — C. für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. ist sericeus, den C. nicht anführt - Reitt. vid. — *H. W. N.* —

2. **sericeus** Dft. — Aach., Düssdf. (F.) — Kref. (B. I. 410) — Elbf. - Samml. Corn. als pygmaeus - daher auch in Samml. Fuß — Tönnisstein (Hubenth. vid. - R.) — *H. W.* —

Byrrhini.

Simplocaria Marsh.

1. **metallica** Stm. — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. verloren. Nicht *H. W. N.* - in Col. Neerl. bezweifelt - doch in C. der Fundort als bemerkenswert hervorgehoben, u. Nord- u. Mitteleuropa u. a. [Ganglb. Käf. M.] —

2. **semistriata** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Morychus Er.

1. **aeneus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Wesel (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W.* —

Pedilophorus Steff.

1. **nitidus** Schall. = **nitens** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — U. Solg. (G.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

[**auratus** Dft. — F. für Aach. [Forst.] - nach B. I. 409 schon zweifelhaft - nicht *H. W. N.* - Osteuropäer. —]

Cytillus Er.

1. **sericeus** Forst. — Rhp. (F. - varius F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Byrrhus L.

1. **fasciatus** Forst. — Rhp. (F. u. B.) — Elbf. (C.) — Wesel (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. subornatus Reitt. — Bonn (1 - Reitt. vid. - R.) —

2. **arietinus** Steff. — Elbf. (1 - Hubenth.) in Samml. R. — St. (Reitt. vid. - R.) — *N.* —

3. **pustulatus** Forst. — Aach., Kref. (F. - dorsalis F.) — Elbf. (C) — Kob. (Preiß) — Bonn, St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **pilula** L. — Rhp. (F) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **luniger** Germ. — Düssdf. (1 - Fuß) — Elbf. (Geilenk.) — Belegst. Heyd. vid. — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

6. **glabratus** Heer = **ornatus** Pz. — Kref. (vom Bruck - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Belegst. Heyd. vid. — *H. W. N.* —

[**signatus** Pz. — *C.* für Elbf. [Corn.] als im Winterlager am Fuß von Eichen zieml. selten. — Nicht *H. W. N.* - alpine Art - unter den 6 Belegst. der Samml. Corn. kein signatus - Heyd. vid. —]

Porcinolus Muls.

1. **murinus** F. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Wesel (Gabr.) — *H. W. N.* —

Syncalypta Steph.

1. **paleata** Er. — Duisb. [1 - Urb.] in Samml. R. - Belegst. Hubenth. vid. — Belg. [Ev. vid. - Col. Neerl.], Darmstadt - von Scriba in Samml. Bruck - Hubenth. vid. —

2. **setigera** Ill. — Aach. (Först. - *F.*) — Kob. (Wirtgen - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

3. **spinosa** Rossi — Kref. (vom Bruck - *F.*) — Kob. (Wirtgen - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Horchheim (1 - Mühlf.) — Sayntal (1 - R.) — *H. W. N.* —

Dascillidae.

Dascillus Latr.

1. **cervinus** L. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Ahrw., Laach. See (je 1 - Fuß) - Laach. See (1 - R.) — *H. W. N.* —

Elateridae.

Agrypnini.

Adelocera Latr.

1. **quercea** Hbst. — Bopp., in einer rotfaulen Eiche, zahlreich (*B. II. 411* - *varia* F.) — *N.* —

Lacon Lap.

1. **murinus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Ludiini.

Corymbites Latr.

1. **virens** Schrk. — Trier (1 - Mühlf.) — Eupen (1 - Brink) — H. Venn b. Hockay in Belgien (1892 u. 1903 je 1 - Fred.) - von.

Hockay Ev. vid. [Col. Neerl.] — Hertogenwald (mehrsach. Heym.) — Sonst Süddeutschl. u. Alpen [Schilsky II.] —

v. inaequalis Ol. — *F.* für Homberg [Pliester - aulicus Pz.] — als Einzelfund eines etwa eingeschleppten Stücks möglich. —

2. pectinicornis L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — Kob. (Bockl.) — Gerolstein, Kottenforst, Soon (R.) — *H. W. N.* —

3. Heyeri Saxes. — Eupen (Heym.) — H. Venn (Fred.) - Hockay u. Gileppe i. Belgien [Sammel. Everts - Col. Neerl.] — *N.* —

4. cupreus F. — H. Venn (Fred.) - dort, Elsenborn (R.) — Eupen (Heym.) — Erbeskopf (Reichensp.) — *W. N.* —

v. aeruginosus F. — Nev. (de Rossi - *C.*) — H. Venn (Fred.) - dort, Elsenborn (R.) — Eupen (Heym.) — *W. N.* —

5. purpureus Poda — Rhp. (*F.* - haemotodes F.) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

6. castaneus L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Brink) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

7. tessellatus L. = **siaelandicus** Müll. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. assimilis Gyll. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf., Hild. H. (G.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

Diacanthus Latr.

1. impressus F. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Ahrw. (Fuß) — Bonn (Verhoeff) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

a. rufipes Schilsky — Elbf. (Geilenk., D. E. Z. 92) — Trier (Mühlf.) —

2. nigricornis Pz. = **metallicus** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - *C.*) — *H. W. N.* —

3. aeneus L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — St. (R.) — *H. W. N.* —

a. germanus L. — Hild. H. (G.) — Kref. - Samml. Bruck — *W. N.* —

4. latus F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. saginatus Mén. — Elbf. (*C.* - Milo Germ.) — Nev. (de Rossi - *C.* - gravidus Germ.) — Kref. - Samml. Bruck — *W. N.* —

5. cruciatus L. — Kref., Linz (*F.*) — Engers (*B.*) — Kleve (Fuß) — Saarl. (Gabr.) — Blumslay - 1 - von einem Koblenzer Sammler gfd. (R.) — *H. W. N.* —

6. bipustulatus L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - Limonius bip.) — Elbf. (*C.*) — Bonn - je 1 - Samml. Bertkau u. R. — Altenahr (1 - Bockl.) — Hertogenwald [1 - Heym.], *H. W. N.* —

7. affinis Pk. — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — H. Venn (Fred.) — Ahrw. (Fuß) — *W. N.* —

8. incanus Gyll. = **quercus** Gyll. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — H. Venn (Fred.) — Montjoie, Sayntal, Vallendar (R.) — *H. W. N.* —

— **angustulus** Ksw. — Fred. für H. Venn - Finder Putzeys u. Chapuis [Ann. Belg. 11, S. 95 u. 14, S. 57] - Hockay u. Baraque Michel [Samml. Everts - Col. Neerl.] - sicher auch im deutschen Teil des H. Venn. — *W.* —

Prosternon Latr.

1. holosericeus Ol. — Rhp. (F.) — Elbf. (G. - tessellatus L.) - in C. übersehen gewesen — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Orithales Ksw.

-- **serraticornis** Pk. — *F.* für Aach. [Fürst.] - ein aachener, jedenfalls Förstersches Stück in Samml. Bruck ist Limon. minutus, zwei Krefelder Stücke dort sind auch nicht serratic. - Reitt. vid. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. anscheinend verloren, jetzt Diac. incanus - Heyd. vid. — Nicht *H. W.*, in *N.* —

Hypoganus Ksw.

1. cinctus Pk. -- Aach., Kref., Saarbr. (B.) — Elbf. (C. u. G.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — St. (1 - R.) — *H.* — Hierhin jedenfalls *F.* mit Athous inunctus Pz. für Aach., Düssdf. [cf. Kiesenw., Ins. D. IV. 299]. —

Sericus Eschsch.

1. brunneus L. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - auch fugax F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
2. subaeneus Redtb. — Nev. (1 - de Rossi - G.) — *W.* —

Dolopius Eschsch.

1. marginatus L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Agriotes Eschsch.

1. aterrimus L. — Aach., Kref., Düsseld. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

2. gallicus Lac. — Aach., Kref., Bopp. (B.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Soon (v. Geyr) — U. Nahe, Trier (R.) — *H. W. N.* — In *F.* als Limonius ruficornis Ahr. angeführt. —

3. ustulatus Schall. — Düssdf. (F. - gilvellus Zieg. - B. II. 47) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. flavicornis Pz. — Saarl. u. Mosel (Gabr.) —

a. sputator Redtb. — Mosel (Gabr.) —

4. **pilosus** Pz. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Siegmdg., Ahrw., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **acuminatus** Steph. = **sobrinus** Ksw. — Düssdf., Bopp. (B. II. 422) — Elbf. (Corn. - C.) — St. (1 - Schwarz vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **pallidulus** Ill. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - Adrastus umbrinus Germ. - B. II. 422) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **sputator** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B. - graminicola Redtb.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

8. **lineatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

9. **obscurus** L. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Ahrw., St. (R.) — *H. W. N.* —

Ludius Latr.

1. **ferrugineus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) - Kref. (Ulbr.) — Werl (v. Hagens - G.) — Bonn, in Mehrzahl (Frings) - daher in Samml. R. — *H. W. N.* —

Synaptus Eschsch.

1. **filiformis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Siegmdg., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Adrastus Eschsch.

1. **limbatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. verloren — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

v. **axillaris** Er. — Kref. - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Kob., St. (je 1 - K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

[**lacertosus** Er. — B. II. 52 für Kref. - in den in Betracht kommenden Samml.: Bruck lacert. mit Candèze vid. nicht aus Rhp., Mink ebenso nicht [Lange]. — *N.* —]

2. **nitidulus** Marsh.

a. **lateralis** Hbst. — Aach. (Fürst. - F.) — *H.* —

a. **pallens** Er. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - pall. F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **rachifer** Geoffr. = **nanus** Hbst. — Aach. (Fürst. - F. - pusillus F.) — Bopp. (B. - pus. F.) — Kref. - Samml. Bruck — Laach. See, Kob., U. Nahe (Schwarz vid. - R.) — *H. N.* —

4. **montanus** Scop. = **humilis** Er. — Elbf. (G.) — Kref. - Samml. Bruck — Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

Cardiophorini.

Cryptohypnus Eschsch.

1. **riparius** F. — Düssdf. (F.) — Ahrw. - Samml. Fuß — H. Venn

(Fred. - Druckfehler *Cryptorhynchus*) — Elztal, Kob., St. (R.) — *W. N.* —

Hypnoidus Steph.

1. **quadripustulatus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — *H. W. N.* —

2. **pulchellus** L. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. **dermestoides** Hbst. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —

v. **tetraphagus** Germ. — Ahrtal (B.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *N.* —

4. **meridionalis** Lap. = *lapidicola* Germ. — Aach. (Fürst. - F. - lapid. Westerh.) — Ahrtal (B.) - Ahrw. (R.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —

5. **minutissimus** Germ. — Düssdf. (F. - min. Parr.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kob., St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Cardiophorus Eschsch.

1. **gramineus** Scop. — Kref., Düssdf., Bopp. (F. - thoracicus F.) — Elbf. (G.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **ruficollis** L. — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Borbeck (G.) — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

3. **rufipes** Geoffr. — Bopp. (B.) — Ahrw. (Fuß) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Elztal, St. (R.) — Belg., N. —

a. **atripes** Buyss. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß - u. Elbf. - 1 - Samml. Corn. — Heyd. vid. omn. — *N.* —

4. **nigerrimus** Er. — Bopp. (B.) — Düssdf. (1 - Geilenk.) - Belegst. Heyd. vid. — Ahrw. (Fuß) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Kochem, St. (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**atramentarius** Er. — Fuß, Berl. E. Z. 61 - 1 - für Ahrw. - Belegst. erwies sich als a. atripes Buyss. - Heyd. vid. — Cat. Col.: Südeuropa. —]

5. **asellus** Er. — Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92) — Duisb. (1 - Urb.) - jetzt in Samml. R. - Heyd. vid. — *H. N.* —

[**musculus** Er. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. in Samml. Corn. ist a. atripes Buyss. - Heyd. vid. — Doch *W. N.* —]

6. **cinereus** Hbst. — Bopp. (B.) — U. Solg. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal, Kochem, St. Goar, St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **equiseti** Hbst. — Aach. (Fürst. - F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (G.) — *H. W. N.* —

[**rubripes** Germ. — F. für Elbf. [Corn.] - nicht in C. - auch Südosteuropäer. —]

Elaterini.

Melanotus Eschsch.

1. **rufipes** Hbst. = *castanipes* Pk. — Rhp. (F.) — Elbf. (C. - Verh. d. Nat. Ver. Jahrg. LXVIII. 1911.

ruf. et cast.) — Duisb. (Urb.) — Bonn (Verhoeff) — Bernkastel (Gabr.) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **crassicollis** Er. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Wesel (Beckers, D. E. Z. 92) — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — *W.* —

3. **punctolineatus** Pel. = niger F. — Rhp. (*F.*) — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — *H. W. N.* —

4. **brunnipes** Germ. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bonn, St. (R.) — *W. N.* —

Idolus Desbr.

1. **picipennis** Bach — H. Venn (Fred.) - Hockay u. Hertogenwald [Ann. Belg. 11 S. 95] — Kref. - Samml. Bruck - Heyd. vid. — *W. N.* —

Betarmon Ksw.

1. **ferrugineus** Scop. — U. Nahe (1 - Heyd. vid. - R.) — *N.* —

Procraerus Reitt. = **Megapenthes** Ksw.

1. **tibialis** Lac. — H. Venn (Fred.) - Hertogenwald, Gileppe [Ann. Belg. 11 S. 95, 18 S. 57] — Kottenforst (1 - Reitt. vid. - R.) — *W. N.* —

Ischnodes Germ.

1. **sanguinicollis** Pz. — Bonn (von Bertkau - Heyd.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *W. N.* —

Elater L.

1. **cinnabarinus** Eschsch. = lythropterus Germ. — Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Horchheim (Reichensp.) — Siegmdg., Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **sanguineus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **praeustus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. u. Hild. H. (*C.* u. Geilenk.) — Bonn, St. (R.) — *W. N.* —

— **pomonae** Steph. — Bei Roermond [Col. Neerl.], sonst in *H.* u. in *N.* - wohl in Rhp. noch aufzufinden. —

4. **sanguinolentus** Schrk. — Aach., Kref., Düssdf., Winningen (*F.* - ephippium *F.*) — Elbf. (*G.*) — Siegmdg. (R.) — *H. W. N.* —

5. **ferrugatus** Lac. — Aach., Düssdf. (*F.* - pomorum Schev.) — Bopp. (*B.* - pom. Geoffr.) — Elbf. (*C.*) — Kochem, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **elongatus** F. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

7. **balteatus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **nigroflavus** Goeze = crocatus Lap. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - croc. Ziegl.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

9. **elegantulus** Schönh. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — W. N. —
 10. **nigrinus** Pk. — Elbf. (Corn. - C.) — St. (1 - Heyd. vid. - R.) — W. N. —

11. **nigerrimus** Lac. — Kleve - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — H. N. —

12. **Megerlei** Lac. — Bopp. (B. II. 415) — W. N. —

Limonius Eschsch.¹⁾.

1. **pilosus** Leske — Aach., Kref., Düssdf. (F. - nigripes Gyll.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

2. **aeruginosus** Ol. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - cylindricus Pk.) — Nev. (de Rossi - C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

3. **minutus** L. — Homberg, Ürdingen (F.) - von Homberg [Pliester] auch beschrieben als forticornis Hoffmg. in litt. B. II. 34 — Nev. (de Rossi - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — St. (1 - R.) — H. W. N. —

4. **parvulus** Pz. — Aach. (Fürst. - F. - mus Ill.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

Pheletes Ksw.

1. **aeneoniger** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - Bructeri F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Brohltal, Vallendar (R.) — H. W. N. —

2. **quercus** Ol. — Bopp. (B. II. 34 - lythrodes Germ.) — Elbf. (1 - C.) — St. (R.) — W. N. —

Athous Eschsch.

— **rufus** Deg. — F. für Kref. [Mink] u. Düssdf. [Braselm.] - 1 in Samml. Mink ohne Fundort (Lange) - von Kref. nicht in Samml. Bruck - vom Vorkommen bei Düssdf. weiß Fuß nichts. — Nicht H., in W. gfd. —

1. **villosum** Geoffr. = **rhombeus** Ol. — Kleve - 1 - Samml. Fuß — Eupen (Heym.) — Altenahr (1 - Bockl.) — H. verbr. - N. —

2. **hirtus** Hbst. = **porrectus** Thoms. — Köln (Kraatz, D. E. Z. 79 S. 376) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — Bonn, Brohltal (Heyd. vid. - R.) — A. hirtus Hbst. in F., angegeben für Aach., Kref., Düssdf., Bopp., umfaßt, wie noch in B. II. 30, den niger mit. — H. W. N. —

1) Lim. murinus Stm., in F. für Homberg [Pliester], blieb ungedeutet. —

3. **niger** L. = **deflexus** Thoms. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck - laesus Germ. — Kob. (Bockl.) — Soon (v. Geyr) — Bleialf [le Roi], M.-Gladbach, Laach. See, St. (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. **scrutator** Hbst. — Aach. (Först. - F.) - daher, von Montjoie, in Samml. Först. — Eupen (Heym.) — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

— **mutilatus** Rosh. — Col. Neerl. für Düssdf. - in Samml. Hagens ohne Fundort (Dom. Hag.) — *N.*, nicht *H. W.* —

— **puncticollis** Ksw. — *C.* für Nev. [de Rossi] - Samml. de Rossi zerstreut. — 1 bei Roermond [Col. Neerl.], nicht *W. N.* —

4. **vittatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **haemorrhoidalis** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **subfuscus** Müll. — Rhp. (F) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **zebei** Bach — Eupen, häufig (Heym.) — *W. N.* —

8. **longicollis** Ol. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Siebengbg. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Prüm [Reichensp.], Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Denticollini.

Denticollis Pill. = **Campylus** Fisch.

1. **rubens** Pill. — Nev. (2 - de Rossi - C.) — Eupen (Heym.) — Bertrich [1 - Frings] in Samml. R. — *W. N.* —

2. **linearis** L. — Rhp. (F. - mesomelas F.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. ♀ **mesomelas** L. — Elbf. (G.) — Bonn [Frings], Kochem, Elztal (R.) — *W. N.* —

Cerophytidae.

Cerophytum Latr.

1. **elateroides** Latr. — Ürdingen (Stollwerck - F.) — Bopp., Saarbr. (B.) — Kref. - Samml. Bruck — Düssdf. (Fuß, Berl. E. Z. 67) — Siegmdg., U. Nahe (R.) — *H. N.* —

Eucnemidae.

Melasini.

Melasis Ol.

1. **buprestoides** L. — Aach., Düssdf. (F.) - Düssdf. u. Essen

(Geilenk.) — Bopp., Saarbr. (B.) — Duisb. (Urb.) — Blumsley
(1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Soon (1 - v. Geyr) — H. W. N. —

Isorhipis Lac. = Tharops Lap.

1. **melasoides** Lap. — Düssdf. (Brasel. - F.) — daher - 1 -
in Samml. Bruck. — N. —

Eucnemini.

Eucnemis Ahr.

1. **capucina** Ahr. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Sieg-
mdg., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

Dromaeolus Ksw.

barnabita Villa — Col. Neerl. für Jülich mit? - Quelle [Eich-
hoff?] nicht ermittelt. — N. —]

Trixagini.

Trixagus Kugel. = Throscus Latr.

1. **dermestoides** L. — Rhp. (F.) — Aach., Kref., Düssdf. (B.
I. 295) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —
2. **carinifrons** Bonv. — Ahrw. (B. I. 520) - Ahrw., Kleve -
Samml. Fuß — Elbf. (Corn. - C.) — H. W. N. —

[**exul** Bonv. — Redtb., Fauna Austr., für Ahrw. [v. Heyden] -
nach dem Befunde der Samml. v. Heyden unrichtig [Heyd.
briefl.] —]

Drapetes Redtb.

— **biguttatus** Pill. — Von Siegen, jenseits der Gebietsgrenze,
in Samml. Bertkau. — Da W. N., sicher auch im Gebiet. —

Buprestidae.

Buprestini¹⁾.

Dicerca Eschsch.

1. **berolinensis** Hbst. — Dudweiler, am brennenden Berg
1 ♂ von Ingenieur Albrecht aus Saarbr. gfd. - Belegst. Hubenth.
vid. — F. für Bopp. [Bach] - trifft nach B. II. 3. u. 396 alni. —
N. —

2. **alni** Fisch. — Bopp. (1 - B. II. 3. u. 396) — N. —

Buprestis L. = Ancylochira Eschsch.

1. **rustica** L.

a. **bisornata** Fleisch. — Mülheim b. Kob., in einem Eichen-
stumpf (1 - Bockl.) - Belegst. Hubenth. vid. — W. —

1) Chalcophora mariana Lap., in W. N., fehlt anscheinend
in Rhp. —

Eurythyrea Sol.

1. **scutellaris** Ol. — Bopp. (1 - *B.* - carniolica Hbst.) — *N.* —

Anthaxia Eschsch.

1. **cichorii** Ol. — Bopp., Kob. (*B.*) — Ahrtal (Fuß, Heyd., Geilenk.) — Bonn (1 - R.) — *N.* —

2. **millefolii** F. — Bopp., Kob. (*B.* II. 404) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 60) - Belegst. K. Dan. vid. — *W. N.* —

— **inculta** Germ. — *B.* II. 17 u. Bach, Berl. E. Z. 58, je 1 für Bopp. - Beschreibung des ♂ trifft inculta, die des ♀ unzweifelhaft millefolii, Geschlecht der Fundstücke, und damit Vorkommen der Art ungewiss. — *N.* —

3. **candens** Pz. — Bopp., Kob. (*B.* Ent. Kl. u. II. 17) — Blumslay (1 - Bockl.) — Essen (1 - G.) — *N.* —

4. **salicis** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Siegmdg. (Reichensp.) — Herrstein, Saarl. (Heyd.) — Soon (v. Geyr) — *W. N.* —

5. **nitidula** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - auch laeta F.) — Elbf. (*C.*) — Nev. (G.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

6. **funerula** Ill. — Bopp. (*B.* II. 404) — *N.* —

7. **sepulchralis** F. — Bopp. (*B.* II. 18 u. 405 - umbellatarum F.) — Beuel einmal in Menge (Frings) - Belegst. in Samml. R. - K. Dan. vid. — (Kobern - 1 - Bockl.) — *N.* —

8. **quadripunctata** L. — Düssdf. (*F.*) — Elbf., Nev. (G.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

9. **Godeti** Lap. — U. Ahr (1 - Heyd.) — *N.* —

Polycestini.

Ptosima Sol.

1. **undecimmaculata** Hbst. — Bopp. (*B.* II. 6) — Blumslay b. Winningen, vereinzelt, jedes Jahr (Bockl.) - daher in Samml. R. — *N.* —

a. **sexmaculata** Hbst. — Blumslay mit der Stammform (Bockl.) - daher in Samml. R. —

Chrysobothrini.

Chrysobothris Eschsch.

[**chrysostigma** L. — Schilsky II. für Rhp. — Quelle nicht ermittelt. — Nicht *H. W. N.* —]

1. **affinis** F. — Bopp., Saarbr. (*B.*) — Blumslay, in Menge (Bockl.) — Siebengbg. [Frings], Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

Agrilini¹⁾.**Coraebus** Lap.

1. **undatus** F. — Bopp. (*B.*) — F. für Ürdingen [Stollwerck] — *N.* —

1) Im Cat. Col. Trachydini; dazu Everts, D. E. Z. 1910 S. 535.

Agrilus Curt.

1. **Guerini** Lac. — Von Saarl., wo in Mehrzahl gfd., erhalten (M. Quedenfeldt, Ent. Nachr. 1885 Nr. 18) — Aus Rheinland von Rechnungsrat Degenhardt in Wiesbaden mit der Angabe „von einem Förster in Rheinland gesammelt“ in Samml. Koltze (Hagedorn briefl.) - jedenfalls auch Saarl., wo ein Degenhardt zur Zeit Bachs Oberförster war. — Frankreich, u. bei Metz [Schilsky briefl.] —

2. **sexguttatus** Brahm — Beuel [1 - Frings] - in Samml. Fuß — Kob. (1 - Bockl.) — N. —

3. **biguttatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C. - pannonicus Pill.) — Wesel (Gabr.) — Kleve (Reichensp.) — Bonn (1 - R.) — H. W. N. —

4. **sinuatus** Ol. — Bopp. (B.) — Kleve, Bonn, Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — H. N. —

— **subauratus** Gebl. — F. für Aach. [Först.] — Nicht H. W., in N. —

5. **viridis** L. — Düssdf. (F.) — Elbf. (1 - Geilenk. - C.) — Ahr-tal (Fuß, Berl. E. Z. 61, u. Geilenk.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

a. **linearis** F. — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr (Heyd.) — W. N. —

a. **nocivus** Ratzb. — Aach. (Först. - F.) — Kref. (Ratzb. det. - B. II. 11.) — H. W. N. —

a. **fagi** Ratzb. — Aach., Bopp. (F.) — Jülich (Samml. Heyd.) — Kob. (Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — H. W. N. —

6. **chrysoderes** Ab.

v. **obtusus** Ab. — U. Ahr (1 - Heyd.) — N. —

7. **coeruleus** Rossi — Aach., Düssdf. (F. - cyanescens Ill.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Bonn (R.) — H. W. N. —

[**betuleti** Ratzb. — B. Ent. Kl. für Bopp. - in der Fauna II. 11 nicht für Rhp. — Doch N. —]

8. **Robertii** Chevr. = **pratensis** Ratzb. — Bopp. (B.) — Elbf. (C. u. G.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Bonn (Fuß) — H. W. N. —

9. **elongatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - tenuis Ratzb.) — Müddersheim (v. Geyr) — H. W. N. —

10. **angustulus** Ill. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - auch olivaceus Gyll.) — Kob. (B.) — Ahrw. (Fuß u. Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

v. **rugicollis** Ratzb. — Bopp. (B. II. 14) — W. —

11. **laticornis** Ill. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Kob. [Bockl.] in Samml. R. — H. W. N. —

12. **olivicolor** Ksw. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — *H. W.*
N. —

13. **derasofasciatus** Lac. — Winningen (Bockl.) — Pfaffen-dorf b. Kob., in Weinbergen häufig (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. - K. Dan. vid. — *N.* —

14. **cinctus** Ol. — Ahrtal, Kob., Bopp. (B. II. 402. 493 - canaliculatus Bach) - Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Herrstein (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — *N.* —

[**binotatus** Gory — *F.* für Bergheim [Stollwerck] - in *B.* nicht für Deutschland - Südeuropäer. —]

15. **aurichalceus** Redtb. — Kreuzn. - 1 - in Samml. Bruck unter hyperici - Belegst. K. Dan. vid. — *N.* —

16. **integerrimus** Ratzb. — Bopp., Kob. (B. II. 12) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 61 u. Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Schmitten-höhe (Mühlf.) — Soon (v. Geyr) — Kreuzn. - Samml. Bruck — *W. N.* —

17. **hyperici** Creutz. — Kob., Kreuzn. - Samml. Bruck - Belegst. K. Dan. vid. — *N.* —

Cylindromorphus Ksw.

1. **filum** Gyll. — U. Nahe (1 - Heyd. vid. - R.) — *W. N.* —

Trachyini.

Aphanisticus Latr.

1. **emarginatus** Ol. — Aach. (Fürst. - *F.*) - Belegst. verloren. — *H. W. N.* —

[**elongatus** Villa — *F.* für Aach. [Fürst.] - in *B.* nicht für Deutschland - in Samml. Fürst. der Namenszettel, doch hat dabei nie ein Stück gesteckt. — Nicht *H.*, in *N.* —]

2. **pusillus** Ol. — Aach. (Fürst. - *F.*) - daher u. Kreuzn. je 1 in Samml. Bruck - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Trachys F.

1. **minuta** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **pygmaea** F. — Aach. (Fürst. u. Kaltenbach - *F.*) — Win-ningen (1 - Bockl.) — *W. N.* —

3. **troglodytes** Gyll. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß — St. (1 - R.) — *H. N.* —

4. **pumila** Ill.

v. **scrobiculata** Ksw. — Kreuzn. - 2 - Samml. Bruck als v. *minor* — Saarl. (Gabr.) — Heyd. vid. omn. — *N.* —

Habroloma Thoms.

1. **nana** Hbst. — Bopp. (Bach - *F.*) — *W. N.* —

Lymexylidae.

Hylecoetus Latr.

1. **dermestoides** L. — Aach., Bopp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — H. Venn (Fred.) - Eupen (Brink) — Kob. (Bockl.) — Kottenforst, in Menge (Frings) — Soon (R.) — *H. W. N.* —

v. ♂ **Marci** L. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. - Heyd. vid. — Elbf. (Geilenk.) — Eupen, Duisb. (Heym.) —

v. ♂ **morio** F. — Elbf. (Geilenk.) — Eupen, Duisb. (Heym.) — **[flabellicornis** Schneid. — *C.* für Elbf. [1 - Stachelhausen - flab. Udd.] - Belegst. [jetzt] in Samml. Corn. ist das Stück der v. Marci. — Nicht *H. W. N.* - anscheinend nur im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

Lymexylon F.

1. **navale** L. — Düssdf. (F.) - daher in Samml. Fuß — Elbf. (G.) — Kref. - Samml. Bruck — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — *H. W. N.* —

Bostrichidae.

Bostrychus Geoffr. = **Apate** F.

1. **capucinus** L. — Aach., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Linz (Heyd.) — Blumsay, Kob. (Bockl.) — Eupen (Brink) — Trier (Mühlf.) — Soon (v. Geyr) — Bonn, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

Xylonites Lesne.

1. **retusus** Ol. = **sinuatus** F. — Ahrw. (Fuß) — Blumsay, Kob. (Bockl.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Saarl. (Heyd.) — Bonn (R.) — *N.* —

Lyctidae.

Lyctus F.

1. **linearis** Goeze = **canaliculatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **pubescens** Pz. = **bicolor** Com. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (G.) — Ahrw. (1 - Fuß) — Bonn (1 - R.) — *H. N.* —

[brunneus Steph. — Ahrw. - 12 - aus Stöcken aus Cubarebe (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Elbf. (1 - Stachelhausen - G.) — Jedenfalls durch den Handel eingeführt [Kiesw., Ins. D. V. 17] - so *H.* —]

Ptinidae.

Gibbiini.

Gibbium Scop.

1. **psylloides** Czemp. — Bonn, in einem Garten (1 - R. - um 1879) - ebendort im Kottenforst [1 - Reichensp. - 1908] in Samml. R. — N. —

Ptinini.

Niptus Boield.

1. **hololeucus** Fald. — Düssdf., Köln (B. II. 443) — Kref. (Ulbr.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Elbf. (C.) — Bonn - Samml. Fuß — Kob. (Bockl. u. Heyd.) — Bonn [Frings] in Samml. R. — Fremdling, doch eingebürgert. — H. W. N. —

2. **unicolor** Pill. = crenatus F. — Aach., Düssdf. (F. u. B. - Ptinus crenatus F.) — Elbf. (C. - griseofuscus Deg.) — Kref. - Samml. Bruck — St. (1 - R.) — H. N. —

Ptinus L.

1. **lichenum** Marsh. — Duisb. (Heinem. - F. - fuscus Dej.) - in B. II. 442 = ornatus Müll. — Niederlahnstein, jenseits der Gebietsgrenze (1 - Reitt. vid. - R.) — H. W. —

2. **rufipes** Ol. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrtal (Fuß u. Heyd.) — Horchheim (Mühlf.) — U. Nahe, St., nicht Kochem, wie Beitr. I (R.) — H. W. N. —

3. **fur** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — H. W. N. —

4. **pusillus** Stm. — Elbf. (2 - Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Reitt. vid. — H. W. N. —

5. **bicinctus** Stm. — (2 - Corn. - C.) - Belegst. verloren. — Kochem in R. Beitr. I. beruht auf Bestimmungsfehler. — H. W. N. —

6. **latro** F. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — H. W. N. —

7. **brunneus** Dft. — Elbf. (Corn. - C.) — Nev. (de R.) — Bonn (Verhoeff) — St. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

a. **testaceus** Boield. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. - Belegst. Reitt. vid. — Kref. - 1 - Samml. Bruck - test. Ol. - mit Kiesw. vid. —

[v. **hirtellus** Stm. — F. für Elbf. [Corn. - hirt. Zieggl.] - nicht in Verz. C. —]

8. **pilosus** Müll. — Elbf. (1 - Corn. - C. - in F. pallipes Megl.) - Belegst. Kiesw. vid. nach W. 178 — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65) - Belegst. Heyd. vid. — W. N. —

9. **subpilosus** Stm. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kochem (2 - Heyd. vid. - R.) — W. N. —

[**Spitzyi** Villa — Elbf. (1 - Kiesw. vid. - C.) - eingeschleppt - Südeuropäer. —]

10. sexpunctatus Pz. — Aach. (Först. - F.) — Bopp. (B.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65) - Belegst. Heyd. vid. — Bonn, in verlassenen Immenbauten (Verhoeff) — Horchheim (1 - Mühlf.) - Belegst. Hubenth. vid. — *W. N.* —

11. variegatus Rossi — *B.* II. 96 für Elbf. - nicht in Verz. *C.* — Kob.-Lützel, zahlreich (Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — Nicht *H. W. N.* - wohl eingeschleppt und eingebürgert. —

12. raptor Stm. [= bidens Ksw. nec. Ol. - Schisky II.] — Elbf. (1 - Corn. - C. - rapt. Stm.) - Belegst. der Samml. Corn. nicht mehr bestimmbar, doch von Kiesw. bestimmt gewesen [bidens Ol.! - *W. 179*] — *F.* noch für Aach. [Först. - rapt. Stm.] - Belegst. verloren. — Beide Angaben in *B.* II. 443. 96 bei bid. Ol., der Südeuropäer. — In Deutschland verbr. [Schilky II.] —

[**nitidus** Dft. — Zebe für Rhp. - nicht *H. W. N.* —]

Anobiidae.

Hedobiini.

Hedobia Stm.

1. imperialis L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. regalis Dft. — Ahrw. (Fuß) -- Trier u. häufig in Gaswasser bei Horchheim (Mühlf.) — Kochem (1 - R.) — *W. N.* —

Dryophilus Chevr.

1. pusillus Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

Priobium Motsch.

1. excavatum Kugel. — die Art.: *F.* für Aach., Kref., Düssdf. [*castaneum* Kugel.] - in *B.* II. 444. 101 cast. Ol. u. cast. F. — Aach. nicht in Samml. Först., Kref. nicht in Samml. Bruck. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. aus Samml. Corn. nicht mehr sicher bestimmbar, doch nicht *excav.* [Schilsky vid.] — *G.* für Elbf. [Drescher u. Ostheide] - Belegst. nicht erreichbar. — Eichh., Berl. E. Z. 66 für Jülich - trifft v. Eichhoffi. — *W. N.* —

v. Eichhoffi Seidl. — Faun. Baltic. 1891 nach dem Eichhoff'schen Funde von Jülich beschrieben - ist var. [Hubenth. briefl. und demnächst in Küst. Käf. Eur.] — Witten [Fügner] —

2. tricolor Ol. — Elbf. - Samml. Geilenk. - Hubenth. vid. — *H.*, Norddeutschl. u. a. [Schilsky II.] —

Gastrallus Duv.

1. *laevigatus* Ol. — Kob. (1 - Schilsky vid. - R.) — *H. W.* —

Xestobium Motsch.

1. *plumbeum* Ill. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Nev. (de R., Westf. Pr 98) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. N.* —

a. *aeneicolle* Bach — Bopp. (B. II. 105) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. N.* —

2. *rufovillosum* Deg. — Rhp. (F. - tessellatum F.) — Elbf. (C.) — Jülich (von Eichh. - Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Ernobiuss Thoms.

1. *nigrinus* Stm. — Elbf. (2 - Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — Arenberg b. Kob. (Hubenth. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[*longicornis* Stm. — Everts, D. E. Z. 92, für Kref. - geht auf vom Bruck zurück [Vorbermerkg. V] - die long. von Kref. in dessen Samml. sind aber mollis - Schilsky vid. — Doch *H. W. N.* - daher wohl noch aufzufinden. —]

— *angusticollis* Ratzb. — *F.* für Aach. [Fürst.] - in *B. II.* 106 nicht für Rhp. - doch *H. W.* —

2. *abietinus* Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Kiesw. vid. — *N.* —

— *Mulsanti* Ksw. — Beckers, D. E. Z. 92, für die Ahr. — Nicht *H. W. N.* - scheint südliche Art. —

3. *abietis* F. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck. — Nach Kiesw. Ins. D. V. 123 hätte Bach diese Art nicht angeführt, die Beschreibung in *B. II.* 106 mit Fundorten Aach., Düssdf. ist auch kaum deutbar. — *H. W. N.* —

4. *pini* Stm. — Aach. (Fürst. - F.) — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. — *H. W. N.* —

5. *mollis* L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref., Ahrtal in Samml. Bruck - consimilis Muls. - mit Kiesw. vid. — Nev. (Heyd. vid. - G.) — U. Ahr (Heyd.) — Löhndorf (Hubenth. vid. - Raderm.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Anobium F.

1. *denticolle* Pz. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — Elbf. - Samml. Corn. unter pertinax — Bonn, Elsenborn (R.) — *H. W. N.* —

2. *pertinax* L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Elbf. (C. u. Geilenk.) - Belegst. Hubenth. vid. — Bopp. (B.) — *W. N.* —

— *emarginatum* Dft. — *F.* für Bopp. [Bach] u. Düssdf.

[Braselm. u. Hildebr.] - nur Düssdf. von *B.* aufgenommen. — *N.*, nicht *H. W.* —

3. **striatum** Ol. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* - *domesticum* Fourc.) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr (Heyd.) — Horchheim (Mühlf.) - Hubenth. vid. — St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **rufipes** F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Siegmdg. [Frings], Tönnisstein, St. (R.) — *W. N.* —

5. **nitidum** Hbst — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Jülich (Eichh. - Samml. Heyd.) — Kob. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **fulvicorne** Stm. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Jülich (Eichh. - Samml. Heyd.) — Bonn, Kob., Brohltal (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

7. **fagi** Muls. — Düssdf. - Samml. Fuß — Jülich (Eichh. - Samml. Heyd.) — Laach. See (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Oligomerus Redtb.

1. **brunneus** Ol. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 101) — Elbf. (*G.*) — Kref. - Samml. Bruck — *W. N.* —

Sitodrepa Thoms.

1. **panicea** L. — Rhp. (*F.*) — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *minuta* F.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Xyletinini.

Trypopitys Redtb.

1. **carpini** Hbst. — Kob. mehrfach (Reitt. vid. - Bockl. u. R.) — Kottenforst [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Ptilinus Geoffr.

1. **pectinicornis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Siegmdg., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **fuscus** Geoffr. = *costatus* Gyll. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - *G.*) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Xyletinus Latr.

1. **ater** Pz. — Ahrw. (Fuß) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **pectinatus** F. — Kettwig (Mink - *F.*) — Ahrw. (Fuß) — Horchheim (Mühlf.) — Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**laticollis** Dft. — *B.* II. 115. für Kref. - wohl nach vom Bruck - in dessen Samml. nicht aus Rhp. - auch nicht in Samml. Mink (Lange) — Doch *H. N.* —]

Lasioderma Steph.

— **serricorne** F. = *testaceum* Dft. — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] - nach *B.* II. 116 zweifelhaft, weil Redtb. [d. h. Bestimmungswerk] den test. Dft. verkannt

habe. — Nicht in Samml. Bruck - noch Samml. Hildebr. (Miss. Steyl). — *H. N.* —

1. **Redtenbacheri** Bach — Kref. - Samml. Bruck mit Kiesw. vid. — *N.* —

Ochina Steph.

1. **ptinoides** Marsh. = *hederae* Müll. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kochem, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Mesocoelopus Duv.

1. **niger** Müll. — Bopp. (*B.* II. 116) — St., vom Epheu der Fustenburg (R.) — *H. W. N.* —

Dorcatoma Hbst.

1. **flavicornis** F. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) - Kref. u. Bopp. in Samml. Bruck mit Kiesw. vid. — Kob. (1 - Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

2. **chrysomelina** Stm. — Düssdf. (*B.*) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — *H. N.* —

3. **dresdensis** Hbst. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Kiesw. vid. — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

4. **serra** Pz. — Kref. - Samml. Bruck mit Kiesw. vid. — Düssdf. (Först. - Kraatz, Berl. E. Z. 71 S. 147) — *W. N.* —

Caenocara Thoms.

1. **bovistae** Hoffm. — Aach. (Först. - *F.*) — Laach. See - Samml. Bruck mit Kiesw. vid. — *H. W. N.* —

2. **affinis** Stm. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Kiesw. vid. — Nicht *H. W. N.* — Mitteleuropa [Cat. Col.] —

Oedemeridae.

Anoncodes Dup.

[**rufiventris** Scop. — *F.* mit ? für das Siebengebirge, ohne Finder — *B.* für Bonn. — Von beiden Orten nicht wieder bekannt geworden u. sicher unrichtig. — *N.* —]

1. **ustulata** F. — Kob. (1 - Bockl.) — Vom bayrischen Alsenztal über Kreuzn., U. Nahe bis St. nicht bes. selten (R.) — *N.* —

Ischnomera Steph.

1. **sanguinicollis** F. — Bonn (Först. - *F.*) — Bopp. (*B.* III. 269) — Trier (Mühlf.) — *W. N.* —

2. **coerulea** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Chrysanthia Schmidt.

1. **viridissima** L. — Bopp. (B.) — Bonn (Verhoeff) — Soon (v. Geyr) — *H. W. N.* —

2. **viridis** Schmidt — Elbf. (G.) — Löhndorf (Raderm.) — Kob., Winningen (Bockl.) — Soon (v. Geyr) — Ehrang [le Roi], Trier (R.) — *H. W. N.* —

Oncomera Steph.

1. **femorata** F. — Siebengbg. - 1 - Samml. Bertkau — Blumsay (1 - Bockl.) — Kochem, St. (je 1 - R.) — *N.* —

Oedemera Ol.

1. **flavipes** F. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Blumsay (Bockl.) — Kottenforst [Frings], Alf, Manderscheid (R.) — *H. W. N.* —

2. **podagrariae** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **flavescens** L. — Aach., Montjoie (Fürst. - F.) — Düsseldf. (Hildebr. - F.) — Belg. b. Engihoul [Ev. vid. - Col. Neerl.], *W. N.* —

4. **subulata** Ol. — Neandertal (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Vallendar, Kob., Kochem (R.) — *H. W. N.* —

5. **tristis** Schmidt — Herrstein in Birkenfeld (B. III. 271) - jedenfalls nach Tischbein - dessen Samml. anscheinend verloren, nicht im Oldenburgischen Landesmuseum - doch nicht zweifelhaft, da in dem ähnlichen Gebiet des H. Venn [von Hockay im belg. Museum - Ev. vid. - Col. Neerl.] — Nicht *H. W. N.* - Schwarzwald [Seidl., Ins. D. V. II. 950] —

6. **nobilis** Scop. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - coerulea F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **virescens** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **lurida** Marsh. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Pythidae.

Pythini.

Pytho F.

1. **depressus** L. — Dinslaken (Beckers - Samml. Heyd.) — Duisb. (Fischer) - Duisb. (2 - Bockl.) — Essen u. Borbeck (Geilenk.) — Kref., Düssdf. (Mitteilgg. Vereins für Naturkunde zu Krefeld, 1909) - Kref., Weihnachten 1910 mit der a. castaneus F. über 200 (Ulbr.) — In Westf. nach W. 308 seit 1881 öfter gefunden und wahrscheinlich aus dem Norden - mit norwegi-

schem Nadelholz? - eingeschleppt und eingebürgert. — Aus Rhp. noch nicht in *F.* u. *B.* - da in *H.* verbr., Einwanderung daher und aus Westf. anzunehmen. —

Salpingini.

Lissodema Curt.

1. **quadripustulatum** Marsh. — Aach., Kref. (*F.* - denticolle Gyll. u. *quadriguttatum* Lep.) — Nev. (de Rossi - *C.*) — H. Venn (Fred.) — Kleve - Samml. Fuß — Saarl. (Gabr.) — St. (1 - R.) — *H. W. N.* —

Sphaeriesthes Steph.

— **ater** Pk. — *C.* für Elbf. [Corn.] - die zahlreichen Belegst. der Samml. Corn. sind Reyi - Seidl. vid. — de R., Verh. Nat. Ver. 82, für Nev. - Samml. de Rossi zerstreut - vermutlich auch Reyi, wie vielfach die älteren Angaben des ater. — *H. u. W.* angegeben. —

1. **Reyi** Abeille — Elbf. in Samml. Corn. - Seidl. vid. — Ahratal, unter Rinde von Weinbergspählen (Seidl. vid. - Heyd.) — Trier in Samml. Mühlf. - Seidl. vid. — In Schilsky II. noch nicht für Deutschl. - Oldenburg [Hubenth. briefl.] —

2. **castaneus** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Von Elbf. [aus Samml. Corn.], Borbeck [aus Samml. Geilenk.], Bonn u. Kob. [aus Samml. R.] Seidl. vid. — *H. W. N.* —

Rhinosimus Latr.

1. **viridipennis** Latr. — Aach., Düssdf. (*F.* - *ruficollis* Pz.) - Aach. (Urb.) — Bopp. (*B.* III. 280 - *ruficeps* Bose). — Von Elbf. [aus Samml. Corn.], Borbeck [aus Samml. Geilenk.] Seidl. vid. — *H. W. N.* —

2. **ruficollis** L. — Kref., Düssdf. (*F.* - *roboris* F.) — Duisb. (*B.* u. Urb.) — Elbf. (*C.* u. Geilenk.) - Seidl. vid. — Kob. (1 - Seidl. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **planirostris** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Seidl. vid. — Elbf. (*C.* u. Geilenk.) - Seidl. vid. — Saarl. (Gabr.) — Kleve [le Roi], Laach. See, Kob., St. (Seidl. vid. part. - R.) — *H. W. N.* —

[**aeneus** Ol. — Col. Neerl. für Elbf. - nach der Angabe von Corn. in W. 195 - durch Verz. C. berichtigt. —]

Mycterini.

Mycterus Ol.

1. **curculionoides** F. — Bopp., Herrstein in Birkenfeld (*B.* III. 278) — *N.* —

Pyrochroidae.

Pyrochroa Geoffr.

1. **coccinea** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf., Nev. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Siegmdg., Kottenforst, Kob., Kochem (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **serraticornis** Scop. = *rubens* Schall. — Siegmdg., Kob., Kochem, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **pectinicornis** L. — Aach. (Först. - *F.*) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Brink) — Kottenforst [Frings], Soon (*R.*) — *W. N.* —

Euglenidae.

Euglenes Westw.

— **pygmaeus** Deg.

v. **oculatus** Pz. — Col. Neerl. für Düssdf. - nicht in Samml. Hagens (Dom. Hag.) — Belg., *W. N.* —

1. **nigrinus** Germ. — Düssdf. - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Hubenth. vid. — Duisb. (1 - Hubenth. vid. - Urb.) — *H. N.* —

Anthicidae.

Notoxus Geoffr.

1. **monocerus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — Hild. H. (*G.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

a. **latemaculatus** Pic. — Kob.-Laubbach (1 - jetzt in Samml. Heyd. - *R.*) — Frankreich [Cat. Col.] —

2. **brachycerus** Fald. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - major Dej.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C. u. G.*) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *W. N.* —

3. **cornutus** F. — Aach., Düssdf., Laach. See, Bopp. (*F.*) — U. Nahe, einmal in Menge an mit Aphiden besetzten Pflanzen (*R.*) — *W. N.* —

[**Formicomus** Laferté.

pedestris Rossi — *F.* für Kref. [vom Bruck] - schon nach *B.* III. 284 zweifelhaft - daher auch nicht in Samml. Bruck. — Im Süden. —]

Anthicus Pk.

1. **humilis** Germ. — Kreuzn. (v. Heyden - *F.*) - dort, Theodorshalle, unter den alten Gradierhäusern nicht selten (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **floralis** L. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Siegmdg. [Frings], Kob., Elsenborn (R.) — *H. W. N.* —

3. **quisquilius** Thoms. [von Gerh., Berl. E. Z. 08, wieder von *floralis* getrennt] — Kref. - 1 - Samml. Bruck unter flor. - Hubenth. vid. — *H.* —

4. **antherinus** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **bifasciatus** Rossi — Kob. - 1 - aus Genist nach Moselhochwasser (Bockl.) — nahe Vallendar in einem Garten (Gabr.) — *N.* —

6. **flavipes** Pz. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — U. Solg. (G.) — Kob. (Bockl. u. Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn (1 - R.) — *H. N.* —

7. **bimaculatus** Ill. — Aach. (Fürst. - F.) - von *B.* nicht aufgenommen, doch sicher richtig. — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Hild. H. (Geilenk.) — Kob., aus Moselgenist (Mühlf.) — *H., N.* [Mombacher Sand.] —

8. **sellatus** Pz. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — U. Solg. (G.) — Oberwerth (Mühlf.) — Niederwerth (1 - R.) — Nicht *H. W. N.* - über ganz Deutschland [Schilsky II.] —

Meloidae.

Meloini.

Meloë L.

1. **proscarabaeus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **violaceus** Marsh. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **decorus** Brandt — Bopp. (2 - B. III. 260 - pygmaeus Redtb.) — *N.* —

[**coriarius** Brandt — Col. Neerl. für Rhp. - nur *N.* —]

5. **variegatus** Donov. — Kref., Düssdf., Bopp. (B.) — Neanderthal (1 - C.) — Godesberg (G.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

6. **brevicollis** Pz. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (F.) — Elbf., U. Solg. (G.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

7. **rugosus** Marsh. — Bopp. (B. III. 259) — Wiedtal, Mitte Oktober (R.) — *H. N.* —

8. **scabriusculus** Brandt — Bopp. (B.) — Godesberg (G.) — Hild. H. (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Zonabrini.

Cerocoma Geoffr.

1. **Schaefferi** L. — Laach. See (vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck. — Nicht wieder aufgefunden, vielleicht infolge der Tieferlegung des Sees verschwunden. — *H. W. N.* —

Lyttini.

Lytta F.

1. **vesicatoria** L. — Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Ahr (R.) — *H. W. N.* —

Rhipiphoridae.

Metoecus Gerst.

1. **paradoxus** L. — Düssdf. (1 - Fuß u. B. III. 255) — Jülich (Eichh. - W. 192). — Bonn (1 - Frings), jetzt in Samml. R. — *H. W. N.* —

Mordellidae.

Mordellini.

Tomoxia Costa.

1. **biguttata** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - bigutt. Zieg.). u. **sericea** Ziegl. — Aach., Bopp. (B. - bigutt. Casteln.) — Elbf. (1 - C.) — Belg., *W. N.* —

Mordella L.

1. **fasciata** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrtal, Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. **coronata** Costa — U. Ahr (Heyd.) —

a. **villosa** Schrk. — Bopp. (B. III. 247) — Kreuzn. - 1 - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Rheinufer b. Kref. (1 - Ulbr.) jetzt in Samml. R. - Schilsky vid. — Westf., Hessen u. a. [Schilsky II.] —

2. **aculeata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Mordellistena Costa.

1. **abdominalis** F. — Rhp. (F.) — Aach., Kref. (F. - ventralis F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Siebengbg. (Urb.) — Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **humeralis** L. — Düssdf. (Hildebr. - F. - flavescent Marsh.) — Belg., *W. N.* —

a. **axillaris** Gyll. — Aach. (Fürst. - F.) — Kref. (vom Bruck - F.) - daher nicht in Samml. Bruck. — Doch Westf. [Erichs. vid. - W. 191] —

3. **lateralis** Ol. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *variegata* F.) — Bopp. (*B.* III. 249. 361) — Elbf. (*C.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

4. **neuwaldeggiana** Pz. — Aach., Kref. (*F.* - *brunnea* Dej.) - Aach. (Urb.) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, U. Nahe, St. (R) — *H. W. N.* —

5. **parvula** Gyll. — Bopp. (*B.* - auch *pusilla* Redtb.) — H. Venn (Fred.) — Rhens (1 - Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **micans** Germ. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — *W. N.* —

7. **pumila** Gyll. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) - 1 aus Samml. Corn. Schilsky vid. — Kreuzn. - Samml. Bruck — Oberstein (Heyd.) — Bonn, Laach. See, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

8. **stenidea** Muls. — Oberstein, auf Malven (Heyd.) — *N.* —

Anaspidini.

[**Cyrtanaspis** Em.

phalerata Em. — *B.* in Ent. Kl. für Bopp. - in der Fauna III. 252 nicht für Rhp. — *N.* —]

Anaspis Geoffr.¹⁾.

[Die An. der Samml. R. von Schilsky revidiert.]

1. **frontalis** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Schilsky vid. — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Elztal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **lateralis** F. — Ahrtal, Bopp. (*F.*) — Elbf. (2 - *C.*) — Winningen (Bockl.) — *W. N.* —

2. **pulicaria** Costa — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — *H. N.* —

3. **thoracica** L. = *confusa* Em. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Schilsky vid. — Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92) — Jülich (Gabr.) — *H. W. N.* —

4. **ruficollis** F. — Aach., Ahrtal, Bopp. (*F.* - *rufic.* Stm.) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (1 - *G.*) — Moseltal (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **Emeryi** Rag. — St. (R.) —

5. **Regimbarti** Schilsky — Bonn, Ahrw., Kob. (R.) — Normandie. —

[*arctica* Zett. — *F.* für Aach. [Fürst.] u. Düssdf. [Hildebr.] - schon nach *B.* III. 253 zweifelhaft „die untersuchten rheinischen Stücke gehören nicht zu der Art“ - ebenso nach Schilsky, D. E. Z. 94 S. 332. — Ein Fürstersches Stück von Aach. in Samml.

1) An. *clypeata* Er., in *F.* für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet. —

- Bruck ist *flava* a. *thoracica* Em. - Schilsky vid. — Nicht *H. W. N.*, insbes. nicht *H. Venn.* — Nordeuropa u. a. [Cat. Col.] — [*latipalpis* Schilsky — Cat. Col. 06 für Rhp. - nur Rheinbayern u. a. [Schilsky briefl.] —]
6. **Geoffroyi** Müll. — Aach. (*F.* - auch *humeralis* F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
 - a. **quadrimaculata** Costa — St. (R.) — *N.* —
 7. **maculata** Geoffr. — Aach., Kref. (*F.* - auch *obscura* Gyll.) — Bopp., häufig (*B.* - *obscura* Marsh.) — Elbf., Nev. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal, Wiedtal (R.) — *H. W. N.* —
 - a. **pallida** Marsh. — Wiedtal (R.) — *N.* —
 8. **flava** L. — Rhp. (*F.* - *flava* F.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Elztal (R.) — *H. W. N.* —
 - a. **thoracica** Em. — Aach. - Samml. Bruck als *arctica* Zett. — Belegst. Schilsky vid. — *N.* —
 9. **Costae** Em. — Elztal (R.) — *H. N.* —
 10. **rufilabris** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *rufil.* Stm.) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Schilsky vid. — *H. W. N.* —
 11. **melanostoma** Costa — Wiedtal, Vallendar, Elztal (R.) — Belg., *W. N.* —
 12. **varians** Muls. — Hild. H. (*C.*) — Elbf. (*G.*) — Oberstein (Heyd.) — Kob., Elztal (R.) — *W. N.* —
 - a. **collaris** Muls. — Oberstein (Heyd.) — *N.* —
 13. **quadrimaculata** Gyll. — Siebengbg., Ahrtal, Brohl, Laach. See (*F.* - *quadripustulata* Müll.) - ob die a. *quadr.* Müll? — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*G.*) — Winningen (Bockl.) — Saarburg (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Melandryidae.

Tetratomini.

Tetratoma F.

1. **fungorum** F. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Soon (R.) — *H. W. N.* —
2. **ancora** F. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *N.* —

Eustrophini.

Eustrophus Latr.

1. **dermestoides** F. — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

Hallomenus Pz.

1. **binotatus** Quens. — Düssdf. (Braselm. - *F.* - *humeralis* F.) — *H. N.* —

[axillaris Ill. — *C.* für Elbf. [1 - Corn. - fuscus Gyll.] - Belegst. ist *Orchesia minor*, die *C.* für Elbf. nicht anführt - Heyd. vid. —]

Orchesiini.

Orchesia Latr.

1. **micans** Pz. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Kref. (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Trier (R.) — Hierhin wohl auch *G.* mit *picea* Hbst. für U. Solg. [v. Hagens] — *H. W. N.* —

2. **minor** Walk. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. - Belegst. Heyd. vid. — Kref. - 1 - Samml. Bruck — Sayntal (1 - R.) — *H. W. N.* —

3. **undulata** Krtz. — Eupen, an Buchenschwämmen (6 - Heym.) — *N.* —

[**fasciata** Pk. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] - in Samml. Mink fehlend (Lange) - Samml. Bruck nicht aus Rhp. — *W. N.* —]

Serropalpini.

Anisoxya Muls.

1. **fuscula** Ill. — Jülich (Eichh. - Seidl. Ins. D. V. II. 514) — Belg., *W. N.* —

Abdera Steph.

1. **affinis** Pk. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Düssdf. (Fuß) — *N.* —

2. **flexuosa** Pk. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Kref. (Geilenk.) - Düssdf. (Fuß) — Elbf. (1 - *C.*) — *H. W. N.* —

3. **triguttata** Gyll. — Nev. (1 - de Rossi - *C.*) — *H. W. N.* —

4. **quadrifasciata** Curt. — Bopp. (1 - v. Hagens, Berl. E. Z. 57) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — H. Venn (Fred.) — Siebengbg. - Samml. Bruck — Belg., *N.* —

Phloeotrya Steph.

1. **rufipes** Gyll. — Barmen (1 - von Kraatz 1853 gefunden - in Samml. Heyd.) — Aach. (Kaltenb. - Verh. Nat. Ver. 1858 S. 91) - daher in Samml. Bruck — Eupen (Heym.) — *H. W. N.* —

2. **Vaudoueri** Muls. — Düssdf. (von Braselm. - in Samml. Heyd.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kref. - Samml. Bruck — Kref., Düssdf. - Samml. Fuß — *H. W. N.* —

Xylita Pk.

1. **buprestoides** Pk. = *laevigata* Pz. — Aach. (Fürst. - *F.*) — Eupen (Heym.) — Düssdf. (B. III. 238) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *W. N.* —

Serropalpus Hellen.

1. **barbatus** Schall. — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) - Belegst. noch

in Samml. Corn. — Nev. (1 - de R., Westf. Pr. 98). — Nicht W. N., in H. [wohl eingeführt - Col. Neerl.] —

Hypulini.

Hypulus Pk.

1. **quercinus** Quens. — Aach. (Fürst. u. Heinem. - F.) — Düssdf. (Fuß, Berl. E. Z. 67) — St. (1 - R.) — W. N. —

Melandryini.

Melandrya F.

1. **dubia** Schall. — Horchheim (1 - Mühlf.) — Hubenth. vid. — N. [bei Nassau] —

2. **caraboides** L. — Rhp. (F. - serrata F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — M.-Gladbach, Bonn, Laach. See, St. (R.) — H. W. N. —

3. **barbata** F. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61 - flavigornis Dft) - Belegst. Heyd. vid. — W. N. —

Conopalpini.

Conopalpus Gyll.

1. **testaceus** Ol. — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 1867 S. 50) — Ahrw. - Samml. Fuß — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Düssdf., Jülich (Heyd.) — H. W. N. —

v. **flavicollis** Gyll. — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — N. —

2. **brevicollis** Krtz. — Kref., Düssdf., Ahrtal (B. III. 242) — Kref. (Mink - nach Kraatz - Seidl., Ins. D. V. II. 658) — Kob., St. (je 1 - R.) — W. N. —

Osphyini.

Osphya Ill.

1. **bipunctata** F. — Bopp. (B. III. 266) — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 65) — Laach. See (1 - R.) — Mittel- u. Süddeutschland u. a. [Schilsky II.] —

Lagriidae.

Lagria F.

1. **hirta** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — W. N. —

Alleculidae.

Alleculini.

Allecula F.

1. **morio** F. — Aach., Kref. (F.) — Duisb. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — H. W. N. —

[**rhenana** Bach — Niederwald b. Bingen (1 - v. Hagens - B. III. 228) - noch nicht in Rhp. gefunden. — *N.* —]

Prionychus Sol.

1. **ater** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Kob. (2 - Bockl.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **melanarius** Germ. — Ahrw. in Samml. Fuß - Belegst. Seidl. vid. — Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92 - laevis Küst.) — daher unzweifelhaft, nicht von Rheydt, wie Seidl. Ins. D. V. II. 69 anführt, dem Wohnort des Finders Beckers, in Samml. Schilsky. — Frankreich, Mitteldeutschl. u. a. [Seidl. l. c.] —

[**Fairmairei** Reiche — Fuß, Berl. E. Z. 65, für Ahrw. [1] - trifft wie Seidl. l. c. S. 71 vermutete, melanarius - Belegst. aus Samml. Fuß Seidl. vid. — Frankreich [Seidl. l. c.] —]

Hymenalia Muls.

1. **rufipes** F. — Kreuzn. - 2 - Samml. Bruck — *H. N.* —

Gonodera Muls.

1. **ceramboides** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (B. III. 230) — Elbf. (1 - *C.*) — Kottenforst [Frings], St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **luperus** Hbst. — Aach. (*F.* - fulvipes F.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See (Stammform - R.) — *H. W. N.* —

a. **ferruginea** F. — Laach. See (R.) — *N.* —

a. **castanea** Marsh. — Kochem, Laach. See (R.) —

3. **murina** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Mycetochara Berthold.

1. **flavipes** F. — Kref. (*B.*) - daher u. Ahrtal in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *W. N.* —

2. **axillaris** Pk. — Düssdf. - Samml. Fuß — Linz (1 - R.) — *W. N.* —

v. **morio** Redtb. — Kleve (Fuß) — *W. N.* —

3. **humeralis** F. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (Corn. - *C.* - bipustulata Ill.) — *H. W. N.* —

4. **linearis** Ill. — Rhp. (*F.* - barbata Latr.) — Düssdf., Bopp. (B. - brevis Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Tönnisstein, Trier (R.) — *H. W. N.* —

Omophlini.

Cteniopus Sol.

1. **sulphureus** L. = *flavus* Scop. — Bopp., Trier (B.) —

Kobern, Elztal selten, Blumslay, nicht selten (Bockl.) — *H. W. N.* —

a. sulphuratus Gmel. = *bicolor* F. — Blumslay (Bockl.) — Belegst. Heyd. vid. — *N.* —

Omophlus Sol.

1. **lepturoides** F. — Herrstein i. Birkenfeld (*B.*) - daher (Heyd.) — Staudernheim [le Roi] in Samml. R. — Soon (v. Geyr) — St. (Heyd. vid. - *R.*) — Süddeutschl. u. a. —

2. **rufitarsis** Leske — Herchenbergskopf b. Burgbrohl (1 - Fuß, Berl. E. Z. 62 - *pubescens* L.) - Nomenkl. Ins. D. V. II. 287 — *H. N.* —

3. **lividipes** Muls. = *picipes* Redtb. — Kreuzn. - Samml. Bruck — dort auch (*R.*) - Belegst. Heyd. vid. - u. Münster a. Stein [le Roi] in Samml. R. — Saarl. (Gabr.) — *N.* —

Tenebrionidae.

Asidini.

Asida Latr.

1. **sabulosa** Goeze — Bopp., Kob., Laach. See (*B.* - *grisea* F.) — Brohltal (Fuß) — Hönningen, Konder Berg b. Kochem (Bertkau - Heyd., D. E. Z. 90 S. 212) — Ruine Hammerstein [Bertkau], am Bausenberg, oberes Brohltal (Heyd. l. c.) — Blumslay (Bockl.) — Niedermendig, Illerich b. Kochem, Marienburg b. Alf. (je 1 - *R.*) — am Palmberg b. Bertrich (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — Trier (Mühlf.). — Elsaß [Heyd. l. c.] - sonst Mittelmeer, Frankreich, Schweiz [Ins. D. V. 236] — Daß die Art zwischen Bingen u. Bonn am ganzen Rhein vorkomme, wie *B.* III. 215 mutmaßen möchte, ist nicht wahrscheinlich; sie hat sich von ihrer durch die Funde moselaufwärts bis Trier gegebenen Einwanderungsstraße „dem Moseltal“ aus im Rheintal nur im weiteren Gebiet der Moselmündung, zu dem auch Boppard zu rechnen, verbreitet. —

Blaptini.

Blaps F.

1. **lethifera** Marsh. = *similis* Latr. — Aach. (Först. - *F.* - *fatidica* Ill.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal u. Sinzig (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Trier, St. (*R.*) — *W. N.* —

[**Milleri** Seidl. — R. Beitr. I. für Kleve [1 - Fuß - *reflexicollis* Fisch.] u. als eingeschleppt bezeichnet — Belegst. ist *lethifera* Seidl. vid. —]

— **mortisaga** L. — F. für Aach. [Först], Kref. [Mink u. vom Bruck], Düssdf., Bopp. [Bach] - doch nicht Bopp. (B. III. 220) - nicht Rhp. in Saunml. Bruck - aus neuerer Zeit nicht wieder angegeben. — Vorkommen gegenüber Ins. D. V. 323 zweifelhaft. — N. - für W. angegeben. —

2. **mucronata** Latr. — Aach., Düssdf. (F.) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — N. —

Opatrini.

Melanimon Stev. = Microzoum Redtb.

1. **tibiale** F. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) - Düssdf. in Samml. Fuß — Hild. H., U. Solg. (G.) — Wesel (Gabr.) — H. W. N. —

Opatrum F.

[**riparium** Scrib. — Schilsky Il. für Rhp. - doch nur N. 243. - immerhin möglich. —]

1. **sabulosum** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — Borbeck (Geilenk.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

Crypticini.

Crypticus Latr.

1. **quisquilius** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - glaber L.) — Nev., Hild. H. (C.) — U. Nahe, Kreuzn. (R.) — H. W. N. —

Boletophagini.

Boletophagus Ill.

1. **armatus** Pz. — Düssdf. (Braselm. - F.) - daher (Heyd.) — Bopp. (B.) — N. —

Eledona Latr.

1. **agaricola** Hbst. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Kob. (Bockl.) — H. W. N. —

Diaperini.

Scaphidema Redtb.

1. **metallicum** F. — Aach., Düssdf. (F. - bicolor F.) - Düssdf. (Heyd.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Nettetal, Oberwerth (R.) — H. W. N. —

Diaperis Müll.

1. **boleti** L. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Nettetal, U. Nahe (die Stammform - R.) — H. W. N. —

Platydema Lap.

1. **violaceum** F. — Aach. (Kaltenb. - F.) — Kref. (vom Bruck - F.) - daher in Samml. Fuß — H. W. N. —

2. **Dejeani** Lap. — Düssdf. (Braselm. - F.) - daher in Samml.

Bruck u. Fuß. — Nicht *H. W. N.* - Thüringen u. im Osten [Schilsky II.] —

Pentaphyllus Latr.

1. **testaceus** Hellw. — Düssdf. (Braseltn. - *F.*) — Bopp. (*B.*) - daher in Samml. Bruck u. Fuß — *W. N.* —

Ulomini.

Hypophloeus F.

1. **unicolor** Pill. = *castaneus* F. — Werden (1 - Urb.) - jetzt in Samml. R. — *H. W. N.* —

[**fraxini** Kugel. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Col. Neerl. für Kref., Düssdf. — Beides unzweifelhaft auf Deutung des *Margus ferrugineus* F. in *F.* als ferrug. Creutz., der früher bei *fraxini*, beruhend - Angabe in *F.* trifft aber *Tribolium navale*. — *N.* —]

2. **bicolor** Ol. — Aach. (Heinem. - *F.*) - in *B.* III. 210 ausdrücklich nicht für Rhp. - doch Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 1858 S. 91) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **fasciatus** F. — Bopp. (*B.*) — Düssdf. - Samml. Fuß — *W. N.* —

4. **linearis** F. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher nicht in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

Caenocorse Thoms. = **Palorus** Duv.

1. **depressa** F. — Bopp. (*B.* III. 209) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Tribolium Mac Leay.

1. **navale** F. — Kref. [vom Bruck] u. Düssdf. (*F.* - *Margus ferrugineus* F.) - in *B.* III. 206 *Tribolium* - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (1 - *C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — Soon (1 - v. Geyr) — Siegmdg., mehrfach [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

v. **bifoveolatum** Dft. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H.* —

Gnathocerus Thunb.

1. **cornutus** F. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *H. N.* —

Melasia Muls. = **Uloma** Lap.

1. **culinaris** L. — Aach. (Först. - *F.*) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

Alphitobius Steph.

1. **piceus** Ol. — Bopp. (*B.* III. 206 - *diaperinus* Pz.) — *H. W.* —

Tenebrionini.

Tenebrio L.

1. **opacus** Dft. — Soon b. Ellern (1 - Heyd. vid. - R.) — *N.* —

2. **obscurus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Müddersheim b. Zülpich, massenhaft (v. Geyr) - Belegst. in Samml. R. - Heyd. vid. — *H. W. N.* —

3. **molitor** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Dinslaken, Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Helopinae.

Helops F.

1. **laevioctostriatus** Goeze — Rhp. (F. - caraboides Pz.) — Elbf. (C. - striatus Fourc.) — Oberemmel, Bernkastel (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Viersen [le Roi], M.-Gladbach, Kref., Bonn (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **quisquilius** Stm. — *C.* für Elbf. [Corn. - quisqu. F.] - das einzige noch vorhandene Belegst. der Samml. Corn. ist laeviocostr. - Heyd. vid. — Col. Neerl. für Kref. - in Samml. Bruck daher nur striat. Fourc. mit Allard vid. — Sonst nicht angegeben, noch in Samml. — Nach Seidl., Ins. D. V. 785, anscheinend nur im Osten. —

Cerambycidae.

Spondylini.

Spondylis F.

1. **buprestoides** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Prionini.

Prionus Geoffr.

1. **coriarius** L. — Rhp. (F. - coriaceus F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Rengsdorf, häufig (Frings) — Bonn, Siebengbg., St. (R.) — *H. W. N.* —

Ergates Serv.

1. **faber** L. — Güls, auf der Höhe, u. Kob., im Siechhaustal (je 1 - Bockl.) — Nicht *H. W. N.* - sonst in ganz Deutschland [Schilsky II.] —

[**Aegosoma** Serv.

scabricorne Scop. — Zebe für Rhp. - ebenso Schilsky II. - nicht nachweisbar. — *N. verbr.* —]

Lepturini.

Rhagium F.

1. **sycophanta** Schrk. = **mordax** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **mordax** Deg. = *inquisitor* Pz. — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —
3. **bifasciatum** F. — Kref., Duisb., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —
- a. unifasciatum** Muls. — Duisburger Wald, mehrfach (G.) —
- a. fasciatum** Pic — Duisburger Wald - 1 - Samml. Geilenk. - unter unifasciat. - Belegst. Heyd. vid. — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. - Heyd. vid. —
4. **inquisitor** L. = *indagator* F. --- Rhp. (F.) — Elbf. (1 - G.) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Soon (R.) — Hertogenwald, *W. N.* —

Rhamnusium Latr.

1. **bicolor** Schrk. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) - Aach. (Urb.) — Elbf. (v. Hagens - G.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
- a. glaucopterum** Schall. — St. (1 - R.) — *W. N.*

Oxymirus Muls.

1. **cursor** L. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Soon (R.) — *W. N.* —

Stenochorus F.¹⁾ = **Toxotus** Serv.

1. **meridianus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- **quercus** Goetz — *F.* für Aach. [Fürst. - humeralis *F.*] - Samml Fürst. ergibt nichts — Elbf. [Corn.], wie *F.* angibt, in C. nicht angeführt. — *W. N.* —

[**Pachyta** Steph.

- quadrimaculata** L. — *F.* für Homberg [Pliester] - von *B.* - *Toxotus quadrim.* - nicht aufgenommen. — Unzweifelhaft unrichtig - nicht *H. W. N.* - in den höheren Gebirgen. —]

Acmaeops Leconte.

1. **collaris** L. — Aach., Bonn, Bopp. (F.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Gaurotes Leconte.

1. **virginea** L. — Jünkerath i. d. Eifel (Bockl.) — *W.* —

Pidonia Muls.

1. **lurida** F. — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. Heyd. vid. — Haus Morsbroich b. Schlebusch (1 - Geilenk.). — Nicht *H. W. N.* - Belg. [Col. Neerl.] —

1) *Toxotus dorsalis* Stm., in *F.* für Homberg [Pliester], blieb ungedeutet. —

Leptura L.

1. **rufipes** Schall. — Bopp. (B. III. 53.) — Ahrw. (Fuß) — Löhndorf b. Sinzig (1 - Raderm.) — Winningen (2 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Kochem (1 - R.) — *H. W. N.* —
2. **sexguttata** F. — Düssdf. (F.) — Elbf., Nev. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Eupen (Brink) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **exclamationis** F. — Saarl. (Gabr.) —
3. **livida** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Soon (v. Geyr) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
4. **fulva** Deg. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - tomentosa F.) — Elbf. (C.) — Soon (v. Geyr) — Kref., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —
5. **maculicornis** Deg. — Elb. (Corn. - C.) — Soon (v. Geyr u. R.) — *W. N.* —
6. **rubra** L. — Elbf. (C.) — Löhndorf b. Sinzig (Raderm.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- [**cordigera** Füssl. — *F.* für Homberg [Pliester - hastata F.] - von *B.* nicht aufgenommen. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten. —]
7. **scutellata** F. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Trier (Schnur - *F.*) — Düssdf. (B. u. G.) - daher in Samml. Fuß — Essen (Heym.) — Kob. (1 - R) — *W. N.* —
- **virens** L. — Fred. für H. Venn - im Hertogenwald [Ann. Belg. 27 S. 138 mit „vielleicht eingeschleppt“.] — In den höheren Gebirgen. —
- **sanguinolenta** L. — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Trier [Schnur] - von Kref. nicht in Samml. Bruck - Trier vielleicht richtig. — *H. W. N.* —
8. **cerambyciformis** Schrk. — Rhp. (F. - Pachyta octomaculata F.) — Elbf. (C.) — Soon (v. Geyr) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **quadrimaculata** Scop. — U. Ahr (Heyd.) —
- a. **sexpunctata** Muls. — U. Ahr (Heyd.) —
- [**sexmaculata** L. — *F.* für Düssdf. [Braselm. - Pachyta sexm.] - von *B.* nicht aufgenommen. — Nicht *H. W. N.* - Alpen, Nordeuropa [Cat. Col.] —]
9. **revestita** L. — Aach., Bonn, Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
- a. **rufomarginata** Muls. — Winningen, Kob. (Bockl.) —
- a. **rubra** Geoffr. — Winningen (Bockl.) — Löhndorf b. Sinzig (Raderm.) — Bonn (R.) — *W. N.* —
- [**pubescens** F. — *F.* für Aach. [Fürst.] - Samml. Fürst.

ergibt nichts. — Von *B* nicht aufgenommen - nicht *H. W. N.* - auch nach den Verbreitungssangaben in Münch. K. Z. II 364 sicher unrichtig. —]

10. **aurulenta** F. — Bopp. (1 - *B.* III. 49) — Trier (2 - Mühlf.) — *N.* —

11. **quadrifasciata** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) — H. Venn (Fred.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **interrupta** Heyd. — U. Ahr (1 - Heyd.) — *N.* —

12. **maculata** Poda = *calcarata* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Siebengbg. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **aethiops** Poda — Rhp. (*F.* - *atra* F.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **Letzneri** Gabr. — Saarl., mehrfach (Gabr., D. E. Z. 95 S. 437). —

14. **melanura** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) *H. W. N.* —

15. **bifasciata** Müll. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —

16. **nigra** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Brohltal (R.) — *H. W. N.* —

17. **attenuata** L. — Trier (Mühlf.) - daher in Samml. R. — *H. W. N.*

Alosterna Muls.

1. **tabacicolor** Deg. = *laevis* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Grammoptera Serv.

1. **ustulata** Schall. — Kref. (Mink - *F.* - *praeusta* F.) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Trier (Mühlf.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **ruficornis** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **variegata** Germ. — Aach. (Heinem. - *F.* - *analis* Pz.) — Düssdf. (Ulbr.) — Hild. H. (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — Kochem (1 - R.) — *W. N.* —

Necydalini.

Necydalis L. = **Molorchus** F.

1. **major** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (*F.* - *major* L.) - Kref. in Samml. Bruck - Endenich b. Bonn (Frings) - sonst mögen die Angaben ulmi Chevr., der noch in *B.* III 26 nicht angeführt wird, mittreffen. — Elbf. (1 - Geilenk.) — Ahrw. - Samml. Fuß — *H. W. N.* —

2. **ulmi** Chevr. — Siegmdg. (1 - in Samml. Fuß gelangt - Frings) — Kob. (1 - Preiß) — *H. W. N.* —

Caenoptera Thoms.

1. **minor** L. — Aach. (Först. - *F.*) — Wesel - Samml. Fuß — St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **umbellatarum** Schreb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch *pygmaea* Dej.) — Trier (Mühlf.) — Ahrw., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Marmottani** Bris. — Schilsky II. für Rhp. - doch nur aus *N.* bekannt [*N.* 273] —]

Cerambycini.

Stenopterus Steph.

1. **rufus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (Geilenk. - *C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Callimus Muls.

1. **angulatus** Schrk. — Bonn (Först. - *F.* - *Stenopterus cyanus* F.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Bonn, U. Ahr (Heyd.) — Siebengbg. - Samml. Bruck, nicht Kref., wie jedenfalls nach vom Bruck in Col. Neerl. angegeben — Löhndorf b. Sinzig (Raderni.) — Königsbach b. Kob. (Preiß) — Schmittenhöhe (Mühlf.) — Bonn, am Venusberg dem Ostabhang bis Kessenich, Brohltal (R.) — *W.* [bei Witten], *N.* —

Obrium Curt.

1. **cantharinum** L. — Aach., Düssdf. (*F.* - ferrugineum *F.*) — Neuenahr - 1 - Samml. Bertkau — Remagen (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **brunneum** F. — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — Blumsay u. Kob. (Bockl.) — Bertrich [1 - Frings], St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Leptidea** Muls.

brevipennis Muls. — Kob., in der Stadt, angeflogen (1 - Heyd. vid. - R.) - sicher eingeschleppt. — Holland vereinzelt, in Belgien stellenweise sehr häufig [Everts, D. E. Z. 07 S. 374] —]

Gracilia Serv.

1. **minuta** F. — Rhp. (*F.* - *pygmaea* *F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Cerambyx L.

1. **cerdo** L. = *heros* Scop. — Bopp. (*F.*) -- Elbf. (1 - Geilenk. - *C.*) — Solingen (1 - Oberlehrer Hahne - Frings) — Winningen

(Bockl.) — An den alten Eichen b. Warmsroth-St. (Oberförster Lösch, Stromberg) — *H. W. N.* —

2. **Scopolii** Füssl. = *cerdo* Scop. — Rhp. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Criocephalus Muls.

1. **rusticus** L. — *F.* für Aach., Bonn [Fürst.] - vor Aufstellung des *ferus* Krtz. — Nev. (1 - de R., Westf. Pr. 98) — Kref. (Ulbr.) - daher in Samml. R. — auch aus Rhp. in Samml. Klette (Gabr.) — *H. W. N.* —

2. **polonicus** Motsch. = *ferus* Krtz. — Kref. (1 - Ulbr.) — Löhndorf [1 - Raderm.], Bonn [1 - Fuß], Endenich b. Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — Hubenth. vid. omn. — Belg., *H.* —

Asemum Eschsch.

1. **striatum** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

a. **agreste** F. — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *W. N.* —

Tetropium Kirb.

1. **castaneum** L. — Rhp. (F. - *luridum* L.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

a. **luridum** L. — Duisb. (Heym.) — Bonn, Soon (R.) —

a. **aulicum** F. — Duisb. (Heym.) —

a. **fulcratum** F. — Duisb. (Heym.) — Laach. See, Kochem, St. (R.) —

Phymatodes Muls.

[**glabratu**s Charp. — *F.* für Bopp. [Bach - Callid. gracile Dej.] - in B. III. 319 *castaneum* Redtb. nur für Österreich. —]

— **pusillus** F. — Bonn (1 - vor Jahrzehnten - K. Dan. vid. - R.) - Fundart? - Einschleppung möglich. — Im Kelsterbacher Wald zwischen Frankfurt u. Mainz von Wasserbauinspektor W. Sattler mehrfach 1907 gfd. [Heyd. briefl.] - Mitteleuropa [Cat. Col.] —

1. **testaceus** L. — Rhp. (F. - *variabilis* F.) — Elbf. (C. u. G.) — *H. W. N.* —

a. **variabilis** L. — Elbf. - Samml. Corn. u. G. — Bonn, Kob. (R.) — *W. N.* —

a. **fennicus** F. — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. - Samml. Corn. — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *W. N.* —

a. **analis** Redtb. — Kref. - 1 - Samml. Bruck — Elbf. - 2 - Samml. Corn. — *W. N.* —

2. **alni** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Nev. (de R., Westf. Pr. Verh. d. Nat. Ver. Jahrg. LXVIII. 1911.

98) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr, Saarl. (Heyd.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. *rufipes* F. — Bopp. (B.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — *W. N.* —

Pyrrhidium Fairm.

1. *sanguineum* L. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kref., wofür in *F.* nach Mink u. vom Bruck angegeben, nicht in Samml. Bruck, nur von Elbf. — *H. W. N.* —

Callidium F.

[*aeneum* Deg. — Bonn, an der Holzschniedemühle in der Gronau (1 - Verhoeff) - zwar *N.*, doch nach der Fundstelle sicher eingeschleppt. —]

1. *violaceum* L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (Bockl.) — M.-Gladbach, Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. *minor* Geilenk. [G. 44 beschr.] — Nev. (de Rossi - G. - v. minor de Rossi i. litt.) —

Hylotrupes Serv.

1. *bajulus* L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Rhopalopus Muls.

1. *clavipes* F. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Bonn (von Förster - Heyd.) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 60) - Fundort Altenahr (Fuß) — Gerolstein - 1 - Samml. Bertkau. — *H. W.* —

2. *femoratus* L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Duisb. (Heym.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *W. N.* —

Rosalia Serv.

alpina L. — Kob., auf dem Kirchhof an der Karthause mehrfach vom Kirchhofwärter Krott gefunden (Oberst Schultze vid. - N. 277) - eingeschleppt, wie auch in *N.* - mag sich aber jahrelang halten. — Alpen. —]

Aromia Serv.

1. *moschata* L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C. u. - *autumnalis* Westh. - G.) — Winningen (Bockl.) — Siegmdg., St. (R.) — *H. W. N.* —

Purpuricenus Fisch.

1. *Kaehleri* L. — Bonn, Bopp. (F.) - Bonn, Venusberg (Verhoeff) — *F.* noch für Düssdf. [Braselm.] - wohl verschlagen — U. Ahr, häufig, Larve in Weinbergspfählen (Heyd.) — Sinzig (1 - Andr.) — Königswinter, Rhöndorf, Honnef (Frings) — Blumslay (Bockl.) — Bienhorntal b. Ehrenbreitstein (1 - Rei-

chensp.) - jetzt in Samml. R. — N. - 1 in W., wohl verschlagen. —

Clytini.

Plagionotus Muls.

1. **detritus** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (Corn. - C. - mit: ob in Elbf. einheimisch?) — H. W. N. —
2. **arcuatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

[**floralis** Pall. — G. für Nev. [1 - de Rossi, mit Fundort?] — Nicht H. W. N. - im Süden u. Osten. —]

Xylotrechus Chevr.

— **rusticus** L. — F. für Trier [Schnur - hafniensis F.] — Belg., N. —

1. **arvicola** Ol. — B. III. 19 für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. C. — Kref. (1 - Brink) - Kref. - 1 - Samml. Ulbr. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß — Bonn - 1 - Samml. Bertkau - Heyd. vid. — Belg., H. N. —

[**antilope** Zett. — F. [antil. Ill.] für Bopp. [Bach] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] - in B. III. 20 nicht für Rhp. - von Kref. nicht in Samml. Bruck - in Samml. Mink 1 arvicola als antil. ohne Fundort (Lange) — N. —]

Clytus Laich.

1. **tropicus** Pz. — B. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — Jülich (5 - Eichh., Berl. E. Z. 66) — Blumsay [1 - Bockl.] in Samml. R. — Belg., N. —

2. **arietis** L. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (1 - Heyd. - a. femoralis de Rossi) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

a. **gazella** F. — Aach., Düssdf., Bonn (F.) — Nord- u. Süddeutschl. [Schilsky II.] —

[**rhamni** Germ. — F. für Elbf. [Corn.] u. Homberg [Pliester] - Elbf. nicht im Verz. C., Homb. ohnehin zweifelhaft — de R., Verh. Nat. Ver. 82, für Nev. - schon im Nachtrag dort berichtigt. — Nicht H. N. - in W. vor langen Jahren einmal 1 - wohl eingeschleppt. — Im Süden. —]

Clytanthus Thoms.

1. **varius** F. — Bonn (F. - ornatus F.) - in B. III. 320 = *verbasci* L. — Herrstein i. Birkenfeld (B. III. 21) — Ahrtal - Samml. Fuß u. Heyd. — W. N. —

2. **glabromaculatus** Goeze — F. für Bopp. [Bach - quadri-punctatus F.] - daher nicht in B. III. 22 — Trier (B.) — Bern-

kastel (Oberförster Bauer u. 1886 von Heyden - Heyd.) — Belg., N. —

3. sartor F. = *massiliensis* L. — Bonn, Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Siebengbg. (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — W. N. —

4. figuratus Scop. = *plebejus* F. — Bonn, Laach. See, Bopp. (F.) — Kref. (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn (R.) — W. N. —

Anaglyptus Muls.

1. mysticus L. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Orsoy (Schneid.) — M.-Gladbach, Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

a. hieroglyphicus Hbst. — Elbf. (2 - Corn. - C.) — W. —

Lamiini.

Dorcadiion Dalm.

1. fuliginator L. — Kob. u. Winningen (Wirtgen - F.) — St. (B.) — Blumsay b. Winningen, Ruine Bischofstein gegenüber Burgen, Pommern nahe Kochem, stets wo sich *Sedum album* findet (Bockl.) — St. im Warmsrother u. unteren Dörrebachtal, U. Nahe am Guldenbach, Kreuzn. (R.) — Belg., N. —

Lamia F.

1. textor L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

[**Monochamus** Curt.

sartor F. — Vohwinkel, am Bahnhof (1 - C.) - sicher, wie Corn. vermutet, eingeschleppt. — Nicht W. N., Rotterdam - 1 — Nordeuropa [Cat. Col.] —

sutor L. — ebenso wie **sartor** (1 - C.) - auch eingeschleppt. — Nicht H. W. N. — Nord- u. Mitteleuropa [Cat Col.] —

[**Acanthoderes** Serv.

clavipes Schrk. — Col. Neerl. für Rhp. - aber nur N. 280. — Aus Rhp. in keiner Samml. —]

Acanthocinus Steph.

1. aedilis L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Düssdf. (G.) — Bonn, Kob., Soon (R.) — H. W. N. —

[**reticulatus** Razum. = *costatus* F. — Kob. (1 - Bockl.) - sicher eingeschleppt, da nicht H. W. N. — Mitteleuropa [Cat. Col.] —]

Liopus Serv.

1. nebulosus L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Dinslaken, Bonn, Vallendar, Kochem, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

[**punctulatus** Pk. — Everts, D. E. Z. 92, für Kref. - beruhend auf Angabe von vom Bruck [Vorbemerkg. V] - die beiden Belegst. von Kref. in Sammlung Bruck sind nebulosus - Heyd. vid. — N. —]

Hoplosia Muls.

— **fennica** Pk. — Kob. - 1 - vor langen Jahren von einem holländischen Sammler gefunden, jetzt in Samml. Everts (Ev. briefl.) - zwar N., doch wohl ein verschlagenes Stück, da bei Kob. nicht wieder gefunden. —

Exocentrus L.

1. **lusitanus** L. — Aach. (Först. - *F.* - *balteatus* L.) - daher in Samml. Bruck, nicht auch von Kref., wie Col. Neerl. angeben. — *W. N.* —

Pogonochaerus Gemm.

1. **hispidulus** Pill. — Rhp. (*F.* - *hispidus* F.) — Elbf. (*C.* - *hispidus* Schrk.) — Tönnisstein - Samml. Bertkau — Trier (Mühlf.) — *W. N.* —

2. **hispidus** L. — Rhp. (*F.* - *pilosus* F.) — Bopp. (*B.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **fasciculatus** Deg. — Kref., Bopp. (*F.* - *fascicularis* Pz.) - Düssdf. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — Bonn [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

4. **decoratus** Fairm. — Düssdf. (1 - Ulbr.) — Bonn - 1 - Samml. Bertkau - Belegst. Heyd. vid. — *H. N.* —

5. **ovatus** Goeze — Kref., Bopp. (*F.* - *ovalis* Gmel.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Preiß) — Alf [de Maes aus Bonn], St. (je 1 - R.) — *W. N.* —

Deroplia Rosh.

— Genei Arag. — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 61) - wohl eingeschleppt oder verschlagen. — Nicht *H. W. N.* — Reutlingen [2 - Keller, Stett. E. Z. 62], Harz u. i. Süden [Schilsky II.] —

Haplocnemia Steph. = *Mesosa* Serv.

1. **curculionoides** L. — Bopp. (Bach - *F.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (1 - Bockl.) — Belg., *N.* —

2. **nebulosa** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kob. (Bockl.) — Dinslaken, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

Anaesthetis Muls.

1. **testacea** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Morgenbachthal b. Bingerbrück, U. Nahe (R.) — *W. N.* —

Agapanthia Serv.

[**Dahli** Richt. — *F.* für Rhp. [*cardui* F.] - trifft die bei Aachen

nicht seltene, in *F.* fehlende *villosoviridescens* Deg. — Dahli aus Rhp. nicht in Samml. Först., Bruck, Corn., Fuß, noch irgendwo angegeben, *B.* III. 40 zweifelhaft — doch *W. N.* —]

[*cynarae* Germ. — *F.* für Homberg [Pliester] - schon in *B.* III. 41 bezweifelt - sicher unrichtig - Südeuropa. —]

1. *villosoviridescens* Deg. — Elbf. (Corn. - *C.* - *angusticollis* Gyll.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — H. Venn (Fred.) — Aach. - Samml. Först. — Kref. - Samml. Bruck u. Ulbr. — M.-Gladbach, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

2. *cardui* L. — Bopp. (*B.* - *suturalis* F.) — Kob., Winningen (Bockl.) — Siebengbg., Ahrw., Alf (R.) — *N.* —

3. *violacea* F. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Rheydt (Geilenk.) — Bonn (Verhoeff) — Linz (Heyd.) — Kob. (Mühlf.) — U. Nahe, St. (R.) — *W. N.*

Saperda F.

1. *carcharias* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, am Tannenbusch (Frings) — Kob. (Bockl.) — Siegmdg., Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

[*similis* Laich. — *C.* für Elb. [2] - Belegst. später von Geilenk. untersucht, sind kleine *carcharias* (*G.*) — *N.* —]

2. *populnea* L. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

3. *scalaris* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf., Nev. (*C.*) — Marxloh (Schneid.) — Kob. (Preiß) — Trier (Mühlf.) — Siegmdg., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

[*octopunctata* Scop. — *F.* für Rhp. [*tremulae* F.] - in *B.* III. 35 nicht für Rhp. - auch nicht in Samml. Först., Bruck, Corn., Fuß u. a. — *N.* —]

Tetrops Steph.

1. *praeusta* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Stenostola Muls.

1. *ferrea* Schrk. — Aach., Düssdf., Bonn (*F.* - *nigripes* F.!) - *alboscutellata* Krtz. kommt nicht in Frage. — Barmen (*C.*) — H. Venn (Fred. - *nigripes* F.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — hierhin jedenfalls *F.* mit *Phytoecia ferrea* F. für Aach., Bopp. — *H. W. N.* —

Phytoecia Muls.

[*rubropunctata* Goeze — Schilsky II. für Rhp. - nur Mainz [*N.* 284] —]

1. *pustulata* Schrk. — Aach., Düssdf. (*F.* - *lineola* F.) — Herrstein (Heyd.) — U. Nahe, St. (R.) — *N.* —

2. *ephippium* F. — Aach. (Först. - *F.*) — Kob. (Mühlf.) — Kob., U. Nahe (R.) — Belg., *W. N.* —

3. *cylindrica* L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. *nigricornis* F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — Siebengbg. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Kochem, Winningen (R.) — *W. N.* —

a. *solidaginis* Bach — Düssdf. (*F.* - *echii* Dahl.) — Bopp. (*B.*) - vielleicht nur rechtsrheinisch, woher beschrieben nach *N. 284* — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Winningen (Bockl.) — *N. —*

5. *coerulescens* Scop. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Ruhrort (Geilenk.) — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck — Rodderberg (Dorm.) — Soon (v. Geyr) — Winningen (Bockl.) — U. Nahe, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

Oberea Muls.

1. *pupillata* Gyll. — Bonn (1 - Frings) - jetzt in Samml. Fuß — Honnef (1 - Geilenk.) — Rhöndorf (1 - Frings) - jetzt in Samml. R. — Belg., *N. —*

2. *oculata* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. *linearis* L. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Stommeln (Raderm.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. *erythrocephala* Schrk. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) — U. Solg., Hild. H. (*G.*) — Kref. (Geilenk.) — Remagen, U. Nahe (R.) — *N. —*

Chrysomelidae.

Eupodae.

Donaciini.

Donacia F.

1. *crassipes* F. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Düssdf. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — M. Gladbach (R.) — *H. W. N.* —

2. *clavipes* F. — Rhp. (*F.* - *menyanthidis* F.) — Elbf. (*C.*) — Kref., Rheydt (Geilenk.) — Viersen [le Roi], Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

3. *semicuprea* Pz. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Weise vid. — Hild. H. (Geilenk.) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. —*

4. *dentata* Hoppe — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht in *C.* — *H. W. N. —*

5. versicolorea Brahm — Aach., Kref. (*F.* - *cincta* Germ.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Pulvermaar u. Wahner Haide [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

6. sparganii Ahr. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve - Samml. Fuß — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —

7. aquatica L. — Rhp. (*F.* - *dentipes* F.) — Elbf. (*C.*) — Wahner Haide [le Roi], Bonn, Laach. See, Rheinböllen (R.) — *H. W. N.* —

— brevicornis Ahr. — *F.* für Aach. [Först.] - nicht *H. W. N.* Deutschl. u. a. [Cat. Col.] —

8. impressa Pk. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Pulvermaar [le Roi], Schalkenmehren, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

9. marginata Hoppe = *lemnae* F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* u. *G.* - *limbata* Perr.) — Bonn, Mürmeswiesen [le Roi], Kochem, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

a. vittata Pz. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) - Belegst. Weise vid. (Geilenk. briefl.) —

a. unicolor Westh. — Rheydt [wie a. *vittata*] — Saarl. (Gabr.) —

10. bicolora Zschach. = *sagittariae* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw., Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

11. thalassina Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Ahrtal - 1 - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — Ahrw., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

12. vulgaris Zschach. — Kleve - Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. concolor Westh. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) - Belegst. Weise vid. (Geilenk. briefl.) —

13. simplex F. = *linearis* Hoppe — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Jünkerath (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Gillenfeld, Bonn, Ahrw., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. sanguinea Westh. — Trier (Mühlf.) - Belegst. Reitt. vid. —

14. cinerea Hbst. — Aach., Düssdf. (*F.* - *hydrocharidis* F.) - Aach. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Geilenk. - *C.*) — Kref. (Ulbr.) - daher in Samml. R. — *H. W. N.* —

15. tomentosa Ahr. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *toment.* Ill.) - Kref. in Samml. Bruck — *H. N.* —

Plateumaris Thoms.

1. sericea L. — Rhp. (*F.* u. *B.* III. 59) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Bonn (Kraatz - Weise, Ins. D. VI. 47) — H. Venn (Fred.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Bopp. (R.) — *H. W. N.* —

a. festucae F. — Rheydt (Beckers - Geilenk. u. Heyd.) — Bopp. (R.) — *W. N.* —

a. micans Pz. — Rheydt (Beckers - Geilenk.) — *W. N.* —
a. armata Pk. — Rheydt (Beckers - Geilenk. u. Heyd.) — *W. N.* —

a. nymphaeae F. — Rheydt (Beckers - Geilenk. u. Heyd.) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Bopp. (R.) — *W. N.* —

a. g. Weise — Rheydt (Beckers - Heyd.) — *N.* —

2. discolor Pz. — *C.* für Elbf. [Corn.] - trifft wie schon im Nachtrag zu *W. 1885* angegeben, disc. Hoppe - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — H. Venn (Fred.) — H. Venn u. Gillenfeld, zahlreich (Weise vid. - R.) — Belg., *H.* —

[**braccata** Scop. — *F.* für Düssdf. [Braselm. - nigra F.] - zwar Belg. *H. W. N.*, doch von Düssdf. nicht wieder bekannt geworden, insbes. nicht Fuß, noch Samml. Bruck, noch v. Hagens, noch [Miss. Steyl] Hildebr. —]

3. consimilis Schrk. = *discolor* Hoppe — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf., Nev. (de R.) - Elbf. in Samml. Corn. - Belegst. Weise vid. — Saarl. (schwarze Stücke - Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**v. variabilis** Kunze — *F.* für Elbf. [Corn. - var. Dahl. = *varicolor* Dahl. i. litt.?] - in *C.* nicht angeführt. —]

4. rustica Kunze — Elbf. (*C.* u. *G.*) — H. Venn (Fred.) — Kyllburg (Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. N.* —

5. affinis Kunze — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred. - auch *pallipes* Kunze) — Schalkenmehren [le Roi], Elztal (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

Orsodacnini.

Orsodacne Latr.

1. cerasi L. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. melanura F. — Vallendar (R.) —

a. limbata Ol. — Vallendar (R.) —

a. glabrata Pz. — Elbf. (1 - Geilenk. - *G.*) - Weise vid. — *W. N.* —

a. Duftschmidi Weise — Schmittenhöhe, Vallendar (je 1 - R.) —

Zeugophora Kunze.

1. scutellaris Suffr. — Aach. (Heinem. - *F.*) — Elbf. (*G.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. frontalis Suffr. — Aach. (Först. - *F.*) — *W. N.* —

2. subspinosa F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Turneri** Pow. — Ein Stück im Rheingenist bei Ruhrort (Geilenk., D. E. Z. 92 S. 208) - Belegst. Schilsky vid. - wurde

tot gefunden, als unzweifelhaft eingeschleppt bezeichnet. — Mittel- u. Ostdeutschl. [Schilsky II.] —]

3. **flavicollis** Marsh. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Neuenahr (Heyd.) — U. Ahr (R.) — H. W. N. —

a. **australis** Weise — Neuenahr, häufig (Heyd.) — N. —

Criocerini.

Lema Lac.

1. **puncticollis** Curt. — Aach., Kref. (F. - rugicollis Kugel.) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — Elbf. (Corn. - C.) — Vallendar (1 - R.) — H. W. N. —

2. **Erichsoni** Suffr. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Kref. (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (1 - Bockl.) — H. W. N. —

3. **septentrionis** Weise — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Saarl. (Gabr.) — de R., Westf. Pr. 98, für Nev. mit „Bestimmung?“ — H. —

4. **cyanella** L. — Rhp. (F. - cyan. L.) - in B. cyan. Suffr. — Elbf. (Corn. - C. - lichenis Voet) — Kref. - Samml. Bruck. — H. W. N. —

a. **obscura** Steph. — Fred. für H. Venn — N. —

5. **tristis** Hbst. = **flavipes** Suffr. — Trier, auf Artemisia (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. — W. N. —

6. **melanopus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

7. **rufocyanea** Suffr. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. verloren — Nev. (de Rossi - C.) — 1 in H. —

Crioceris Geoffr.

1. **lilii** Scop. = **merdigera** F. — Rhp. (F. - merd. L.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

2. **merdigera** L. = **brunnea** F. — Kref., Bopp. (B. - brunn. F.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

3. **duodecimpunctata** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kleve [le Roi], Bonn, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

[**quatuordecimpunctata** Scop. — F. für Aach. [Fürst.] - in B. nicht für Rhp. - Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 1856 S. 247, betont, vielleicht gegenüber der Angabe in F., das Fehlen bei Aach. — Im Süden u. Osten. —]

4. **asparagi** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

Camptosomata.

Clythrini.

Labidostomis Redtb.

[*taxicornis* F. — *F.* für Düssdf. [Brasel.] - in *B.* nicht für Rhp. - nicht *H. W. N.* - Südeuropäer. —]

[*lusitanica* Germ. — *B.* für Bopp. [1 ♂ - tibialis Lac.] - vielleicht richtig, der Vergleich mit Stücken aus Südfrankreich wird betont - doch allenfalls nur irgendwie verschlagen. — Südeuropäer. —]

1. **tridentata** L. — Roertal zwischen Montjoie u. Düren, Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - sonst mag die in *F.* fehlende humeralis mitgetroffen sein. — Elbf. (1 - *G.*) — Kleve - Samml. Fuß — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kochem (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. **humeralis** Schneid. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C. u. G.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Ahrw. (Fuß) — Winningen (Bockl.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn, Brohltal, Kochem, St. (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

3. **lucida** Germ. — Blumsay, Pfaffendorf (Bockl.) — U. Nahe, Kreuzn., St. (Heyd. vid. - R.) — *W.* —

v. axillaris Lac. — Elbf. (1 - Corn - *C.*) — *N.* —

4. **longimana** L. — Ahrtal, Siebengbg., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - *G.*) — Blumsay (Bockl.) — Ahrw., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Lachnaea Redtb.

1. **sexpunctata** Scop. — Bopp. (*F.* - *longipes* F.) — U. Ahr, Laach. See (Heyd.) — Winningen (Bockl.) — Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Clyttha Laich.

1. **quadripunctata** L. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Borbeck (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **laeviuscula** Ratzb. — Aach., Düssdf.) Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - *G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Gynandrophthalma Lac.

1. **cyanea** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Nev. (de Rossi - *C.*) — Siebengbg., Bopp. (Geilenk.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **flavicollis** Charp. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65) - Belegst. aus Samml. Fuß Weise vid. — *H.*, nicht *N.* [*B.* III. 104 für Ems unrichtig - *N.* 290] —

3. **aurita** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Bopp. (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **affinis** Hellw. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

Coptocephala Chevr.

1. **unifasciata** Scop. — Laach. See, Bopp. (F. - quadrimaculata F.) — Ahrtal, Trier (Geilenk.) - Belegst. Hubenth. vid. — Blumsay (Bockl.) - daher in Samml. R. — W. N.

[**Scopolina** L. — F. für Bopp. [Bach] - B. III. 105: überall nicht selten - trifft die in B. noch nicht getrennte, im Gebiet von Bopp., Kob. stellenweise nicht seltene rubicunda, die auch allein aus den Samml. nachweisbar. — Nicht H. [Ev. briefl.], angeblich in W., 1 in N. —]

2. **rubicunda** Laich. — Hierhin F. mit Scopolina für Bopp. — Bopp. (Geilenk.) — Ahrw. - Samml. Fuß als Scopolina — Blumsay, häufig (Bockl.) — Bonn [1 - Frings], St.-Goar, St. (R.) — Heyd. vid. omn. — N. —

Cryptocephalini.

Cryptocephalus Geoffr.

1. **coryli** L. — Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kochem, Trier (R.) — H. W. N. —

2. **cordiger** L. — Aach. (B.) — Winningen (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Gerolstein (1 - R.) — N. —

3. **octopunctatus** Scop. — Aach., Bopp. (F. - variabilis F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Rheydt (Geilenk.) — Trier (1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — M.-Gladbach (1 - R.) — H. W. N. —

4. **sexpunctatus** L. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — H. W. N. —

5. **signatus** Laich. — Laach. See - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — R., Beitr. I., für M.-Gladbach unrichtig. — Nicht H. W. N. — Mittel- u. Süddeutschl. —

6. **distinguendus** Schneid. — Bonn - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Nicht H. W. N. - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

[**bimaculatus** F. — F. für Homberg [Pliester] - in B. nicht für Rhp. - nicht H. W. N. - Südeuropäer —]

7. **primarius** Harold — Blumsay, jährlich einzeln, 1908 zahlreich (Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — Süd- u. Ostdeutschl. [Schilsky II.] —

8. **imperialis** Laich. — Bopp. (B. - bistripunctatus Creutz.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — N. —

[**trimaculatus** Rossi — *F.* [salicis F.] für Bopp. [Bach] u. Homberg [Pliester] - in *B.* nicht für Rhp. - nicht *H. W. N.* - Alpen, Südeuropa. —]

9. **bipunctatus** L. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 61, u. Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Trier (Mühlf.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **sanguinolentus** Scop. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61 - *lineola* F.) — Elbf. (3 - Geilenk. - *G.*) — Eupen (Heym.) — *H. W. N.* —

a. Thomsoni Weise — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — *H. N.* —

10. **biguttatus** Scop. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.* - *bipustulatus* F.) — H. Venn (Fred.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

11. **Schäfferi** Schrk. — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

12. **aureolus** Suffr. — Nev. (de R.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

13. **sericeus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. **coeruleus** Weise — Elbf. (*G.*) — U. Nahe (R.) — *N.* —

a. **mozambanellus** Mars. — Ahrw. (3 - Fuß, Ent. Nachr. 82 S. 32 - *intrusus*) - Belegst., ♂♂, Hubenth. vid. — Sonst im Süden [Schilsky II.] —

14. **cristula** Duf. = *hypocoeridis* Suffr. — Elbf. (Geilenk. - C. u. *G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Belg., *W. N.* —

15. **violaceus** Laich. — Aach., Bopp. (*F.* - *viol.* F.) — Winningen (Bockl.) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**marginellus** Ol. — *F.* für Bopp. [Bach - marg. Rossi] - in *B.* nicht für Rhp. - Südeuropäer. —]

— **nitidulus** F. — *F.* für Aach. [Först.] u. Bopp. [Bach] - in *B.* nicht für Rhp. - da Belg. [Col. Neerl.], wohl Aach. richtig. — *W. N.* —

16. **nitidus** L. — Aach., Kref., Kob. (*F.* - *nitens* L.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

17. **punctiger** Pk. — Elbf. (*C.*) — Barmen - Samml. Bruck — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Schmittenhöhe (1 - Heyd. vid. - (R.) — *H. W. N.* —

[**janthinus** Germ. — *B.* III. 121 für Kref. [janth. Schüpp.] - daher nicht in Samml. Bruck - noch Samml. Mink (Lange). — Nicht *H. W. N.* - im Südosten. —]

18. **parvulus** Müll. — Kref. (*F.* - *fulcratus* Germ.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.* III. 121) — Elbf. (*C.* - *nigro-*

coeruleus Goeze) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — *H. W.* *N.* —

19. **coerulescens** Sahlb. — Aach., Kref. (*F.* - *flavilabris* Pk.) - Kref. in Samml. Bruck - *flavil.* Suffr. — Bopp. (*B.* - *flavil.* Pk.) — *H. W.* —

20. **marginatus** F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[*quinquepunctatus* Harrer — *F.* für Düssdf. [Braselm. - *duodecimpunctatus* F.] - in *B.* III. 116 nicht für Rhp. - sicher mit Recht. — Nicht *H. W.*, 1 in *N.* —

a. **octonotatus** Schneid. — *F.* für Homberg [Pliester] - in *B.* nicht angeführt - nicht *H. W. N.* - äußerst zweifelhaft wie die Stammform. —]

21. **pini** L. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (*G.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

a. **abietis** Suffr. — Trier (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. — *N.* —

22. **decemmaculatus** L. — Aach., Kref. (*F.* - *decempunctatus* F.!) - Kref. in Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — *W. N.* —

a. **bothnicus** L. — Hild. H. (Drescher u. Ostheide - *G.*) — H. Venn (Fred.) — *H. W.* —

a. **barbareae** L. - Hild. H. (Drescher u. Ostheide - *G.*) — — **frenatus** Laich.

a. **flavescens** Schneid. — Fred. für H. Venn - Fundort Heusy b. Verviers [Ann. Belg. 14. S. 59]. — Vielleicht im deutschen Teil des H. Venn noch anzufinden. —

23. **Moraei** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Bonn, Ahrw., Wiedtal (R.) — *H. W. N.* —

v. f. Weise — Kob. (*B.* III. 123) —

[*octacosmus* Bed. = *sexpustulatus* Rossi — Col. Neerl. für Rhp. - nicht *H. W. N.* —]

24. **flavipes** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Ahrtal, Kochem, Manderscheid, St.-Goar (R.) — *H. W. N.* —

25. **vittatus** F. — Aach., Kref., Ahrtal, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Tönnisstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **negligens** Weise — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Belg. [Col. Neerl.] —

26. **bilineatus** L. — Aach., Bopp. (*F.*) — *H.*, u. a. Maastricht, *N.* —

27. **elegantulus** Grav. — Bopp. (*B.* - *tessellatus* Germ.) - daher in Samml. Bruck — Blumslay, nicht selten (Bockl.) -

daher u. Kreuzn. [Reichensp.], Oberstein [le Roi] in Samml. R. — *W. H.* —

28. **chrysopus** Gmel. — Aach., Bopp. (*F.* - Hübneri *F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob., St. (R) — *W. N.* —

29. **ocellatus** Drap. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *geminus* Megl.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

30. **querctei** Suffr. — Bopp. (*B.* - *querc.* Er.) — *N.* —

31. **labiatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Schneifel [le Roi], Olbrück, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

[**exiguus** Schneid. — *F.* - *Wasastjernii* Gyll. - für Aach. [Först.] u. Düssdf. [Braselm.] - in *B.* III. 124 nicht für Rhp. — Nicht *H. W.*, in *N.* —]

32. **pygmaeus** F. — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Bonn, Brohltal (R.) — *H. W. N.* —

33. **fulvus** Goeze — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - *minutus* F.) — U. Solg. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

34. **macellus** Suffr. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — H. Venn (Fred.) - Finder Chapuis [Ann. Belg. 14 S. 59] — *H.* —

35. **ochroleucus** Fairm. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — *H. N.* —

36. **populi** Suffr. — Siegm., U. Nahe (Weise vid. - R.) — *W. N.* —

37. **pusillus** F. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Bonn, St. (R.) -- *H. W. N.* —

38. **rufipes** Goeze — Rhp. (*F.* - *gracilis* F.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Soon (v. Geyr) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Pachybrachis Redtb.

1. **hieroglyphicus** Laich. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg., Benrath (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Siegm., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. **tristis** Laich. — Hierhin wohl *F.* mit *histrio* *F.* für Aach., Kref., Düssdf. — doch nicht in Samml. Bruck. — *N.* —

2. **suturalis** Weise — Oberes Ahrtal (Heyd.) — Elsaß, Bayern [Weise, Ins. D. VI. 253.] —

3. **tessellatus** Ol. — Hild. H. b. Eller (Geilenk.) - daher in Samml. R. — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck — *W. N.* —

4. **picus** Weise = *histrio* Redtb. — Ahrw. [Kraatz], Brohl [Habelmann] (Weise, Ins. D. VI. 265) — Col. Neerl. noch für

Aach., Kref., Düssdf. - wohl für histrio F. in *F.* - doch nicht in Samml. Bruck. — *N.* —

Cyclica.

Lamprosomini.

Lamprosoma Kirb.

1. **concolor** Stm. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Bonn, Elztal, Unterstes Bienhorntal b. Kob., Morgenbachthal b. Bingerbrück [le Roi] in Samml. R. — *H. N.* —

Eumolpini.

Pachnephorus Redtb.

1. **pilosus** Rossi — Bonn, Kob. (*F.* - arenarius F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Bonn (1 - R.) — *W. N.* —

Bromius Redtb.

1. **obscurus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (C.) — die Stammform: Schneifel [le Roi], Laach. See, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **epilobii** Weise — H. Venn (Fred.) — Bonn (1 - R.) — *N.* —

a. **villosulus** Schrk. — Aach. (*F.* - vitis F.) — Bopp. (B.) — Überall, Weinbergsschädling (Heyd.) — U. Nahe, St. (R.) — *W. N.* —

Chrysomelini.

Colaphus Redtb.

1. **sophiae** Schall. — Aach., Bonn (Först. - *F.*) - von Aach. (Heyd.) — Hochdahl (Geilenk. - *G.*) — *H. W. N.* —

Gastroidea Hope.

1. **viridula** Deg. — Rhens am Rheinufer, mehrfach, Aldegund a. Mosel [1 - le Roi], Trier a. d. Biewermdg. (R.) — *H. W.* —

2. **polygoni** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Siebengbg. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. Goar, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. **ruficollis** F. — Saarl. (Gabr.) —

Timarcha Latr.

1. **tenebricosa** F. — Rhp. (*F.* - laevigata L.!) - so noch *B.* III. 78 — Elbf. (C.) — Kasel (Heyd.) — Bonn, Kob., Kochem, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

[**montana** Fairm. — Fred. für H. Venn - Zitat nach Ann. Belg. tom. XIX p. 60 richtig, Fundort Hockay. — Cat. Col. nur Türkei - sicher Bestimmungsfehler. —]

2. **coriaria** Laich. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (C. u. G.) — Saarl., Eifel (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. **aerea** Fairm. — Saarl. (Gabr.) — *N.* —

3. **metallica** Laich. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — Kob., nach Moselhochwasser im Genist (2 · Bockl.) — *H. W. N.* —

Chrysomela L.¹⁾.

1. **haemoptera** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) Ahrtal, Gerolstein, St., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

[**Rossia** Ill. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] u. Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. *C.* - noch von Düssdf. in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl). — Südeuropa. —]

2. **göttingensis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **Sturmi** Westh. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — *W.* —

3. **limbata** F. — Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf., U. Solg. (G.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

4. **staphylaea** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **sanguinolenta** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (2 · C. u. G.) — Rheydt, Borbeck (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

6. **marginalis** Dft. — Düssdf. (F. - marg. Megl.) — Elbf. (C.) — H. Venn (Fred.) — Kyllburg, Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **carnifex** F.

a. **coerulescens** Suffr. — U. Ahr b. Heimersheim (Heyd.) — *N.* — Die Art noch für Düssdf. [Hildebr.] in *F.* - doch nicht *H. - W.* 269 anscheinend mit Bedenken - sonst Mainz, Darmstadt u. a. [Weise, Ins. D. VI. 388] —

8. **marginata** L. — Kref., Düssdf. (F.) - Düssdf. in Samml. Fuß — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Trier (Geilenk.) — Ahrw., Bonn (R.) — *H. W. N.* —

9. **analis** L. — Bopp. - 1 - Samml. Bruck — *N.* —

a. **lomata** Hbst. — Kob. (1 · Bockl.) — *W. N.* —

10. **fuliginosa** Ol.

a. **galii** Weise = *molluginis* Suffr. — Bopp. (B. - in Ent. Kl. nigroaenea) — Elbf. (Geilenk. - C.) — Bonn - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Sayntal, Schmittenhöhe, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **orichalcea** Müll. — Aach., Bopp. (F. - lamina F.!) - Aach. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Kob. (3 · Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

1) Leptinotarsa decemlineata Say, der Colorado-Käfer, wurde um 1875 eingeschleppt und hielt sich kurze Zeit auf einem Felde bei Mülheim-Rhein. Dazu Westhoff, Jahresber. zool. Sekt. Westf. Prov.-Vereins für 1877/78.

- a. **lamina** F. — Oberwerth, Elztal (R.) —
 -- **rufoaenea** Suffr. — Kob., aus Moselgenist (1 - Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — Einheimisch? - Elsaß (Schilsky II.) doch schon 1 bei Nassau gfd. von Buddeberg [N. 299] —
12. **brunsvicensis** Grav. — Elbf., Nev. (C.) - Elbf. (Heyd.) — Kref. - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *H. W.* —
13. **geminata** Pk. — Aach., Düssdf. (F.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn [1 Frings], Laach. See, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **cuprina** Dft. — Aach. (Fürst. - F.) — *N.* —
14. **quadrigemina** Suffr. — Elbf. (Corn. - C. - v. *gemellata* Dft.) - Belegst. Suffr. vid. nach *W.* 271. — Lengsdorf b. Bonn (Verhoeff) - Belegst. verloren. — *W. N.* —
15. **hyperici** Forst. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - *fucata* Ol.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
16. **didymata** Scrib. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bertrich (Ev. vid. - Col. Neerl.) — Saarl. (Gabr.) — *N.* —
17. **cerealis** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C. u G.) — Wassenach u. am Bausenberg, auf vulkan. Boden (Andr.) — Gerolstein (Geilenk. u. R.) — Trier (Mühlf.) — i. d. Eifel gewöhnlich (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — Kreuzn. [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —
- a. **alternans** Pz. — Gerolstein (Geilenk.) —
18. **coeruleans** Scrib. — Aach., Düssdf., Bopp. (F. - *violacea* Dft.) — Elbf. (C.) — Holzmaar [le Roi], U. Ahr, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
19. **fastuosa** Scop. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
20. **graminis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. u. Geilenk. - C.) — Ruhrtal, Bopp. - Samml. Bruck — Kref., zahlreich (Ulbr.) - daher in Samml. R. — *H. W. N.* —
- a. **fulgida** F. — Kref., Düssdf. (F.) — Samml. Bruck mit Rhen. u. Ruhr bezettelt. —
21. **menthastris** Suffr. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - *menthae* Schott.) — Linz, Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Winningen (Bockl.) — Laach. See [le Roi], Ahrw. (R.) — *H. W.* —
- [a. **croatica** Weise — Bockl. für Kob.-Lützel [1 - im Juli auf Mentha] - Belegst. Weise vid. — Danach für Schilsky II. angegeben von R. - das Stück dürfte doch wohl aus einer Tauschsendung stammen. —]
22. **varians** Schall. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. centaura Hbst. — Elbf. (Geilenk. - *G.*) — Bonn, St. (R.) —

a. aethiops F. — Elbf. (Geilenk. - *G.*) —

23. polita L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Chrysochloa** Hope. = **Orina** Motsch.

cacaliae Schrk. — *F.* für Homberg [Pliester] - möglich nach Rheinhochwasser. — Vogesen, Alpen. —

v. senecionis Schumm. — Kob.-Lützel, 1880, Winningen, 1884, je 1, beidemal nach Moselhochwasser (Bockl.). — Vogesen. —

frigida Weise — Ardenbach a. Rhein, vor langen Jahren (1 - Weise vid. - Geilenk.). — Alpen. —]

Phytodecta Kirb. = **Gonioctena** Redtb.¹⁾

1. viminalis L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Alf (R.) — *H. W. N.* —

a. Baaderi Pz. — Kob. (1 - Bockl.) - Belegst. Weise vid. — *W.* —

a. cinctus Weise — Kob. (1 - Bockl.) - Belegst. Weise vid. —

2. rufipes Deg. — Rhp. (*F.* - ruf. Pk.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**flavicornis** Suffr. — Nicht Saarl., auf welchem Fundort die Angabe in Ins. D. VI. 1125, verb. 1124, für Rhp. jedenfalls beruht - die Stücke stammten aus Schlesien [Gabr. briefl.] — Fred. für H. Venn [**flavicollis** Suffr.!] - Fundort Heusy b. Verviers [Ann. Belg. 14 S. 59 - **flavicorn.**] - vielleicht im deutschen Teil des H. Venn noch aufzufinden. — *N.* —]

3. Linnaeanus Schrk. — Aach., Bonn, Bopp. (*B.* - *triandrae* Suffr.) — H. Venn (Fred. - *Cistela triandr.*) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

a. decastigma Dft. — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Elztal, Alf (R.) — *N.* —

a. nigricollis Westh. — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kochem (R.) — *W. N.* —

a. satanas Westh. — U. Ahr (Heyd.) — Elbf., Kreuzn. - Samml. Bruck — Kreuzn. (Reichensp.) — Trier (Mühlf.) — Ahrw. (R.) — *W. N.* —

[**fornicatus** Brügg. — *F.* für Düssdf. [Hildebr. - *sexpunctatus* F.] - schon in *B.* III. 93 nicht für Rhp. - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl). — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten. —]

4. olivaceus Forst. — Rhp. (*F.* - *litura* F.) - trifft die Art — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Prüm [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

1) Gon. nivalis ohne Autornamen, in *B.* Ent. Kl. für Bopp., blieb ungedeutet. —

a. litura F. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. [Fischer], St. (R.) — *W.* —

[**a. rufitarsis** Marsh. - im Cat. Col. nicht angeführt — *C.* für Elbf. [Corn.] - Belegst. nicht in Samml. Corn. —]

5. quinquepunctatus F. — Aach. (*F.* - *pallidus* F.!) - hierhin nach *B.* III. 93 - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — *H. W. N.* —

a. unicolor Weise — Eupen (Heym.) —

a. nigriventris Penecke — Eupen (Heym.) —

a. flavidollis Dft. — Bonn (R.) —

6. pallidus L. — Aach. - Samml. Bruck — H. Venn (Fred.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Phyllodecta Kirb. = **Phratora** Redtb.

1. vulgatissimus L. — Elbf. (*C.*) — Kob., U. Nahe u. a. (R.) — *H. W. N.* — Überall nicht selten, in *F.* nur übersehen. —

a. obscurus Weise — Saarl. (Gabr.) —

2. tibialis Suffr. — Bopp. (*B.* - *tib.* Stm.) — Elbf. (*C.* - viennensis Schrk.) — Kob. (1 - Bockl.) — Trier (Mühlf.) — *W. N.* —

a. Cornelii Weise — Elbf. (Corn. - *C.*) —

3. vitellinae L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. laticollis Suffr. — Elbf. (Corn. - *C.*) — U. Ahr (von Fuß - Heyd.) — *H. W. N.* —

5. atrovirens Corn. — Elbf. (*C.* - daher beschrieben, Stett. E. Z. 57.) — 1 in Belg. [Ev. vid. - Col. Neerl.] —

Hydrothassa Thoms.

1. aucta F. — Aach., Kref., Düssefd. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Schneifel [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. marginella L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. hannoverana F. — Rhp. (*F.*) — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 59 S. 220) — Hild. H. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Schalkm. Maar [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

a. calthae Weise — Immerather Maar [le Roi] in Samml. R. —

Prasocuris Latr.

1. phellandrii L. — Aach., Kref., Düssefd. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn [le Roi], Kochem, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. junci Brahm — Rhp. (*F.* - *beccabungae* Hellw.) — Hild. H. (Corn. - *C.*) — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

Sclerophaedon Weise.

1. carniolicus Germ. — Bonn (Fürst. - *F.* - *carn.* Megl.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Harz u. im Osten u. Süden [Schilsky II.] —

— **orbicularis** Suffr. — *F.* für Aach., Bonn [Fürst. - pyritosus Rossi] - nach *B.* III. 94 hierhin — *B.* für Bopp. — Für *W.* angegeben. — Scheint nach den Fundgebieten in Schilsky II. dem Süden u. Osten anzugehören. —

Phaedon Latr.

1. **pyritosus** Rossi — Aach. (*F.* - graminicola Ill.) — Bopp. (*B.* - pyr. Ol.) — Kref. - Samml. Bruck — Winningen (1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Kochem (R.) — *H. W. N.* —

2. **cochleariae** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw. (R.) — *H. W. N.* —

3. **armoraciae** L. — Elbf. (3 - *C.* u. *G.*) — Ahrw., - Samml. Bruck — Schalkm. [le Roi], Kottenforst [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Plagiodesma Er.

1. **versicolor** Laich. — Rhp. (*F.* - armoraciae F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Melasoma Steph. = **Lina** Redtb.

1. **aeneum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

a. **haemorrhoidale** L. — Elbf. (*C.* - violaceum Ol.) —

2. **cupreum** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **vigintipunctatum** Scop. — Düssdf., Rheydt (*F.*) — Aach., Bopp. (*B.*) — Elbf. (Heym.) — Nev. (1 - de Rossi - *G.*) — Kottenforst, in Menge (Frings) — Sayntal (R.) — *H. N.* —

4. **collare** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Kob., Stadtkyll (Bockl.) — Kref. (R.) — *H. W. N.* —

5. **populi** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

6. **tremulae** F. = longicolle Suffr. — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) — Elbf. (*C.*) — Aach. - Samml. Fuß — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

7. **saliceti** Weise = tremulae Suffr. — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe (R.) — Hierhin wohl *F.* mit trem. *F.* für Rhp. — *H. W. N.* —

Galerucini.

Agelastica Redtb.

1. **alni** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Phyllobrotica Redtb.

1. **quadrimaculata** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Hild. H. (*C.*) — Kleve u. Schalkm. Maar [le Roi], Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

Luperus Geoffr.

1. **circumfusus** Marsh. — Aach., Bonn, Bopp. (F.) — Elbf. (2 - C. u. G.) — Saarl. (Gabr.) — Oberstein (Heyd.) — Schneifel [Reichensp.], Brohltal, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **pinicola** Dft. — Bonn, Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

— **xanthopus** Schrk. — *G.* für Barmen [3 - Samml. Stachelhausen] mit „Fundortangabe wohl irrtümlich“. — 1 in N., sonst im Süden u. Osten. —

3. **longicornis** F. — Rhp. (F. - rufipes F.) - in B. = longic. F. — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Schneifel [Reichensp.] in Samml. R. — Hierhin wohl de R. mit rufipes Scop. für Nev. — *H. W. N.* —

4. **niger** Goeze — Elbf. (C. - niger Geoffr.) — Nev. (de R.) — Hild. H. (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Vallendar, St. (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. **flavipes** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (G.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Wanzenboden i. Eifel [le Roi], St. (R.) — *H. W. N.* —

Lochmaea Weise.

1. **capreae** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C) — U. Ahr, häufig (Heyd.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **suturalis** Thoms. — Kleve - Samml. Fuß — Kempenich (1 - Andr.) — Blumsay (1 - Bockl.) — H. Venn (R.) — *H. N.* —

3. **crataegi** Forst. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - sanguinea F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (1 - Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Bopp. (Geilenk.) — Bonn, Sayntal, Bertrich [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Galerucella Crotch.

1. **viburni** Pk. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Neuenahr, häufig (Heyd.) — Gummersbach [le Roi], Remagen, Rhens (R.) — *H. W. N.* —

2. **nymphaeae** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - nymph. Gyll.) — Elbf. (C.) — Kleve (Fuß) — *H. W. N.* —

a. **aquatica** Geoffr. — Düssdf. (F. - sagittariae Gyll. !) - die nicht wie früher = grisescens Joann. — Elbf. (C.) — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Kref. [Fischer] in Samml. R. — *W. N.* --

3. **lineola** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., Trier, St. (R.) — *H. W. N.* —

— **luteola** Müll. = **xanthomelaena** Schrk. — *F.* für Jülich [Fürst.] u. Düssdf. [Braselm.] — Aus Rhp. nicht in Samml. Bruck - möglich da *H. N.* —

4. calmariensis L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

5. tenella L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — H. Venn [le Roi], Sayntal, St. (R.) — H. W. N. —

Galeruca Geoffr. = **Adimonia** Laich.

1. tanaceti L. — Rhp. (F.) — Elbf., häufig (G.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Gerolstein, St. (R.) — H. W. N. —

2. interrupta Ol. — Düssdf. (Braselm. - F.) — Bopp., Kob., (B. III. 131) — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Belg., W. N. —

3. pomonae Scop. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - rustica Schall.) — Elbf. (C.) — Wesel (Gabr.) — M.-Gladbach, Bonn (R.) — H. W. N. —

[**rufa** Germ. — *F.* für Aach. [Fürst. - rufa Megl.] - von *B.* zwar aufgenommen, doch fehlt in Samml. Fürst. der regelmäßig eingeklebte Namenszettel. — Nicht H. W. N. - im Südosten. —]

— **melanocephala** Ponza — Beuel b. Bonn (1 - Bertkau, Verh. Nat. Ver. 89 S. 69) - Belegst. Heyd. vid. — Ob einheimisch? - Nach der Fundstelle, Fußpfad am Rheinufer, und der Zeit, 20. April, wohl durch Frühjahrshochwasser angeschwemmt. — Nicht H. W. N. - Frankreich u. im Süden u. Osten. [Ins. D. VI. 659] —

Sermyla Chap.

1. halensis L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Podagraria Foudr.

1. fuscipes L. — Aach., Kref. (F.) - Kref. (Geilenk.) — Elbf. (1 - C.) — H. W. N. —

— **malvae** Ill. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - in Samml. Hildebr. ohne Fundort (Miss. Steyl) - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht H. W., in N. sehr vereinzelt. —

2. fuscicornis L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

Derocrepis Weise.

1. rufipes L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Gerolstein, St. (R.) — H. W. N. —

Crepidodera Chevr.

— **femorata** Gyll. — Col. Neerl. für Aach. - nicht H. W. N. - Mitteleuropa [Ins. D. VI. 695]. —

1. nigritula Gyll. — Elbf. (G.) - Reitt. sah das Stück, das jetzt verloren (Geilenk.) — N. —

2. transversa Marsh. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — U. Nahe, St. (J. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

3. **ferruginea** Scop. — Rhp. (*F.* - exoleta F.) — Elbf. (*C.*) — Moseltal (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Ochrosis Foudr.

1. **ventralis** Ill. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. (Heym.) — Elbf. (*C.*) — Nettetal (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

Lythraria Bed.

1. **salicariae** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. - Samml. Ulbr. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Oberwerth, Güls (R.) — *H. W. N.* —

Epithrix Foudr.

1. **pubescens** Koch — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.* III. 140.) — Laach. See (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Kob. (Gabr.) — Siegmdg. [Reichensp.], Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

2. **atropae** Foudr. — Bopp. (*B.* III. 334. 140) — Laach. See (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Ahrtal - Samml. Bruck — *W. N.* —

a. **quadrimaculata** Weise — Trier (Mühlf.) in Samml. R. —

Chalcoides Foudr.¹⁾

1. **nitidula** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. **aurea** Geoffr. — Elbf. in Samml. Corn als metallica Dft. - Weise vid. - metall. Dft. in *C.* u. auch bei de Rossi, Westf. Pr. 86 S. 50, von Nev. hierhin, nicht, wie nach Cat. Col. von 1883, zu lamina Bed. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Saarl. (Gabr.) — St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

a. **cyanea** Marsh. — Nev. (de R.) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **fulvicornis** F. — Aach., Kref. (*F.* - Crepid. fulvic.) — Elbf. (*C.* - Crepid. helxines L.) — Duisb. (Urb.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

4. **aurata** Marsh. — Elbf., Nev. (*G.*) — Kref. - Samml. Ulbr. — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Nettetal, Kob. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **pulchella** Steph. — U. Ahr, selten (Heyd.) — Elztal, Sayntal (R.) — *N.* —

5. **Plutus** Latr. = **chloris** Foudr. — Elbf. (*C.*) - Belegst. Weise vid. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth, St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

1) Crepid. helxines Ol., in *F.* für Rhp., blieb ungedeutet - Mischart. —

a. **Foudrasi** Weise — U. Ahr (Heyd.) — Oberwerth (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

[**lamina** Bed. = **metallica** Weise — in Schilsky II. für Rhp. - beruht auf **metallica** Dft. in C. von Elbf. u. bei de R., Westf. Pr. 86 S. 50. von Nev. entsprechend der damaligen Deutung des Namens - fehlt sicher in Rhp. wie in *H. W. N.*] —

Hippuriphila Foudr.

1. **Modeeri** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Mantura Steph.

1. **obtusata** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) - daher, aus Samml. Fuß, J. Dan. vid. — Belg., *H. N.* —

2. **ambigua** Kutsch. — Aach. (Weise, Ins. D. VI. 745) - beruhend auf Kutschera und Allard [Weise briefl.], bei denen näheres über den Finder nicht angegeben [Heyd. briefl.] — Belg. [Col. Neerl.] —

3. **chrysanthemi** Koch — Aach., Kref. (*F.*) — Nev. (de Rossi - G.) — Duisdorf - 1 - Samml. Raderm. — *H. W. N.* —

4. **rustica** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **suturalis** Weise — Saarl. (Gabr.) — Laach. See (R.) — *N.* —

Chaetocnema Steph. = **Plectroscelis** Redtb.

[**chlorophana** Dft. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - nach dentipes in *F.* [Schilsky briefl.], die aber = **concinna**. — Im Süden und Osten. —]

1. **semicoerulea** Koch — Düssdf., Elbf., Ahrtal - Samml. Bruck — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — hierhin wohl *F.* mit saltitans Kirb. für Kref. [vom Bruck] - cf. Ins. D. VI. 760 — *W. N.* —

2. **concinna** Marsh. — Rhp. (*F.* - dentipes Ent. H.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **confusa** Boh. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß - Belegst. J. Dan. vid. — *N.* —

4. **Mannerheimi** Gyll. — Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **subcoerulea** Kutsch. — Fred. für H. Venn. — *H.* — In den angrenzenden Gebietsteilen wohl noch aufzufinden. —

5. **aridula** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **Sahlbergi** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Eupen (1 - Heym.) — Bopp. (*B.*) — *H. W. N.* —

7. **hortensis** Geoffr. = aridella Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Psylliodes Berthold.

1. **cucullata** Ill. — Laach. See - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Schneifel [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **chrysocephala** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. Goar, U. Nahe (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. **anglica** F. — Elbf. (Corn. - *C.* - var. mit gelben Flügeld.) - Belegst., von 1868, aus Samml. Corn. Reitt. vid. — Kref. - Samml. Bruck — *N.* —

3. **napi** F. — Aach., Kref. (*F.* - *napi* Ent. H. u. rapae Ill.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Trier, St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **thlaspis** Fouadr. — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — *N.* —

5. **obscura** Dft. — Rhp., auf Cruciferen (Weise, Ins. D. VI. 811) — Col. Neerl. für Aach. — *N.* —

6. **cuprea** Koch — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht in *C.* — Oberwerth (Weise vid. - Mühlf.) — *H. W.* —

[**fusiformis** Ill. — Schilsky II. für Rhp. - Ins. D. VI. 813 nur „am Rhein“ - aus Rhp. nicht bekannt. — Nicht *H. W. N.* —]

7. **instabilis** Fouadr. — Brodenbachatal (1 - J. Dan. vid. - R.) — *N.* —

8. **affinis** Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

9. **dulcamarae** Koch — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., Kochem (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

10. **hyoscyami** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **cupronitens** Först. — Aach. (daher nach 2 von Heinem. gefundenen Stücken beschrieben - *F.*) — Mitteldeutschl. [Schilsky II.] —

v. **chalcomera** Ill. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Laach. See - Samml. Fuß — U. Nahe (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

11. **luteola** Müll. — Elbf. (Corn. *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kref. - Samml. Bruck - propinqua Redtb. — Nev. (de Rossi) in Samml. R. - Weise vid. — *H. N.* —

12. **picina** Marsh. — Aach. (*F.* - *picea* Redtb. u. *rufilabris* Ent. H.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Oberwerth, Nettetal, U. Nahe (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **melanophthalma** Dft. — Kref. (Mink - *B.* III. 158. 353) — Saarl. (Gabr.) — *W.* —

Haltica Geoffr.

1. **quercetorum** Foudr. — Aach. (*F.* - erucae *F.*) - erucae
Ol. *B.* III. 137. 332 — Kref. - Samml. Ulbr. — Nev. (1 - de R.) —
Kleve - Samml. Fuß — Trier, häufig (Mühlf.) — *H. W. N.* —
2. **lythri** Aub. — Elbf. (2 - *C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98)
— Kob. (Bockl.) — U. Nahe, Kreuzn. (J. Dan. vid. - ♂♂ - R.) —
H. W. N. —
3. **tamaricis** Schrk. — U. Nahe, St. (J. Dan. vid. - ♂♂ - R.) —
Sonst im Süden u. Osten [Ins. D. VI. 840] —
4. **oleracea** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) —
Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
- a. **nobilis** Weise — Saarl. (Gabr.) —
- a. **lugubris** Weise — Saarl. (Gabr.) — *N.* —
5. **pusilla** Dft. — Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

Hermaeophaga Foudr.

1. **mercurialis** F. — Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn,
Sayntal, St. (R.) — *W. N.* —

Batophila Foudr.

1. **rubi** Pk. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) —
Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
2. **aerata** Marsh. — Aach. - Samml. Bruck — Ahrw. - Samml.
Fuß - Belegst. J. Dan. vid. — Frankreich u. im Süden [Ins. D.
VI. 855] —

Phyllotreta Foudr.¹⁾

1. **armoraciae** Koch = nemorum F. — Aach., Bonn, Bopp.
(*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (R.) — *W. N.* —
2. **exclamationis** Thunb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - bras-
siaeae *F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
- a. **vibex** Weise — Kob., U. Nahe (R.) —
3. **ochripes** Curt. — Aach. (*F.* - excisa Redtb.) — Bopp. (*B.*
III. 142) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —
4. **tetrastigma** Com. — Kref. - Samml. Bruck — Duisb.
(Urb.) — Bonn, Vallendar, St. (R.) — *H. W. N.* —
5. **flexuosa** Jll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - flex. Ent.
H.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — Nev. (de
R.) — *H. W. N.* —
6. **sinuata** Steph. — Aach. (*F.* - sin. Dej.) — Elbf. (*C.*) —
Kref. - Samml. Bruck — St. (R.) — *H. W. N.*
7. **undulata** Kutsch. — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — St. (R.) —
H. W. N. —

1) Phyll. quadriguttata Steph., in *F.* für Kref. [Mink],
blieb ungedeutet - vielleicht = *exclamationis*. —

8. **vittula** Redtb. — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **nemorum** L. — Rhp. (F. - nem. F.!) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **atra** F. — Elbf. (C. - aterrima Schrk.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kob. (Gabr.) — Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* — Hierhin wohl *F.* mit *atra* Ent. H. für Rhp. —

11. **cruciferae** Goeze — Elbf. (C. u. G.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

12. **consobrina** Curt. — Rhp., vereinzelt (Weise, Ins. D. VI. 882) — *N.* —

13. **nodicornis** Marsh. — Aach., Rheinufer b. Kref., Bopp. (F. - antennata Ent. H.) - Aach. in Samml. Bruck — Elbf., Hild. H. (Reitt. vid. - G.) — *H. W. N.* —

14. **procera** Redtb. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) - Belegst. J. Dan. vid. — *N.* —

15. **nigripes** F. — Rhp. (F. - lepidii Ent. H.) — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Aphthona Chevr.

1. **cyparissiae** Koch — Kref., Düsseldorf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **laevigata** F. — Walporzheim, aus Genist der Ahr (2 - J. Dan. vid. - R.) — Nicht *H. W. N.* - Grünstadt [von Scriba - Samml. Bruck], sonst im Süden. —

3. **lutescens** Gyll. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] - daher nicht in Samml. Bruck - nicht im Verz. C. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

4. **venustula** Kutsch. — Laach. See, Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. **pygmaea** Kutsch. — Saarl. (Gabr.) — Winningen (1 - J. Dan. vid. - R.) — Über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

6. **cyanella** Redtb. — Aach. (F.) — Elbf. (G. - atrocoerulea Steph.) - Belegst. Weise vid. — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

7. **coerulea** Geoffr. — Aach., Kref., Bopp. (F. - coer. Pk.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Trier (Mühlf.) — Wiedtal, Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

8. **euphorbiae** Schrk. — Rhp. (F. - euph. F.) — Elbf. (C. - auch hilaris Steph.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kref. - Samml. Bruck — *H. N.* —

9. **atrovirens** Först. — Vaals b. Aach. (daher beschrieben - F.) — Bopp. (B.) — Mittel- u. Süddeutschl. u. a. [Schilsky II.] —

10. **herbigrada** Curt. — Homberg (B.) — St. (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

Longitarsus Latr.¹⁾.

1. **echii** Koch — Aach. (Fürst. - *F.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — St. (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —
[**fuscoaeneus** Redtb. — Col. Neerl. für Düssdf. - in Samml. Hagens nicht daher (Dom. Hag.) — Belg., *H.* —]
2. **anchusae** Pk. — Aach. (*F.*) — Elbf. (1 - Reitt. vid. - *G.*) — Bonn, Tönnisstein, Sayntal, Kob. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
3. **absinthii** Kutsch. — *B.* III. 336. 149 für Bopp. - doch lag nach *N.* 312 die Fundstelle rechtsrheinisch, in Nassau — Düssdf. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Hubenth. vid. — *N.* —
4. **obliteratus** Rosh. — Vaals b. Aach. (daher beschrieben - *F.* - consociatus Fürst.) — Bopp. (*B.*) — *H. W. N.* —
5. **niger** Koch — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Düssdf. - Samml. Bruck — Sayntal (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —
6. **parvulus** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - parv. Pz.) - in *B.* parv. Pk. - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* - ater *F.!*) - Elbf. (Reitt. vid. - Geilenk.) — *H. W. N.* —
7. **nigerrimus** Gyll. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Frankreich, Norddeutschl. [Ins. D. VI. 944] —
8. **holsaticus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Oberwerth (1 - Mühlf.) — Schmittenhöhe (1 - R.) — *H. W. N.* —
— **quadriguttatus** Pontopp. — *B.* - quadripustulatus *F.* - für Kreuzn. - nicht in der Samml. vom Bruck, von dem manche der Angaben für Kreuzn. in *B.* stammen. — Nicht *H. W. N.* —
9. **apicalis** Beck — Aach. (*F.* - analis Creutz.) - daher in Samml. Bruck — Arenberg, Remstecken b. Kob. (J. Dan. vid. - R.) — *N.* —
10. **brunneus** Dft. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — *H. N.* —
11. **luridus** Scop. — Aach., Kref. (*F.* - lur. Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Stammform: Saarl. (Gabr.) — Nettetal, Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
a. nigricans Weise — Saarl. (Gabr.) — Nettetal (R.) —
v. cognatus Weise — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Ulbr.] u. Oberwerth (J. Dan. vid. - R.) — *N.* —
12. **minusculus** Foudr. — Kreuzn. (Weise, Ins. D. VI. 961) - Finder Paul Weise [Weise briefl.] — Frankreich, Mitteldeutschl. u. a. [Ins. D. l. c.] —
13. **dorsalis** F. — Aach., Bonn (Fürst. - *F.*) — Kreuzn. (Heyd.) — *H. N.* —

1) L. *oblongiusculus* Dft., in *F.* für Aach. [Fürst.], blieb ungedeutet. —

14. **nasturtii** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C. u. G.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
15. **suturalis** Marsh. — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Sayntal, Vallendar (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —
16. **atricillus** L. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
17. **suturellus** Dft. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kob., Horchheim (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —
18. **piciceps** Steph. — Elbf. (1 - Corn. - C. - picipes Steph.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — *H. W. N.* —
— **gracilis** Kutsch. — Kreuzn., im Anspülicht der Nahe (Weise, Ins. D. VI. 974) - Finder Paul Weise [Weise briefl.] - nach der Fundart nicht sicher einheimisch. — Frankreich u. a. [Ins. D. l. c.] —
19. **curtus** All. — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. der Samml. Corn. verloren - doch *H. N.* —
[**liliputanus** All. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - daher nicht bekannt, nur Rheinpfalz nach Eppelsh., D. E. Z. 75 S. 412. — In Ins. D. VI. nicht als deutsche Art. —]
20. **melanocephalus** Deg. — Aach., Kref., Bopp. (F. - mel. Gyll.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
[longipennis Kutsch. — *C.* für Elbf. [sehr häufig - Corn.] - unter den 5 Belegst. der Samml. Corn. kein longip. - Weise vid. — de R., Verh. Nat. Ver. 82, für Nev. — Osteuropäer. —]
21. **nigrofasciatus** Goeze — Elbf. (C. u. G. - je 1 - lateralis Ill.) - Belegst. verloren - das von Geilenk. jedenfalls von Reitt. bestimmt. — *N.* —
22. **verbasci** Pz. - [für tabidus F. des Cat. Col. wieder herzustellen - Weise briefl.] — Aach., Kref., Bopp. (F. - verb. Pz.) — Elbf. (C. - tab. F.) — Trier (Mühlf.) — U. Nahe, St. (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —
a. **sisymbrii** F. — Elbf. (C. u. - Reitt. vid. - G.) — *N.* —
23. **lycopi** Foudr. — Elbf. (1 - Drescher u. Osttheide - Reitt. vid. - G.) — *H.*
24. **membranaceus** Foudr. — Kreuznach, Oberstein (von Allard bestimmt - Heyd.) — *N.* —
25. **pratensis** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - auch pusillus Gyll.) — Elbf. (C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
a. **collaris** Steph. — Elbf. - Samml. Corn. - Hubenth. vid. — *N.* —

26. **exoletus** L. — Aach., Bopp. (daher beschrieben - *B.* III. 152 - *boppardiensis*) - Kref., Bopp. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

27. **rubiginosus** Foudr. — Elbf. (*C.* - *flavicornis* Steph.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Duisb. (Urb.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

28. **pellucidus** Foudr. — Elbf. (*C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

29. **tabidus** Pz. = *jacobaeae* Waterh. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — Trier (Mühlf.) — Nev. (de Rossi) in Samml. R. - Belegst. Weise vid. — *H. W. N.* —

30. **ochroleucus** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — U. Ahr (Heyd.) - nicht Unteres Saartal, wie Ins. D. VI. 1013 für diesen Fund angeben. — *H. N.* —

Dibolia Latr.

1. **femoralis** Redtb.

a. **aurichalcea** Först. — Aach. (daher beschrieben - *F.*) — Bopp. (*B.*) - daher in Samml. Bruck. — Mittel- u. Süddeutschl. [Ins. D. VI. 1033] —

2. **timida** Ill. — Bopp. (daher beschrieben - *B.* - *eryngii* Bach) — *N.* —

3. **Försteri** Bach — Aach., Bopp. (daher beschrieben - *B.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - *buglossi* Kze. - u. 67) — Belg., *N.* —

4. **rugolosa** Redtb. — Aus Rhp. - 2 - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — *N.* —

5. **cynoglossi** Koch — Aach., Kref. (*F.*) · nur Aach. in Samml. Bruck — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Oberstein (Heyd.) — *H. N.* —

6. **occultans** Koch — Aach. (Först. - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

7. **cryptocephala** Koch — Oberstein (Heyd.) — Col. Neerl für Kref. - die crypt. in Samml. Bruck mit „Rheinprov.“, nicht „Kref.“, bezettelt sind rugulosa - Hubenth. vid. — *W. N.* —

Apteropeda Chevr.

1. **globosa** Ill. — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, Wiedtal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **orbiculata** Marsh. — Aach., Kref. (*F.* - *ciliata* Ol.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **splendida** All. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. J. Dan. vid. — *N.* —

Mniophila Steph.

1. **muscorum** Koch — Bopp. (*B.*) — Elbf. (v. Hagens - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —

Argopus Fisch.

1. **Ahrensi** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — *N.* —

Sphaeroderma Steph.

1. **testaceum** F. = *cardui* Gyll. — Rhp. (*F.* - *test.* *F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **rubidum** Graëlls = *testaceum* Gyll. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - *cardui* Kirb.!) — Elbf. (Corn. - *C.* - *cardui* Gyll.!) — Wiedtal (1 - R.) — *H. W. N.* —

Cryptostomata.**Hispani.****Hispella** Chap.

1. **atra** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Cassidini.**Hypocassida** Weise.

1. **subferruginea** Schrk. — Aach., Bopp. (*F.* - *ferruginea* F.) — U. Solg. (*G.*) — Kob. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Cassida L.

1. **fastuosa** Schall. — Bopp. (*B.* - *vittata* F.) — *N.* —

2. **canaliculata** Laich. — Bopp. u. rheinaufwärts bis Würtemberg (*B.* - *austriaca* F.) - Bopp. in Samml. Bruck — Winningen (Bockl.) — Kob. (von Oberst A. Schultze - Dorm.) — St. (4 R.) — *N.* —

3. **viridis** L. — Rhp. (*F.* - *equestris* F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **hemisphaerica** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **azurea** F. = *lucida* Suffr. — Bopp. (*B.*) — U. Ahr (Heyd.) - Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92) — Kob. (Bockl. u. Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *N.* —

6. **margaritacea** Schall. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

7. **Murraea** L. — Rhp. (*F.*) — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 59 S. 230) — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Borbeck (*G.*) — Kref. Samml. Bruck — Stommeln (Raderm.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

8. **seladonia** Gyll. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. als *rufovirens* Suffr. - Belegst. Weise vid. — *H. N.* —

9. **denticollis** Suffr. — Elbf., Nev. (Corn. - *C.*) — Ahrw. (Fuß,

Berl. E. Z. 67) — Saarl. (Gabr.) — St. (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

10. **rufovirens** Suffr. — Bopp. (B.) — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - nach dem Belegst. seladonia, die in *C.* nicht angeführt - Weise vid. — *H. W. N.* —

11. **stigmatica** Suffr. — Düssdf. (B.) — H. Venn (Fred.) - Fundort Hockay [Ann. Belg. 37. S. 90] — *H. W. N.* —

12. **sanguinolenta** Müll. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **prasina** Ill. = chloris Suffr. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

14. **sanguinosa** Suffr. — Aach. (Fürst. - F.) — Bopp. (B. - sang. Creutz.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — hierhin languida Corn. von Elbf., Barmen, Wetter a. d. Ruhr [C. u. B.] nach der Beschreibung [Weise, Ins. D. VI. 1103] u. den noch vorhandenen Belegst. der Samml. Corn., deren 1 mit „1850 gezogen“ bezettelt ist - Weise vid. — *H. W. N.* —

15. **rubiginosa** Müll. — Rhp. (F. - rub. Ill.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

16. **Panzeri** Weise = thoracica Pz. — Bonn, St. (Weise vid. - R.) — Sonst in Österreich [Schilsky II.] — Ob thoracica F., in *F.* für das Siebengbg. [Fürst.], hierhin oder zu ferruginea Goeze, die aber in *B.* III. 74 Nr. 13 nicht aus Rhp. angegeben, zu stellen, bleibt fraglich. —

17. **vibex** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C. - liriophora Kirb.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **discoidea** Weise — St. (R.) —

18. **nebulosa** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Andernach, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

19. **flaveola** Thunb. — Rhp. (F. - obsoleta Ill.) — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 59 S. 254) — Elbf. (C.) — Bonn, Nettetal, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**berolinensis** Suffr. — Schilsky II. für Rhp. - beruht auf obsoleta Hbst. statt obs. Ill. = flaveola - auch dem Nordosten angehörig. —]

20. **nobilis** L. — Rhp. (F.) — Aach., Kref., Düssdf. (F. - viridula Pk.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

21. **vittata** Villers = oblonga Ill. — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

Bruchidae.

Spermophagus Stev.

1. **cisti** F. = *cardui* Boh. — Aach., Kref. (*F.* - *cardui* Stev.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*G.*) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Bruchus L.

1. **loti** Pk. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — *W. N.* —

— **pallidicornis** Boh. — Elbf., in Linsen (*C.*) - anscheinend als eingeführt betrachtet. — *N.* —

2. **atomarius** L. — Rhp. (*F.* - *granarius* L.) — Bopp. (*B.* II. 162 - *seminarius* L.!) — Elbf. (*C.* - sem. L. - u. *G.*) — Kref. - Samml. Bruck als sem. L. - Belegst. Schilsky vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

3. **rufimanus** Boh. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn (R.) — Belegst. aus Samml. Corn., Bruck, R. Schilsky vid. — *H. W. N.* —

4. **affinis** Fröl. — Elbf. (1 - Corn. *C.*) - Belegst. verloren — Kob. (1 - Schilsky vid. - R.) — *N.* —

5. **pisorum** L. — Rhp. (*F.* - *pisi* L.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

v. **sparsus** F. — Bonn (1 - Schilsky vid. - R.) —

— **ervi** Fröl. = *sertatus* Ill. } Kleve, in Linsen (Fuß) - Belegst.
— **lentis** Fröl. } Schilsky vid. - beide Arten nicht
H. W. N., wohl eingeschleppt. —

6. **luteicornis** Ill. — Elbf., Nev., Hild. H. (*G.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 - R.) — Belegst. aus Samml. Geilenk., Bruck, R. Schilsky vid. — Ganz Deutschl. [Schilsky II.] — Hierhin, nicht wie früher zu *nubilus* Boh., *rufipes* Hbst. von Elbf. [*C.* u. *G.*] u. Kreuzn. [Samml. Bruck] - Belegst. aus Samml. Corn., Geilenk., Bruck, Schilsky vid. - jedenfalls auch [entsprechend *B.* III. 162] *nub.* Dej. in *F.* für Aach. [Först.] — Damit *nub.* Boh., nach Schilsky II. in Deutschland weit verbreitet, für Rhp. vorläufig wegfällend. —

Bruchidius Schilsky.

1. **marginalis** F. — Laach. See, Kob., Bopp. (*B.* II. 164. 454) — *N.* —

2. **unicolor** Ol. — Kob. (*B.* - *olivaceus* Germ.) — Kreuzn. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — *W. N.* —

— **bimaculatus** Ol. — *C.* für Elbf. [nicht häufig - Corn.] — Belegst. verloren, jetzt ganz andere Art - Schilsky vid. — Nicht *H. W. N.* - doch Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

— **imbricornis** Pz. — *B.* II. 163 für Düssdf. — Nicht *H. W. N.* - Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

3. **dispar** Gyll. — Kreuzn. (Riehl - Bach vid. ♂♀ - *B.* II. 163) — Fuß, Berl. E. Z. 62, für Laach. See - in Samml. Fuß nur 1 aus Toskana. — Nicht *H. W. N.* - Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

4. **varius** Ol. — Kreuzn. (vom Bruck - *B.* - *tarsalis* Schönh.) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

[**pauper** Boh. — Zebe für Elbf. - nicht in *C.*, noch *H. W. N.* - in Schilsky II. nur Tirol. —]

[**perparvulus** Boh. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - Quelle nicht mehr feststellbar, sicher unrichtig. —]

5. **cisti** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *cisti* F.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Bopp. (*B.* II. 164 - *villosum* F. - u. *F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

Acanthoscelides Schilsky.

obtectus Say — Elbf. - 1 - Samml. Geilenk. - Belegst. Schilsky vid. — Durch den Handel eingeschleppt, über ganz Deutschland [Schilsky II.] —

Anthribidae.

Urodoninae.

Urodon Schönh.

1. **suturalis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *N.* —

2. **conformis** Suff. — Aach., Kob., Bopp. (*B.* - conf. Chevr.) — U. Solg. (G.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — *W. N.* —

— **pygmaeus** Gyll. — *B.* II. 166: „mit rufipes gesellschaftlich“, u. dieser nicht selten - schwerlich eigene Beobachtung, da rufipes vielfach, pygm. weiter nicht aus Rhp. angegeben. — In Samml. Bruck 2 pygm. [K. Dan. vid.] mit „Bor. Rh.“, = Rheinpreußen, bezettelt, doch beim Artnamen, nicht am Stück - daher, zumal nicht *H. W. N.* u. in Schilsky II. nur Thüringen u. im Süden u. Osten, bis zur sicheren Auffindung als fraglich zu führen. —

3. **rufipes** Ol. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - ruf. *F.*) — U. Solg.

(G.) — Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — H. W. N. —

Anthribinae.

Tropiderini.

Platyrrhinus Clairv.

1. **resinosus** Scop. — Rhp. (*F. - latirostris* F.) — Elbf. (C.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Soon (v. Geyr) — Elztal (1 - R.) — H. W. N. —

Tropidères Schönh. [Anordnung nach Schilsky II.]

1. **sepicola** F. — Bopp. (B.) — Kleve (Fuß) — Jülich (Eichh.. Berl. E. Z. 66) — Laach. See (R.) — H. W. N. —

2. **marchicus** Hbst. — *B.* für Elbf. [*cinctus* Pk.] - nicht im Verz. C. — Bonn (1 - R.) — H. W. N. —

3. **niveirostris** F. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — H. W. N. —

4. **albirostris** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Kob. (1 - R.) — H. W. N. —

Anthribini.

Platystomus Schneid.

1. **albinus** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (C. u. G.) — Ahrw. (Fuß) — Bonn [Frings], St. (R.) — H. W. N. —

Anthribus Geoffr. = **Brachytarsus** Schönh.

1. **fasciatus** Forst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - scabrosus* F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kochem (1 - R.) — H. W. N. —

2. **nebulosus** Forst. = **variegatus** Fourc. — Düssdf. (*F. - varius* F.) — Elbf. (C.) — Horchheim (Mühlf.) — Bonn, Soon, Kreuzn. (R.) — H. W. N. —

[**tessellatus** Boh. — Col. Neerl. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck - nicht H. W. N. —]

Choragini.

Araeocerus Schönh.

fasciculatus Deg. — Elbf., aus einem Spezereiladen (G.) — Durch den Handel eingeschleppt - in Deutschl. weit verbr. [Schilsky II.] —]

Choragus Kirb.

1. **Sheppardi** Kirb. — Düssdf. (Crumbach u. v. Hagens - B. II. 170) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - C.) — St., an altem Efeu der Fustenburg zahlreich (R.) — H. W. N. —

Curculionidae.

Otiorrhynchinae.

Otiorrhynchus Germ.¹⁾.

1. **armadillo** Rossi, Apfb. = *rhaeticus* Stierl. — Bopp., Kob. (B. II. 273) - Kob.-Laubbach (A. Schultze - Samml. Heyd.) — Siebengbg. (Fuß - Beitr I. - *scabripennis*) — Wolkenburg, Hammerstein - Samml. Bertkau · Belegst. K. Dan. vid. — Linz (1 - K. Dan. vid. - R.) - in Beitr. I. als *multipunctatus* F. angeführt. — Rochusberg b. Bingen [N. 323] - auch in Süddeutschland. [Schilsky II.] - sonst in den Alpen. —

2. **clavipes** Bonsd. — Aach. (Först. - *F.* - *tenebricosus* Hbst.) - daher 1 in Samml. Först. von 1837 — Eifel (Gabr.) — U. Nahe (R.) — K. Dan. vid. omn. — Bopp. - Samml. Bruck — *H.*, u. a. bei Maastricht, *W.* —

3. **niger** F. — *B.* in Ent. Kl. für Bopp., in der Fauna nicht für Rhp. — Kob. im Stadtwald, Winningen auf der Höhe, Lutzerath (Bockl.) - Stammform, Reitt. vid. — *W. N.* —

[**fuscipes** Ol. — R. Beitr. II. für U. Nahe - trifft clavipes - K. Dan. vid. —]

[**laevigatus** F. — Schilsky I. für Rhp. - unrichtig [Schilsky briefl.] —]

4. **morio** F. — Kref., Düssdf. (*F.* - *unicolor* Hbst.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — H. Venn (Fred.) — Herrstein (Heyd.) — *W. N.* —

5. **raucus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (*C.*) — Landskron i. Ahrtal (Heyd.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**conspersus** Germ. — *B.* Ent. Kl. für Bopp. [*conspersus*] - in der Fauna II. 473 nicht für Rhp. —]

6. **rugosostriatus** Goeze — *F.* für Kref. [vom Bruck - *sabrosus* Marsh.] - in Samml. Bruck nur Ostende. — Landskron i. Ahrtal (Heyd.) — Burgbrohl (1 - Andr.) - K. Dan. vid. — *H.* —

— **ligneus** Ol. — Zebe für Rhp. — In *H.*, u. a. Maastricht, Roermond - daher im angrenzenden Gebiet wohl noch aufzufinden. —

7. **scaber** L. — *F.* für Bopp. [*Bach - septentrionis* Hbst.] - in B. II. 276 nicht für Rhp. — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — Col. Neerl. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck. — *W. N.* —

— **uncinatus** Germ. — *G.* für Elbf. [1 - Drescher und Ostheide] mit ? - nach Mitteigl. Geilenk., weil die Auffälligkeit des Fundes

1) Ot. pauper, in *B.* Ent. Kl. für Bopp., in der Fauna fehlend, blieb ungedeutet - wenn = paup. Boh., auch nicht in Rhp., alpin. —

richtige Bestimmung bezweifeln ließ. — Moselweiß, aus Genist nach Moselhochwasser (2 - K. Dan. vid. - R.) - ob einheimisch? — Nicht *H. W. N.* — Süddeutschl. [Schilsky II.] —

8. **porcatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Landskron (Heyd.) — Bonn, Ahrthal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **singularis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - picipes F.) — Elbf. (C.) — Nev. (de R.) — mögen wohl die a. Chevrolati mittreffen. — Landskron, Linz, Bernkastel, an Rebenwurzeln (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Brodenbachthal (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **Chevrolati** Gyll. — Olbrück, Laach. See, Kob., Alf., Bopp., St. (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

10. **Marquardti** Fald. — Kob. - Samml. Schultze (K. Dan.) — Kochem, Alf, Trier (K. Dan. vid. - R.) — Bayern u. a. [Schilsky II.] —

[**impressiventris** Fairm. — Schilsky, D. E. Z. 90 S. 192, für Kob.-Laubbach [A. Schultze] - Belegst. der Samml. Schultze sind Marquardti [K. Dan. briefl.] —]

11. **gemmatus** Scop. — Hild. H. (4 - Geilenk. - C. u. G.) — Belegst. noch in Samml. Geilenk. — Sonst Bayern u. Alpen [Schilsky II.] —

12. **sulcatus** F. — Aach., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. in Samml. Bruck — U. Ahr, Linz, Mosel, Saar (Rebenwurzelzerstörer - Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — Aus der Trierer Gegend 1901 als Weinbergsschädling erhalten - daraus einige Stück einer Phasia-artigen Fliege, die in Samml. V. v. Röder übergegangen, von ihm als neu erkannt, als Phanistoma Otiorrhynchi n. g. n. sp. beschrieben werden sollte, wobei es verblieben zu sein scheint (R.). — *H. W. N.* —

[**tristis** Scop. — Ev., D. E. Z. 92, u. Col. Neerl. für Kref. [nigrita F.] — als nigr. auch bezettelt 2 sulcatus, die einzigen von Kref., in Samml. Bruck - K. Dan. vid. —]

13. **ligustici** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **Brucki** Bach — Kref. (daher nach einem Funde von vom Bruck beschrieben - B. II. 236 - Liophloeus . . .) —

14. **ovatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Caenopsis Bach.

1. **fissirostris** Walt. — Von Aach. [Fürst.] und Kref. [vom Bruck] beschrieben als Bachi Först. i. litt. in B. II. 269 — Elbf. (Corn. u. v. Hagens - C.) — H. Venn (Fred.) — *H. W.* —

2. **Waltoni** Boh. — Kleve - Samml. Fuß — Kref. - Samml. Bruck — *H.* —

Peritelus Germ.

1. **hirticornis** Hbst. — Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn, Laach. See, St.-Goar (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **sphaeroides** Germ. = griseus Ol. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Rheinufer unterhalb Beuel, Oberwerth, U. Nahe (R.) — Kein Weinbergsschädling, wie *B.* II. 268 angibt, oft auf Weiden [R. Beitr. II.] — *H. W. N.* —

Mylacus Schönh.

1. **rotundatus** F. — Aach., Düssdf. (F. - Omias) — Kref. - Samml. Ulbr. — Bopp. (B.) — Elbf. (C. - Platytarsus) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn, U. Nahe (R.) — *W. N.* —

Phyllobius Schönh. [Anordnung nach Schilsky II.]

1. **sinuatus** F. — Aach. (F.) — U. Solg., Hild. H. (G.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **oblongus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **floricola** Gyll. — Stommeln - 1 - Samml. Raderm. — *W. N.* —

3. **viridicollis** F. — Elbf. (1 - Geilenk. - G.) — *W.* —

4. **sulcirostris** Boh. — Siebengbg. - mehrfach - Samml. Bruck — Duisb. [1 - Urb.] in Samml. R. — K. Dan. vid. omn. — Bisher nur im Osten u. Süden [Schilsky, Küst. Käf. Eur. 08] —

5. **viridiaeris** Laich. = pomonae Ol. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (Preiß) — Kref. [Ulbr.], Kob. (R.) — *H. W. N.* —

6. **parvulus** Ol. = uniformis Steph. — Rhp. (F. - uniform. Marsh.! - u. *B.* II. 260, 19) — Elbf. (sehr häufig - *C. viridiaeris* Laich.!) — Nev. (gemein - de R., Westf. Pr. 98) — Saarl. (Gabr.) — Olbrück, St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**pallidus** F. = incanus Gyll. — *C.* für Elbf. [nicht selten - Corn.] - das einzige Stück der Samml. Corn. gehört zu einer andern Art. — Nicht *H. W. N.* - im Osten [Cat. Col.] —]

7. **maculicornis** Germ. — Elbf. (C.) — Barmen - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Kob. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **betulae** F. — Aach., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr. - trivialis Boh.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **argentatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Löhndorf (Raderm.) — Saarl. (Gabr.) — Vallendar, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **viridans** Boh. — Saarl. (Gabr.) —

10. **piri** L. — Rhp. (*F.* - *vespertinus* F.) — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - *piri* L. u. *mutus* Schönh.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **calcaratus** F. — Die Art: Aach., Kref. (*F.* - auch *carniolicus* Ol.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

a. **piri** F. — Kob. (1 - R.) —

a. **densatus** Schils. — M.-Gladbach, Bonn, St. (R.) —

12. **urticae** Deg. — Aach. (*B.* - *pomaceus* Schönh.) — Elbf. (*G.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Rheydt (Geilenk.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Sayntal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

v. **Fussi** Schilsky — Ahrtal - nach Stücken der Samml. Fuß daher [große, schwarze Stücke eines Phyllob. - Fuß, Berl. E. Z. 65] u. a. beschrieben [Küst., Käf. Eur., Heft 45] — Noch Holland u. Dessau [Schilsky l. c.] —

Brachyderinae.

Polydrosus Germ. ¹⁾. [Anordnung nach Schilsky II.]

1. **impar** Gozis = *mollis* Germ. — In *F.* wohl nur versehentlich nicht angeführt. — Bonn, Winningen (R.) u. jedenfalls allg. verbr. — *H. W. N.* —

2. **atomarius** Ol. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bopp. (R.) — *H. W. N.* —

3. **marginatus** Steph. = *ambiguus* Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.* - *iris* Ol.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. **mollis** Stroem = *micans* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **sericeus** Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *ser.* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Jülich (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

6. **impressifrons** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck als *flavipes* Deg. - K. Dan. vid. — *H.* —

7. **confluens** Steph. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.* - *chrysomela* Ol.!) - Belegst. aus Samml. Bruck Heyd. vid. — Bopp. (*B.* - *chrys.* Schönh.) — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Kleve - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — *H. W. N.* —

8. **ervinus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. - Samml. Fischer — Elbf. (*C.*) — Stommeln (Raderm.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Winningen, Sayntal (R.) — *H. W. N.* —

9. **pilosus** Gredl. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92 - *melanostictus* Chevr.) — *W. N.* —

10. **tereticollis** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *undatus* F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

1) *P. rufipes* L., in *F.* für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet. —

— **ruficornis** Bonsd. — *C.* für Elbf. [Corn. - fasciatus Müll.] - einzige Belegst. der Samml. Corn. nicht ruficorn. — Reitt. vid. — Nicht *H. W. N.* - doch Mittel- u. Süddeutschl. [Schilsky II.] —

[**flavipes** Deg. — *F.* für Rhp. - nach *B.* II. 225 überall - *C.* für Elbf. [Corn.] — Aus den Samml. nicht nachweisbar - die flav. der Samml. Bruck sind impressifrons, der Samml. Corn. der im Verz. *C.* fehlende coruscus [K. Dan. vid.] - sonst in keiner Samml. — Nicht *N.* - für Westf. als überall n. sltn. angegeben *W.* 199, Angabe von Verhoeff für Soest, Verh. Nat. Ver. 90, trifft nach dem einen erhaltenen Belegst., das jetzt in Samml. R., coruscus [Heyd. vid.]. — *H.* - daher vielleicht im Gebiet noch aufzufinden. —]

11. **pterygomalis** Boh. — Aach. (Kaltenb. - *B.*) — Elbf. (Corn. - *G.*) — Saarl. (Gabr.) — Kottenforst [1 · Frings], Sayntal (R.) *H. W. N.* —

12. **coruscus** Germ. — Aach., Kref. (*F.* - cor. *Mlr.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. in Samml. Corn. — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Scythropus Schönh.

1. **mustela** Hbst. — Blumsay, zahlreich, April 09 (Bockl.) - daher in Samml. R. — Trier, Horchheim (Mühlf.) — *W. N.* —

Sciaphilus Steph.

1. **asperatus** Bonsd. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - muricatus F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) St. (R.) — *H. W. N.* —

Brachysomus Steph. = **Platytaurus** Schönh.

[**villosulus** Germ. — *B.* II. 265 für Kref. - kann nur auf vom Bruck oder Mink beruhen. — In Samml. Bruck nicht daher, Minksche Stücke in Samml. Geilenk. waren echinatus - Schilsky vid. — Nicht *H. W. N.* —]

[**hirtus** Boh. — Col. Neerl. für Rhp. - nur *N.* 328. —]

1. **echinatus** Bonsd. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - Omias hirsutulus F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Foucartia Duv.

1. **squamulata** Hbst. — Bopp. (*B.* - *Strophosomus*) — nicht auch Elbf. (*C.*) — Güls, Schmittenhöhe, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Barypithe Duv.

1. **araneiformis** Schrk. — Die Art: Aach., Düssdf. (*F.* - brun-nipes Ol.) — Bopp. (*B.* II. 166) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß - Schilsky, D. E. Z. 89 S. 338) — *H. W. N.* —

v. setosus Form. — Kref. in Samml. Bruck — Brohltal in Samml. Andr. — Bonn, Siebengbg., Kochem, St. (K. Dan. vid. - R.) — anscheinend in Rhp. nur die var. - die zahlreichen Stücke der Samml. Fuß ohne Fundort auch hierhin. —

[**Chevrolati** Boh. — *F.* für Aach. [Först. - *Omias ruficollis* F.] - hierhin entsprechend *B.* II. 266 — Col. Neerl. für Düssdf. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

2. pellucidus Boh. — Ahrw. (von Fuß - Heyd.) — *F.* für Kref. [pell. Chevr.] u. die Angaben für die Nachbargebiete müssen wegen der Abtrennung des *duplicatus* dahingestellt bleiben. — Von Kref. nicht in Samml. Bruck. —

3. duplicatus Keys [Entomol. Monthly Magazine 1911] — Ahrw. (von Fuß als *pelluc.* - Heyd.) — Lüttich, auch Frankr. [Heyd. briefl.] —

4. mollicomus Ahr. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — *W. N.* —

5. tener Boh. — Kleve - Samml. Fuß — Elbf. (Formánek vid. - Heyd.) — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Kref., Neuenahr-Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Kottenforst, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

Omias Schönh.

[**concininus** Boh. — *B.* II. 267 für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Düssdf. [v. Hagens] - Zebe für Kref. „bei Ameisen“ — Nicht in Samml. Bruck, noch [Lange briefl.] in Samml. Mink - Minksche Tauschstücke von Kref. in Samml. Geilenk. waren Baryp. tener - Schilsky vid. - von v. Hagens später nicht, bes. nicht in *G.* angegeben. — Nicht *H. W. N.* —]

1. mollinus Boh. — Kref. - Samml. Bruck mit Seidl. vid. - daher auch 1 von Ulbr. gfd. in Samml. R. — *N.* —

Strophosomus Steph.

1. melanogrammus Forst. = *coryli* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. rufipes Steph. [= *obesus* Marsh.] — Elbf. (*C.*) — Dinslaken [le Roi], Bonn, Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

3. fulvicornis Waltl = *curvipes* Thoms. — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 73) - Belegst. K. Dan. vid. - Fundstelle die Donsbrügger Heide (Fuß) — *H.* —

4. faber Hbst. — Aach., Düssdf., Kreuzn. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

5. lateralis Pk. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — von Elbf. [Mühlf.] in Samml. R. — *H. W.* —

6. retusus Marsh. — Aach. (Först. - *F.* - *oxyops* Chevr.) — Belg. u. Südlimburg! [Col. Neerl.] — *F.* noch für Kref. [vom Bruck] und Düssdf. - nicht in Samml. Bruck — *B.* II. 215 für Bopp. - doch nicht in *N.* —

Eusomus Germ.

1. **ovulum** Germ. — Aach. (Fürst. - F.) — St., nicht selten (R.) — W. N. —

Brachyderes Schönh.

1. **incanus** L. — Kref., Düssdf., Bopp. (F. - auch lepidopterus Chevr.) — Elbf. (C.) — Löhndorf (Raderm.) — Trier (Mühlf.) — Kleve [Reichensp.], Ahrw. (R.) — H. W. N. —

Sitona Germ.

[**gressorius** F. — C. für Elbf. [1 - Corn.] — H. u. Belg. [Ev., D. E. Z. 07 S. 375] - doch das Belegst. in Samml. Corn. griseus · Heyd. vid. —]

1. **griseus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Ahrw. (R.) — H. W. N. —

2. **cambricus** Steph. — Aach. (F. - cribricollis Schönh.) — Kref. (B.) — Elbf. (C.) — Rhens, St. (R.) — H. W. N. —

3. **regensteinensis** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf., (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — H. W. N. —

4. **tibialis** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Mosel (Gabr.) — Tönnistein, Olbrück (R.) — H. W. N. —

a. **ambiguus** Gyll. — F. für Aach., Kref., Düssdf. - von Kref. [Allard vid.] nicht in Samml. Bruck — W. N. —

5. **lineatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck mit Allard vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. (K. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

6. **suturalis** Steph. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck mit Allard vid. — Bonn (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

a. **elegans** Gyll. — Aach. (Fürst. - F.) — Angabe in F. für Elbf. [Corn.] durch Verz. C. nicht bestätigt. — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. - Reitt. vid. —

a. **lateralis** Gyll. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - die beiden jetzt in Samml. Corn. befindlichen Belegst. zu andern Arten gehörig - K. Dan. vid. — W. —

7. **sulcifrons** Thunb. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B. - medicaginis Redtb.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Hubenth. vid. - Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (K. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

8. **gemellatus** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck mit Allard vid. — H., Belg. —

9. **puncticollis** Steph. — Kref. (B.) - daher in Samml. Bruck mit Allard vid. — Saarl. (Gabr.) — H. W. N. —

10. **flavescens** Marsh. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - octopunctatus Germ.) - Kref. in Samml. Bruck mit Allard vid. — Elbf. (C.) — Kob. (Preiß) — Saarl., Loef (Gabr.) — Rhens (R.) — H. W. N. —

— **lineellus** Bonsd. — *F.* für Aach. [Först.] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] - Belegst. in Samml. Mink sind crinitus (Lange) - in Samml. Bruck mit Allard vid. nicht aus Rhp. — *C.* für Elbf. [Corn.] - Belegst. sind [jetzt] crinitus - Hubenth. vid. — *W. N.* nicht *H.* —

a. brevicollis Gyll. — *F.* für Aach. [Först.] — nicht *H.*, in *N.* —

11. Waterhousei Walt. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59 · setosus Redtb.) — Sayntal (K. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

12. crinitus Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch nanus Bess.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

13. hispidulus F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Sayntal, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

14. cylindricollis Fahrs. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. unter suturalis a. lateralis — Tönnisstein (a. varians Desbr. - 1 - R.) — K. Dan. vid. omn. — Belg., *H.* —

15. humeralis Steph. — Aach., Düssdf. (*F.* - discoideus Megl.) — Bopp. (*B.*) — Borbeck (Geilenk.) - Belegst. K. Dan. vid. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Allard vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Laach. See, Kob., Sayntal (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

16. inops Gyll. — Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

Trachyphloeus Germ.

1. laticollis Boh. — Aach. (daher nach 1 Stück beschrieben - *F.* - anoplus Först.) — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Hessen u. a. [Schilsky II.] —

2. alternans Gyll. — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. spinimanus Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — noch in *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Düssdf. [Braselm.] - von Kref. nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

4. scabriculus L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - auch erinaceus Redtb. u. setarius Schönh.) - Kref., Siebengb. in Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Elbf. (*C.*) — Neuenahr (Heyd.) — Bonn, Andernach, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. bifovealatus Beck — Aach., Kref., (*F.* - squamosus Schn.) — Elbf. (*C.*) — Ahrw., Schalkenmehren, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. tessellatus Marsh. — Kref. (3 - Geilenk.) —

6. aristatus Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw., Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

7. **Olivieri** Bed. = *squamulatus* Ol. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

[**Psalidium** Ill.

maxillosum F. — *B. II.* 212 für Elbf. — nicht in Verz. C. - Südeuropäer. —]

Cneorrhiniinae.

Cneorrhinus Schönh.

1. **plagiatus** Schall. = *geminatus* F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Wesel (Gabr.) — Bonn, Kob., Trier (R.) — *H. W. N.* —

2. **exaratus** Marsh. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92, u. Gabr.) - daher, aus Samml. Geilenk. Heyd. vid. — Roermond, Venlo [Col. Neerl.] —

Liophloeus Germ.

1. **tessulatus** Müll. = *nubilus* F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **aquisgranensis** Först. — Aach. (daher nach Funden von Först. u. Heinem. beschrieben - F.) — H. Venn (Fred.) — Kref. - Samml. Bruck — Immerath i. Eifel - Samml. Raderm. — Ahrw. (von Fuß - Samml. Heyd.) — Brohltal, Elztal (Heyd. vid. - R.) — *N.* —

v. **maurus** Marsh. — St., einige Stück auf einer sumpfigen Wiese (R.) - Belegst. Schilsky vid. —

[**Schmidti** Boh. — *F.* für Aach. [Först. - Schmidti Schönh.] — *B. II.* 236 noch für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Ahrtal [v. Hagens] - von Kref. nicht in Samml. Bruck, vom Ahrtal nicht in Samml. Fuß. — Nicht *H. W. N.* - im Osten [Cat. Col.] —]

[**Herbsti** Gyll. — *C.* für Elbf. [Corn.] - einzige Belegst. der Samml. Corn. ist [jetzt] tessul. - Heyd. vid. — Nicht *H. N.* - *W.?* - Deutschland [Cat. Col.] —]

[**Brucki** Bach — Kref. (nach einem Funde von vom Bruck beschrieben *B. II.* 236 (462) - ist *Otiorrh. ligustici* var. - Belegst. nicht in Samml. Bruck. —]

Barynotus Germ.

[**margaritaceus** Germ. — Schilsky II. für Rhp. - wohl nach Redtb., Fauna Austr. III. Aufl., II. 190: „am Rhein“. — Nicht *H. W. N.* - Alpen [Cat. Col.] —]

1. **obscurus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C. - *murinus* Bonsd.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **moerens** F. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. Heyd. vid. — *H. W.* —

[**alternans** Boh. — Fred. für H. Venn [squalidus Gyll.] - die Art in den die Nachbargebiete berücksichtigenden Col. Neerl. nicht aufgenommen. — *W.* —]

Tanymecinae.

Amomphini.

[**Thylacites** Germ.

pilosus F. — *F.* für Aach. [Först.] - in Samml. Först. nicht der sonst regelmäßig eingeklebte Namenszettel. — Kraatz, D. E. Z. 76 S. 378: „1 von Kleve - Fuß“ - in Samml. Fuß nur Rußland, Fuß wohnte aber damals in Kleve. — Nicht *H. W. N.* —]

Chlorophanus Germ.

— **gibbosus** Pk. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr. - pollinosus F.] - nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl) - von Düssdf. nicht wieder angegeben - nicht *H.*, *W.* [1 Fundort], *N.* [2] —

1. **dorsiger** Faust — Andernach (dort 1 der Stücke, nach denen die Art aufgestellt, 1830 von Dr. Carové gefunden - *N.* 331) — Hild. H. - 1 - Samml. Geilenk. u. Bonn (1 - R.) - Belegstücke Heyd. vid. — Sonst Mainz, Straßburg [*N.* 331] —

2. **viridis** L. — Rhp. (*F.* - vir. Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Neuenahr (Heyd.) — Rhöndorf [Reichensp.], Kob., St.-Goar, U. Nahe (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **salicicola** Germ. — *B.* II. 223 für Bopp. - Stücke in Samml. Bruck mit „Bopp.-Bach“ bezettelt sind a. Germari — *G.* für Hild. H. [Geilenk] u. Elbf. [Drescher u. Osttheide] - das einzige Belegst. aus Samml. Geilenk. ist dorsiger — Heyd. vid. omn. — Nach *N.* 332 nur Südeuropa. —]

3. **graminicola** Gyll.

a. **Germari** Faust. — Aach. (von Först. - Faust determ. - Heyd.) — Bopp. in Samml. Bruck - Belegst. Heyd. vid. — *N.* [die Art.] —

Tanymecini.

Tanymecus Schönh.

1. **palliatus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Cleoninae.

Lepyrini.

Lepyrus Germ.

1. **palustris** Scop. — Rhp. (*F.* - colon *F.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

a. **canus** Gyll. — Saarl. (Gabr.) —

2. **capucinus** Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - binotatus *F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Cleonini.

Leucosomus Motsch.

1. **pedestris** Poda — Kreuzn. (Mink - *F.* - ophthalmicus Rossi) — Bopp. (*B.*) — Laach. See - Samml. Fuß. — *H. W. N.* —

Coniocleonus Motsch.

1. **glaucus** F. — Die Art: Aach., Kref., Bopp. (*F.* - Cleonus u. Bothynoderes *glaucus* F.) —

a. **turbatus** Fahrs. — scheint allein vorzukommen — *B. II.* 233 kennt den echten Cl. *glaucus* F. nicht, hat II. 229 *turbatus* Schönh. mit den Försterschen Fundorten des *glaucus* und Düssdf. — Elbf. (*C.*) u. Hild. H. (*G.*) treffen die Abart nach dem Sammlungsbestande [Geilenk. briefl.] — Kleve, Kref. - Samml. Bruck - *turb.* Schönh. mit Chevr. vid. — Düssdf. - Samml. Fuß - die Stammform dabei, unbekannter Herkunft — Wesel (Gabr.) — Bonn (Heyd. vid. - R.) — Angaben in *N.* treffen die Abart [Heyd. briefl.] - wohl auch in *W.* [*turb.* Fahrs.!] —

2. **nebulosus** L. — Aach., Kref. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Kleve (von Fuß - Samml. Heyd.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **nigrosuturatus** Goeze — Kref. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Heyd. vid. — wohl hierhin der Cleon. *sulcicollis* Parr. [für Fahrs.?] in *F.* von Homberg. — *N.* —

— **cicatricosus** Hoppe — Bopp. (daher nach 1 beschrieben - *B. II.* 230 - *callosus* Bach) - wohl verschlagen. — Bayern u. im Süden [Cat. Col.] —

Mecaspis Schönh.

[**alternans** Hbst. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - daher nicht in Samml. Bruck — *B. II.* 231 für Bopp. - vor Abtrennung des caesus, trifft diesen nach seiner anderweiten Verbreitung. — Nicht *N.*, in *W.* von caesus nicht getrennt - Südeuropa. —]

1. **caesus** Gyll. — Kreuzn. (Heyd., D. E. Z. 75 S. 391) — Gerolstein (Dr. Böttger - Heyd.) — Ahrtal, Bonn (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) - Belegst. in Samml. R. — Linz, St. (R.) — Heyd. vid. omn. — *N.*, in *W.* wohl als *alternans*. —

[**striatellus** F. — Südeuropäer - zu unrecht für caesus von R. in Schilsky II. S. 203 berichtigt. —]

Pseudocleonus Chevr.

1. **cinereus** Schrk. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - *costatus* F.) - daher in Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — Bopp. (*B. II.* 232) — *W. N.* —

2. **grammicus** Pz. — St. (1 - Heyd. vid. - R.) — *N.* —

Chromoderus Motsch.

1. **fasciatus** Müll. — Kreuzn. (Mink - *F.* - *albidus* F.) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.* - *affinis* Schrk.) — Kref. - Samml. Bruck — Winningen (Bockl.) — Kreuzn. (1 - R.) — *H. W. N.* —

Cyphocleonus Motsch.

1. **tigrinus** Pz. = *marmoratus* F. — Bopp., Kreuzn. (*F.*) — Hild. H. (1 - Geilenk. - *G.*) — Kob. (Bockl.) — U. Ahr, Laach. See, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **trisulcatus** Hbst. — Bopp., Herrstein (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Neandertal (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrtal, Alf, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Adosomus** Faust.

roridus Pall. — *B.* II. 229 für Bopp. - nicht *H. W. N.* - Osteuropa. —]

Cleonus Schönh.

1. **piger** Scop. — Rhp. (*F.* - *sulcirostris* L.) — Elbf., U. Solg. (*G.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kref. - Samml. Bruck — Winningen (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, St.-Goar (R.) — *H. W. N.* —

Lixus F.

1. **paraplecticus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Mörs (Schneid.) — Soon (v. Geyr) — *H. W. N.* —

2. **iridis** Ol. — Bopp. (*B.* - *turbatus* Gyll.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kref. (Heym.) — Soon (v. Geyr) — Ahrw., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

3. **myagri** Ol. — Bopp. (daher beschrieben - *B.* - *margine-maculatus* Bach) — Ahrw. - Samml. Fuß — Winningen (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Alf (R.) — *W. N.* —

4. **Ascanii** L. — Bopp., Laach. See (*F.*) - Laach. See, Kreuzn. in Samml. Bruck mit Capiom. vid. — Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Traben (Verhoeff) — Bonn, St. (R.) — *N.*, in *W.?* —

5. **algirus** L. — Laach. See - Samml. Fuß — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — *N.* —

6. **elongatus** Goeze — Bopp. (*B.* - *filiformis* F.) — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. - Heyd.) — *N.* —

7. **cribricollis** Boh. — Trier (Mühlf.) — Kochem, St. (R.) — K. Dan. vid. omn. — *N.* [bei Rüdesheim - jetzt in Samml. Heyd. - R.] - Bergstraße, Metz [Heyd.] —

8. **bardanae** F. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck mit Capiom. vid. — Bopp. (*B.*) — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. -

Heyd.) — Winningen (Bockl.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Larinus Germ.

[*cynarae* F. — *F.* für Homberg [Pliester] - schon in *B.* II. 287 bezweifelt - Südeuropäer. —]

[*latus* Hbst.

v. costirostris Gyll. — Zebe für Elbf. - schon in *B.* II. 287 bezweifelt - nicht im Verz. *C.* - wie die in Schilsky II. für Elbf. angegebene *v. teretirostris* Gyll. nicht gut möglich. — Süd-europa. —]

[*flavescens* Germ. — *B.* II. 481 für das Ahrtal [Fuß] - von Fuß nicht veröffentlicht, noch sonst angegeben - in Samml. Fuß nur aus Frankreich. —]

[*obtusus* Gyll. — Ev., D. E. Z. 92, für Kref. - in Samml. Bruck, die dafür in Betracht kommt [Vorbemerkg. V], nicht aus Rhp. —]

1. turbinatus Gyll. — U. Nahe, St. (je 1 - Heyd. vid. - R.) — *N.* —

2. sturnus Schall. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Capiom. vid. — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. - Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kob., St.-Goar (Reitt. vid. - R.) — *W. N.* —

3. planus F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (v. Hagens - *G.*) — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. - Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Capiom. vid. — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. jaceae F. — Düssdf. (*F.*) — Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. - Heyd.) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

Rhinocyllus Germ.

1. conicus Fröl. — Bopp. (*B.* - *latirostris* Latr.) — Elbf. (1 - *C.*) — Kref., Ahr - Samml. Bruck — Aach. (Urb.) — Ahrw., Kreuzn. (je 1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. Olivieri Gyll. — Aach. (Först. - *F.* - Oliv. Megl.) — *W. N.* —

Tropiphorinae.

Tropiphorus Schönh.

1. carinatus Müll. — Aach., Düssdf. (*F.* - auch *mercurialis* F.) - *B.* II. 238 stellt Aach. zu seinem *carinatus* Müll., der nach der aus Redtenbacher entlehnten Beschreibung = *styriacus* Bed. sein müßte; dieser, auch in Schilsky I. u. II. für Rhp., kommt aber keinesfalls da vor. — Ahrw. (Fuß) — Kref. - Samml. Bruck — Kob., St. (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Rhytirrhininae.

Rhytirrhinini.

Minyops Schönh.

1. **carinatus** L. [= variolosus F. - K. Dan., Münch. K. Z. III.] — Kref., Düssdf., Trier (F.) — Kob. (Wirtgen - B.) — Hild. H., U. Solg. (G.) — Deutz, am Altwasser - Samml. Bertkau — Trier (1 - Mühlf.) — Belg., W. —

Gronops Schönh.

1. **lunatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Düssdf. in Samml. Fuß u. Geilenk. — Elbf. (Stachelhausen u. Geilenk. - C.) — H. W. N. —

Alophini.

Alophus Schönh.

1. **triguttatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Hylobiinae.

Hylobius Schönh.

1. **abietis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

2. **pinastri** Gyll. — Elbf. (2 - Stachelhausen - G.) - jetzt in Samml. Geilenk., Fundstelle Marpetal b. Barmen (Geilenk. briefl.) — N. —

3. **fatuus** Rossi — Kref. (F.) — Elbf. (C. u. G.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Viersen [le Roi], Bonn (R.) — H. W. N. —

Liparus Ol.¹⁾ = **Molytes** Schönh.

— **glabrirostris** Küst. — F. für Aach. [Fürst. - carinaerostris Megl.] - auch Aach. in B. II. 242 bei carin. Schönh., der in B. = glabrirostr. — Nicht H., in W. 208. —

1. **germanus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Bopp., Rheinböllen u. Ellern b. St. (R.) — H. W. N. —

2. **coronatus** Goeze — Aach., Kref., Bopp. (F. - coron. Latr.) — U. Solg. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Kob., St. (R.) — H. W. N. —

[**Plinthus** Germ. = **Meleus** Lac.

Tischeri Germ. — Kob. - 1 - nach Moselhochwasser (Bockl.) - Heyd. vid. — Baden, in Mitteldeutschland u. im Osten [Schilsky II.] - in den Vogesen Megerlei Pz. —]

1) Mol. laevigatus Stev., in F. für Düssdf. [Hildebr.], blieb ungedeutet - wenn = laevig. Schönh. [Gyll.], wie in Zebe für Rhp., unrichtig - Südrußland. —

Epipolaeus Weise = **Plinthus** Reitt.

1. **caliginosus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - calig. Germ.) — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — H. Acht (Heyd.) — Schmittenhöhe (Bockl.) — Eupen (Brink) — H. Venn u. Schneifel [le Roi], Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Liosoma Steph.

1. **deflexum** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - ovatum Clairv.) - Aach. (Urb.) — Elbf. (C.) - daher (Heyd.) — Bonn, Sayntal, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **oblongulum** Boh. — Soon (1 - Hubenth. vid. - R.) — Hertogenwald [1 - Heym.] - sonst im Südosten [Schilsky II.] —

— **cibrum** Gyll. — *F.* für Aach. [Fürst.] - Samml. Fürst. ergibt nichts. — Nicht *H.*, in *W.* 208. —

Trachodes Germ.

1. **hispidus** L. — Elbf. (v. Hagens - C.) — Kleve, Ahrw. (Fuß) — Duisb. (Urb.) — Schmittenhöhe (1 - Mühlf.) — St. (1 - R.) — *W. N.* —

Hyperinae.

Hypera Germ.

[**cyrta** Germ. — Schilsky I. u. II. für Elbf. - nicht im Verz. C. - Südeuropa. —]

[**oblonga** Boh. — *F.* für Homberg [Pliester - obl. Schönh.] - nicht *H. W. N.* - Südeuropa. —]

oxalidis Hbst.

v. ovalis Boh. — Hild. H. (1 - Geilenk.) - nicht Stammform, wie in Hild. H. angegeben - Belegst. Heyd. vid. — Vallendar, Chaussee nach Höhr bes. auf der Bergwiese zwischen Klmtr. 2,3 und 2,4 stets im Spätherbst n. selten (Heyd. vid. - R.) — Elsaß u. a. [Schilsky II.] —

2. **intermedia** Boh. — Kref. - 2 - Samml. Bruck mit Capiom. vid. - zwar Fundort auf dem Namenszettel, doch die einzigen Stücke der Art in Samml. Bruck. — Sonst im Süden u. Osten - auch Allergebiet [Schilsky II.] —

[**palumbaria** Germ. — *F.* für Aach. [Fürst.] u. Kref. [vom Bruck] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - im Osten [Cat. Col.] —]

[**comata** Boh. — *B.* II. 248 für Düssdf. [v. Hagens] - von v. Hagens später, insbes. für *G.* nicht angegeben, in Samml. Hagens ganz fehlend [Dom. Hag.] — Nicht *H. W. N.* - im Osten, v. borealis Krauß i. Schwarzwald. —]

3. **tessellata** Hbst. — Elbf. (1 - C.) — Kref. - Samml. Fuß - nicht Kleve, wie in Beitr. I. — Königswinter - 1 - Samml. Bertkau - Heyd. vid. — U. Nahe, St. (R.) — *N.* —

[**crinita** Boh. — Zebe für Rhp. — Fuß, Berl. E. Z. 65 für Andernach [Eigenbrodt - visnagae] - in Samml. Fuß nur Frankreich - 1 Belegst. der visnagae von Fuß auch Phyton. pastinacae [Kirsch, Berl. E. Z. 71 S. 183] — Südeuropa. —]

Phytonomus Schönh.

1. **punctatus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **fasciculatus** Hbst. — Aach., Düssdf. (F.) — Kref. - Samml. Bruck - daher auch beschrieben als variegatus Bach (B. II. 257) — U. Solg. (G.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

3. **adspersus** F. — Kref., Düssdf. (F. - pollux F.) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Wiedtal, Sayntal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. **rumicis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

5. **arundinis** Pk. — Rhp. ohne näheren Fundort - 1 - Samml. Bruck mit Capiom. vid. — *H. b. Arnheim, Maastricht.* —

— **Kunzei** Germ. — de R., Verh. Nat. Ver. 82 für Nev. [2] - in C. aufgenommen. — De R., Westf. Pr. 98, bemerkt, nach einer Mitteilung von v. Heyden werde wohl Verwechslung mit alternans Steph. vorgelegen haben . von einer Nachprüfung daraufhin verlautet nichts - kein Belegst. in Samml. Corn. (Geilenk.) — Nicht *H. W. N.* — Mitteldeutschl. u. a. —

6. **pastinaceae** Rossi.

a. **Olivieri** Cap. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Quelle nicht mehr feststellbar. — Nicht *W. N.* —

a. **tigrinus** Boh. — Kob. (Wirtgen - B. II. 255 - tigr. Schönh. mit Bestimmung nicht ganz sicher) - doch Kob. in Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — Neuenahr (2 - Heyd.) — *H. N.* —

a. **albicans** Cap. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Quelle nicht mehr feststellbar. — Nicht *W. N.* —

7. **meles** F. — Kref., Bopp. (F.) - Kref. in Samml. Bruck mit Capiom. vid. — Elbf. (C.) — Kob. (K. Dan. vid. - R. — *H. W. N.* —

a. **pallidus** Cap. — Elbf. (1 - G.) —

[**constans** Boh. — F. für Aach. [Fürst. - const. Ziegl.] - in B. const. Schönh. — Nicht *H. W. N.* - im Osten. —]

8. **nigrirostris** F. — Rhp. (F. - nigr. Gyll.) — Eibf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

9. **arator** L. = **polygoni** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Trier (Mühlf.) — Viersen [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

10. **pedestris** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - suspiciosus

Hbst.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw., Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **elongatus** Pk. — Kref. (F.) — Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

12. **plantaginis** Deg. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

13. **murinus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Düssdf. (Crumbach - B. - auch suturalis Redtb.) — Elbf. (C.) — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* —

14. **variabilis** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

15. **viciae** Gyll. — Ahrtal - Samml. Fuß - Hubenth. vid. — *W. N.* —

16. **trilineatus** Marsh. — Düssdf., Bopp. (B. - auch plagiatus Redtb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) - Belegst. Heyd. vid. — Brohltal (Andr.) — Strotzbüsch, Kob., U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* — Hierhin wohl Bradybatus trilineatus von Bopp. in B. Ent. Kl. —

Limobius Schönh.

1. **borealis** Pk. = dissimilis Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Düssdf. (B.) — U. Solg. (G.) — *H. W. N.* —

Erirrhininae.

Pissodini.

Pissodes Germ.

1. **piceae** Ill. — Forst Thronecken a. d. Mosel, einmal sehr häufig (Fuß) - Belegst. aus Samml. Fuß Heyd. vid. — Belg. [Col. Neerl.] —

2. **notatus** F. — Aach., Kref. (F. - not. Gyll.) - Aach. (Urb.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **pini** L. — Düssdf. (Hildebr. - F.) — Kref. (Ulbr.) — Bonn (1 - Fuß) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Gyllenhali** Gyll. — F. für Aach. [Fürst.] - nicht *H. W. N.* - im Norden u. Osten. —]

4. **piniphilus** Hbst. — Kref. (1 von Puhlmann gfd. - Ulbr.) - jetzt in Samml. R. - Hubenth. vid. — *N.*, nicht *H. W.* —

Erirrhinini.

Procas Steph.

1. **armillatus** F. — Kref. (daher nach einem Funde von vom Bruck beschrieben - B. II. 296 - moestus Bach) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - Steveni - u. 65) — Kleve, Goch (Fuß) — Stommeln (1 - Raderm.) — Belg. [Col. Neerl.] - Thüringen [Schilsky II.] —

Grypidius Steph.

1. **equiseti** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (1 - C.) — Bonn, Laach.
See, Kochem, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **brunneirostris** F. — Aach. (F.) — Kref. (B.) — Elbf. (C.)
— Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Viersen [le Roi], Oberwerth
(R.) — *H. W. N.* —

Pachytychius Jekel.

1. **sparsutus** Ol. — Kreuzn. (vom Bruck - *B.* - Tychius) -
Belegst. aus Samml. Bruck Heyd. vid. — Oberstein, auf Genista
pilosa (Heyd.) — Col. Neerl. für Elbf. - nicht im Verz. *C.* — *N.*,
nicht *H. W.* —

Erirrhinus Schönh.

1. **festucae** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Stenden
u. Weinfeld. Maar [le Roi], Laach. See, Güls, Trier (R.) — *H.*
W. N. —

2. **Nereis** Pk. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.)
— Weinfeld. Maar [le Roi], Ahrw., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **scirrhosus** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. - Samml.
Fuß - Hubenth. vid. — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. - Hubenth.
vid. — *H. W. N.* —

Notaris Steph.

1. **bimaculatus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) —
U. Solg. (G.) — Bonn, Oberwerth. (R.) — *H. N.* —

2. **scirpi** F. — Elbf. (1 - C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Duisb.
(Urb.) — Laach. See (Fuß) — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.)
— *H. W. N.* —

3. **acridulus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) —
Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., Soon (R.) — *H. W.*
N. —

v. **montanus** Tourn. — Soon (1 - Hubenth. vid. - R.) —
Kassel, sonst im Osten [Schilsky II.] —

Dorytomus Steph.

1. **longimanus** Forst. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - vorax
F.) — Nev., U. Solg. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Oberwerth
(R.) — *H. W. N.* —

a. **macropus** Redtb. — Aach. (F.) — Nev., U. Solg. (G.) —
Kref. - Samml. Ulbr. — Bonn, U. Nahe (R.) — *W. N.*

2. **tremulae** Pk. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck
— Bopp., Kreuzn. (B. - auch variegatus Schönh.) — Düssdf. -
Samml. Fuß — Bonn, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **tortrix** L. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn,
Laach. See, Nettetal, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **nebulosus** Gyll. — Ahrw. - Samml. Fuß — Laach. See, Kob., Kreuzn. (K. Dan. vid. - R.) — *H.* —

5. **validirostris** Gyll. — Elbf. (1 - C.) — Kref. (Ulbr.) — Ahrw. (Fuß) — Siegmdg., Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**hirtipennis** Bed. — *H.*, verbr. u. nicht slt., *N.*, u. über ganz Deutschland [Schilsky II.] - wohl auch in Rhp. —]

6. **flavipes** Pz. — Aach. (F. - suratus Megl.) - in *B.* II. 301 sur. Schönh. — Elbf. (Corn. - G.) — Kref. - Samml. Bruck mit Wenck. vid. — Sayntal, Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

7. **filirostris** Gyll. — U. Solg. (G.) — Ahrw. (Fuß) — Duisb. (Urb.) — Viersen [le Roi], Bonn [Frings], Laach. See, Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **Dejeani** Faust = costirostris Gyll. — Kref. (B.) - daher in Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Elbf. (C.) — Nev. (de R.) — Bonn, Siebengbg., Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

9. **taeniatus** F. = bituberculatus Zett. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Nev. (de Rossi - G.) — Kref. - Samml. Bruck - taen. F. u. Silbermanni Wenck. mit Wenck. vid. — *H. W. N.* —

10. **affinis** Pk. — Aach., Kref. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Elbf. (C.) — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* —

[**occalescens** Gyll. — Zebe für Rhp. - nicht *H. N.*, *W.?* - im Süden und Osten. —]

11. **melanophthalmus** Pk. — Kref. (B. - punctator Hbst.) - daher in Samml. Ulbr. - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (C. - punct. Hbst. u. agnathus Boh.) — U. Nahe (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. clitellarius Boh. — Kref. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. - Kref. (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Winningen (Bockl.) - Hubenth. vid. —

12. **majalis** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) · von Kref. nicht in Samml. Bruck — Elbf. (C.) - daher, aus Samml. Corn., Reitt. vid. — *W. N.* —

13. **salicis** Walt. — Kref. - 1 - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — *N.* —

14. **salicinus** Gyll. — Aach. (Fürst. - F.) — Kref. - Samml. Bruck mit Wenck. vid. - daher in Samml. Fuß - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

15. **rufulus** Bed. — Aach., Kref. (F. - pectoralis Gyll.) — Bopp. (B. - pect. Pz.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Elztal (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

16. **dorsalis** L. — Aach., Kref. (F. - dors. Pk.) - Kref. in Samml. Bruck — *W. N.* —

Smicronychini.

Smicronyx Schönh.

1. **jungermanniae** Reich — Aach., Kref. (*F.* - variegatus Schönh.) — Bopp., Kreuzn. (*B.*) - Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

2. **coecus** Reich — Kref. (*B.* - politus Schönh.) - daher u. Siebengbg. in Samml. Bruck mit Wenck. vid. — Ahrw. (Fuß) - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Tanyssphyrini.

Tanyssphyrus Germ.

1. **lemnæ** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

Bagoini.

[Anordnung nach Schilsky II.]

Orthochaetes Germ.

1. **setiger** Beck — Aach., Kref. (*F.* - Styphlus) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.* II. 327) — *H. W. N.* —

Pseudostyphlus Tourn.

1. **pilumnus** Gyll. — *B.* Ent. Kl. für Bopp. - doch nicht in der Fauna II. 297 — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

Hydronomus Schönh.

1. **alismatis** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß) — Bonn (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

Bagous Schönh.

1. **cylindrus** Pk. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — U. Nahe (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

[lutosus] Gyll. — *F.* für Kref. [vom Bruck], Ürdingen [Stollwerck] u. Elbf. [Corn.] - nicht in Samml. Bruck, noch im Verz. *C.* - Ürd. ohnehin zweifelhaft. — Doch *H. W.* —]

2. **glabrirostris** Hbst. — Aach., Kref. (*F.* - lutulentus Gyll.) - Kref. in Samml. Bruck - collignensis Hbst. - mit Tourn. vid. — Elbf. (1 - *G.*) — *H. W. N.* —

3. **nigritarsis** Thoms. — Kref. (Kraatz, Berl. E. Z. 71 S. 169) - daher [Ulbr.] in Samml. R. - Schilsky vid. — Ahrw. (Fuß) — *H. N.* —

4. **diglyptus** Boh. — Aach. (Först. - *F.*) — Belg. [Col. Neerl.] — *N.*, b. Niederlahnstein [Schilsky vid. - R.] —

5. **limosus** Gyll. — Oberwerth (1 - Schilsky vid. - R.) — *H. —*

6. **frit** Hbst. — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Schilsky vid. — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — U. Nahe (Schilsky vid. - R.) — *H. N.* —

7. **lutulosus** Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — *H. W. N.* —

8. **tempestivus** Hbst. — Aach. (Först. - F. - daher auch beschrieben tessellatus Först. u. adspersus Först.) — nicht Elbf., wie *F.* angibt, nicht in *C.* — *H. W. N.* —

Cossoninae.

Dryophthorus Schönh.

1. **corticalis** Pk. — Bopp. (*B.* - lymexylon *F.*) — Kref. - Samml. Bruck — Ernster Wald b. Kochem (1 - R.) — *W. N.* —

Cossonus Clairv.

1. **parallelepipedus** Hbst. = ferruginens Clairv. — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

2. **linearis** F. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Laach. See, Oberwerth, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. **cylindricus** Sahlb. — Aach. (*F.* - cyl. Dej.) — Bopp., in *F.* angegeben, doch nicht in *B.* II. 388 — Kref. - Samml. Bruck — Elbf., in Mehrzahl (Geilenk.) — *H. N.*, u. Soest [Verhoeff.] —

Eremotes Wollast.

[**ater** L. = chloropus *F.* — *F.* für Düssdf. [Braselm.] u. Homberg [Pliester] - war von Düssdf. nach *B.* II. 390 Rhync. truncorum Homberg ohnehin zweifelhaft - daher, wenn auch in *W. N.*, noch des Nachweises bedürftig. —]

1. **punctatus** Boh. — Kob. - Samml. Fuß — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. N.* —

2. **reflexus** Boh. — Bopp. (*B.* II. 391) — *N.* —

— **porcatus** Germ. — *F.* für Homberg [Pliester] - von *B.* II. 390 aufgenommen entgegen dem sonstigen Übergehen von Homb. - ob Untersuchung, wie bei *ater*, stattgefunden? — *N.*, nicht *H. W.* —

Rhyncolus Germ.

1. **truncorum** Germ. — Düssdf., Bopp. (*B.* - trunc. Gyll.) — U. Solg. (G.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **lignarius** Marsh. — Bopp. (*B.* - cylindrirostris Ol.) — U. Solg. (G.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **turbatus** Schönh. — *B.* II. 490 für Bopp., Düssdf. - Fuß, Berl. E. Z. 59 für Düssdf. [nicht selten] - fehlt in Samml. u. Sammlungsverzeichnis Fuß u. auch in Samml. v. Hagens [Dom. Hag.], von dem die Angabe Düssdf. in *B.* herrührt - deshalb, zumal nicht in *H. W. N.*, zweifelhaft. —

Cryptorrhynchinae.

Gasterocercus Lap.

— **depressirostris** F. — Aus Eichenrinde von Neuhäusel b. Ehrenbreitstein, jenseits der Gebietsgrenze, erzogen von Bockl. - wohl auch im Gebiet. — *N.* —

Cryptorrhynchus Ill.

1. **lapathi** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Acalles Schönh.

1. **camelus** F. — Siebengbg. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Schnittenhöhe (Mühlf.) — *N.* —

2. **ptinoides** Marsh. — Aach., Kref. (*F.* - nocturnus Schönh.) - Kref. in Samml. Bruck u. Fuß — *H. W. N.* —

3. **roboris** Curt. — Kref. (*B.* - abstersus Schönh.) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Laach. See, Kob., Horchheim (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **hypocrita** Boh. — Barmen (Stachelhausen - *C.*) — Oberwerth, mehrfach (Mühlf. u. R.) — *N.* —

5. **turbatus** Boh. — Aach., Kref. (*F.* - turbatus Schönh. u. a., nudiusculus Först.) — Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **echinatus** Boh. -- Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

Ceutorrhynchinae.

Ceutorrhynchini.

[Die Ceutorrhynchini der Samml. R. sind, meist auch für alle Fundorte, von A. Schultze, nach ihm von Dr. K. Daniel revidiert.]

Mononychus Germ.

1. **punctum-album** Hbst. — Kref., Duisb. (*F.* - pseudacori F.) - Kref. (Heym.) — Elbf. (*C.*) — M.-Gladbach (1 - R.) — *H. W. N.* —

Coeliodes Schönh.

1. **ruber** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß) - daher in Samml. Schultze (K. Dan.) — Löhndorf - Samml. Raderm. — *H. W. N.* —

2. **erythroleucus** Gmel. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - subrufus Hbst.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Löhndorf (Raderm.) — Brohltal, Laach. See, Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

3. **dryados** Gmel. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - quercus F.) — Elbf. (*C.*) — Kob., Brodenbach, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **trifasciatus** Bach — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Ahrw. (Fuß) — Breyeller See [le Roi], Nettetal, Kob., St. (R.) — *H. N.* —

5. **rubicundus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - rub Pk.) —

Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß) — Vallendar, Kob. (R.) — H. W. N. —

Stenocarus Thoms.

1. **cardui** Hbst. — Aach., Kref. (F. - guttula F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — H. W. N. —
2. **fuliginosus** Marsh. — Aach. (Fürst. - F.) — Saarl. (Gabr.) — Löhndorf - Samml. Raderm. — U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

Craponius Leconte.

1. **epilobii** Pk. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Belegst. aus Samml. Corn. K. Dan. vid. — H. W. N. —

Cidnorrhinus Thoms.

1. **quadrimaculatus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - didymus F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Nettetal, Kob. (R.) — H. W. N. —

a. **immaculatus** Gyll. — Kob. (1 - R.) — N. —

Coeliastes Weise.

1. **lamii** F. — Aach. (daher beschrieben - F. - congener Fürst.) — Bopp. (B.) — Elbf. (Reitt. vid. - G.) — Kref. - Samml. Bruck — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Tönnesstein, Nettetal (R.) — W. N. — Hierhin punctulum Hbst., in F. für Aach., Kref., der im Cat. Col. nicht mehr angeführt. —

Allodactylus Weise

1. **exiguus** Ol. — Ahrtal (v. Hagens - B.) - daher auffallenderweise nicht in Samml. Fuß - doch H. W. N. —

2. **affinis** Pk. — Aach. (F. - geranii Pk.) — Bopp. (B.) — Ahrtal (Fuß) — Elztal, St. Goar, St. (R.) — H. W. N. —

[**asperatus** Gyll. — C. für Elbf. [1 - Corn. - Coeliodes asp.] - Osteuropäer - Belegst. der Samml. Corn. ein Rhinoncus asperatus Gyll. = bruchoides Hbst. - K. Dan. vid. —]

Rhytidosoma Steph.

1. **globulus** Hbst. — Aach. (Fürst. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — St. (R.) — H. W. N. —

2. **fallax** Otto — Schmittenhöhe, im Hochwald nördlich vom Wirtshaus (1 Anfang Sept. 07, 1, jetzt in Samml. Dan., Anfang Juli 09 - R.) — Bisher aus den Ostalpen bekannt, Zwischenfundorte, außer Vorarlberg [Schilsky II.], fehlen. —

Amalus Schönh.

1. **haemorrhous** F. = scortillum Hbst. — Aach. (F.) — Kref. (B.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Laach. See, Kob., Kreuzn. (R.) — H. W. N. —

Rhinoncus Steph.

1. **castor** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Düssdf. (von A. Schultze - R.) — *H. W. N.* —

2. **bruchoides** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Vallendar (R.) — *H. W. N.* —

3. **gramineus** F. = inconspectus Hbst. [im Cat. Col. fehlend] — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Sayntal, Nettetal, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

4. **pericarpius** L. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

5. **perpendicularis** Reich — Aach., Kref. (F. - guttalis Grav. u. subfasciatus Gyll.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Vallendar, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

6. **albicinctus** Gyll. — Kref. (vom Bruck - F.) — Kleve, sehr häufig (Fuß) - Belegst. aus Samml. Fuß K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Phytobius Schönh.

1. **canaliculatus** Fahrs. — Ahrw. (Fuß) — Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

2. **Waltoni** Boh. — Elbf. (Corn. - C.) — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —

3. **comari** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Werden in Samml. Schultze (K. Dan.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Bonn, Sayntal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. **quadrifituberculatus** F. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Wiedtal, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **quadrinodosus** Gyll. — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß) — Saarl. (Gabr.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

6. **quadricornis** Gyll. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Düssdf. in Samml. Schultze (K. Dan.) — *H. W. N.* —

7. **leucogaster** Marsh. — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Kleve (Fuß) — Düssdf. (von A. Schultze - R.) — *H. W. N.* —

8. **velatus** Beck — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Phrydiuchus Gozis.

1. **topiarius** Germ. — Bonn (1 - R.) - nicht St., wie Beitr. II. — *N.* —

Ceutorrhynchidius Duv.

1. **horridus** Pz. — Ürdingen (Stollwerck - F.) — Kob. (Fuß) — *W. N.* —

2. **troglodytes** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **rufulus** Duf. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — Elsaß [Schilsky II.], *H. N.* —

Micrelus Thoms.

1. **ericae** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, H. Venn, Schneifel [Reichensp.], Kob. (*R.*) — *H. W. N.* — [**ferrugatus** Perris — *C.* für Nev. [1 - de Roi] — Südeuropäer - Angabe schon von A. Schultze, D. E. Z. 98 S. 267, bezweifelt - das in Samml. Corn. gelangte Belegst. ist *ericae*, unreif, rot - K. Dan. vid. —]

Ceutorrhynchus Germ.¹⁾.

1. **terminatus** Hbst. — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 - *R.*) — *H. W. N.* —

2. **apicalis** Gyll. — Kob. (2 - *R.*) — *H. N.* —

3. **quercicola** Pk. — Aach. (*F.* - auch *depressicollis* Gyll.) — Kref. (Mink - Kraatz, Berl. E. Z. 67 S. 386 - *versicolor* Bris. n. sp. ined.) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Kob., Elztal (je 1 - *R.*) — *H. W. N.* —

4. **nigrinus** Marsh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Arenberg b. Kob. (*R.*) — *H. N.* —

5. **floralis** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Kob., Trier, St., Kreuzn. (*R.*) — *H. W. N.* —

6. **pyrrhorhynchus** Marsh. — Kref. (*B.* II 357) — Elbf. (*C.*) — Wiedtal (1 - *R.*) — *H. W. N.* —

7. **pulvinatus** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) - in Rhp. nicht wieder aufgefunden, doch *H. W. N.* —

8. **rhenanus** Schultze — Kob. (1 ♂ - Schultze, D. E. Z. 95 S. 424) — Frankreich u. a. [Cat. Col.] —

9. **posthumus** Germ. — Aach., Kref. (*F.* - *pumilio* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

10. **melanarius** Steph. — Aach., Kref. (*F.* - *convexicollis* Schönh.) — Elbf. - Samml. Corn. - K. Dan. vid. — Kleve in Samml. Schultze (K. Dan.) — *H. W.* —

11. **viduatus** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Elbf. (*C.*) — Kob. (Mühlf. u. *R.*) — *H. W. N.* —

12. **abbreviatulus** F. — Kref. (1 - Ulbr.) - in Samml. R. — Sayntal, U. Nahe (je 1 - *R.*) — *W. N.* —

13. **geographicus** Goeze — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *echii*

1) Ceuth. congener Schüpp., in *F.* für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet, ebenso *C. crenatulus* Bach, *B.* II. 489 von Kref. nach einem Funde von vom Bruck beschrieben [nicht in Samml. Bruck]. —

F.) - Düssdf. in Samml. Schultze (K. Dan.) — Elbf. (C) — Mosel (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

14. **crucifer** Ol. — Aach. (Först. - F.) — Bopp. (B. II. 366) — *H. W. N.* —

15. **larvatus** Schultze — Kreuzn., im Geisenheynerschen Garten auf Pulmonaria obscura Dumort., Bienhorntal b. Kob. (R.) — Bayern u. a. [Schilsky II.] —

16. **litura** F. — Aach., Kref. (F.) - Kref. (Ulbr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (C.) - daher [Mühlf.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

17. **trimaculatus** F. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (Stachelhausen - C.) — *H. W. N.* —

18. **asperifoliarum** Gyll. — Aach., Kref. (F. - asp. Kirb.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

19. **pallidicornis** Bris. — Arenberg b. Kob. (1 - R.) — Mitteleuropa [Cat. Col.] —

20. **albosignatus** Gyll. — Kref. (Mink - Kraatz, Berl. E. Z. 97 S. 386) - daher in Samml. Bruck - K. Dan. vid. — St. (1 - R.) — *H. N.* —

[**urticae** Boh. — für Schilsky II. als in Rhp. vorkommend auf Grund Bestimmungsfehlers angegeben von R. - scheint auch dem Osten u. Süden anzugehören. —]

21. **euphorbiae** Bris. — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. — *N.* —

22. **sympyti** Bed. — Aach., Kref. (F. - raphani F.!) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. Mühlf.) — Kreuzn., Söbernheim (R.) — *H. W. N.* —

23. **angulosus** Boh. — Kref. (1 - Fuß) — H. Venn (Fred.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Vallendar, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

24. **suturalis** F. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

25. **arquatus** Hbst. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) - Belegst. aus Samml. Corn. K. Dan. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Kob. (1 - R.) — *H. W.* —

26. **campestris** Gyll. — Bopp. (B.) — Nev. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

27. **millefolii** Schultze — Barmen [Kraatz] u. Köln (Schultze, D. E. Z. 96 S. 271) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — Mitteldeutschl. [Schilsky II.] —

28. **chrysanthemi** Germ. — Aach., Kref. (F. - chrys. Müll.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W.* —

[**figuratus** Gyll. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - das Belegst.

der Samml. Corn. ist der im Verz. C. nicht angeführte *triangulum* - K. Dan. vid. — Im Norden u. Osten [Cat. Col.] —

29. **triangulum** Boh. — Elbf. (2 - Reitt. vid. - G.) - daher auch in Samml. Corn. — Bopp. (Schultze - N. 349) — Kob., St. (R.) — H. W. u. Mainz [in Samml. Schultze - K. Dan.] —

30. **rugulosus** Hbst. — Aach. (F.) — Kref. (B.) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (C.) — H. W. N. —

31. **melanostictus** Marsh. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

32. **denticulatus** Schrk. — Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Kob., St. (R.) — H. W. N. —

33. **macula-alba** Hbst. — Aach., Kref. (F.) - Kref. (1 - Geilenk.) — Elbf. (C.) — Nev. (de Rossi - G.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

34. **marginatus** Pk. — Aach. (F. - marg. Schönh.) -- Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (R.) — H. W. N. —

— **distinctus** Bris. — Cat. Col. für „Rhenan.“ - schwerlich in Rhp. - beschrieben aus den Pyrenäen u. England - Cat. Col. noch Südrußland - sonst nicht in Deutschl. [Schilsky II.] —

35. **Möllerii** Thoms.

a. **rotundatus** Bris. — Trier (1 - R.) — H. [die Art], Frankr. u. a. [Cat. Col.] —

36. **punctiger** Gyll. — Aach., Kref. (F. - punct. Megl.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Nettetal, Kob. (R.) — H. N. —

37. **pilosellus** Gyll. — Kleve (1 - Fuß) - Belegst. Schultze vid. — H. [anscheinend mit Bedenken], Frankr. u. im Osten [Cat. Col.] —

— **resedae** Marsh. — F. für Aach. [Fürst.] u. Düssdf. [Braselm.] - von B. aufgenommen. — Nicht W. N., in H., daher wohl richtig. —

38. **pollinarius** Forst. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98, II. Nachtr. - glaucinus Boh.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, Nettetal (R.) — H. W. N. —

39. **pleurostigma** Marsh. — Bopp. (B. - sulcicollis Gyll.) — Elbf. (C.) — Kref. (Ulbr.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., nicht selten (R.) — H. W. N. —

40. **Roberti** Gyll. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — H., Frankreich u. a. [Cat. Col.] —

a. **alliariae** Bris. — Kref. (Ulbr.) — Schmittenhöhe, Laubbach b. Kob., Rhens (R.) — H. —

41. **puncticollis** Boh. — Kob. (Fuß) — Kob., St. (R.) — Sachsen u. im Osten [Schilsky II.] —

42. **griseus** Bris. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — R., Beitr. II., für St. unrichtig. — Frankreich u. a. [Cat. Col.] —

43. **obsoletus** Germ. — Kref. (Mink - F.) - daher nicht in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. verloren. — Doch W. N. u. über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

44. **rapae** Gyll. — Kref. (B.) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — H. W. N. —

45. **napi** Gyll. — Kref. (F. - napi Koch) — Elbf. (C.) — Kleve, Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saynthal, Kob. (R.) — H. W. N. —

[**borraginis** F. — F. für Kref. [Mink u. vom Bruck] - so auch B. III. 361 - in Samml. Bruck nur Südfrankreich - in Samml. Mink fehlend (Lange). — Nicht H. N. - für W. angegeben. —]

46. **syrites** Germ. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. verloren. — Aus Rhp. nicht in Samml. Bruck - doch H.W. N. —

[**arator** Gyll. — R., Beitr. I, für Ahrw., Kleve [Fuß] - nach den Belegst. der Samml. Fuß napi - K. Dan. vid. — Östliche Art (Schultze, D. E. Z. 93) —]

47. **assimilis** Pk. — Aach., Kref. (F.) — Kref. in Samml. Ulbr. — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Laach. See, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

48. **constrictus** Marsh. — Kref. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — Rhens (1 - R.) — H. N. —

49. **cochleariae** Gyll. — Aach., Kref. (F. - auch atratulus Gyll) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Bopp. in Samml. Schultze (K. Dan.) — Kob., St. (R.) — H. W. N. —

50. **nanus** Gyll. — Kref. (F. - nan. Bess.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Laach. See (Fuß) - Belegst. Schultze vid. — R., Beitr., II. für St. unrichtig. — W. N. —

51. **atomus** Boh. — Aach. (F. - setosus Märk.) — Bopp. (B. - set. Schönh.) — Elbf. (C.) — Laach. See, Kob. (R.) — H. W. N. —

[**sophiae** Stev. — C. für Elbf. [Corn.] - die 2 Belegst. der Samml. Corn. sind melanarius, der in C. für Elbf. nicht angeführt ist - K. Dan. vid. — Auch nicht H. W. N. —]

52. **querceti** Gyll. — Kref. (Ulbr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — alboscutellatus Gyll. von Düssdf. [Fuß] in Beitr. I. von R. unrichtig hierhin gestellt. — H. —

53. **consputus** Germ. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Düssdf. - Samml. Fuß - alboscutellatus Gyll. - Belegst. Schultze vid. — Vallendar (R.) — Über ganz Deutschland (Schilsky II.) --

54. **quadridens** Pz. — Aach., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Trier (Schultze vid. . Mühlf.) — Brohltal, Kob. (R.) — H. W. N. —

55. **pictarsis** Gyll. — Ahrw., Kob. (Fuß, Berl. E. Z. 65) - Belegst. aus Samml. Fuß Schultze vid. — Kref. (1 - Geilenk.) — *H. N.* —

56. **sulcicollis** Pk. — Aach. (*F.* - cyanipennis Ill.) — Elbf. (*C.*) — Düssdf. in Samml. Schultze (K. Dan.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

57. **carinatus** Gyll. — St. (1 - R.) — *N.* —

58. **scapularis** Gyll. — Aach. (*F.* - obscurecyaneus Schönh.) — Elbf. (1 - Reitt. vid. - *[G.]*) — Duisb. (Urb.) - Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. [Bockl.] in Samml. R. — *H. N.* —

59. **pervicax** Weise [= suturellus Gyll.] — Vallendar, Kob., Soon (R.) — *W. N.* —

60. **erysimi** F. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) - Reitt. vid. — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. cyaneus Weise — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. —

61. **contractus** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) - Reitt. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — St. Goar, St. (R.) — *H. W. N.* —

62. **hirtulus** Germ. — Aach. (Först. - *F.* - hirt. Schüpp.) - nicht auch Elbf. [Corn.], wie *F.* angibt, nicht in *C.* — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* —

63. **chalybaeus** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Ahrthal - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

64. **Leprieuri** Bris. = Rübsameni Kolbe — U. Nahe, aus Gallen erzogen (Rübsamen, Ent. Nachr. 1900 S. 230) - nach mündl. Mitteilung des Entdeckers rheinabwärts, woher er viele Gallen erhielt, weit verbreitet. — Mitteleuropa [Cat. Col.] —

65. **moguntiacus** Schultze — Kob. (1 - R.) — *H. N.* —

[laetus Rosh. — Schilsky II. für Rhp. - irrtümlich angegeben [Schilsky briefl.] —]

66. **nasturtii** Germ. — Kref. (Mink, Stett. E. Z. 53 - Poophagus) - daher in Samml. Schultze (K. Dan.) — Benrath (Ulbr., Verh. Nat. Ver. 09 E. 115) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

Poophagus Schönh.

1. **sisymbrii** F. — Düssdf. (*F.*) — Kref. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Oberwerth, Trier (R.) — *H. W. N.* —

Tapinotus Schönh.

1. **sellatus** F. — Kref., Bonn (*F.*) — Laach. See (*B.*) - daher in Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Siegmdg. [Frings], St. (R.) *H. W. N.* —

Orobitis Germ.

1. **cyaneus** L. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Coryssomerini.**Coryssomerus** Schönh.

1. **capucinus** Beck — Aach. (F.) — Kref. (B.) - daher in Samml. Bruck — Brohlthal (2 - Andr.) — Oberwerth (1 - K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

Barini.**Baris** Germ.

1. **atricolor** Boh. — Düssdf., Köln (A. Schultze - Schilsky, D. E. Z 92 S. 204) - Köln in Samml. Schultze (K. Dan.). — Sonst nur im Südosten [Cat. Col.] —

2. **artemisiae** Hbst. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — Bonn, Kob. (R.) — *W. N.* —

3. **morio** Boh. — Aach. [Kaltenbach], Ahrtal [Fuß], Kob. [Eigenbrodt], Bopp. (B. II. 485 = resedae Bach) - Ahrtal in Samml. Fuß u. Bruck. — *W. N.* —

4. **laticollis** Marsh. = *picina* Germ. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C. - *glabra* Hbst.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**timida** Rossi = *nitens* F. — *F.* für Aach. [Fürst.], Bopp. [Bach], Düssdf. [Braselm.] - in B. II. 328 nicht für Bopp., 485 Vorkommen in Rhp. bezweifelt. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

[**angusta** Brull. — *F.* für Düssdf. [Hildebr. - *violacea* Schönh.] - *B.* nicht für Deutschl. - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl). — Nicht *H. W. N.* - Osteuropa. —]

5. **cuprirostris** F. — Bopp, sehr häufig (B.) - daher in Samml. Fuß — Hild. H. (Geilenk.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

6. **lepidii** Germ. — Kref., Düssdf. (F. - *lep.* Müll.) — Elbf. (C.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

7. **coerulescens** Scop. — Elbf. (1 - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — U. Nahe, St. (R.) — *W. N.* —

a. **chloris** F. — Bopp. (B. II. 329) — *W. N.* —

8. **picicornis** Marsh. — Kref., Düssdf., Bopp. (B. - *punctatus* Schönh.) — U. Solg. (G.) — Bonn, Ahrw., Tönnesstein, Kob. (R.) — *H. N.* —

9. **chlorizans** Germ. — Aach. (F.) — Kref., Bopp. (B.) - Kref. in Samml. Bruck -- Elbf. (C.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Limnobaris Bed.

1. **T-album** L. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

Calandrinae.

Sphenophorus Schönh.

1. **striatopunctatus** Goeze = *mutilatus* Laich. — Aach., Bopp., Kreuzn. (F. - abbreviatus F.!) - die älteren Angaben des abbr. F. hierhin, so *B.* II. 387, mit den Fundorten wie *F.*, erkennbar nach der Beschreibung - cf. noch *N.* 354 — Ahrtal (Fuß u. Heyd.) — Winningen, Kob. (Bockl.) — Bonn, u. nicht selten U. Nahe, St. (R.) — *N.* —

Calandra Clairv.

1. **granaria** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

[**oryzae** L. — Rhp. (F.) — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 44) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* - durch den Handel überallhin verschleppt [*N.* 355] —]

Tychiinae.

Tychiini.

Balaninus Sam.

1. **elephas** Gyll. — Elbf. (C. u. G.) — *W. N.* —

2. **venosus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (*B. glandium* Marsh.) — Elbf. (C. - *gland.* Marsh.) — Bonn, Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

3. **villosus** F. — Rhp. (F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (C. u. G.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **nucum** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Linz, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **glandium** Marsh. = *turbatus* Gyll. — Aach. (F.) — Kref., Bopp. (*B.*) — Elbf. (C. - *tessellatus* Fourc.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **cerasorum** Hbst. — Kref. (*B.*) — Elbf. (C. u. G.) — U. Nahe (zahlreich - R.) — R., Beitr. I, für Bonn trifft *rubidus*. — *H. W. N.* —

7. **rubidus** Gyll. — Aach. (F. - rub. Dej.) — Elbf. (C. - *betulae* Steph.) — Kref. - Samml. Brink — Bonn (Fuß) — *H. W. N.* —

Balanobius Jekel.

1. **crux** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **salicivorus** Pk. — Rhp. (F. - *brassicae* F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.*

3. **pyrrhoceras** Marsh. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Anthonomus Germ.¹⁾.

1. **varians** Pk. — Aach. (*F.* - *melanocephalus F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — Nev. (1 - *G.*) — Kref. (*Ulbr.*) — Winningen (Bockl.) — Bonn (1 - *R.*) — *H. W. N.* —

a. **perforator** Hbst. — Elbf. (1 - *G.*) —

2 **rubi** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (*Urb.*) — Saarl. (*Gabr.*) — Linz, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **sorbi** Germ. — Eupen (Reitt. vid. - Heym.) — Norddeutschland u. a. [Cat. Col.] —

4. **pubescens** Pk. — Kob. (1 - Bockl.) - Hubenth. vid. — *N.* —

5. **cinctus** Kollar — Elbf. (*C.*) — Nev. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Wiedtal, Kob., St. (K. Dan. vid. — - *R.*) — *H. N.* —

6. **inversus** Bed. — Aach., Kref. (*F.* - *ulmi Deg.!*) — Elbf. (*C.*) — Oberwerth, U. Nahe (K. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

7. **pedicularius** L. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Kob. (1 - Mühlf.) — Montjoie (1 - K. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

8. **rufus** Gyll. — Ruine Olbrück i. Brohltal (K. Dan. vid. - *R.*) — *N.* —

9. **pomorum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **humeralis** Pz. — Bopp. (*B.* - *incurvus Pz.*) - daher in Samml. Bruck — Nev. (de Rossi - *C.*) — Elztal, Kob. [Bockl.], Soon u., jenseits der Gebietsgrenze, Niederlahnstein (K. Dan. vid. - *R.*) — *H. W.* —

11. **rectirostris** L. — Rhp. (*F.* - *druparum L.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Bradybatus Germ.²⁾.

1. **Creutzeri** Germ. — Bopp. (*B.* II. 306) — *N.* —

Brachonyx Schönh.

1. **pineti** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *indigena Hbst.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Acalyptus Schönh.

1. **carpini** Hbst. — Aach. (Först. - *F.*) — *H. W. N.* —

a. **alpinus** Villa — Elbf. (1 - Drescher u. Osttheide - Reitt. vid. - *G.*) — *H. W. N.* —

1) Anth. *dorsalis* Stm., in *F.* für Kref. [Mink], blieb ungedeutet. —

2) Brad. *trilineatus*, in *B.* Ent. Kl. für Bopp., wohl = *Phytonomus tril.* —

Elleschus Steph.

1. **scanicus** Pk. — Aach. (F.) — Kref., Kob., Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Oberwerth (Mühlf.) - daher in Samml. R. - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

2. **bipunctatus** L. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C) — Trier (Mühlf.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **infirmus** Hbst. — Aach., Kref. (F. - Dorytomus) - Kref. in Samml. Bruck — Oberwerth (Mühlf.) - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W.* —

Lignyodes Schönh.

1. **enucleator** Pz. — Düssdf. (Hildebr. - B.) — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

Tychius Germ.

1. **quinquepunctatus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **lineatulus** Steph. — Laach. See, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

3. **Schneideri** Hbst. — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — *H. W.* — Ob hierhin T. Schneideri Hbst. in F. für Aach. [Fürst.] u. in B. II. 314 für Düssdf. [jedenfalls nach v. Hagens, wie T. Schneideri Hbst. in G. für U. Solg.], oder zu lineat. Steph. = Schneideri Gyll., wohin in Col. Neerl. die Angabe von Düssdf. gestellt ist, bleibt ungewiß. —

4. **venustus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F) — Elbf. (C.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**striatulus** Gyll. — Zebe für Rhp. - jedenfalls nach F. mit striat. Dej. für Kref. [Mink] - fehlt in Samml. Mink ganz (Lange briefl) -- Nicht *H. W. N.* —]

5. **crassirostris** Kirsch — Kob. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. - daher auch in Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Sonst im Süden u. Osten [Schilsky II.] —

aureolus Ksw.

v. medicaginis Bris. — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Über Mitteldeutschl. [Schilsky II.] —

7. **junceus** Reich — Bopp. (B. Ent. Kl.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck - flavicollis Boh. - mit Tourn. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

8. **melioloti** Steph. — Bopp. (B.) - daher in Samml Bruck u. Fuß — Kob. (Gabr.) - Kob. in Samml. Mink (Lange) — Sayntal, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

9. **pusillus** Germ. — Ahrw. (Kraatz, Berl. E. Z. 67 S. 385 - pygmaeus Bris.) — *H. N.* —

10. **tomentosus** Hbst. — Rhp. (F.) — Nev. (C.) — Elbf. (G.) — Sayntal, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

11. **picrostris** F. — Aach., Kref., (F.) — Elbf. (C. - auch posticus Gyll.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Sibinia Germ.

1. **sodalis** Germ. — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Sonst im Süden und Osten [Schilsky II.] —

2. **signata** Gyll. — Aach., Kref. (F. - primita Hbst.) - Kref. in Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Düssdf. (B.) — Elbf. (C.) — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **variata** Gyll. — *F.* für Aach. [Fürst. - var. Chevr.] - in B. II. 318. [var. Schönh.] zweifelhaft - doch *H. N.* —

[**attalica** Gyll.

v. tibiella Gyll. — *F.* für Aach. [Fürst. - tib. Schönh.] - in B. II. 318 anscheinend angezweifelt. — Nicht *H. W. N.* - Südeuropa.—]

3. **cana** Hbst. — Elbf. (1 - C. - pellucens Scop.) — Ahrw. (Fuß) — Kob., U. Nahe (R.) — *W. N.* —

4. **viscariae** L. — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Ahrtal - Samml. Bruck — Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. **potentillae** Germ. — Kref. (Mink - B.) daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Nev. (de Rossi - C.) — St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Orchestini.

Anoplus Schönh.

1. **plantaris** Naezen — Aach., Kref., Düssdf. (F. - plant. Gyll.) — Elbf. (C.) — Kref. [Ulbr.], Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **roboris** Suffr. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck mit Wenck. vid. — nicht Elbf., wie in *F.*, nicht in *C.* — Kob., St. (R.) — *H. N.* —

Orchestes Ill.

1. **quercus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kref. - Samml. Fischer — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **rufus** Schrk. — Kref. (B. - ruf. Ol.) - daher in Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **alni** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth (R.) — *H. N.* ...

4. **pilosus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - ilicis F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C. u. G.) — *H. W. N.* —

5. **erythropus** Germ. — Aach., Kref. (F. - erythr. Müll.) - Kref. in Samml. Bruck - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

6. **jota** F. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

7. **fagi** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **testaceus** Müll. — Aach., Kref. (F. - scutellaris F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —

a. **carnifex** Germ. — *F.* für Aach. [Fürst.], Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] — in Samml. Bruck nicht aus Rhp., auch nicht in C. — doch *H. W. N.* —

a. **semirufus** Gyll. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - Elsaß, Bayern u. a. [Schilsky II.] —

a. **pubescens** Stev. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. — Elbf. (Corn. - C.) — *W.* —

9. **loniceræ** Hbst. — Bopp. (B.) — Kref. - Samml. Bruck — *W. N.* —

10. **rusci** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

11. **avellanae** Donov. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - signifer Creutz.) — Elbf. (C.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**pratensis** Germ. — *G.* für Elbf. [3 aus Samml. Stachelhausen] - das übersandte Belegst. war fagi - Schilsky vid. — Doch *H.*, daher wohl im Grenzgebiet. —]

12. **decoratus** Germ. — Aach. (F. - dec. Schüpp.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Kref. (Ulbr.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **rufitarsis** Germ. — Kref. [1 - Brink] in Samml. R. - K. Dan. vid. — Brüggen b. Kempen (3 - Heym.) — *W. N.* —

14. **salicis** L. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C. u. G.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

15. **stigma** Germ. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

16. **populi** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Nev. (de R.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

17. **foliorum** Müll. — Aach., Kref. (F. - saliceti F.) — Elbf. (C.) — Winnen, Vallendar (R.) — *H. W. N.* —

Rhamphus Clairv.

1. **pulicarius** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - flavidornis Clairv.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **subaeneus** Ill. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63) - Belegst. aus Samml. Fuß K. Dan. vid. — Metz, Rheinbayern u. a. [Schilsky II.] —

Mecinini.

Mecinus Germ.

1. **janthinus** Germ. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. N.* —

2. **pyraster** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Laach. See, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**circulatus** Marsh. — Schilsky II. für Westdeutschl. · nicht auf Rhp. auszudehnen, nur Elsaß u. Rheinbayern [Schilsky briefl.] —]

Gymnetron Schönh.

1. **labile** Hbst. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Nev. (C.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**ictericum** Gyll. — *F.* für Kref. [vom Bruck - ict. Schönh.] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - im Osten. —]

2. **pascuorum** Gyll. — Bopp. (B.) — Kob., Rhens (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **rostellum** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. - Samml. Corn. als melanarium - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

[**melanarium** Germ. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - das Belegst. in Samml. Corn. ist das in *C.* für Elbf. nicht angeführte rostellum - K. Dan. vid. —]

4. **vilosulum** Gyll. — Bopp. [Bach] u. Siebengbg. - Samml. Bruck — *H. N.* —

5. **beccabungae** L. — Kref. (Mink - *F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — *H. W. N.* —

6. **veronicae** Germ. — Aach., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**asellus** Grav. = cylindriostre Gyll. — *F.* [asellus] für Aach., Kref. [vom Bruck] u. Duisb. - ebenso *B.* II. 380 - cylindr. in *B.* II. 381 ausdrücklich nicht für Rhp. — In Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —]

7. **tetrum** F. — Elbf. (C. u. G.) — Ahrw. (Fuß) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) - Reitt. vid. — St. Goar, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. subrotundatum Reitt. = antirrhini Germ. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (2 - Samml. Stachelhausen - G.) — St. (K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

8. **antirrhini** Pk. = noctis auct. — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 83) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — Tönnisstein (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

9. **hispidum** Brull. = pilosum Gyll. — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 84) — Bopp. (B.) — Elbf. (G.) — Nev. (de R.,

Westf. Pr. 98) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid.
— H. N. —

10. **melas** Boh. — Kleve, Ahrw., je 1 unter anderen Arten in Samml. Fuß - K. Dan. vid. — Nord- u. Mitteleuropa [Cat. Col.] —

11. **netum** Germ. — Aach., Ahrtal (*F. - ellipticum* Hbst.) - Ahrw. in Samml. Fuß - K. Dan. vid. — Bopp., erzogen (Bach, Berl. E. Z. 58 S. 370) — *F.* für Elbf. [Corn.] - in *C.* nicht angegeben. — H. N. —

12. **thapsicola** Germ. — Bopp., Kirn (*B.*) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Deutschl., Frankr. [Cat. Col.] —

13. **collinum** Gyll. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — H. N. —

14. **bipustulatum** Rossi = *spilotum* Germ. — Rhens, U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — N. —

15. **linariae** Pz. — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 84) — Bopp. (*B.*) - daher, nicht Kref., wie *F.* angibt, in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — H. W. N. —

Miarus Steph.

[**longirostris** Gyll. — *B.* für Bopp. - nicht *W. N.*, *H.* bei Breda - sonst im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

1. **graminis** Gyll. — Düssdf., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Mosel (Gabr.) — Kob., St. (K. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

2. **micros** Germ. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — H. W. N. —

3. **plantarum** Germ. — Aach. (*F. - plant. Dej.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — H. W. N. —

4. **campanulae** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, St. Goar, St. (R.) — H. W. N. —

Cionini.

Cionus Clairv.

1. **tuberculosus** Scop. — Rhp. (*F. - verbasci F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

2. **scrophulariae** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

3. **hortulanus** Geoffr. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - *G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Wiedtal, St. (R.) — H. W. N. —

4. **thapsi** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C. - similis* Müll.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — W. N. —

5. **Olivieri** Rosensch. — Aach. (Fürst. - *F.*) — Bopp. (*B.*) — Col. Neerl. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck. — W. N. —

6. **olens** F. — Bopp. (B.) — Ahrtal - Samml. Bruck — Trier, zahlreich (Mühlf.) — *H. N.* —

7. **alauda** Hbst. = *blattariae* F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf., Nev. (C) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

8. **pulchellus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Elbf. (G.) — U. Ahr (Heyd.) — Tönnisstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **solani** F. — Elbf. (C. u. G.) — Tönnisstein (R.) — *H. W. N.* —

10. **fraxini** Deg. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Nanophyini.

Nanophyes Schönh.

1. **globulus** Germ. — Kref. (Mink u. vom Bruck - F.) - daher in Samml. Bruck — *H. W. N.* —

2. **flavidus** Aub. — Ahrw. in Samml. Fuß - K. Dan. vid. - Belegst. für die Angabe von *gracilis* Redtb. in Berl. E. Z. 58 für Ahrw. — Elsaß [Schilsky II.] —

3. **marmoratus** Goeze — Rhp. (F. - *lythri* F.) — Kref., Bopp. (B.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **ruficollis** Rey — U. Nahe (R.) — Soden i. Taunus [Heyd.] —

Magdalinini.

Magdalis Germ.

1. **memnonia** Gyll. — Duisb. (Heym.) — Kref. - 1 - Samml. Fischer — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. - K. Dan. vid. — *W. N.* —

2. **phlegmatica** Hbst. — Aach. (F.) — Kref. (B.) - daher in Samml. Bruck u. [von Brink] in Samml. R. — Bonn (Geilenk.) - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

3. **nitida** Gyll. — Duisb. (2 - Heym.) — Bonn (1 - Fuß) jetzt in Samml. R. - K. Dan. vid. — *W. N.* —

4. **violacea** L. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - K. Dan. vid. — Elbf., Nev. (G.) - Nev. in Samml. Geilenk. - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

5. **frontalis** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. - Samml. Geilenk. — St. - Samml. R. — K. Dan. vid. omn. — *H. W. N.* —

6. **duplicata** Germ. — Kref., Bopp. (B.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (G.) — Duisb. (Urb.) — Bopp. (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

7. **armigera** Geoffr. — Aach. (F. - *stygia* F.) — Elbf. (C. - *aterrima* F.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Wiedtal, Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

8. **carbonaria** L. — Aach. (*F.* - *atramentaria* Germ.) — Kref., Bopp. (*B.*) - Kref. nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

9. **cerasi** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Trier (R.) — *H. W. N.* —

10. **barbicornis** Latr. — Aach. (*F.* - auch *rhina* Gyll.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (R.) — *H. W. N.* —

11. **nitidipennis** Boh. — Ahrw. - Samml. Fuß — Soon (1 - R.) — *H. N.* —

12. **ruficornis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *pruni* L.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Duisb. [Urb.], Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **flavicornis** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) jetzt in Samml. R. - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Apionini.

Apion Hbst.¹⁾.

[Belegst. für die aus der vom Bruckschen Sammlung entnommenen Fundorte von Wencker bestimmte, soweit nicht neuere Bestimmung angegeben.]

1. **brunnipes** Hbst — Kref. (*F.* - *laevigatum* Kirb.) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Aach., Bopp. (*B.* II 192) — *H. N.* --

2. **confluens** Kirb. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. - Belegst. Schilsky vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

3. **stolidum** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — *B.* II. 189 für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

4. **carduorum** Kirb. — Aach. (*F.* - *gibbirostre* Gyll.) — Bopp. (*B.* II. 191) — Elbf. (*C.*) — Kref., Siebengbg. - Samml. Bruck — St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **onopordi** Kirb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 190) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **penetrans** Germ. — Aach. (*F.*) — Kref. (*B.* II. 190) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

7. **fuscirostre** F. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 210) — Elbf. (*C.*) — St. (R.) — *H. W. N.* —

— **genistae** Kirb — *F.* u. *B.* für Kref., Homberg, Bopp., u. Fuß für Ahrw. treffen wohl sämtlich gen. auct. = *compactum* Desbr. - so wenigstens gen. Kirb. in Samml. Bruck u. Fuß - K. Dan. vid. — Entsprechend wohl auch *W.* 229. — Damit als deutsche Art - in Schilsky II. nur Rhp. angeführt - zweifelhaft. —

1) Ap. *basicorne* Ill., in *F.* für Aach. [Först.], heute zu *carduorum* Kirb., blieb ungedeutet. —

8. **compactum** Desbr. — Siebengbg., Kreuzn. in Samml. Bruck als gen. Kirb. - Ahrw. in Samml. Fuß als gen. Kirb. - K. Dan. vid. omn. — hierhin jedenfalls gen. Steph. u. Kirb. in *F.* u. *B.* von Homberg, Bopp. — *H. N.* - *W.*? [gen. Kirb.] —

9. **hungaricum** (Desbr.) Wagner — Homberg, Siebengbg. in Samml. Bruck als difficile Hbst. — Ahrw. in Samml. Fuß als difficile Hbst. — Kob. in Samml. Mühlf. — Soon in Samml. R. — K. Dan. vid. omn. — Harz u. im Osten u. Südosten von Deutschl. [Münch. K. Z. III. 29] — Ob die älteren Angaben von difficile Hbst in *B.* für Bopp., Saarbr., in *C.* u. *G.* für Elbf., hierhin oder zu corniculatum Germ. = diff. auct. zu stellen - dieses in Schilsky II. für ganz Deutschl. - bleibt fraglich. —

10. **difficile** (Hbst.) Schilsky — Homberg - Samml. Bruck — Bonn (R.) - K. Dan. vid. omn. — *H. N.* —

11. **ochropus** Germ. — Bopp. (*B.* II. 189) — Elbf. (*C.* u. - Reitt. vid. - *G.*) — Bonn, St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

12. **pomonae** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **craccae** L. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 188) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

14. **cerdo** Gerst. — Ahrw. (*B.* II. 457) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. - Schilsky vid. -- Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — *H. W. N.* —

[**v. consanguineum** Desbr. — Schilsky II. für Rhp. - doch in Mitteilg. der schweizerischen entom. Gesellschaft 1872 S. 187 [woher die Angabe - Schilsky briefl.] beschrieben nur aus „Bavière Rhénane“. —]

15. **opeticum** Bach — Ahrw. (Fuß) - aus Samml. Fuß Schilsky vid. -- *H. W. N.* —

16. **subulatum** Kirb. — Aach., Düssdf. (*F.* - auch Marshami Steph.) — Bopp. (*B.* II. 188) — Elbf. (*C.* u. *G.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Schilsky vid. — Ahrtal - Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

17. **aeneum** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. - Reitt. vid. - *G.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —

18. **radiolus** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 191) — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — *H. W. N.* —

19. **ebeninum** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 201) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

20. **laevigatum** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - sorbi Hbst. u. Sahlbergi Schönh.) — Bopp. (*B.* II. 206) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

21. **Hookeri** Kirb. — *B.* II. 190 für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —

22. **dispar** Germ. — Rheinland [Kraatz] u. Kref. - Samml. Bruck — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W.* —

23. **urticarium** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *vernale F.*) — Bopp. (*B.* II. 193) — Elbf. (*C.* u. - Reitt. vid. - *G.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

24. **flavofemoratum** Hbst. — Bopp. (*B.* II. 192) — Rhens (K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

25. **pallipes** Kirby. — Aach., Kref. (*F.*) - Aach. (Geilenk.) — Bopp. (*B.* II. 193) — *H. N.* —

26. **semivittatum** Gyll. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63 - Ger. mari Walt.) - Belegst. aus Samml. Fuß Schilsky vid. — *N.* —

27. **rufirostre** *F.* — Aach., Kref. (*F.* - rufir. Germ.) — Kob., Bopp. (*B.* II. 192) — U. Solg. (*G.*) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — *H. W. N.* —

28. **pubescens** Kirby. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

29. **seniculus** Kirby. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 199) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **curtulum** Desbr. — Unter den Stücken des pubescens von Kref. 1 in Samml. Bruck - Schilsky vid. — Fundort nicht am Stück, daher vielleicht unrichtig, zumal nicht *H. W. N.* — Nordwestfrankreich [Col. Neerl.] —

30. **vicinum** Kirby. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

31. **atomarium** Kirby. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 190) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

32. **elongatum** Germ. — St. (1 - K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

33. **rubens** Steph. — Bopp. (*B.* II. 194) — H. Venn [le Roi] in Samml. R. - Schilsky vid. — *H. W. N.* —

34. **sanguineum** Deg. — Aach. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — *H. W. N.* —

35. **frumentarium** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - frum. L. u. haematodes Stm.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Wiedthal, Vallendar, Nettetal, St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

36. **cruentatum** Walt. — Bopp. (*B.* II. 194) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (Schilsky vid. - R.) — *H. N.* —

37. **miniatum** Germ. — Aach., Kref. (*F.*) — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

38. **filirostre** Kirby. — Aach. (*F.* - morio Germ.) — Kref. (*B.* II. 201) — Elbf. (*C.*) — Ahrtal - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Kob. (Reitt. vid. - Bockl.) — *H. W. N.* —

39. **nigritarse** Kirby. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 195) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

40. **flavipes** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - flav. F.!) - in *B.* II. 195 und noch Cat. Col. 1877 = flav. Pk. — Elbf. (*C.* - flav. F.) - Belegst. aus Samml. Corn. Schilsky vid. — Kref. (Ulbr.) - Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

41. **dissimile** Germ. — Laach. See - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Schilsky vid. — *H. W. N.* —
42. **ononicola** Bach — Aach., Kref. (*F.* - ononidis Gyll.) — Bopp. (*B.* II. 195) — Loef (Gabr.) — *H. N.* —
43. **assimile** Kirb. — Rhp. (*F.* - assim. Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
44. **apricans** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 196) — Elbf. (*C.*) — Kref. Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
45. **varipes** Germ. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 197) — Elbf. (*C.*) — Siebengbg. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
46. **aestivum** Germ. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) - in *B.* II. 196 trifolii L. — Elbf. (*C.*) — Kref. [Fischer] in Samml. R. - Schilsky vid. — *H. W. N.* —
- a. ruficrus** Germ. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 196) — *W. N.* —
47. **malvae** F. — Kref., Kob., Bopp. (*B.* II. 193) - Kob., Rheinanlagen (Geilenk) — U. Solg. (G.) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — Bonn (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
48. **curtirostre** Germ. — Aach. (*F.* - humile Germ.) — Kref., Bopp. (*B.* II. 208) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Ulbr.], U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —
49. **simum** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —
50. **sedi** Germ. — Aach. (*F.*) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
51. **brevirostre** Hbst. — Aach., Kref. (*F.* - brev. Ol.) - Kref. in Samml. Bruck. — *N.* —
52. **affine** Kirb. — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
53. **marchicum** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. [Brink] in Samml. R. - Reitt. vid. — *H. W. N.* —
54. **violaceum** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 208) — Elbf. (*C.*) — Duisb (Wagner vid. - Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R) — *H. W. N.* —
- [**hydrolapathi** Marsh. — *F.* für Kref. [vom Bruck - hydrol. Gyll.] - von *B.* II. 209 nicht aufgenommen - in Samml. Bruck der Namenszettel mit Kref., die Stücke nur mit Ostende u. a. bezeichnet. — *H. —*]
55. **minimum** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (Schilsky vid. - R) — *H. W. N.* —
56. **Gyllenhali** Kirb. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (*B.* II. 199) - daher nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —
57. **platalea** Germ. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

58. **Spencei** Kirb. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —
59. **vorax** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B. II. 202) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —
60. **viciae** Pk. — Aach. (F. - *viciae* Kirb.) — Kref., Bopp. (B. II. 195) — Elbf. (C.) — St. (R.) — *H. W. N.* —
 a. **Griesbachi** Steph. — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) —
61. **pisi** F. — Aach. (F. - *pisi* Megl.) — Kref., Bopp. (B. II. 206) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
62. **punctigerum** Pk. — Aach., Kref. (F. - *punct.* Germ.) — Elbf. (C.) — Bonn (Schilsky vid. - R.) — *H. N.* —
63. **aethiops** Hbst. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. (Ulbr.) - Reitt. vid. — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Kob. (Bockl.) - Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
64. **immune** Kirb. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck und Geilenk. — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Mosel (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
65. **striatum** Kirb. — Aach., Kref., Bopp. (B. II. 199) — Elbf. (C.) — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Tönnisstein, Montjoie (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
66. **pavidum** Germ. — Aach. (F. - *plumbeum* Schönh.) — Kref. (B. II. 203.) — U. Solg., Nev. (G.) — Kob. (Gabr.) — *W. N.* —
67. **ervi** Kirb. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B. II. 200) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe, St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
68. **simile** Kirb. — Aach. (F. - *superciliosum* Gyll.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Bonn (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
69. **melancholicum** Wenck. — Bonn, Venusberg, massenhaft auf *Lathyrus silvestris* (Fuß) - Belegst. K. Dan. vid. — Würtemberg u. i. Osten [Schilsky II.] —
70. **ononis** Kirb. — Aach. (F. - auch *glaucinum* Schönh.) — Bopp. (B. II. 200) — Elbf. (C.) — Loef (Gabr.) — *H. W. N.* —
71. **elegantulum** Germ. — Kref. (F.) — Elbf. (C.) — U. Nahe (i - Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
72. **astragali** Pk. — Kref. (F.) — Kob. (B. II. 205) — Laach. See (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
73. **virens** Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B. II. 206) — Elbf. (C.) — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
74. **tenuē** Kirb. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

75. **meliloti** Kirb. — *B.* Ent. Kl. für Bopp. - in der Fauna II. 205 nicht wiederholt. — Elbf. (Reitt. vid. - G.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

76. **loti** Kirb. — Aach., Kref (F.) — Bopp. (*B.* II. 200) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

77. **columbinum** Germ. — Ahrtal - Samml. Bruck, nicht Kref., wie *B.* II. 204. — Elbf. (C.) — Kreuzn. (Schilsky vid. - Heyd.) — Bonn (Fuß) — Kob. (R.) — *W. N.* —

— **punctirostre** Gyll. — Fuß, Berl. E. Z. 58, für das Ahrtal, zahlreich - in Samml. u. Sammlungsverzeichnis Fuß ganz fehlend — Beckers, D. E. Z. 92, für Rheydt [Schmidti Bach] — Nicht *H. W. N.* - in Schilsky II. nur aus Sachsen u. dem Süden u. Osten. —

78. **reflexum** Gyll. — Andernach, Bopp. (*B.* II. 205) — Elbf. (C.) — Ahrw. (Geilenk.) — Saarl (Gabr.) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Rhynchitinae.

Rhynchites Schneid.

1. **betulae** L. — Rhp. (F. - bet. L.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **Mannerheimi** Humm. — Aach., Kref. (F. - megacephalus Germ) - Kref. u. Ahr in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob. (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

3. **nanus** Pk. — Aach., Kref. (F.) - nicht auch Elbf. [Corn.], wie F. angibt, nicht in C. — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

4. **tomentosus** Gyll. — Elbf. (Corn. - C. - uncinatus Thoms.) — Nev. (Heyd. vid. - de R., Westf. Pr. 98) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

5. **coeruleocephalus** Schall. — Herrstein (Tischbein - *B.* II. 172) — Rochusberg b. Bingen, jenseits der Gebietsgrenze [Dorm.] - Belegst. in Samml. R. — *N.* —

6. **olivaceus** Gyll. — Bopp. (*B.* II. 456, 176 - ophthalmicus Steph.!) — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Heyd. vid. — Kleve, Düssdf. (Everts, D. E. Z. 92) — Kref. - Samml. Bruck — Stommeln - Samml. Raderm. — Winningen (Bockl.) — Bertrich [1 - Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

7. **cavifrons** Gyll. = pubescens Hbst. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (G.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **sericeus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **germanicus** Hbst. — Aach., Düssdf. (F. - minutus Hbst.!) —

— Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — U. Solg. (G. - min. Gyll.) — Kref. (Ulbr.) — St. (R.) — H. W. N. —

10. **aeneovirens** Marsh. — Aach., Kref., Bopp. (F. - obscurus Megl.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — St. (R.) — H. W. N. —

11. **interpunctatus** Steph. — Kref. (B.) — Elbf. (1 - C. - alliariae Pk.) — Aach. (G. - all. Pk.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

12. **pauxillus** Germ. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kref. [Ulbr.], Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

13. **aequatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Düssdf., Gerolstein (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

14. **cupreus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

15. **coeruleus** Deg. — Rhp. (F. - conicus Ill.) — U. Solg. (G.) — St. (R.) — H. W. N. —

16. **auratus** Scop. — Bopp. (B. Ent. Kl.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Saffenburg a. d. Ahr [1 - Reichensp.] in Samml. R. — H. W. N. —

17. **Bacchus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - auch laetus Schüpp.) — Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Byctiscus Thoms.

1. **populi** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

2. **betulae** L. = betuleti F. — Rhp. (F. - betuleti F.) — Elbf. (C. - alni Müll.) — Nev. (de Rossi - G. - v. fastuosus de Rossi) — U. Ahr (Heyd.) — St. (R.) — H. W. N. —

a. **violaceus** Scop. — U. Ahr. (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — N. —

Attelabus L.

1. **nitens** Scop. — Rhp. (F. - curculionoides L.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

Apoderus Ol.

1. **coryli** L. — Rhp. (F.) u. Elbf. (C.) - jedenfalls nur a avellanae, die aus Rhp. allein in den Samml. — Stammform auch nicht H. W. N. —

a. **avellanae** L. — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Nemonychidae.

Rhinomacer F.

1. **attelaboides** F. — Aach., Kref. (F.) - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

Diodyrrhynchus Schönh.

1. **austriacus** Ol. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck u. [von Ulbr.] Samml. R. — Düssdf. (B.) — Benrath (G.) — Hild. H. (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — H. W. N. —

Ipidae.

Ecoptogastrini.

Ecoptogaster Hbst.

1. **scolytus** F. = **destructor** Ol. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — Kref., Kempen, Hamborn (Borgers in Krefeld, Verh. Nat. Ver. 09 E. S. 34 - mit Reitt. vid.) — St. (R.) — H. W. N. —

— **Ratzeburgi** Janson — **destructor** Ol., in *F.* für Aach., Kref., Düssdf., Elbf., nach der damaligen Nomenklatur und *B.* II. 140. 452 hierhin zu stellen - trifft gleichwohl sicher den *scolytus* F. - Ratzeb. Jans. auch nicht von Kref. in Samml. Bruck, von Elbf. nicht in Verz. C. — Sonst nicht angegeben, doch *H. W. N.* —

2. **pygmaeus** F. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W.* —

3. **mali** Bechst. = **pruni** Ratzb. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

v. **piri** Ratzb. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — *H. W. N.* —

a. **castaneus** Ratzb. — Kref., Bopp. (*B.* - cast. Koch) — *H. W. N.* —

— **carpini** Ratzb. — Col Neerl. für Rhp. - Quelle? — *W. N.* —

4. **intricatus** Ratzb. — Aach. (*F.* - inr. Koch) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (G.) — Kref. - Samml. Bruck — Löhndorf (1 - Raderm.) — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

5. **rugulosus** Ratzb. — Aach., Kref. (*F.* - rug. Koch) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **multistriatus** Marsh. — Aach. (*F.*) — Elbf. (C.) — Kref. (Borgers in Krefeld, Verh. Nat. Ver. 09 E. S. 34 - mit Reitt. vid.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 ♂ - Bockl.) — St. (1 ♂ - R.) — *H. N.* —

v. ulmi Redtb. — *B. II.* 452 für Aach. — Nicht *H. W. N.* - in Schilsky II. sonst nur Österreich. —

Hylesinini.

Phloeophthorus Wollast.

1. **rhododactylus** Marsh. — Aach. (daher nach einem Stück beschrieben - *F.* - Polygr. tarsalis Först.) — Bopp. (*B. II.* 145) — Laach. See - Samml. Bruck — Montjoie (R.) — *H. W. N.* —

Phthorophloeus Rey.

1. **spinulosus** Rey = *rhododactylus* Chap. et auct. — Aach. (Först. - *F.* - *rhododact.* Marsh.!) — *H. N.* —

Phloeosinus Chap.

1. **thujae** Perr. — Kreuzn., in Gärtnereien in alten Thuja-Stämmen von Paul Weise gfd. (Weise briefl.) — *N.* —

Hylesinus F.

1. **crenatus** F. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Fuß — Elbf. (*C. u. G.*) — Duisb. (Urb.) — Kochem (R.) — *H. W. N.* —

2. **oleiperda** F. — Saarl. (von Degenhardt - Heyd.) — Laach. See (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. N.* —

3. **fraxini** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Myelophilus Eichh.

1. **piniperda** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **minor** Hartig — Aach. (Först. - *F.*) — *H. N.* —

Dendroctonus Er.

1. **micans** Kugel. — Hertogenwald b. Eupen (Brink) — Soon (R.) — Nach Zeitungsangaben um 1894 im Gebiet des Maifelds schädlich. — *W. N.* —

Hylastinus Bed.

1. **obscurus** Marsh. = *trifolii* Müll. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Sayntal, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Kissophagus Chap.

1. **hederae** Schmidt — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *N.* —

— **pilosus** Ratzb. — *F.* für Aach. [Först. - *pilos.* Knoch] — *W.*, nicht *H. N.* —

Carphoborus Eichh.

1. **minimus** F. — Aach. (Först. - *F.*) — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — *H. N., W.?* —

Polygraphus Er.

1. **pubescens** F. — Bopp. (*B.* II. 452) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Soon (R.) — *H. W. N.* —

Hylurgus Latr.

1. **ligniperda** F. — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kottenforst [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Hylastini.**Hylastes** Er.

1. **ater** Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **cunicularius** Er. — Elbf. (*C.*) — Soon (R.) — *H. W. N.* —

3. **linearis** Er. — Elbf. (1 - Geilenk. - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Heyd. vid. — *H. N.* —

4. **angustatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —

v. attenuatus Er. — Düssdf. (*F.*) — Saarbr. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kref. (Ulbr.) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —

5. **opacus** Er. — Aach. (*F.* - op. Ill.) — Saarbr. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

— **glabratu**s Zett. — Elbf. (1 - Eppelsh. vid. - *G.*) - ob eingeschleppt? - nicht *H. W. N.* - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

6. **palliatus** Gyll. — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Düssdf. (Hens) — Kob. (Bockl.) — H. Venn [le Roi], Soon (R.) — *H. W. N.* —

Crypturgus Er.

1. **pusillus** Gyll. — *G.* für Elbf., in Staubpilzen, sehr häufig [Drescher u. Ostheide] - die Aufenthaltsangabe macht die Bestimmung zweifelhaft — Brohltal (Andr.) - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

[**cinereus** Hbst. — Col. Neerl. für Rhp. — Nicht *H. W. N.* - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —]

Thamnurgus Eichh.

1. **Kaltenbachi** Bach — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) - vielleicht nur rechtsrheinisch [nach *N.* 379] — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 73) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Pfaffendorf b. Kob. (Bockl.) — *N.* —

Ipini¹⁾.**Cryphalus** Er.

1. **abietis** Ratzb. — *F.* für Bopp. [Bach] - in *B.* nicht für

1) Bostr. carinatus Waltl, in *F.* für Homberg [Pliester], blieb ungedeutet. —

Rhp. — Nev. (de Rossi - *G. - tiliae* Gyll.) — Löhndorf [Raderm.] in Samml. R. - Reitt. vid. — *H. W. N.* —

2. **fagi** F. — Bopp. (*B.* II. 183 - *fagi* Nördl.) - daher (Heyd.) — Elbf. in Samml. Corn. unter anderer Art - Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

3. **tiliae** Pz. — Elbf. (*C.*) — Jülich (von Eichhoff - Heyd.) — *H. W. N.* —

[**granulatus** Ratzb. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl) - nicht *H. W. N.* - im Norden u. Osten [Schilsky II.] —]

4. **asperatus** Gyll. — Rhp. (Zebe) — Rhp. (Letzner - Samml. Gabr.) — Rheinland (Hagedorn, Münch. Kol. Z. II. 231) - wie Anfrage ergab, daher in Samml. Koltze durch Rechnungsrat Degenhardt gelangt - Fundort wohl, wie bei *Agrilus Guerini*, Saarl. — *H. W. N.* —

Pityophthorus Eichh.

1. **Lichtensteini** Ratzb. — Ahrw. (Hubenth. vid. - Geilenk.) — *N.* —

2. **ramulorum** Perr. — Pyrmont i. oberen Elztal (Everts - Col. Neerl.) — *H.* —

3. **micrographus** L. — Aach. (*F.* - *pityogr.* Ratzb.) — Elbf. (*C.*) — Borbeck, Kref. (Hubenth. vid. - Geilenk.) — *W. N.* —

— **exsculptus** Ratzb. — Trédl, Entomol. Blätter 1907 S. 42, für Rheinland - weiteres nicht bekannt. — *N.* —

Pityogenes Bed.

1. **chalcographus** L. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Horchheim (Mühlf.) — Brohltal ($\sigma\varphi$ - Andr.) — Soon (in Menge - Reitt. vid. - R.) — *W. N.* —

2. **bidentatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *bidens* F.) — Kref. - 1 σ - Samml. Ulbr. — Elbf. (*C.*) - daher im Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — U. Ahr. (Heyd.) — Horchheim [1 σ - Mühlf.] in Samml. R — *H. W. N.* —

Ips Deg. = **Bostrychus** F.

1. **sexdentatus** Boerner — Aach., Kref. (*F.* - *stenographus* Dft.) - Kref. in Samml. Bruck — Hild. H. (Geilenk.) — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

[**amitinus** Eichh. — Schilsky II. für Rhp. - Quelle? - nicht *W. N.*, in *H.* —]

2. **typographus** L. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — *W. N.* —

— **acuminatus** Gyll. — *F.* für Aach. [Fürst.] — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. aus Samml. Corn. verloren. — Nicht *H. N.* —

W. 239 anscheinend mit Bedenken - sonst über ganz Deutschl.
[Schilsky II.] —

3. **laricis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn,
St. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **suturalis** Gyll. — Kref. (F. - sut. Dej.) — Elbf. (C.) — Belegst.
aus Samml. Corn. Reitt. vid. — Nev. (G.) — Duisb. (Urb.)
— *H. W. N.* —

5. **curvidens** Germ. — Elbf. (1 - C.) — Nev. (G.) — Kob.
(Bockl.) — *W. N.* —

Taphrorychus Eichh.

1. **bicolor** Hbst. — Aach., Düssdf. (F.) — *W. N.* —

Xylocleptes Ferr.

1. **bispinus** Dft. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) - daher u. Düssdf.
in Samml. Bruck — Elbf. (G.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H.
W. N.* —

Dryocoetes Eichh.

1. **autographus** Ratzb. — Elbf. (C. u. Geilenk.) — Duisb.
(Urb.) — Brohlthal (Andr.) — Bonn [Frings], St. Goar (R.) —
H. W. N.

2. **alni** Georg — Eupen (2 - Heym.) — Deutschl., Frankreich
[Cat. Col.] —

3. **villosus** F. — Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Jülich
(Eichh., Berl. E. Z. 66) — Duisb. (Urb.) — Bonn [Frings], Düssdf.
[Hens.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

4. **coryli** Perris — Elbf. (1 - Eichh. det. - C. - u. Eichh., Berl.
E. Z. 64) — Brohlthal (1 - Reitt. vid. - R.) — *W. N.* —

Coccotrypes Eichh.

dactyliperda F. — Aach. (F.) — Bopp. (B. II. 135) — *W.* -
u. durch den Handel über Europa verschleppt [Cat. Col.] —.

Xyleborus Eichh.

[**cryptographus** Ratzb. — Col. Neerl. für Rhp. - doch nur
N. —]

1. **Saxeseni** Ratzb. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) - Aach. in
Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Sayntal, Kob., Soon (R.) — *H.
W. N.* —

2. **dryographus** Ratzb. — Bopp. (B.) - daher in Samml.
Bruck — Elbf. (C.) — Laach. See (R.) — *W. N.* —

3. **monographus** F. — Bopp. (B.) — Kob. (Bockl.) — Col.
Neerl. für Düssdf. — *W. N.* —

4. **dispar** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - disp. Hellw.) — Elbf.
(C.) — Horchheim (B.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Xyloterus Er.

1. **domesticus** L. — Düssdf. (F.) — Elbf. (C. u. G.) — St. (R.) — *H. W. N.* —
2. **signatus** F. — Elbf. (C. u. G.) — Düssdf. (von Crumbach zahlreich gfd. - Fuß, Berl. E. Z. 65 - *quercus* Eichh.) — *W.* —
3. **lineatus** Ol. — Aach. (F. - lin. Gyll.) — Elbf. (C.) — Soon (R.) — *H. W. N.* —

Platypini.

Platypus Hbst.

1. **cylindrus** F. — Bopp. (B.) — Soon (v. Geyr) — Kob. (1 - R.) — *W. N.* —

Lucanidae.

Lucanini.

Lucanus L.

1. **cervus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hamborn (Schneid.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —
- v. **capreolus** Füssl. — Elbf. (G.) — Ahrtal (Heyd., Societ. entomol. 97) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
- v. **pentaphyllus** Reiche — Ahrtal (Übergangsstücke zur Stammform - Fuß, Berl. E. Z. 65) — Hessen u. a. [Schilsky II.] —

Dorcus Mac Leay.

1. **parallelepipedus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Nev., U. Solg. (G.) — Marxloh (Schneid.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Systemocerus Weise = **Platycerus** auct.

1. **caraboides** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Nev. (G.) — Mörs (Schneid.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- v. ♀ **rufipes** Hbst. — Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Sinodendrini.

Sinodendron Hellw.

1. **cylindricum** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

Scarabaeidae.

Troginae.

Trox F.

1. **perlatus** Goeze — Düssdf., Bopp., Kreuzn. (F.) — Landskron (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. N.* —

2. **sabulosus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Siegmdg [Frings], Bonn, Trier (R.) — H. W. N. —
 3. **hispidus** Laichart. — Kob. (1 - Bockl.) — H. W. N. —
 4. **scaber** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kreuzn. (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —
 5. **Perrisi** Fairm. — U. Ahr (1 - Heyd. - nidicola Bonn.) — Nicht H. W. N. - Aschaffenburg [Flach, D. E. Z. 79 - Haroldi n. sp.] u. Frankreich [Cat. Col.]
 [Eversmanni Kryn. — Col. Neerl. für Rhp. - doch nur N. —]

Coprophagi.

Aphodiini.

Psammobius Heer.

[**porcicollis** Ill. — F. für Düssdf. [Braselm.] - von B. nicht aufgenommen - nicht H. W. N. - Südeuropäer. —]

1. **sulcicollis** Ill. — Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — U. Solg. (G.) — Duisb. (Heym.) — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

Rhysssemus Muls.

1. **asper** F. — Aach., Kref. (F. - germanus L.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (2 - J. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

Diastictus Muls.

— **vulneratus** Stm. — W. N., in H. bei Roermond an der Gebietsgrenze - wohl in Rhp. noch aufzufinden. —

Pleurophorus Muls.

1. **caesus** Pz. — Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — H. N. —

Oxyomus Lap.

1. **silvestris** Scop. — Rhp. (F. - porcatus F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Aphodius Ill.

1. **erraticus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (R.) — H. W. N. —

2. **subterraneus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — St. (R.) — H. W. N. —

a. **fuscipennis** Muls. — Saarl. (Gabr.) — N. —

3. **foscor** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Sayntal, Manderscheid, Daun, St. (R.) — H. W. N. —

- a. **silvaticus** Ahr. — Elbf. (1 - G.) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — W. N. —

4. **haemorrhoidalis** L. — Rhp. (F.) — Elbf., U. Solg. (G.) — H. W. N. —
5. **brevis** Er. — Walporzheim (Fuß) — Trier (2 - Mühlf.) — H. W. —
6. **foetens** F. — Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — H. W. N. —
7. **fimetarius** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —
8. **scybalarius** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — H. W. N. —
- a. **conflagratus** Ol. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Saarl. (Gabr.) —
9. **granarius** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —
- a. **Ragusanus** Reitt. — Kreuzn., U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — [hydrochoeris] F. — Erichs., Ins. D. III. 821 für Rheinl. u. Westf. - F. für Elbf. [Corn.] - so auch B. I. 354 — Angaben schon in W. 147 berichtigt, doch in C. noch für Elbf. — Was jetzt an Belegst. in Samml. Corn. sich befindet, ist sordidus. — Nicht H. W. N. - Südeuropäer. —]
10. **sordidus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — St. (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —
- v. **quadripunctatus** Pz. — U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — N. —
11. **rufus** Moll. — Düssdf., Bopp. (F. - rufescens F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — H. W. N. —
12. **lugens** Creutz. — Strotzbüsch i. Eifel (1 - Schilsky vid. - R.) — Belgisch Luxemburg [Col. Neerl.] u. W. —
13. **nitidulus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Nev. (C.) — Gerolstein (R.) — H. W. N. —
14. **ater** Deg. — Kref. (F. - terrestris F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — H. W. N. —
- v. **convexus** Er. — Nev. (de Rossi - G.) — H. —
15. **corvinus** Er. — Duisb. (1 - Urb.) - jetzt in Samml. R. — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — Laach. See (1 - R.) — Nicht H. W. N. - im Süden u. Osten [Schilsky II.] —
16. **varians** Dft. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - F. - bimaculatus F.) - in B. I. 356 das Fehlen in Rhp. betont, doch Düssdf. sicher richtig, da bei Kref. die a. ambiguus. — H. W. N. —
- a. **ambiguus** Muls. — Kref. - 1 - Samml. Bruck als niger Stm. - Belegst. Reitt. vid. —
17. **plagiatus** L. — Aach. (Fürst. - F.) — H. W. —
18. **niger** Pz. — Elbf. (1 - C.) — Kob., U. Nahe, St. (J. Dan. vid. - R.) — H. N. —

19. **rhododactylus** Marsh. — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W.* —
20. **merdarius** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Wesel (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
21. **scrofa** F. — Aach., Kref., Bopp. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf., U. Solg. (G.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schnur) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
22. **tristis** Pz. — Aach., Kref. (F. - trist. Zenk.) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (G.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — *H. W. N.* —
23. **pusillus** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —
- v. rufulus** Muls. — Elbf. - Samml. Corn. - Belegst. Heyd. vid. —
24. **quadrimaculatus** L. — Aach. (F.) — Nev. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Strotzbüsch i. Eifel (1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
25. **biguttatus** Germ.
- a. similis** Schilsky — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — Belg., N. —
- [**obscurus** F. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - daher nicht in Samml. Bruck - nicht *H. W. N.* —]
26. **porcus** F. — Kref. (F.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (B. I. 361) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —
27. **pictus** Stm. — Elbf. (1 - G.) - Belegst. aus Samml. Geilenk. Heyd. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
28. **sticticus** Pz. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Laach. See, Kob. (je 1 - J. Dan. vid. - R. — *H. W. N.* —
- [**conspurcatus** L. — *F.* für Kref. (Mink u. vom Bruck) - schon von B. I. 359 nicht aufgenommen - in Samml. Bruck u. [Lange briefl.] Samml. Mink nicht aus Rhp. — *N.* —
29. **melanostictus** Schmidt — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —
30. **inquinatus** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
- a. nubilus** Pz. — Saarl. (Gabr.) —
31. **tessulatus** Pk. — Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —
32. **obliteratus** Pz. — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — *H. W. N.* —
33. **contaminatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Preiß) — Viersen [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —
34. **prodromus** Brahm — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **pubescens** Stm. — *G.* für Elbf. [1 - Drescher u. Ostheide] mit? — Nicht *H. N.* - für *W.* angegeben - anscheinend mehr im Süden. —

35. **punctatosulcatus** Stm. — Nach *B. I.* 363 überall gemein — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

a. **marginalis** Steph. — Saarl. (Gabr.) — *N.* —

— **consputus** Creutz. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] u. Elbf. [Corn.] - nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl) - von Elbf. nicht in Verz. *C.* — *G.* für Elbf. [Drescher u. Ostheide] — Nicht *H. N.*, *W.* 146 anscheinend mit Vorbehalt - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

[**bimaculatus** Laxm. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr. - bipunctatus F.] - in *B. I.* 356, vielleicht gegenüber *F.*, das Fehlen in Rhp. betont - nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl). — Nicht *H. W. N.* — im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

36. **rufipes** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Schneifel [le Roi], Nettetal (*R.*) — *H. W. N.* —

37. **luridus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl. u. *R.*) — *H. W. N.* —

a. **nigripes** F. — Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — *N.* —

38. **depressus** Kugel. — Aach., Bopp. (*F.* - depr. *F.*) — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] - nach Samml. Bruck und Verz. *C* unrichtig. — *H. W. N.* —

a. **atramentarius** Er. — St. (*R.*) —

Heptaulacus Muls.

1. **testudinarius** F. — Düssdf. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Trier (Mühlf. u. *R.*) — *H. W. N.* —

Aegialiini.

Aegalia Latr.

1. **rufa** F. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - Fundstelle Rheinufer [Erichs., Ins. D. III. 919] — Düssdf., Rheinufer (Braselm. - Fuß) - daher in Samml. Fuß — Hild. H. (1 - Geilenk.) — *H. W.* [1 Stück], *N.* [Mainz, Schierstein] —

[**sabuleti** Pk. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - auch in die Fauna Germanica übergegangen - Quelle? — Vorkommen nicht nachweisbar, sicher auch unrichtig - nicht *H. W. N.* —]

Geotrupini.

Odontaeus Klug.

1. **armiger** Scop. — Rhp. (*F.* - mobilicornis *F.*) — Elbf. (*C.*) — Aach. (Urb.) — Soon (v. Geyr) — M.-Gladbach, Bonn, Siegmdg. [Frings u. le Roi], Elztal (*R.*) — *H. W. N.* —

Ceratophyus Fisch.

1. **Typhoeus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Marxloh (Schneid.) — Duisb. (Urb.) — Siegburg (Voigt) — Brohltal (Andr.) — Kottenforst (R.) — *H. W. N.* —

Geotrupes Latr.

1. **mutator** Marsh. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Mülheim a. Rhein (Geilenk. - v. chlorophanus Westh.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **spiniger** Marsh. — Aach. (*F.* - putridarius Eschh.) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **stercorarius** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

v. foveatus Marsh. — Elbf. (1 - *C.*) — Nev. (de Rossi - G.) — Kleve - Samml. Fuß. — *W.* —

4. **niger** Marsh. = *hypocrita* Serv. — Ohligs (Geilenk. - *C.*) — Hild. H., häufig (G.) - daher in Samml. R. - J. Dan. vid. — Belg. u. *H. W.* verbr. — In Rhp., wie auch in *W.* nach *W. XIV*, erst in neuerer Zeit aus dem Norden eingewandert, noch nicht in *B.* —

5. **stercorosus** Scrib. = *silvaticus* Pz. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — Angabe der v. *nigrinus* Muls. in *G.* für Elbf. nach Mitteilg. Geilenk. unrichtig. — *H. W. N.* —

6. **vernalis** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Hild. H., U. Solg. (G.) — Kob. (Bockl.) — Wahner Heide, Bertrich [Frings], Strotzbüsch (R.) — *H. W. N.* —

Coprini.**Gymnopleurus** Ill.

[*Mopsus* Pall. — Schnur für Trier [pilularius Hbst.] - in Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

— **cantharus** Er. — B. I. 341 für Bingen - vielleicht Fund von Bach, den *F.* für seinen hierhin gehörigen *Mopsus* Pall. von Bingen als Gewährsmann anführt. — *N.* [Mainz] - an der U. Nahe vielleicht noch aufzufinden. —

Sisyphus Latr.

1. **Schäfferi** L. — Hunsrück (B. I. 342) — Gerolstein, 1888 (1 - Geilenk.) - dort, 1878 (1 - R.) — Belg. [Col. Neerl.], *N.* —

Oniticellus Serv.

1. **fulvus** Goeze — Saarbr. (B. - *flavipes* F.) — Trier (Schnur) — Belg. [Col. Neerl.], *N.* —

Onthophagus Latr.

1. **Amyntas** Ol. — *F.* für Homberg [Pliester - Hübneri F.] — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß — Bertrich (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — *N.* [1] —

2. **taurus** Schreb. — Mörs, Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — U. Solg. (G. - rugosus Poda) — Hild. H. (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
3. **ovatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
4. **semicornis** Pz. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß — *N.* —
5. **verticicornis** Laich. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - nutans F.) — U. Solg. (G.) — Soon (v. Geyr u. R.) — *W. N.* —
6. **fracticornis** Preyssl. — Rhp. (F. - fract. F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Kochem (R.) — *H. W. N.* —
7. **coenobita** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
8. **lemur** F. — Laach. See (Fuß) — Kob. (Bockl. u. Preiß) — *W. N.* —
9. **vacca** L. — Rhp. (F) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —
- v. **medius** Pz. — Elbf. (C.) — Kleve - Samml. Fuß — *W.* —
10. **nuchicornis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Caccobius Thoms.

1. **Schreberi** L. — Bonn (Fürst. - F.) - in Samml. Fürst ohne Fundort - von Bonn auch nicht weiter bekannt geworden - doch wohl richtig, da *H. W. N.* — Trier (Schnur) —

Copris Geoffr.

1. **lunaris** L. — Rhp. (F.) — Düssdf. (B.) — Kleve, Düssdf. (Fuß) — Wesel (Geilenk.) — Trier (Schnur) — vor Jahrzehnten auch auf dem Rodderberg (de Maes, Bonn) — *H. W. N.* —

Sericinae.

Serica Mac Leay.

1. **brunnea** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Maladera Muls.

1. **holosericea** Scop. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Homaloplia Steph.

- **ruricola** F. — Schnur für Trier — Elsaß [Schilsky II. - die v. *atrata* Geoffr.] - daher wohl richtig. — *W. N.* —

Melolonthinae.

Rhizotrogus Latr.

1. **marginipes** Muls. — Duisb. (häufig - Heym.) — *N.* —
- v. **foveolatus** Bach — Kob., Bopp. (B. I. 334) - daher beschrieben, Stett. E. Z. 50, unter Betonung des Unterschieds von

der in die Fauna aufgenommenen Stammform · nur auf den Höhen des Rheintals u. dem Hunsrück (Berl. E. Z. 58, S. 269) Bopp. in Samml. Bruck — Kob. in Samml. Fuß — Duisb. (Heym.) —

2. **aestivus** Ol. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — U. Ahr b. Heimersheim, häufig (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Trier (Mühlf.) — . *W. N.* —

Amphimallus Latr.

1. **solstitialis** L. — Aach., Kref., Bopp., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Ruhrtort, U. Solg. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. **ochraceus** Knoch — Kob.-Lützel (1 - Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — *N.* —

2. **ater** Hbst. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Ahr, auf dem Gipfel der Landskron, Ende Juni frühmorgens (Heyd.) — Gerolstein (Geilenk.) — Kaisersesch (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Strotzbüschn u. Brockscheid i. Eifel (R.) — *H. W. N.* —

3. **ruficornis** F. — Kref. (*F.*) — Aach., Kob., Bopp., Sobernheim (*B.*) — Wesel - Samml. Fuß — U. Ahr (1 - b. Heimersheim-Heyd.) — Brohl (Frings) — Laach. See - Samml. Bertkau — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

4. **assimilis** Hbst. — Karthause b. Kob. (von Wirtgen - Heyd.) — Melbtal b. Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — Nicht *H. W. N.* - Elsaß. —

Melolontha F.

1. **hippocastani** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref., Kleve in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Finkenberg b. Beuel u. Tannenbusch b. Bonn (Frings) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

v. **nigripes** Com. — Kleve - Samml. Bruck. — *H. N.* —

2. **vulgaris** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) -- Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **albida** Redtb. — Saarl. (Gabr.) — Elbf. (Geilenk.) — *W. N.* —

a. **pulcherrima** D'Torre — Saarl. (Gabr.) — *W.* —

a. **lugubris** Muls. — Elbf. (3 - G.) -- Kob., Jünkerath (Bockl.)

— *W. N.* —

a. **discicollis** Muls. — Kob. (Bockl.) —

a. **ruficollis** Muls. — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

3. **pectoralis** Germ. — Kob. bis über die Gebietsgrenze rheinaufwärts, bei Bopp. ziemlich häufig (*B.* - *albida* Dej. - Verh. Nat. Ver. II. 19 - *rhennana* Bach) — Ahrw. [Fuß] u. Kreuzn. (Heyd.) — Laach See (Fuß, Berl. E. Z. 59, u. R.) — Kob. (Bockl.) -- *N.* —

[**Polyphylla** Harr.

fullo L. — In *H. N.* verbr., nicht in *W.*, fehlt in Rhp. —

Soll bei Düssdf. vorkommen, was Fuß verneint; auch Geilenk. in Hild. H. kennt ihn nicht aus Rhp. —]

[**Anoxia** Lap.

villosa F. — Col. Neerl. für Rhp. - Irrtum, beruhend auf Fund bei Mainz [Ev. briefl.] --]

Hoplinae.

Hoplia Ill.

1. **praticola** Dft. — Trier (Schnur) - dort zahlreich (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. - Heyd. vid. — *N.* —

2. **philanthus** Füßl. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schnur-argentea F.) — Saarl. (Heyd. - ripicola Muls.) — Gerolstein, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. **farinosa** L. — H. Venn (Fred.) — U. Ahr b. Heimersheim (1 - Heyd.) — Rheinland ohne näheren Fundort - Samml. Bertkau - Belegst. Heyd. vid. — *N.* —

— **graminicola** F. — Schnur für Trier — *W. N.*, u. über ganz Deutschl. [Schilsky II.] - daher wohl möglich. —

Rutelinae.

Anomala Sam.

1. **aenea** Deg. — Kref., Düssdf. (F. - Frischi F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (G.) — Borbeck (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Kordel b. Trier [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. tricolor D'Torre — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe (R.) —

[**vitis** F. — F. für Düssdf. [Braselm.] - schon in B. I. 411 bezweifelt - nicht *H. W. N.* - im Süden. —]

Phyllopertha Kirb.

1. **horticola** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — M.-Gladbach, Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. ustulatipennis Villa — Duisb. (1 - Reitt. vid. - Heym.) —

Anisoplia Serv.

1. **segetum** Hbst. — Kref., Düssdf. (F. - fruticola F.) - Kref. nicht in Samml. Bruck — U. Solg. (v. Hagens - G.) — *H. W. N.* —

2. **agricola** Poda — Kleve, Laach. See (Fuß) — Wahner Haide (Frings) — Winningen (Bockl.) — Kreuznach - Samml. Bruck — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

[**Dynastinae.**]

Oryctes Ill.

nasicornis L. — *H. W. N.* — für Rhp. nicht nachweisbar u., wie schon B. I. 323 bemerkt, wohl fehlend - nicht Aach. [Frings], Ahrw. [Fuß], St. [R.], Orten mit viel Gerbereibetrieb. —]

Valginae.

Valgus Scriba.

1. **hemipterus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Trichiinae.

Osmoderma Serv.

1. **eremita** Scop. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — Orsoy, Marxloh (Schneid.) — Elsenborn, Kob. (Bockl.) — Bonn, im Hofgarten (Bertkau u. Frings) — Sinzig (Andr.) — Trier (Schnur) — *H. W. N.* —

Gnorimus Serv.

1. **variabilis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Mörs (Schneid.) — Borbeck, Rheydt (Geilenk.) — Bonn (Frings) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schnur) — *W. N.* —

v. **Heydeni** Beckers — Rheydt (daher beschrieben - Beckers, D. E. Z. 88) - dort an der Niers, verbr. (Geilenk.) —

2. **nobilis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Mörs (Schneid.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Trichius F.

1. **fasciatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Nev., U. Ahr (Stammform - Heyd.) — *H. W. N.* —

a. **dubius** Muls. — Nev. (von de Rossi - Heyd.) —

a. **commutatus** de Rossi — Nev. (daher beschrieben - d. R., Verh. Nat. Ver. 82) — *N.* —

a. **abbreviatus** Muls. — Nev. (daher beschrieben - de R., Verh. Nat. Ver. 82 - Erichson) - daher (Heyd.) —

a. **pulchellus** de Rossi — Nev. [wie abbreviatus] — Bonn (Heyd. vid. - R.) —

a. **vulgaris** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] — Hohe Acht (Heyd.) — Bonn, Kob. (Heyd. vid. - R.) — *N.* —

a. **Fabricii** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] — *N.* —

a. **abruptus** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] —

a. **succinctus** F. — Nev. (de R., Verh. Nat. Ver. 82) — Kochem (Heyd. vid. - R.) —

a. **Linnei** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] —

a. **divisus** Muls. [= confluens de Rossi nach Mitteilg. Heyd.] — Nev. [wie abbrev.] —

a. **Beckersi** Geilenk. — Elbf. (daher beschrieben - Geilenk. [nec Schilsky], D. E. Z. 92 S. 207, u. G.) —

2. **zonatus** Germ. — die Art [Stammform nur im Süden]: Bopp. (B. - abdominalis Mén.!) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

v. gallicus Heer — Rheydt (Geilenk.) — Linz, Neuenahr (Heyd.) — Bonn (R.) —

3. sexualis Bed. — Kob. (3 ♀ - Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — St. Goar (1 in Samml. Everts - Ev. briefl.) — Frankfurt [Heyd.] — Odenwald, Darmstadt [Ent. Blätter 1909 Nr. 9] - sonst im Osten. —

Cetoniinae.

Tropinota Muls. = **Epicometis** Burm.

1. **hirta** Poda — Bopp. (*F. - hirtella* L.) — Laach. See - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Finkenberg b. Beuel (R.) — N. —

Oxythyrea Muls.

1. **funesta** Poda — Rhp. (*F. - stictica* L.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

Cetonia F.

1. **aurata** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

a. **piligera** Muls. — Kob. (1 - Preiß) - Belegst. Heyd. vid. —

a. **purpurata** Heer — Elbf. (*G. - cuprifulgens* Muls.) — N. —

Liocala Thoms.

1. **marmorata** F. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Neandertal (*G.*) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

Potosia Muls.

1. **aeruginosa** Drury = *speciosissima* Scop. — Bopp. (*B.*) — Kob. u. Niederlahnstein, Gebietsgrenze (Bockl.) — Trier (Schnur-fastuosa F.) — Horchheim (von einem Koblenzer Sammler - R.) — N. —

2. **affinis** Andersch — Meisenheim i. Nahegebiet, Saarbr. (*B.*) - nicht auch Bopp., wie *F.* angibt. — N. —

3. **cuprea** F.

v. **metallica** Hbst. = *floricola* Hbst. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F. - metallica* F.) — Elbf., Nev. (*C. u. G. - floricola* Hbst.) — Bonn, Kob. (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —

v. **Fieberi** Krtz. — Düssdf. - 1 - Samml. Fuß - Heyd. vid. — Sonst im Süden u. Osten [Schilsky II.] —

Nachtrag.

- S. 18. Die Eichhoffsche Sammlung ist nach N. Amerika verkauft worden bis auf die Bostrychiden, die noch von Eichhoff für eine wissenschaftliche Arbeit nach Frankreich verschickt waren und dort verschollen sind [Mitteilung des Hauptlehrers Kratz zu Vallendar, Sammelfahrten von Eichhoff in seiner Hambach-Jülicher Zeit.]
- S. 29. 30. *C cancellatus* v. *carinatus* Charp. — daß eine bisher als *car.* Charp. betrachtete Form in der Rheinprovinz bes. um Koblenz verbreitet sei, wird von Born, Entomol. Bl. 1911 S. 138, beiläufig angegeben. —
- S. 41. *Ophonus 4a. cordatus* Dft. — Kreuzn. [1 - Reichensp.] in Samml. R. - K. Dan. vid. — *W. N.* —
- S. 51. *Pterost. 19a. aethiops* Pz. — Eupen (Heym.) - damit, wie vermutet, in Rhp. —
- S. 62. *Agab. melanarius* — Hertogenwald [Heym.] —
- S. 73. *Trogophl. punctatellus* Er. — inzwischen noch bei Erpel (1 - Reichensp.) —
- S. 97. *Bryocharis 3. inclinans* Grav. — Elbf. (Corn. - C.) — Kleve - Samml. Fuß — Brohltal (Andr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
- S. 111. *Ath. 69a. myrmecobia* Krtz. — Oberwinter [2 - Reichensp.] in Samml. R. - Bernh. vid. — *W. N.* —
- S. 112. *Ath. triangulum* — noch Laach. See (1 - Heym.) —
- S. 114. *Ath. 101a. macrocera* Thoms. — Brüggen b. Kempen (1 - Heym.) — Nord- und Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —
- S. 120. *Oxyp. 5a. lateralis* Mannh. — Eupen (1 - Heym.) — Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —
- S. 135. *Ecanus glaber* F. — der angebliche Fund von Corn. schon von Westhoff [*W. 109*] zu *Agyrtes bicolor* gestellt, doch in *C. 27* wieder als *Hadrambe glabra*. —
- S. 174. *Monotoma 4a. brevipennis* Kunze — Eupen (Heym.) — *N. verbr.* —
- S. 179. *Atomaria 5a. diluta* Er. — Eupen (Heym.) — Österreich, Deutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —
- S. 222. *Ischnom. sanguinicollis* — Petersberg i. Siebengbg. (Heym.). —
- S. 291. *Liosoma oblongulum* — Fundangabe Hertogenwald zu löschen. —

Verzeichnis der Gattungen.

Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.

Abax 49.	Amauronyx 126.	Astilbus 117.
Abdera 230.	Amphicyllis 138.	Astrapaeus 95.
Ablattaria 135.	Amphimallus 334.	Atemeles 118.
Abraeus 147.	Amphotis 167.	Atheta 106, 338.
Absidia 157.	Anacaena 151.	Athous 211.
Acalles 298.	Anaesthetis 245.	Atomaria 179, 338.
Acalyptus 308.	Anaglyptus 244.	Attagenus 202.
Acanthocinus 244.	Anaspis 228.	Attalus 160.
Acanthoderes 244.	Anatis 195.	Attelabus 321.
Acanthoscelides 275.	Ancylochira 213.	Autalia 104.
Achenium 84.	Ancyrophorus 72.	Axinotarsus 160.
Acidota 71.	Anisodactylus 46.	
Acilius 65.	Anisoplia 335.	Badister 41.
Acmaeops 237.	Anisosticta 192.	Bagous 296.
Acritus 147.	Anisotoma 137.	Balaninus 307.
Acrognathus 72.	Anisoxya 230.	Balanobius 307.
Acrolocha 69.	Anobium 220.	Baptolinus 86, 345.
Acrotrichis 142.	Anomala 335.	Baris 306
Acrlia 68.	Anommatus 189.	Barynotus 285.
Actobius 86.	Anoncodes 222.	Barypithes 281.
Acupalpus 44.	Anoplus 310.	Batophila 267.
Adalia 192.	Anoxia 335.	Batrisodes 126.
Adelocera 205.	Anthaxia 214.	Batrirus 126.
Adimonia 263.	Antherophagus 178.	Bembidion 33.
Adonia 192.	Anthicus 225.	Berosus 150.
Adosomus 288.	Anthobium 68.	Betarmon 210.
Adrastus 208.	Anthocomus 161.	Bibloplectus 126.
Aegialia 331.	Anthonomus 308.	Bibloporus 126.
Aegosoma 236.	Anthophagus 72.	Bidessus 58.
Agabus 61, 338.	Anthracus 45.	Blaps 233.
Agapanthia 245.	Anthrenus 203.	Blechrus 54.
Agarciphagus 137.	Anthribus 276.	Bledius 75.
Agathidium 138.	Apate 217.	Blethisa 32.
Agelastica 261.	Aphanisticus 216.	Blitophaga 134.
Agenus 188.	Aphidecta 192.	Boletophagus 234.
Agonum 52.	Aphodius 328.	Bolitobius 97.
Agrilus 215.	Aphthona 268.	Bolitochara 104.
Agriotes 207.	Apion 315.	Borboropora 105.
Agyrtes 135.	Apistus 189.	Bostrychus F. 325.
Aleochara 123.	Apoderus 321.	Bostrychus Geoff. 217.
Aleuonota 106.	Apteropeda 271.	Brachida 102.
Alexia 190.	Araeocerus 276.	Brachonyx 308.
Allecula 231.	Argopus 272.	Brachyderes 283.
Allodactylus 299.	Aromia 242.	Brachygluta 126.
Allonyx 164.	Arpedium 71.	Brachynus 56.
Alophus 290.	Arthrolips 139.	Brachypterus 166.
Alosterna 239.	Asaphidion 33.	Brachysomus 281.
Alphitobius 235.	Aseumnus 241.	Brachytarsus 276.
Amalus 299.	Asida 233.	Brachyusa 106.
Amara 46.	Aspidiphorus 187.	Bradybatus 308.
Amarochara 119.	Astenus 81.	Bradyceillus 45.

Bromius 256.	Chaetocnema 265.	Corylophus 139.
Brontes 174.	Chalcoides 264.	Corymbites 205.
Broscus 33.	Chalcophora 213.	Corynetes 164.
Bruchidius 274.	Charopus 160.	Coryphium 72.
Bruchus Lin. 274.	Chennium 128.	Coryssomerus 306.
Bryaxis 127.	Chilocorus 196.	Cossonus 297.
Brychius 56.	Chilopora 119.	Craponius 299.
Bryocharis 97, 338.	Chlaenius 40.	Crataaraea 122.
Bryoporus 96.	Chlorophanus 286.	Crenitis 151.
Buprestis 213.	Choleva 130.	Creophilus 93.
Bytiscus 321.	Choragus 276.	Crepidodera 263.
Byrrhus 204.	Chromoderus 288.	Criocephalus 241.
Bythinus 127.	Chrysanthia 223.	Crioceris 250.
Byturus 165.	Chrysobothris 214.	Cryphalus 324.
Caccobius 333.	Chrysochloa 259.	Cryptaracha 173.
Caenocara 222.	Chrysomela 257.	Crypticus 234.
Caenocorse 235.	Cicindela 27.	Cryptobium 85.
Caenopsis 278.	Cicones 189.	Cryptocephalus 252.
Caenoptera 240.	Cidnorrhinus 299.	Cryptohypnus 208.
Caenoscelis 178.	Cionus 313.	Cryptophagus 176.
Calandra 307.	Cis 187.	Cryptopleurum 154.
Calathus 51.	Clambus 139.	Cryptorrhynchus 298.
Callicerus 116.	Claviger 128.	Crypturgus 324.
Callidium 242.	Cleonus 288.	Cteniopus 232.
Callimus 240.	Clerus 164.	Ctesias 203.
Callistus 40.	Clitostethus 197.	Cucujus 175.
Calodera 119.	Clinina 32.	Cybister 65.
Calosoma 28.	Clytanthus 243.	Cybocephalus 172.
Calvia 195.	Clytra 251.	Cychramus 172.
Calyptomerus 138.	Clytus 243.	Cyhrus 27.
Campylus 212.	Cnemidotus 57.	Cylindromorphus 216.
Cantharis 156.	Cneorrhinus 285.	Cylistosoma 143.
Carabus 28, 338.	Coccidula 198.	Cymbiodyta 152.
Cardiophorus 209.	Coccinella 193.	Cymindis 55.
Carphoborus 323.	Coccotrypes 326.	Cynegetis 191.
Carpophilus 166.	Coelambus 58.	Cyphocleonus 288.
Cartodere 184.	Coeliastes 299.	Cyphon 198.
Cassida 272.	Coeliodes 298.	Cyrtanaspis 228.
Cateretes 166.	Coelostoma 153.	Cyrtusa 137.
Catops 131.	Colaphus 256.	Cytinus 204.
Cephennium 129.	Colenis 137.	Dacne 182.
Cerambyx 240.	Colobicus 188.	Dadobia 116.
Cerapheles 161.	Colon 132.	Danacea 163.
Ceratophyus 332.	Colydiun 188.	Dascillus 205.
Cercus 166.	Colymbetes 64.	Dasycerus 183.
Cercyon 153.	Combocerus 182.	Dasytes 161.
Cerocoma 227.	Conioleonus 287.	Deleaster 72.
Cerophytum 212.	Conopalpus 231.	Demetrias 55.
Cerylon 190.	Conosoma 97.	Dendroctonus 323.
Cetonia 337.	Copelatus 63.	Dendrophagus 175.
Ceuthorrhynchidius 300.	Copris 333.	Dendrophilus 145.
Ceuthorrhynchus 301.	Coprophilus 72.	Denops 163.
Chaetarthria 153.	Coptocephala 252.	
	Coraebus 214.	
	Corticaria 184.	

Denticollis 212.	Epicometis 337.	Gronops 290.
Dermestes 202.	Epilachna 191.	Grypidius 294.
Derocrepis 263.	Epipolaeus 291.	Gymnetron 312.
Deroplia 245.	Epithrix 264.	Gymnopleurus 332.
Diacanthus 206.	Epuraea 167.	Gymnusa 101.
Diachromus 46.	Eremotes 297.	Gynandrophthalma 251.
Dianous 80.	Ergates 236.	Gyrinus 65.
Diaperis 234.	Erirrhinus 294.	Gyrophaena 102.
Diastictus 328.	Ernobius 220	
Dibolia 271, 345.	Esolus 200.	Habrocerus 100.
Dicerca 213.	Euaesthetus 80.	Habroloma 216.
Dictyopterus 155.	Eubria 199.	Haliplus 57.
Dinarda 123	Euenemis 213.	Halomenus 229.
Dinopsis 100.	Euconnus 130.	Haltica 267.
Diodyrrhynchus 322.	Euglenes 225.	Halyzia 195.
Diplocoelus 182.	Eulissus 86.	Haplocnemia 245.
Ditoma 188.	Euplectus 125.	Haplocnemus 162.
Dolicaon 84.	Euryalea 120.	Haploderus 74.
Dolichosoma 162.	Euryporus 96.	Harpalus 42.
Dolichus 52.	Eurythyrea 214.	Hedobia 219.
Dolopius 207.	Euryusa 104.	Helichus 200.
Domene 83.	Eusomus 283.	Helmis 201.
Donacia 247.	Eustrophus 229.	Helochares 152.
Dorcadion 244.	Euthia 129.	Helodes 198.
Dorcatoma 222.	Exocentrus 245.	Helophorus 147.
Dorcus 327.	Exochomus 196.	Helops 236.
Dorytomus 294.	Falagria 105.	Hendecatomus 187.
Drapetes 213.	Feronia 49.	Henoticus 176.
Drilus 160.	Formicomus 225.	Heptaulacus 331.
Dromaeolus 213.	Foucartia 281.	Hermaeophaga 267.
Dromius 55.	Galeruca 263.	Hetaerius 145.
Dryocoetes 326.	Galerucella 262.	Heterhelus 166.
Dryophilus 219.	Gasterocercus 298.	Heterocerus 201.
Dryophthorus 297.	Gastrallus 220.	Heterostomus 166.
Dryops 199.	Gastroidea 256.	Heterothops 95.
Drypta 56.	Gauropterus 86.	Hippodamia 191.
Dyschirius 32.	Gaurotes 237.	Hippuriphila 265.
Dytiscus 65.	Geodromicus 71.	Hispella 272.
Ebaeus 160.	Georyssus 201.	Hister 143.
Ecanus 135, 338.	Geotrupes 332.	Hololepta 143.
Eccoptogaster 322.	Gibbium 218.	Holoparamecus 186.
Elaphrus 32	Glischrochilus 173.	Homalisus 155.
Elater 210.	Globicornis 202.	Homaloplia 333.
Eledona 234.	Gnathocerus 235.	Homalota 103
Elleschus 309.	Gnathoncus 145.	Homoeusa 122.
Emphylus 178.	Gnorimus 336.	Hoplia 335.
Emus 93.	Gnypeta 106.	Hoplosia 245.
Encephalus 102.	Gonodera 232.	Hydaticus 64.
Endomychus 191.	Gonioctena 259.	Hydnobius 136.
Enicmus 184.	Gracilia 240.	Hydraena 149.
Ennearthron 188.	Grammoptera 239.	Hydrobius 151.
Enoplium 164.	Graphoderes 64.	Hydrochus 148.
Epaphius 39.	Grobbenia 179.	Hydrocyphon 199.
Ephistemus 181.		Hydronomus 296.

- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Hydrophilus 150. | Larinus 289. | Macronychus 201. |
| Hydroporus 59. | Lasioderma 221. | Magdalitis 314. |
| Hydrothassa 260. | Latelmis 200. | Malachius 161. |
| Hydrous 150. | Lathridius 183. | Maladera 333. |
| Hygrobia 57. | Lathrimaeum 70. | Malthinus 158. |
| Hygronoma 101. | Lathrobium 83. | Malthodes 159. |
| Hygrotus 58. | Lathropus 175. | Mantura 265. |
| Hylastes 324. | Lebia 54. | Masoreus 54. |
| Hylastinus 323. | Leja 33 | Mecaspis 287. |
| Hylecoetus 217. | Leistus 30. | Mecinus 312. |
| Hylesinus 323. | Lema 250. | Medon 82. |
| Hylobius 290. | Leptacinus 85. | Megapenthes 210. |
| Hylotrupes 242. | Leptidea 240. | Megarthrus 67. |
| Hylurgus 324. | Leptinotarsa 257. | Megasternum 154. |
| Hymenalia 232. | Leptinus 139. | Megatoma 202. |
| Hypebaeus 160. | Leptura 238. | Melandrya 231. |
| Hypera 291. | Leptusa 104. | Melanimon 234. |
| Hyperaspis 196. | Lepyrus 286. | Melanophthalma 185. |
| Ilyphhydrus 58. | Lesteva 71. | Melanotus 209. |
| Hypnoidus 209. | Leucoparyphus 100. | Melasia 235. |
| Hypocassida 272. | Leucosomus 287. | Melasis 212. |
| Hypocyptus 100. | Licinus 41. | Melasoma 261. |
| Hypoganus 207. | Lignyodes 309. | Meleus 290. |
| Hypophloeus 235. | Limnebius 153. | Meligethes 169. |
| Hypulus 231. | Limnichus 204. | Meloë 226. |
| Idolus 210. | Limnius 200. | Melolontha 334. |
| Ilybius 63. | Limnobaris 307. | Mesocoelopus 222. |
| Ilyobates 118. | Limnoxenus 151. | Mesosa 245. |
| Ipidea 167. | Limobius 293. | Metabletus 54. |
| Ips Deg. 325. | Limonius 211. | Metoecus 227. |
| Ips Fabr. 173. | Lina 261. | Metopsia 67. |
| Ischnodes 210. | Liocola 337. | Miarus 313. |
| Ischnomera 222, 338. | Liodes 136. | Micrambe 176. |
| Isorhipis 213. | Lionychus 54. | Micraspis 194. |
| Ityocara 119. | Liophloeus 285. | Micrelus 301. |
| Kissophagus 323. | Liopus 244. | Microcara 198. |
| Labidostomis 251. | Liosoma 291, 338. | Microglossa 122. |
| Laccophilus 61. | Liparus 290. | Microlestes 54. |
| Laccobius 152. | Lissodema 224. | Micropeplus 66. |
| Lachnaea 251. | Litargus 186. | Microzoum 234. |
| Lacon 205. | Lithocharis 82. | Micrurula 168. |
| Laemophloeus 175. | Lixus 288. | Minyops 290. |
| Laemostenus 51. | Lochmaea 262. | Mniophila 271. |
| Lagria 231. | Lomechusa 118. | Molops 49. |
| Lamia 244. | Longitarsus 269. | Molorchus 239. |
| Lamprinus 98. | Lorocera 32. | Molytes 290. |
| Lamprinodes 98. | Lucanus 327. | Monochamus 244 |
| Lamprohiza 155. | Ludius 208. | Mononychus 298. |
| Lamprosoma 256. | Luperus 262. | Monotoma 174, 338. |
| Lampyris 155. | Lycoperdina 190. | Mordella 227. |
| Langelandia 189. | Lyctus 217. | Mordellistena 227. |
| Laricobius 165. | Lygistorpterus 155. | Morychus 204. |
| | Lymexylon 217. | Mycetaea 190. |
| | Lythraria 264. | Mycetochara 232.[345. |
| | Lytta 227. | Mycetophagus 186, |

Mycetoporus 96.	Olophrum 71.	Pedilophorus 204.
Mycterus 224.	Omalium 69.	Pentaphyllus 235.
Myelophilus 323.	Omias 282.	Perileptus 39.
Mylacus 279.	Omophlus 233.	Peritelus 279.
Myllaena 101.	Omophron 31.	Peryphus 33.
Myrmecoxenus 189.	Omosiphora 168.	Phaedon 261.
Myrmedonia 117.	Omosita 168.	Phalacrus 182.
Myrmetes 145.	Oncomera 223.	Phausis 155.
Myrrha 195.	Oniticellus 332.	Pheletes 211.
Mysia 194.	Ontholestes 92.	Philonthus 87.
Nanophyes 314.	Onthophagus 332.	Philorinum 70.
Nargus 131.	Onthophilus 146.	Philydrus 151.
Nebria 31.	Oodes 41.	Phloeobium 67.
Necrobia 164.	Ooty whole 181.	Phloeocharis 67.
Necrodes 134.	Opatrum 234.	Phloeodroma 118.
Necrophorus 133.	Ophonus 41, 338.	Phloeonomus 70.
Necydalis 299.	Opilo 163.	Phloeophilus 163.
Nemadus 132.	Orchesia 230.	Phloeophthorus 323.
Nemosoma 165.	Orchestes 310.	Phloeopora 118.
Neobisnius 86.	Orectochilus 66.	Phloeosinus 323.
Nephantes 141.	Orina 259.	Phloeostichus 175.
Nephus 197.	Orithales 207.	Phloeotrya 230.
Neuraphes 129.	Orobitis 306.	Phosphaenus 155.
Niptus 218.	Orochares 70.	Phosphuga 135.
Nitidula 169.	Orphilus 203.	Phratora 260.
Nosodendron 203.	Orsodacne 249.	Phrydiuchus 300.
Nossidium 140.	Orthocerus 189.	Phthorophloeus 323.
Notaris 294.	Orthochaetes 296.	Phyllobius 279.
Noterus 61.	Orthoperus 140.	Phyllobrotica 261.
Notiophilus 31.	Orthopleura 164.	Phyllodecta 260.
Notothecta 116.	Oryctes 335.	Phyllodrepa 69.
Notoxus 225.	Osmoderma 336.	Phyllopertha 335.
Novius 196.	Osphyra 231.	Phyllotreta 267.
Nudobius 85.	Ostoma 165.	Phymatodes 241.
Oberea 247.	Othius 86.	Phymatura 104.
Obrium 240.	Otiorrhynchus 277.	Phytobius 300.
Ocalea 119.	Oxylaemus 189.	Phytodecta 259.
Ochina 222.	Oxynirus 237.	Phytoecia 246.
Ochrosis 264.	Oxyomus 328.	Phytonomus 292.
Ochthebius 149.	Oxypoda 120, 338.	Pidonia 237.
Octotemnus 188.	Oxyporus 76.	Pissodes 293.
Ocys 38.	Oxytelus 74.	Pityogenes 325.
Ocyusa 120.	Oxythyrea 337.	Pityophagus 173.
Ocyusida 120.	Pachnephorus 256.	Pityophthorus 325.
Odacantha 56.	Pachybrachis 255.	Placusa 103.
Odontaeus 331.	Pachyta 237.	Plagiodes 261.
Oeceptoptoma 134.	Pachytychius 294.	Plagionotus 243.
Oedemera 223.	Paederus 81.	Planeustomus 72.
Olibrus 182.	Palorus 235.	Platambus 63.
Oligella 141.	Panagaeus 39.	Plateumaris 248.
Oligomerus 221.	Paramecosoma 176.	Platycerus 327.
Oligota 102.	Parnus 199.	Platycis 155.
Olisthopus 52.	Paromalus 145.	Platydema 234.
	Patrobus 39.	Platynaspis 196.
		Platypus 327.

Platyrrhinus	276.	Pycnomerus	189.	Silpha	134.
Platysoma	143.	Pygidia	158.	Silusa	104.
Platystethus	75.	Pyrochroa	225.	Silvanus	174.
Platystomus	276.	Pyrrhidium	242.	Simplocaria	204.
Platytarsus	281.	Pytho	223.	Sinodendron	327.
Plectroscelis	265.	Quedius	93.	Sipalia	116.
Plegaderus	146.	Reichenbachia	127.	Sisyphus	332.
Pleurophorus	328.	Rhagium	236.	Sitodrepa	221.
Plinthus	290, 291.	Rhagonycha	158.	Sitona	283.
Pocadius	172.	Rhamnusium	236.	Smicronyx	296.
Podabrus	156.	Rhamphus	311.	Soronia	167.
Podagrifica	263.	Rhantus	63.	Sospita	195.
Pogonochaerus	245.	Rhinocyllus	289.	Spercheus	150.
Polydrosus	280.	Rhinomacer	322.	Spermophagus	274.
Polygraphus	324.	Rhinoncus	300.	Sphaeridium	153.
Polyphylla	334.	Rhinosimus	224.	Sphaeriesthes	224.
Polystichus	56.	Rhizobius	198.	Sphaerites	165.
Poophagus	305.	Rhizophagus	173.	Sphaerius	140.
Porcinolus	205.	Rhizotrogus	333.	Sphaeroderma	272.
Potamophilus	199.	Rhopalodontus	188.	Sphaerosoma	190.
Potosia	337.	Rhopalopus	242.	Sphenophorus	307.
Prasocuris	260.	Rhynchites	320.	Sphindus	187.
Pria	169.	Rhyncolus	297.	Sphodrus	51.
Priobium	219.	Rhysodes	66.	Spondylis	236.
Prionocyphon	199.	Rhyssemus	328.	Staphylinus	91.
Prionus	236.	Rhytidosoma	299.	Stenelmis	200.
Prionychus	232.	Riolus	200.	Stenichnus	129.
Procas	293.	Rosalia	242.	Stenocarus	299.
Procraerus	210.	Sacium	139.	Stenochorus	237.
Pronomaea	101.	Saperda	246.	Stenolophus	44.
Propylaea	196.	Saprinus	145.	Stenopterus	240.
Prosternon	207.	Scaphidema	234.	Stenostola	246.
Proteinus	67.	Scaphidium	142.	Stenus	76.
Psalidium	285.	Scaphium	142.	Stethorus	197.
Psammobius	328.	Scaphosoma	142.	Stichoglossa	122.
Psammoecus	174.	Schistoglossa	116.	Stilicus	81.
Pselaphus	128.	Sciaphilus	281.	Stilbus	183.
Pseudobium	84.	Scirtes	199.	Stomis	49.
Pseudocleonus	287.	Sclerophaedon	260.	Strophosomus	282.
Pseudostyphlus	296.	Scopaeus	82.	Subcoccinella	191.
Psilothrix	162.	Scydmaenus	130.	Sunius	81.
Psylliodes	266.	Scymnus	197.	Symbiotes	190.
Ptenidium	140.	Scythropus	281.	Synaptus	208.
Pterostichus	49, 338.	Semiadalia	192.	Syncalypta	205.
Pteryngium	176.	Serica	333.	Synchita	188.
Pteryx	141.	Sericoderus	139.	Syntomium	72.
Ptilinus	221.	Sericus	207.	Synuchus	52.
Ptiliolum	141.	Sermyla	263.	Systemocerus	327.
Ptilium	141.	Seropalpus	230.	Tachinus	99.
Ptinella	141.	Siagonium	66.	Tachyporus	98.
Ptinus	218.	Sibinia	310.	Tachypus	33.
Ptomaphagus	132.	Silis	158.	Tachys	38.
Ptosima	214.			Tachyta	38.
Pullus	196.			Tachyusa	105.
Purpuricenus	242.				

Tachyusida 104.	Tillus 163.	Tropinota 337.
Tanymecus 286.	Timarcha 256.	Tropiphorus 289.
Tanysphyrus 296.	Tomoglossa 116.	Trox 327.
Taphria 52.	Tomoxia 227.	Trypopitys 221.
Taphrorychus 326.	Toxotus 237.	Tychius 309.
Tapinotus 305.	Trachodes 291.	Tychus 128.
Telephorus 156.	Trachyphloeus 284.	Typhaea 186.
Telmatophilus 176.	Trachys 216.	Tyrus 128.
Tenebrio 235.	Trechus 39.	Uleiota 174.
Tenebroides 165.	Triarthron 136.	Uloma 235.
Teredus 189.	Tribolium 235.	Urodon 275.
Teretrius 146.	Trichius 336.	Valgus 336.
Tetraplatypus 45.	Trichoceble 163.	Velleius 95.
Tetratoma 229.	Trichocellus 45.	Vibidia 195.
Tetropium 241.	Trichodes 164.	Xantholinus 85.
Tetrops 246.	Trichonyx 126.	Xestobium 220.
Thalassophilus 39.	Trichophya 100.	Xyleborus 326.
Thalycrea 172.	Trichopteryx 142.	Xyletinus 221.
Thamiaraea 117.	Trichotichnus 44.	Xylita 230.
Thamnurgus 324.	Trimium 125.	Xylocleptes 326.
Thanasimus 164.	Trinodes 203.	Xylodrepa 134.
Thanatophilus 134.	Triphyllus 186.	Xylodromus 70.
Tharops 213.	Triplax 181.	Xylonites 217.
Thea 195.	Tritoma 181.	Xyloterus 326.
Thectura 103.	Trixagus 213.	Xylotrechus 243.
Thiasophila 122.	Troglops 160.	Zabrus 46.
Thinobius 73.	Trogoderma 203.	Zeugophora 249.
Throscus 213.	Trogophloeus 73, 338.	Zyras 117.
Thymalus 165.	Trogosita 165.	
Thylacites 286.	Tropideres 276.	

Druckfehler.

- S. 86. *Baptolinus* Nr. 1 — statt longipes lies longiceps.
 S. 186. *Mycetophagus* Nr. 1 — statt quadripunctulatus lies quadri-pustulatus.
 S. 271. *Dibolia* Nr. 4 — statt rugolosa lies rugulosa.

Berichtigung.

Roettgen. Die Käfer der Rheinprovinz.

(Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen
Rheinlande und Westfalens. LXVIII. Jahrg. 1911.)

Durch ein Versehen sind beim Druck auf Seite 226 unter
Meloë die beiden folgenden Zeilen ausgefallen:

3. **autumnalis** Ol. — Bopp. (B.) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 61,
u. Heyd.) — *H. W. N.* —